LINNGANA
QK91
.C601
1796
t.2

CAROLI A LINNÉ

SYSTEMA VEGETABILIUM.

TOM. II.

Mo. Bot. Garden,
1894

CLASSIS XIII.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

† *calicibus superis.*

DISPERMA. *Sem.* 2. calice coronata.

†† *inferis.*
* *subquinquefidis.*

1236. PERILLA. *Stili* 2. *Stamina* distantia.
722. LEONURUS. *Antheræ* punctis osseis adspersæ.
714. GLECOMA. *Antherarum* paria cruciata.
709. HYSSOPUS. *Filamenta* distantia, recta. *Corolla* ringens.
713. MENTHA. *Filamenta* distantia, recta. *Corolla* subæqualis.
712. SIDERITIS. *Stigma* alterum vaginans alterum.
711. LAVANDULA. *Corolla* resupinata.
706. TEUCRIUM. *Corollæ* labium superius 0. 2partitum.
705. AJUGA. *Corollæ* labium superius staminibus brevius.
723. PHLOMIS. *Corollæ* labium superius hirtum.
718. BETONICA. *Corollæ* labium superius planum, ascendens, tubo cylindrico. *Stamina* longitudine faucis.
716. LAMIUM. *Corollæ* labium inferius utrinque dente setaceo.
717. GALEOPSIS. *Corollæ* labium inferius supra bidentatum.
POLLICHIA. *Corollæ* labium superius integrum, inferius sine dentibus ad faucem.
719. STACHYS. *Corollæ* labium inferius lateribus deflexum. *Stamina* deflorata ad latera deflexa.
710. NEPETA. *Corollæ* labium inferius crenatum. *Faux* margine reflexo.
707. SATUREIA. *Corolla* laciniis subæqualibus. *Stamina* remota.
720. BALLOTA. *Cal.* 10striatus. *Corollæ* labium superius fornicatum.
721. MARRUBIUM. *Cal.* 10striatus. *Corollæ* labium superius rectum.
724. MOLUCCELLA. *Cal.* campanulatus, corolla amplior, dentibus spinosis.

HYPTIS. *Cal.* turbinatus. *Cor.* labium inferius ſemibifidum.

* *Verbenæ multæ.*

** *calicibus bilabiatis.*

734. SCUTELLARIA. *Calix* fructiferus operculatus.
727. THYMUS. *Calix* fauce villis clauſus.
732. OCYMUM. *Corolla* reſupinata. *Filamenta* bina baſi proceſſu.

GLANDULARIA. *Germen* 4partitum. *Stil.* 2fidus, glandula inter utramque laciniam media.

735. PRUNELLA. *Filamenta* omnia apice bifurca.
736. CLEONIA. *Stigmata* 4.
733. TRICHOSTEMA. *Filamenta* longiſſima.
729. DRACOCEPHALUM. *Corollæ* faux inflato-dilatata.
726. ORIGANUM. *Strobilus* calices colligens.
725. CLINOPODIUM. *Involucrum* calices colligens.
708. THYMBRA. *Callix* utrinque linea ciliata carinatus. *Stilus* ſemibifidus. *Corollæ* labia plana.
731. MELITTIS. *Cal.* tubo corollæ amplior. *Corollæ* labium ſuperius planum integrum. *Antheræ* cruciatæ.
728. MELISSA. *Cal.* angulatus, ſcarioſus, labio ſuperiore aſcendente.
730. HORMINUM. *Cor.* laciniæ 4 ſubæquales, quinta majore emarginata.
737. PRASIUM. *Semina* baccata.
738. PHRYMA. *Semen* 1.

ANGIOSPERMIA.

* *corollis monopetalis.*

† *calicibus monophyllis.*

‡ *calicibus integris.*

408. CASTILLEIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* ringens. *Labium* inferius glandulis tubuloſis. *Cal.* tubuloſus longitudinaliter hians.

CONOBEA. *Capſ.* 1locularis, 4valvis, polyſperma. *Cor.* ringens. *Stigma* 2lobum. *Cal.* 5dentatus.

TANÆCIUM. *Bacca* corticoſa maxima. *Cor.* tubuloſa, ſubæqualis, 5fida. *Cal.* cylindricus, truncatus. *Rudimentum* filamenti 5ti.

260. BRUNSFELSIA. *Bacca* 1locularis, polysperma, conceptaculo maximo. *Cor.* tubo longissimo. *Cal.* 5dentatus.

TALIGALEA. *Bacca* 1locularis, 2pyrena, officulis 1spermis. *Cor.* infundibuliformis, tubo longo. *Cal.* 4-5dentatus.

GALIPEA. *Peric.* - - - *Cor.* 4-5fida, tubo brevi. *Cal.* 4 5angulatus, 4-5dentatus. *Germen* 4-5gonum.

AMBULIA. *Caps.* 5gona, 1locularis polysperma. *Cor.* tubulosa, 4fida. *Cal.* 5dentatus.

†† *calicibus bifidis.*

778. OBOLARIA. *Caps.* 1locularis. *Cor.* campanulata, 4fida. *Filamenta* ex divisuris corollæ.

779. OROBANCHE. *Caps.* 1locularis. *Cor.* subæqualis, 4fida. *Glandula* sub basi germinis.

770. HEBENSTREITIA. *Caps.* 2sperma. *Cor.* 1labiata, 4fida. *Stamina* margini laterali corollæ inserta.

754. TORENIA. *Caps.* 2locularis. *Cor.* personata. *Filamenta* 2 2fida.

793. ACANTHUS. *Caps.* 2locularis. *Cor.* 1labiata, 3fida. *Antheræ* villosæ.

DOMBEYA. *Caps.* 4locularis. *Cor.* 1labiata, labio concamerato. *Cal.* 2labiatus.

1316. PREMNA. *Bacca* 4sperma. *Cor.* 4fida, inæqualis.

162. CRECENTIA. *Bacca* 1locularis. *Sem.* 2locularia. *Cor.* tubo campanulato. *Germen* pedicellatum.

††† *calicibus trifidis.*

761. HALLERIA. *Bacca* 2locularis. *Cor.* 4fida, labio superiore longiore.

†††† *calicibus quadrifidis.*

769. SELAGO. *Sem.* 1. involutum, corollæ inæquali.

781. LIPPIA. *Sem.* 1. 2loculare. *Cor.* hypocrateriformis. *Cal.* compressus.

743. LATHRÆA. *Caps.* 1locularis. *Cor.* personata. *Glandula* sub germine.

MATUREA. *Caps.* 1locularis, 2valvis, polysperma. *Cor.* 2labiata. *Stigma* 2lamellatum.

739. BARTSIA. *Caps.* 2locularis. *Cor.* personata. *Cal.* coloratior.

741. EUPHRASIA. *Capf.* 2locularis. *Cor.* perfonata. *Antheræ* inferiores hinc fpinofæ.

740. RHINANTHUS. *Capf.* 2locularis. *Cor.* perfonata. *Cal.* compreffus.

742. MELAMPYRUM. *Capf.* 2locularis. *Sem.* bina, gibbofa. *Cor.* perfonata.

749. SCHWALBEA. *Capf.* 2locularis. *Cor.* perfonata. *Cal.* laciniæ fuperiores fenfim minores.

PATTERSONIA. *Capf.* 2locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Sem.* 4.

785. BARLERIA. *Capf.* 2locularis, elaftica. *Semina* bina. *Cor.* infundibuliformis.

PIRIPEA. *Capf.* 2locularis, 2valvis, polyfperma. *Cor.* hypocrateriformis.

767. LOESELIA. *Capf.* 3locularis. *Cor.* laciniis fecundis. *Stamina* petalo adverfa.

763. GMELINA. *Drupa* nucleo 2loculari. *Cor.* 2labiata. *Antheræ* binæ craffiores 2partitæ.

NEPHRANDRA. *Drupa* nuce 2loculari, *loculis* 1fpermis. *Cor.* galea 3fida, media involuta, labium 2fidum.

765. LANTANA. *Drupa* nucleo 2loculari. *Cor.* hypocrateriformis. *Stigma* uncinatum.

rrrrr *calicibus quinquefidis.*

1237. AVICENNIA. *Capf.* 1locularis, coriacea, 1fperma. *Cor.* labio fuperiore quadrato.

745. TOZZIA. *Capf.* 1locularis, 1fperma. *Cor.* hypocrateriformis.

776. LIMOSELLA. *Capf.* 1locularis, polyfperma. *Cor.* campanulata, regularis.

773. BROWALLIA. *Capf.* 1locularis, polyfperma. *Cor.* hypocrateriformis.

1315. LINDERNIA. *Capf.* 1locularis. *Cor.* ringens. *Stamina* inferiora dente terminali.

1265. VANDELLIA. *Capf.* 1locularis. *Cor.* ringens. *Stamina* inferiora e difco labii enata.

749. GESNERIA. *Capf.* 2locularis. *Cor.* fupera.

GALVESIA. *Capf.* 2locularis. *Cor.* tubulofa, bafi fubventricofa.

NEMIA. *Capf.* 2locularis, 2valvis. *Cor.* infundibuliformis, limbo fubæquali 5partito.

756. SCROPHULARIA. *Capf.* 2locularis. *Cor.* refupinata. *Labium* fegmento intermedio interno.

777. STEMODIA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* inæqualis. *Stam.* 2fida. *Antheræ* geminæ.
MONTIRA.	*Capf.* 2locularis, 4 valvis, polyfperma. *Cor.* tubus ventricofus, incurvus.
757. CELSIA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* rotata. *Filamenta* lanata.
1405. HEMIMERIS.	*Capf.* 2locularis, loculo altero magis gibbofo. *Cor.* rotata, lacinia una majore obcordata, *foſſula* laciniarum nectarifera.
775. SIBTHORPIA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* rotata. *Stamina* 2 & 2 approximata.
768. CAPRARIA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Stigma* cordatum 2valve.
758. DIGITALIS.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* campanulata fubtus ventricofa. *Stamina* declinata.
759. BIGNONIA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Sem.* alata, imbricata.
TOURRETIA.	*Capf.* 4locularis. *Sem.* alata, imbricata. *Cor.* 2labiata.
784. RUELLIA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Stamina* per paria approximata.
772. BUCHNERIA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* hypocrateriformis, limbi laciniis obcordatis æqualibus.
771. ERINUS.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* 2labiata, labio fuperiori breviſſimo reflexo.
764. PETRÆA.	*Capf.* 2locularis, feminibus folitariis. *Cor.* rotata calice colorato minor.
1264. MANULEA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* limbus 5partitus, lacinia infima profundiore reflexa.
750. ANTIRRHINUM.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* perfonata fubtus nectario prominente.
792. COLUMNEA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* ringens fupra bafin gibba. *Antheræ* connexæ.
747. GERARDIA.	*Capf.* 2locularis, 1fperma, bafi dehifcens. *Cor.* hypocrateriformis, inæqualis.
AFZELIA.	*Capf.* 2locularis, polyfperma, receptaculis hemifphæricis. *Cor.* campanulata.
746. PEDICULARIS.	*Capf.* 2locularis, feminibus tunicatis. *Cor.* perfonata.
783. MIMULUS.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* perfonata. *Cal.* prifmaticus.
780. DODARTIA.	*Capf.* 2locularis. *Cor.* perfonata, labio fuperiore brevi, afcendente.

748. CHELONE.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata, inflata, clauſa. *Rudimentum* filamenti quinti.
782. SESAMUM.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata inæqualis. *Rudimentum* filamenti quinti.
753. MARTYNIA.	*Capſ.* 5locularis. *Cor.* campanulata. *Rudimentum* filamenti quinti.
752. CRANIOLARIA.	*Capſ.* 5locularis. *Cor.* hypocrateriformis, tubo filiformi longiſſimo.
TAMONEA.	*Nux* carnoſa, 4locularis, *ſeminibus* ſolitariis. *Cor.* ringens, limbo 5fido. *Cal.* 5ariſtatus.
794. PEDALIUM.	*Nux* 2locularis.
1409. AMASONIA.	*Nux* ovata, 1locularis.
774. LINNÆA.	*Bacca* 3locularis, ſicca. *Cor.* campanulata. *Cal.* ſuperus.
791. BONTIA.	*Bacca* 1ſperma, ſemine plicato. *Cor.* labium inferius revolutum.
766. CORNUTIA.	*Bacca* 1ſperma. *Cor.* ringens. *Stilus* longiſſimus.
789 CLERODENDRON.	*Bacca* 1ſperma. *Cor.* ringens, tubo anguſto. *Stamina* longiſſima.
MYOPORUM.	*Bacca* 1-2ſperma, *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* campanulata, limbo 5partito.
788. VOLKAMERIA.	*Bacca* 2ſperma, *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* laciniis ſecundis.
760. CITHAREXYLON.	*Bacca* 2ſperma, *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* ſubæqualis.
787. OVIEDA.	*Bacca* 2ſperma. *Cor.* longiſſima, limbo 3fido. *Cal.* fructificus campanulatus.
1406. MILLINGTONIA.	*Siliqua.* *Cor.* longiſſima, limbo 4fido. *Calicis* margo reflexus. *Antheræ* 2partitæ, vaginantes.
790. VITEX.	*Bacca* 4ſperma. *Cor.* ringens, labio ſuperiori 3fido.
786. DURANTA.	*Bacca* 4ſperma, ſeminibus 2locularibus. *Cor.* ſubringens, tubo curvo.
755. BESLERIA.	*Bacca* polyſperma 1locularis. *Cor.* inæqualis.

††††† *calicibus multifidis.*

751. CYMBARIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* ringens. *Cal.* 10-dentatus.

1407. THUNBERGIA. *Capf.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Cal.* duplex; *exterior* 2phyllus, *interior* multipartitus.

†† *calicibus non monophyllis.*

1317. HYOBANCHE. *Capf.* 2locularis. *Cor.* 1labiata. *Cal.* 5-phyllus.

** *corollis tetrapetalis.*

795. MELIANTHUS. *Capf.* 4locularis, 4loba. *Corollæ* labium fuperius o.

GEVUINA. *Capf.* 1locularis, coriacea. *Cal.* o.

GYMNOSPERMIA.

DISPERMA. *Cor.* tubulofa, limbo 4fido. *Cal.* 2-phyllus. *Sem.* 2calice coronata hinc marginata plana inde convexa.

repens. 1. DISPERMA. *Walt. flor. carol. p.* 160.

705. AJUGA. *Cor.* labium fuperius minimum. *Stamina* labio fuperiori longiora.

orientalis. 1. A. foliis ovatis, corollis obliquis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 100. *β*) *Dill. h. Elth. t.* 53. *f.* 61.

pyramidalis. 2. A. tetragono-pyramidalis villofa, foliis oblongis dentatis, radicalibus maximis. *Flor. dant. t.* 185.

alpina. 3. A. caule fimplici, foliis dentatis, caulinis radicalia æquantibus, bracteis integris. *Mant. p.* 80. *Pluckn. phyt. t.* 18. *f.* 3. *an mera pyramidalis varietas?*

genevensis. 4. A. foliis tomentofis lineatis dentatis, bracteis plurimis trilobis, calicibus hirfutis. *Riv. monop. t.* 140. *f.* 2. *an mera pyramidalis reptantifve varietas?*

reptans. 5. A. glabra, ftolonibus reptantibus, foliis ovatis crenatis. *Blackw. herb. t.* 64. *f.* 1.

decumbens. 6. A. decumbens villofa, foliis obovatis dentatis. *Thunb. flor. jap. p.* 243.

706. TEUCRIUM. *Cor.* labium fuperius erectum, ultra bafin profunde 2partitum, inter ejus divifuram ftamina.

campanulatum. 1. T. foliis multifidis, floribus lateralibus folitariis, caulibus repentibus. *Riv. monop. t.* 24. *β*) *Till. h. pif. t.* 49. *f.* 1. *Flos centralis interdum pentandrus, corolla campanulata.*

parviflorum. 2. T. foliis multifidis linearibus, racemo decompofito, pedicellis elongatis divaricatis. *Schreb. vertic. unilab. gen. & fp. p.* 31. *n.* 18. *ic.*

orientale. 3. T. foliis multifidis linearibus, racemo compofito, pedicellis brevibus. *Riv. monop. t.* 19.

Botrys. 4. T. foliis multifidis, floribus lateralibus ternis pedunculatis. *Hoffmann bot. Taſchenb. f.* 1791. *t.* 9.

maurita- num. 5. T. foliis multifidis linearibus, floralibus mucronatis, racemo ſimplici. *Shaw. it.* 2. *app. p.* 121. *n.* 575. *ic.*

læviga- tum. 68. T. foliis inferioribus multifidis, ſummis tripartitis, pedunculis ſolitariis longitudine foliorum. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 40.

niſſolia- num. 6. T. foliis quinquefidis trifidiſque linearibus muticis, pedunculis ſolitariis breviſſimis, caule decumbente.

chium. 7. T. foliis trifidis, floribus axillaribus ſolitariis folio longioribus, caule diffuſo. *Schreb. vert. unilab. gen. & ſp. p.* 25. *n.* 5.

Chamæ- pitys. 8. T. foliis trifidis, floribus axillaribus ſolitariis folio brevioribus, caule diffuſo. *Flor. dan. t.* 733.

Pſeudo- chamæpi- tys. 9. T. foliis trifidis integriſque linearibus mucronatis, pedunculis ſolitariis elongatis, caule diffuſo. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 95.

Iva. 10. T. foliis ſubtricuſpidatis linearibus, floribus ſeſſilibus axillaribus ſolitariis. *Lob. ic.* 384.

moſcha- tum. 11. T. foliis linearibus integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Schreb. vert. unilab. gen. & ſp. p.* 26. *n.* 7.

Libanitis. 12. T. foliis linearibus integerrimis revolutis confertis cauleque tomentoſis, ſpicis ſubrotundis. *Barr. pl. rar. ic.* 1090.

Supinum. 13. T. foliis linearibus integerrimis margine revolutis, corymbo terminali. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 417. *an meræ montani varietas?*

pumilum. 14. T. foliis linearibus integerrimis planis quadrifariis confertis, capitulis ſeſſilibus terminalibus, caule procumbente tomentoſo. *Barr. pl. rar. ic.* 1092. *β*) *Barr. pl. rar. ic.* 1093.

anguſtiſ- ſimum. 15. T. foliis linearibus integerrimis ſubnudis, capitulis terminalibus piloſis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic.* 1080.

cæleſte. 16. T. foliis linearibus integerrimis incanis, capitulis terminalibus tomentoſis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic.* 1081.

creticum. 17. T. foliis linearibus integerrimis acuminatis ſubtus niveis, racemo floribus ternatis ſolitariiſque, calicibus ſpinoſis. *Alpin. exot. t.* 102.

brevifolium. 18. T. foliis lanceolatis revolutis integerrimis obtusis incanis, floribus solitariis, calicibus muticis. *Rivin. monop. t.* 20.

fruticans. 19. T. foliis lanceolatis integerrimis subtus niveis, floribus solitariis. *Jungh. plant. ic. cent.* 1. *t.* 20.

salicifolium. 20. T. foliis lanceolato-ellipticis obtusiusculis integerrimis, calicibus solitariis quadrifidis. *Mant. p.* 80. *Schreb. dec. pl.* 1. *t.* 9.

latifolium. 21. T. foliis integerrimis rhombeis acutis villosis subtus tomentosis. *Dill. h. Elth. t.* 284. *f.* 368.

trifoliatum. 69. T. foliis oblongis ternis tomentosis revolutis anterius crenatis, capitulis subrotundis laxis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 40.

Marum. 22. T. foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis, floribus racemosis secundis. *Mant. p.* 409. *Blackw. herb. t.* 47. *Regn. bot. t.* 164.

Laxmanni. 23. T. foliis ovato-oblongis integerrimis sessilibus, floribus solitariis sessilibus.

montanum. 24. T. foliis petiolatis ellipticis margine revolutis subtus tomentosis, corymbis terminalibus glabris, caule procumbente. *Riv. monop. t.* 25. *f. inf.* 6.

multiflorum. 25. T. foliis ovatis, superne glabris serrato-dentatis, floribus racemosis, verticillis sexfloris. *Bocc. musc. t.* 117.

thymifolium. 26. T. foliis ovatis obtusis petiolatis subtus tomentosis, capitulis terminalibus paucifloris, caule procumbente. *Barr. pl. rar. ic.* 1062.

japonicum. 66. T. foliis ovatis acuminatis serratis petiolatis, racemis nudiusculis verticillato-spicatis. *Pluken. amalth. t.* 441. *f.* 2.

sibiricum. 27. T. foliis ovatis serratis, pedunculis solitariis trifloris, intermedio sessili bracteis lineari-lanceolatis.

Arduini. 28. T. foliis ovatis serratis, racemo spicato tereti sessili terminali. *Mant. p.* 81. *Arduin. spec.* 1. *t.* 3.

virginicum. 29. T. foliis ovatis inæqualiter serratis, racemis terminalibus. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 30.

massiliense. 30. T. foliis ovatis rugosis inciso-crenatis incanis, caulibus rectis, racemis rectis secundis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 94.

lucidum. 31. T. foliis ovatis inciso-serratis glabris, verticillis dimidiatis, caulibus erectis lævibus. *Medic. act. Palat.* 3. *phys. t.* 12. *f.* 7-9.

flavum. 32. T. foliis ovatis crenatis, floralibus integerrimis, verticillis dimidiatis in racemos digestis, caule fruticoso pubescente. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 5.

nitidum. 33. T. foliis ovatis crenatis, floralibus integerrimis, verticillis dimidiatis racemosis, caule bifariam barbato. *Schreb. vertic. unilab. gen. & sp. p.* 35. *n.* 24.

regium. 34. T. foliis ovatis anterius dentatis, floralibus integerrimis sessilibus, verticillis racemosis, caule ramoso. *Pluckn. alm. t.* 365. *f.* 2.

aureum. 35. T. foliis ovatis serratis caulibusque dense lanatis, summitatibus luteis nitidis, corymbis terminalibus pilosis. *Rivin. monop. t.* 25.

villosum. 36. T. foliis elliptico-ovatis acuminatis serratis petiolatis villosis, racemo spicato terminali, calicibus inflatis. *Forst. fl. austr. p.* 43.

hetero-phyllum. 37. T. foliis ellipticis crenatis, floribus lateralibus solitariis, corollæ labio exterius lanato, ramis heterophyllis. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 84.

Chamæ-drys. 38. T. foliis cuneiformi-ovatis incisis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus subpilosis. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 83. β) *Blackw. herb. t.* 80.

betonicæ-folium. 39. T. foliis rhombeo-ovatis obtuse serratis incanis, racemis terminalibus, bracteis oppositis lanceolatis acutis integerrimis, caule fruticoso. *Jacq. collect.* I. *p.* 145. *t.* 17. *f.* 2.

quadra-tulum. 40. T. foliis ovato-rhombeis dentatis subtus niveis, verticillis racemosis. *Schreb. vert. unilab. gen. & sp. p.* 36. *n.* 27.

canaden-se. 41. T. foliis ovato-lanceolatis serratis, caule erecto, racemo tereti terminali, verticillis hexaphyllis.

cubense. 42. T. foliis obovatis inciso-serratis glabris in petiolum attenuatis, floribus solitariis pedunculatis. *Jacq. stirp. amer. plā. t.* 164.

pyrenai-cum. 43. T. foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis pilosis, corymbis terminalibus.

rotundi-folium. 44. T. foliis subrotundis crenatis villosis, corymbis terminalibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1095.

Salviaf-trum. 45. T. foliis ovalibus crenulatis rugosis subtus tomentosis petiolatis, racemo secundo. *Schreb. vertic. unilab. gen. & sp. p.* 38. *n.* 33.

buxifolium. 46. T. foliis ovalibus rugosis villosis apice crenatis, corymbis terminalibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1036.

abutiloides. 47. T. foliis cordatis dentatis acuminatis, racemis lateralibus nutantibus. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 84.

Scorodonia. 48. T. foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Flor. dan. t.* 485. *β) Gesn. op.* 1. *t.* 85. b.

hircanicum. 49. T. foliis cordatis oblongis obtusis, caule brachiato dichotomo, spicis longissimis terminalibus sessilibus spiralibus. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 19.

scordioides. 50. T. foliis cordatis oblongis amplexicaulibus crenatis lanuginosis, floribus axillaribus pedunculatis geminis. *Schreb. vertic. unilab. gen. & sp. p.* 37. *n.* 36.

Scordium. 51. T. foliis oblongis sessilibus dentatis nudiusculis, floribus axillaribus pedunculatis geminis, caule diffuso pubescente. *Flor. dan. t.* 593.

arenarium. 52. T. foliis oblongis obtusis inciso-crenatis sessilibus, floribus axillaribus pedunculatis subternis. *S. G. Gmelin, it.* 1. *p.* 149. *t.* 26. *f.* 2.

inflatum. 53. T. foliis oblongis acuminatis inæqualiter serratis pubescentibus, spicis sessilibus terminalibus, calicibus inflatis villosis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 88. *an forte idem cum villoso ?*

Pseudhyssopus. 54. T. foliis oblongis anterius crenatis tomentosis incanis, capitulis rotundatis laxis, caule lanato corymbifero. *Col. ecphr.* 1. *t.* 67.

betonicum. 55. T. foliis lanceolatis serratis utrinque acutis, racemis terminalibus, caule florifero brachiato. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 82. *t.* 40.

capitatum. 56. T. foliis lanceolatis crenatis tomentosis niveis, capitulis subrotundis breviter pedunculatis, caule erecto. *Barrel. ic.* 1047.

Polium. 57. T. foliis lanceolatis crenatis tomentosis incanis, capitulis subrotundis breviter pedunculatis, caule decumbente. *Regn. bot. t.* 161. *β) Barr. pl. rar. ic.* 1078.

asiaticum. 58. T. foliis lanceolatis repande-serratis basi rectangulis, floribus solitariis. *Mant. p.* 80. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 41.

trifidum. 59. T. foliis lanceolatis trifidis, pedunculis axillaribus trifloris. *Retz. obs. bot.* 1. *p.* 21.

Achæmenis. 60. T. foliis inverſe lanceolatis anterius crenatis tomentoſis incanis, floralibus flore longioribus, corymbis denſis. *Moriſ. hiſt. pl. 3. t. 2. f. 12.*

flaveſcens. 61. T. foliis lineari-lanceolatis anterius crenatis capitulisque ſubrotundis tomentoſis, ſummitatibus flavis. *Barr. pl. rar. ic.* 1073.

valentinum. 62. T. foliis linearibus crenatis, capitulis ſubrotundis breviter pedunculatis, caule erecto incano. *Barr. pl. rar. ic.* 1048.

luſitanicum. 63. T. foliis linearibus obtuſis crenulatis incanis, capitulis laxis, caule pubeſcente corymbifero. *Schreb. vertic. unilab. p.* 47. *n.* 50.

pycnophyllum. 64. T. foliis linearibus revolutis anterius crenatis confertis cauleque denſe tomentoſis, capitulis ſubrotundis. *Barr. pl. rar. ic.* 1091. 1096.

gnaphalodes. 65. T. foliis linearibus revolutis crenatis calicibusque lanatis, floribus ſolitariis confertis. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 84. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1083.

ſpinoſum. 67. T. ſpinoſum, pedunculis geminis, calicum labio ſuperiore ovato, corollis reſupinatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 389. Teucrium mucronatum. *Barr. pl. rar. ic.* 202.

707. SATUREIA. *Corollæ* laciniæ ſubæquales. *Stamina* diſtantia.

Thymbra. 1. S. floribus verticillatis hiſpidis, foliis oblongis acutis. *Blackw. herb. t.* 318.

juliana. 2. S. verticillis faſtigiatis, foliis lineari-lanceolatis. *Moriſ. hiſt. pl. 3. t. 17. f. 4.*

capitata. 3. S. floribus ſpicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Barr. pl. rar. ic.* 897.

montana. 4. S. pedunculis lateralibus ſolitariis, floribus faſciculatis faſtigiatis, foliis mucronatis lineari-lanceolatis integerrimis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 64.

rupeſtris. 5. S. pedunculis lateralibus ſolitariis ſecundis, foliis ovato-lanceolatis ſerrulatis. *Wulf ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 130.

viminea. 6. S. pedunculis axillaribus trifloris, involucris linearibus, foliis lanceolato-ovatis integerrimis.

græca. 7. S. pedunculis ſubtrifloris lateralibus, involucellis calice brevioribus. *Pluckn. alm. t.* 84. *f.* 8.

hortensis. 8. S. pedunculis bifloris. *Blackw. herb. t.* 419.

thymifolia. 10. S. pedunculis ramosis corymbosis; foliis ovatis subdentatis. *Scop. fl. carn. ed.* 2. *t.* 29.

spinosa. 9. S. ramis spinosis, foliis hispidis.

708. THYMBRA. *Cal.* subcylindricus, 2labiatus, utrinque linea villosa exaratus. *Stilus* semibifidus.

spicata. 1. Th. floribus spicatis. *Pluckn. alm. t.* 116. *f.* 5.

verticillata. 2. Th. floribus verticillatis. β) Thymbra caroliniana. *Walt. flor. carol. p.* 162.

709. HYSSOPUS. *Corollæ* labium inferius lacinula intermedia crenata. *Stamina* erecta, distantia.

officinalis. 1. H. spicis secundis, foliis lanceolatis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 254.

Lophanthes. 2. H. corollis resupinatis, staminibus inferioribus corolla brevioribus, foliis cordatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 182.

nepetoides. 3. H. caule acuto quadrangulo. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 69.

HYPTIS. *Cal.* turbinatus. *Corollæ* limbus patentissimus, labium inferius semibifidum. *Antheræ* dependentes.

capitata. 1. Hyptis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 102. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 109. *f.* 2. *an forsan clinopodii generi adjungenda?*

710. NEPETA. *Corollæ* labium inferius lacinula intermedia crenata, faux margine reflexo. *Stamina* approximata.

fidæfolia. 1. N. paniculis laxissimis, pedunculis verticillatis filiformibus, foliis cordatis. *Herit. sert. angl. p.* 19.

pectinata. 2. N. paniculis compactis, floribus secundis, corollis minimis, foliis cordato-ovatis nudis, caule frutescente.

3. N.

lavandulacea. 3. N. ſpica compacta, foliis ovatis inciſo-ſerratis lineatis. *Suppl. p.* 272. *Pallas act. Petrop.* 1779. 2. *t.* 12.

ſcordotis. 4. N. ſpicis terminalibus ſeſſilibus: bracteis ſubcordatis villoſis, foliis cordatis obtuſis. *Alp. exot. t.* 283.

tuberoſa. 5. N. ſpicis terminalibus: bracteis oblongis acuminatis nervoſo-lineatis coloratis, foliis cordatis pubeſcentibus, corollæ lobis lateralibus reflexis. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 72. *β) Sabb. h. rom.* 3. *t.* 81.

lanata. 22. N. ſpicis terminalibus: bracteis ovatis nervoſo-rugoſis ſubſcarioſis, foliis oblongis cordatis villoſis, corollæ lobis lateralibus patentibus. *Jacq. obſ. bot.* 3. *p.* 21. *t.* 75.

multifida. 6. N. floribus ſpicatis, corollæ lobis lateralibus ſubpatulis, foliis pinnatifidis: laciniis ſubæqualibus linearibus. *Suppl. p.* 273. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 55.

americana. 23. N. ſpicis imbricatis acuminatis, foliis ovatis acutis ſerratis. *Pluckn. amer. t.* 162. *f.* 2.

tomentoſa. 24. N. tomentoſa, ſpicis verticillatis, foliis ellipticis acute ſerratis. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv.*

Cataria. 7. N. floribus ſpicatis: verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Flor. dan. t.* 580.

malabarica. 8. N. ſpica verticillata: bracteis filiformibus, foliis lanceolatis inferne integerrimis. *Mant. p.* 566.

italica. 9. N. floribus ſeſſilibus verticillato-ſpicatis: bracteis lanceolatis longitudine calicis, foliis petiolatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 112.

hirſuta. 10. N. floribus ſeſſilibus verticillato-ſpicatis: verticillis tomento obvolutis. *Bocc. ſic. t.* 25. *f.* 2.

cærulea. 20. N. cymis pedunculatis multifloris hirtis, foliis oblongis cordatis villoſis ſubſeſſilibus, corollæ lobis lateralibus reflexis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 285.

violacea. 11. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis ſubpetiolatis cordatis nudiuſculis, corollæ lobis lateralibus patentibus. *Barr. pl. rar. ic.* 601.

amboinica. 12. N. floribus ſubverticillatis: bracteis ovatis, foliis cordatis obtuſis crenatis. *Suppl. p.* 273. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 90.

nuda. 13. N. florum racemis verticillatis nudis, foliis cordato-oblongis ſeſſilibus ſerratis. *Mant. p.* 410. *Jacq. fl. auſtr.* 2. *t.* 129.

canescens. 21. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis petiolatis oblongis subcordatis crenatis tomentosis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 285.

Nepetella. 14. N. cymis pedunculatis, foliis cordatis oblongo-lanceolatis tomentosis profunde serratis.

ucranica. 15. N. floribus paniculatis, foliis lanceolatis serratis sessilibus nudis.

pannonica. 16. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis cordatis lanceolato-oblongis nudis petiolatis obsolete crenatis, corollæ lobis lateralibus reflexis. *Jacq. fl. austr.* 1. *t.* 24.

incana. 17. N. florum paniculis axillaribus, foliis petiolatis ovatis serratis tomentosis. *Thunb. flor. jap. p.* 244.

angustifolia. 25. N. corymbis pedicellatis spicatis, foliis lanceolatis rugosis tomentosis obtuse serratis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 41.

virginica. 18. N. capitulis terminalibus, staminibus flore longioribus, foliis lanceolatis. *Pluckn. alm. t.* 85. *f.* 2.

indica. 19. N. corollarum labio superiore integerrimo brevissimo.

711. LAVANDULA. *Cal.* ventricosus, subdentatus, striatus, bractea suffultus. *Cor.* resupinata. *Stamina* intra tubum. *Sem.* basi late derosa.

Spica. 1. L. foliis sessilibus lanceolato-linearibus margine revolutis, spica interrupta nuda. α) *Blackw. herb. t.* 294. β) *Blackw. herb. t.* 295.

Stœchas. 2. L. foliis sessilibus linearibus margine revolutis, spica coarctata comosa. *Blackw. herb. t.* 241.

viridis. 3. L. foliis sessilibus linearibus rugosis villosis margine revolutis, spica comosa: bracteis indivisis. *Herit. sert. angl. p.* 19. *t.* 21.

dentata. 4. L. foliis sessilibus linearibus pectinato-pinnatis, spica coarctata comosa. *Kniph. bot. orig. cent.* 2. *n.* 38.

pinnata. 5. L. foliis petiolatis pinnatis: foliolis cuneiformibus, spica imbricata. *Jacq. pl. rar. ic.* 1. *t.* 9.

multifida. 6. L. foliis petiolatis pinnatis: foliolis decursive pinnatifidis, spica quadrangulari: angulis spiralibus. *Burm. ind. t.* 38. *f.* 1. *Commel. rar. t.* 27. γ)

Pluckn. alm. t. 303. *f.* 5. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 11.

carnosa. 7. L. foliis petiolatis ovato-cordatis serratis carnosis, spica tetragona: calicibus recurvatis. *Suppl. p.* 273. *Diss. de lavandula t.* 2.

712. SIDERITIS. *Stamina* intra tubum corollæ. *Stigma* brevius involvens alterum.

* *ebracteatæ.*

canariensis. 1. S. fruticosa villosa, foliis cordato-oblongis, acutis petiolatis, spicis verticillatis ante florescentiam nutantibus, ramis divaricatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 30.

candicans. 2. S. fruticosa tomentosa, foliis ovato-lanceolatis cordatis apice attenuatis subtus niveis, verticillis suboctofloris remotis. *Commel. hort. amst.* 2. *p.* 197. *t.* 99.

cretica. 3. S. fruticosa tomentosa, foliis cordato-oblongis obtusis petiolatis, ramis divaricatis, spicis verticillatis.

syriaca. 4. S. fruticosa tomentoso-lanata, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 40.

perfoliata. 5. S. herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus amplexicaulibus. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 86.

montana. 6. S. herbacea, calicibus corolla majoribus spinosis: labio superiori trifido. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 434.

elegans. 7. S. herbacea villosa, caule diffuso, calicum laciniis subæqualibus spinulosis. *Murray comm. Goett.* 1778. *p.* 92. *t.* 4.

romana. 8. S. herbacea decumbens, calicibus spinosis: labio superiori ovato. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 12. *f.* 5.

** *bracteatæ.*

incana. 9. S. suffruticosa tomentosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis: floralibus bracteisque dentatis. *Bocc. mus.* 2. *t.* 67. *f.* 2.

hyssopifolia. 10. S. foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calicibus æqualibus.

scordioides. 11. S. foliis lanceolatis subdentatis supra glabris, bracteis ovatis dentato-spinosis, calicibus æqualibus. *Lob. ic.* 528.

hirsuta. 12. S. foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato-spinosis, caulibus hirtis decumbentibus. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 58.

spinosa. 15. S. hirsuta, foliis lanceolatis bracteisque cordatis dentato-spinosis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 41.

ciliata. 13. S. herbacea, foliis ovatis serratis, bracteis ciliatis. *Thunb. flor. jap. p.* 245.

lanata. 14. S. erecta, foliis cordatis obtusis villosis, spica oblonga, calicibus muticis lanatis.

713. MENTHA. *Cor.* subæqualis, 4fida: lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta, distantia.

* *floribus paniculatis.*

plumosa. 1. M. paniculis dichotomis terminalibus: calicibus plumosis, foliis ovatis petiolatis serratis subtus albo-tomentosis, caule fruticoso. *Suppl. p.* 273. *Herit. sert. angl. p.* 20. *t.* 22.

origanifolia. 2. M. paniculis dichotomis: calicibus plumosis, foliis ovatis integerrimis subtus candidissimis. *Herit. sert. angl. p.* 20.

** *floribus racemosis.*

perilloides. 3. M. racemis secundis lateralibus. *Sp. pl. p.* 833. Ocymum frutescens. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 77.

*** *floribus spicatis.*

Auricularia. 4. M. spicis oblongis, foliis oblongis serratis pilosis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Mant. p.* 81. *Rumpf amb.* 6. *t.* 16.

niliaca. 5. M. spicis oblongis, foliis ovatis serratis villosis sessilibus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 87.

sylvestris. 6. M. spicis oblongis, foliis oblongis serratis tomentosis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 484.

viridis. 7. M. spicis oblongis, foliis lanceolatis nudis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Regn. bot. t.* 166.

rotundifolia. 8. M. spicis oblongis, foliis subrotundis rugosis crenatis sessilibus.

dubia. 9. M. floribus ſpicato capitatis: ſtaminibus corolla brevioribus, foliis hirſutis acuminatis ſerratis ovato-lanceolatis. *Villars pl. Delph.* 2. *p.* 358. *n.* 4.

**** *floribus capitatis.*

criſpa. 10. M. foliis cordatis dentatis undulatis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla duplo longioribus. *Rivin. monop. t.* 50.

hirſuta. 11. M. foliis ovatis ſerratis ſubſeſſilibus pubeſcentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mant. p.* 81. *β) Raj. ſl. angl.* 3. *t.* 10. *f.* 1.

aquatica. 12. M. foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 673.

piperita. 13. M. foliis ovatis petiolatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Knigge de menth. piper. diſſ. ic. Jungh. pl. off. ic. t.* 10.

punctata. 14. M. pedunculis dichotomis, foliis ovatis dentatis glabris punctulatis. *Herit. ſert. angl. p.* 20. *t.* 23.

canarienſis. 15. M. pedunculis dichotomis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis ovatis crenatis ſubtus villoſis, caule arboreſcente. *Pluckn. alm. t.* 317. *f.* 2.

***** *floribus verticillatis.*

ſativa. 16. M. foliis ovatis acutiuſculis ſerratis, ſtaminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 794.

gentilis. 17. M. foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Flor. dan. t.* 736.

arvenſis. 18. M. foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam æquantibus. *Flor. dan. t.* 512.

Pulegium. 19. M. foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Blackw. herb. t.* 302.

auſtriaca. 20. M. foliis ſubovatis villoſis, corollæ laciniis omnibus obtuſis ſtamina ſuperantibus. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 430.

exigua. 21. M. foliis lanceolato-ovatis glabris acutis integerrimis. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 38.

cahirina. 22. M. foliis ovato-lanceolatis acutis ſerratis: ſerraturis deſcendentibus. *Forsk. ſl. æg. arab. p.* 213.

canadenſis. 23. M. foliis lanceolatis ſerratis petiolatis piloſis, ſtaminibus corollam æquantibus.

cervina. 24. M. foliis linearibus, bracteis palmatis, staminibus corolla longioribus. *Blackw. herb. t.* 304.

1236. PERILLA. *Calicis* lacinia suprema brevissima. *Stamina* distantia. *Stili* 2 connexi.

ocymoides. 1. PERILLA. *Arduin. spec.* 2. *t.* 13.

714. GLECOMA. *Cal.* 5fidus. *Antherarum* singula paria in formam crucis conniventia.

hederaceum. 1. GLECOMA. *Flor. dan. t.* 789.

716. LAMIUM. *Cor.* labium superius integrum, fornicatum: *labium* inferius obcordatum; faux utrinque dente setaceo.

Orvala. 1. L. foliis cordatis inaequaliter arguteque serratis, corollis fauce inflata, caulibus coloratis. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *t.* 27. *β*) Orvala garganica. *Sp. pl. p.* 807. *Michel. n. pl. gen. t.* 17.

lævigatum. 2. L. foliis cordatis rugosis, caule lævi, calicibus glabris longitudine tubi corollæ. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 34.

rugosum. 3. L. foliis cordatis acutis rugosis caulibusque pilosis, verticillis multifloris: faucis dente unico setaceo. *Bocc. mus. p.* 35. *t.* 23.

garganicum. 4. L. foliis cordatis pubescentibus, corollis fauce inflata: tubo recto dente utrinque gemino. *Till. h. pis. t.* 34. *f.* 2.

maculatum. 5 L. foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. *Col. ecphr.* 1. *t.* 192.

album. 6. L. foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Flor. dan. t.* 594.

bifidum. 10. L. foliis cordatis acuminatis, corollæ galea bifida: laciniis divaricatis. *Cyrill. pl. rar. Neap. fasc.* 1. *t.* 7. *an hujus generis?*

purpureum. 7. L. foliis cordatis obtusis petiolatis. *Flor. dan. t.* 523.

molle. 8. L. foliis petiolatis subdentatis: inferioribus cordatis; superioribus ovatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 297.

multifidum. 9. L. foliis multipartitis. *Commel. rar. t.* 26.

717. GALEOPSIS. *Cor.* labium superius subcrenatum, fornicatum, inferius trifidum: faux utrinque dente obtusiusculo concavo acuta.

Ladanum. 1. G. verticillis omnibus remotis, calicibus campanulatis pubescentibus: dentibus lineari-setaceis divergentibus longioribus. *Mant. p.* 411.

grandiflora. 2. G. verticillis omnibus remotis, calicibus tubulosis hirsutissimis: dentibus lanceolato-acuminatis brevioribus rectis. *Riv. monop. t.* 24.

Tetrahit. 3. G. verticillis summis subcontiguis, calicibus ventricosis: dentibus longissimis setaceis æqualibus. *Mant. p.* 411. *Riv. monop. t.* 44.

cannabina. 4. G. verticillis summis subcontiguis, calicibus tubulosis: dentibus brevioribus linearibus inæqualibus; tribus majoribus. *Rivin. monop. t.* 45.

POLLICHIA. *Corollæ* labium superius integrum, fornicatum; faux absque dentibus.

Galeobdolon. 1. P. calicibus pungentibus, corollæ labio inferiore trifido, foliis omnibus cordatis dentatis petiolatis. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 394. Galeopsis Galeobdolon. *Knorr del. hort.* I. *t.* N. 9. *n.* 1.

amplexicaulis. 2. P. calicibus inermibus, corollæ labio inferiore bifido, foliis caulinis sessilibus rotundatis incisis: radicalibus petiolatis cordato-lobatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 393. Lamium amplexicaule. *Flor. dan. t.* 752.

718. BETONICA. *Cal.* ariſtatus. *Corollæ* labium ſuperius erectum planum: tubus cylindricus.

officinalis. 1. B. ſpica interrupta: corollæ galea integra; labii lacinia intermedia emarginata, calicibus glabriuſculis. *Flor. dan. t.* 726.

incana. 2. B. ſpica interrupta: corollæ galea bifida; labii lacinia intermedia crenata, tubo tomentoſo incurvo. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 299.

ſtricta. 3. B. ſpica oblonga: corollæ galea integra; labii lacinia intermedia crenato-undulata calicibus piloſis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 299.

orientalis. 4. B. ſpica integra: corollæ labii lacinia intermedia integerrima.

alopecuros. 5. B. ſpica baſi foliofa: corollæ galea bifida. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 78.

hirſuta. 6. B. ſpica baſi foliofa: corollis galea integra. *Mant. p.* 248. *Murr. comm. Goett.* 1779. 2. *p.* 13. *t.* 3.

heraclea. 7. B. calicibus lanatis: dentibus filiformibus, foliis lanceolatis nudis. *Mant. p.* 83.

719. STACHYS. *Corollæ* labium ſuperius fornicatum; inferius lateribus reflexum: lacinia intermedia majore emarginata. *Stamina* deflorata verſus latera reflexa.

ſpinoſa. 1. St. ramulis ſpina terminatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 10. *f.* 9.

glutinoſa. 2. St. ramis ramoſiſſimis, foliis lanceolatis glabris.

patens. 3. St. ramoſiſſima, ramis filiformibus patentibus, foliis lanceolatis ſerratis glabris, floribus ſubverticillatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 88.

maritima. 4. St. foliis cordatis obtuſis tomentoſis crenatis, bracteis oblongis integerrimis. *Mant. p.* 82. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 70.

palæſtina. 5. St. floribus ſubſpicatis, foliis lanceolatis ſeſſilibus tomentoſis rugoſis integerrimis, calicibus muticis. *Sp. pl. p.* 1674. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 109. 112.

orientalis. 6. St. foliis tomentosis ovato-lanceolatis: floralibus verticillo brevioribus.

recta. 7. St. verticillis subspicatis, foliis cordato-ellipticis crenatis scabris, caulibus adscendentibus. *Mant. p.* 82. *Jacq. fl. austr.* 4. *t.* 359.

æthiopica. 8. St. verticillis bifloris. *Mant. p.* 82. *Plukn. alm. t.* 315. *f.* 3.

palustris. 9. St. verticillis subsexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus. *Curt. flor. Lond. t.* 2.8.

lavandulifolia. 24. St. verticillis sexfloris hirsutissimis, foliis lanceolatis integerrimis lineatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 42.

sylvatica. 10. St. verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Curt. flor. Lond. t.* 283.

arvensis. 11. St. verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine calicis, caule debili. *Curt. flor. Lond. t.* 246.

rugosa. 12. St. verticillis sexfloris, foliis lanceolatis basi attenuatis tomentosis rugosis serratis, calicibus muticis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 303.

annua. 13. St. verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis lævibus petiolatis, caule erecto. *Mant. p.* 411. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 360.

hirta. 14. St. verticillis sexfloris, caulibus prostratis, corollæ labio superiori bifido divaricato reflexo.

canariensis. 15. St. verticillis sexfloris, foliis cordatis villosis crenatis, caulibus suberectis, calicibus fructiferis campanulato-patentissimis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 48.

circinata. 16. St. verticillis sexfloris, foliis cordato-rotundatis crenatis. *Herit. stirp. nov.* 3. *p.* 51. *t.* 26.

heraclea. 23. St. hirsuta, verticillis decemfloris, foliis atro-virentibus elliptico-lanceolatis. *Allion. flor. pedem. t.* 84. *f.* 1.

cretica. 17. St. verticillis trigintafloris, calicibus pungentibus, caule hirto. *Walth. hort. t.* 19.

lanata. 18. St. verticillis multifloris, foliis lanatis subcrenulatis, caulibus basi procumbentibus radicantibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 59.

intermedia. 19. St. verticillis multifloris, calicibus subpungentibus, foliis oblongis subcordatis crenatis, caule sublanato. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 301.

germanica. 20. St. verticillis multifloris, foliorum ſerraturis imbricatis, caule lanato. *Flor. dan. t.* 684. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 319.

alpina. 21. St. verticillis multifloris, foliorum ſerraturis apice cartilagineis, corollis labio plano. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 41.

latifolia. 22. St. verticillis multifloris ſubſpicatis: galea bifida; laciniis acutis, foliis latis cordatis rugoſis piloſis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 303.

720. BALLOTA. *Cal.* hypocrateriformis, 5dentatus, 10ſtriatus. *Cor.* labium ſuperius crenatum, concavum.

nigra. 1. B. foliis cordatis indiviſis ſerratis, calicibus acuminatis. *Blackw. herb. t.* 136.

alba. 2. B. foliis cordatis indiviſis ſerratis, calicibus ſubtruncatis; *an vere diſtincta a nigra?*

ſuaveolens. 3. B. foliis cordatis, pedunculis axillaribus ſolitariis, calicibus truncatis: ariſtis linearibus. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 42.

lanata. 4. B. foliis palmatis dentatis, caule lanato. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 42.

diſticha. 5. B. verticillis dimidiatis bipartitis ſemiſpicatis. *Mant. p.* 83. *Burm. zeyl. t.* 71. *f.* 1.

721. MARRUBIUM. *Cal.* hypocrateriformis, rigidus, 10ſtriatus. *Cor.* labium ſuperius 2fidum, lineare, rectum.

* *calicibus 5dentatis.*

Alyſſon. 1. M. foliis cuneiformibus quinquedentatis plicatis, verticillis involucro deſtitutis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 10 *f.* 12.

plicatum. 2. M. foliis ſemiorbiculatis tomentoſis rugoſis plicato-lobatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 213.

peregrinum. 3. M. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, calicum-denticulis ſetaceis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 160.

candidiſſimum. 4. M. foliis ſubovatis lanatis ſuperne emarginato-crenatis, calicum denticulis ſubulatis. *Dill. h. Elth. t.* 174. *f.* 214.

astracanicum. 5. M. foliis ovatis crenatis tomentosis rugosissimis, calicum dentibus subulatis, corollæ laciniis superioribus acutis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 7.

indicum. 13. M. foliis cordatis serratis, calicibus villosis: dentibus subulatis. *Burm. th. zeyl. t.* 71. *f.* 1.

supinum. 6. M. calicum dentibus setaceis rectis villosis. *Barr. pl. rar. ic.* 685. 686.

*** calicibus 10dentatis.*

africanum. 7. M. foliis cordatis subrotundis emarginato-crenatis. *Pluckn. alm. t.* 306. *f.* 2.

crispum. 8. M. foliis cordatis subrotundis crenato-subdentatis, calicibus muticis. *Sp. pl. p.* 1674. *Herm. par. Lugdb. t.* 200.

vulgare. 9. M. calicum dentibus setaceis uncinatis. *Blackw. herb. t.* 479.

hispanicum. 10. M. calicum limbis patentibus: denticulis acutis. *Herm. par. Lugdb. t.* 201.

Pseudodictamnus. 11. M. calicum limbis planis villosis, foliis cordatis concavis, caule fruticoso. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 47.

acetabulosum. 12. M. calicum limbis tubo longioribus membranaceis: angulis majoribus rotundatis. *Barr. pl. rar. ic.* 129.

722. LEONURUS. *Antheræ* punctis nitidis adspersæ.

crispus. 1. L. foliis omnibus acute serratis rugosissimis margine inæqualiter reflexis; caulinis quinquelobis. *Murray comm. Goett.* 1777. *p.* 44. *t.* 4.

Cardiaca. 2. L. foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Flor. dan. t.* 727.

sibiricus. 3. L. foliis tripartitis multifidis linearibus obtusiusculis. *Amm. ruth. t.* 8. *an varietas tatarici?*

tataricus. 4. L. foliis tripartitis laciniatis, calicibus villosis. *Mill. h. angl. t.* 80.

Marrubiastrum. 5. L. foliis ovatis lanceolatisque serratis, calicibus sessilibus spinosis. *Mant. p.* 412. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 405.

723. PHLOMIS. *Cal.* angulatus. *Cor.* labium superius incumbens, compressum, villosum.

* *floribus nudis.*

Nissolii. 1. Phl. foliis radicalibus cordato-sagittatis utrinque tomentosis villosis. *Mill. h. angl. t.* 204.

sinensis. 2. Phl. foliis ovatis serratis tomentoso-sericeis, calicibus verticillatis decemdentatis. *Bladh. apud Retz. obs. bot.* 2. *p.* 19.

laciniata. 3. Phl. foliis alternatim pinnatis: foliolis lanceolatis, calicibus lanatis.

** *floribus involucratis.*

Lychnitis. 4. Phl. foliis lanceolatis tomentosis; floribus ovatis, involucris setaceis lanatis. *Mill. h. angl. t.* 203.

zeylanica. 5. Phl. foliis lanceolatis subserratis, capitulis terminalibus, calicibus octodentatis. *Rumpf amb.* 6. *t.* 16. *f.* 1. *β)* Leonurus indicus. *Sp. pl. p.* 817.

Leonurus. 6. Phl. foliis lanceolatis serratis, calicibus decagonis decemdentatis muricis, caule fruticoso. *Mant. p.* 412. *Knorr del. hort.* 2. *t.* L.

caribæa. 7. Phl. foliis ovato-lanceolatis oppositis serratis petiolatis villosis, verticillis axillaribus multifloris, involucris hirsutis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 154.

alba. 8. Phl. ovatis serratis villosis, calicibus quinquedentatis obliquis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 107.

glabrata. 19. Phl. foliis ovatis serratis, calicibus labio inferiore producto tridentato, ramis reverse pilosis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 42.

moluccoides. 20. Phl. foliis ovatis, involucris setaceis, calicis labio inferiore magno rotundato membranaceo. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 107. Clinopodium fruticosum.

Leonotis. 9. Phl. foliis ovatis obtusis subtomentosis crenatis, calicibus septemdentatis aristatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 83. *Mill. h. angl. t.* 162.

indica. 10. Phl. foliis ovatis pilosis, involucris linearibus, calicibus unilabiatis obliquis.

Samia. 11. Phl. foliis ovatis subtus tomentosis, involucris subulatis strictis tripartitis.

Herba-venti. 12. Phl. foliis ovato oblongis scabris, involucris setaceis hispidis, caule herbaceo. *Sabb. h. rom. 3. t. 17.*

martinicensis. 13. Phl. foliis ovato oblongis villosis, involucris setaceis, verticillis subglobosis, calicibus recurvis: laciniis superioribus subulatis longissimis. *Jacq. stirp. amer. p. 160. t. 177. f. 75.*

alpina. 14. Phl. foliis cordatis serratis: floralibus lanceolatis trinerviis, involucris setaceis villosis. *Pallas nov. comm. Petrop. 1779. 2. p. 265. t. 13.*

neptifolia. 15. Phl. foliis cordatis acutis serratis subtomentosis, calicibus sex-vel octodentatis: dente supremo infimoque majori, caule herbaceo. *Suppl. p. 274. Herm. par. Lugdb. t. 117.*

tuberosa. 16. Phl. foliis cordatis scabris, involucris hispidis subulatis, caule herbaceo. *Buxb. cent. 1. t. 6. Gaertn. de fr. & sem. cent. 5. t. 66. f. 9.*

purpurea. 17. Phl. foliis cordatis oblongis tomentosis, involucris linearibus obtusis calice brevioribus, caule suffruticoso. *Plukn. alm. t. 57. f. 6.*

fruticosa. 18. Phl. foliis subrotundis tomentosis crenatis, involucris lanceolatis, caule fruticoso. *Sabb. h. rom. 3. t. 15. β) Dill. h. Elth. t. 237. f. 306.*

724. MOLUCCELLA. *Cal.* ampliatus, corolla latior, spinosus. *Sem.* 3quetra.

lævis. 1. M. calicibus campanulatis subquinquedentatis: denticulis æqualibus. *Sabb. h. rom. 3. t. 45. Gaertn. de fr. & sem. cent. 5. t. 66. f. 10.*

spinosa. 2. M. calicibus ringentibus octodentatis. *Sabb. h. rom. 3. t. 46.*

frutescens. 3. M. calicibus infundibuliformibus quinquefidis, corollis calice longioribus. *Burm. ind. t. 38. f. 2.*

tuberosa. 4. M. calicibus infundibuliformibus patentissimis sexdentatis corolla duplo brevioribus. *Pallas it. 3. p. 738. t. T. f. 1-3.*

725. CLINOPODIUM. *Stamina* curvata : *antheris* conniventibus.

vulgare. 1. Cl. capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 65. *β) Sabb. h. rom.* 3. *t.* 66. *γ) Mill. ic. t.* 95.

rugoſum. 2. Cl. capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis, foliis rugoſis. *Pluckn. phyt. t.* 222. *f.* 7.

incanum. 3. Cl. foliis ſubtus tomentoſis, verticillis explanatis, bracteis lanceolatis. *Pluckn. mant. t.* 344. *f.* 7.

martinicenſe. 4. Cl. foliis ovato-oblongis baſi attenuatis, verticillis globoſis : bracteis ſetaceis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 45.

726. ORIGANUM. *Strobilus* 4gonus, ſpicatus, calices colligens.

ægyptiacum. 1. O. foliis carnoſis tomentoſis, ſpicis nudis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f. ult.*

Dictamnus. 2. O. foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Blackw. herb. t.* 462.

ſipyleum. 3. O. foliis omnibus glabris, ſpicis nutantibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 2.

creticum. 4. O. ſpicis aggregatis longis prismaticis rectis : bracteis membranaceis calice duplo longioribus.

bengalenſe. 15. O. foliis ovatis dentatis, ſpicis imbricatis lanuginoſis : bracteis ovatis. *Burm. ind. t.* 38. *f.* 3.

ſmyrnæum. 5. O. foliis ovatis acutis ſerratis, ſpicis congeſtis umbellatim faſtigiatis.

Tournefortii. 6. O. ſpicis tetragonis : bracteis ſubrotundis maximis. *Tournef. it.* 1. *p.* 240. *ic.*

heracleoticum. 7. O. ſpicis longis pedunculatis aggregatis : bracteis longitudine calicum. *Lob. ic.* 492.

vulgare. 8. O. ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis : bracteis calice longioribus ovatis. *Flor. dan. t.* 638.

Onites. 9. O. ſpicis oblongis aggregatis hirſutis, foliis cordatis tomentoſis. *Bocc. muſc.* 2. *t.* 38.

ſyriacum. 10. O. ſpicis longis ternatis pedunculatis villoſis, foliis ovatis villoſis. *Lob. ic.* 499.

Maru. 11. O. ſpicis hirſutis, foliis ovatis tomentoſis ſeſſilibus. *Alp. exot. t. 288.*

Majorana. 12. O. foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Zorn pl. med. ic. t. 41. β) Sabb. h. rom. 3. t. 78.*

clinopodioides. 13. O. capitulis rotundatis verticillatis terminalibusque, floribus ſeſſilibus, foliis cordato-ovatis ſubpetiolatis glabris. *Walt. flor. carol. p. 165.*

flexuoſum. 14. O capitulis axillaribus: floribus ſeſſilibus, caule flexuoſo, foliis ſublinearibus. *Walt. flor. carol. p. 165, an diſtincta hujus generis ſpecies?*

727. THYMUS. *Cal.* 2labiatus: faux villis clauſa.

Serpyllum. 1. Th. floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Zorn pl. med. ic. t. 17. β) Sabb. h. rom. 3. t. 69.*

cephalotus. 2. Th. capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis. *Barr. pl. rar. ic. 787.*

villoſus. 3. Th. capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis; foliis ſetaceis piloſis.

virginicus. 4. Th. capitulis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 389. Satureja virginiana. *Pluckn. alm. t. 54. f. 2.*

numidicus. 5. Th. floribus capitato-ſpicatis hirſutis, foliis linearibus glabris integerrimis, bracteis baſi latiuſculis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 187.*

vulgaris. 6. Th. erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis. *Blackw. herb. t. 211. β) Sabb. h. rom. 3. t. 68.*

Zygis. 7. Th. floribus verticillato-ſpicatis, caule ſuffruticoſo erecto, foliis linearibus baſi ciliatis. *Barr. pl. rar. ic. 777.*

Acinos. 8. Th. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *Balliard herb. Franc. t. 318.*

Maſtichina. 9. Th. floribus verticillatis: calicibus lanuginoſis; dentibus ſetaceis villoſis. *Mant. p. 413. Blackw. herb. t. 134.*

Tragoriganum. 10. Th. floribus verticillatis, caule fruticoſo erecto, foliis hiſpidis acuminatis. *Mant. pl. 84. Alp. exot. t. 78.*

indicus. 16. Th. ſpicis verticillato-interruptis, caulibus erectis. *Burm. ind.*

pannonicus. 17. Th. verticillis ad apicem ramorum congeſtis, foliis ovatis cauleque hirſutis. *Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 267.

alpinus. 11. Th. verticillis ſexfloris, foliis obtuſiuſculis concavis ſubſerratis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 97.

Piperella. 12. Th. pedunculis multifloris lateralibus, foliis ovatis obtuſis glabris nervoſis integerrimis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 694.

Brownei. 13. Th. floribus pedunculatis axillaribus, foliis orbiculatis crenatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 89.

imbricatus. 14. Th. floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus, caulibus decumbentibus imbricatis, foliis ovatis acutis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 108.

filiformis. 15. Th. floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis, foliis cordatis acutis integerrimis petiolatis, caulibus filiformibus decumbentibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 313.

728. MELISSA. *Cal.* aridus, angulatus: labio ſuperiori reflexo-patente. *Cor.* labium ſuperius ſubfornicatum, 2fidum; inferius lobo medio cordato.

Nepeta. 1. M. pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adſcendente hirſuto. *Gſeck. ic. faſc.* 1. *n.* 14. *β) Riv. monop. t.* 47. *Faux villis clauſa; an thymus?*

grandiflora. 2. M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. *Beſl. h. Eyſt. æſt.* 7. *t.* 7. *f.* 1.

Calamintha. 3. M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Blackw. herb. t.* 166.

officinalis. 4. M. racemis axillaribus verticillatis: pedicellis ſimplicibus. *Blackw. herb. t.* 27.

cretica. 5. M. racemis terminalibus: pedunculis ſolitariis breviſſimis. *Barr. rar. pl. ic.* 1166.

fruticoſa. 6. M. ramis attenuatis virgatis, foliis ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo.

729. DRACOCEPHALUM. *Cor.* faux inflata : labium superius fornicatum.

* *floribus spicatis.*

virginianum. 1. Dr. foliis lineari-lanceolatis serratis; floribus confertis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 26.

denticulatum. 2. Dr. foliis obovato-lanceolatis superne denticulatis, floribus remotis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 317.

canariense. 3. Dr. foliis compositis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 27.

pinnatum. 4. Dr. foliis cordatis pinnato-sinuatis. *Gmel. flor. sib.* 3. *t.* 52.

Ruyschiana. 5. Dr. foliis bracteisque lanceolatis indivisis muticis. *Flor. dan. t.* 121.

austriacum. 6. Dr. foliis bracteisque linearibus partitis spinosis.

peregrinum. 7. Dr. floribus subspicatis, foliis caulinis ovato-oblongis incisis, bracteis lineari-lanceolatis denticulato-spinosis.

** *floribus verticillatis.*

sibiricum. 8. Dr. floribus subverticillatis : pedunculis bifidis secundis, foliis cordato-oblongis acuminatis nudis. *Gmel. flor. sib.* 3. *t.* 51.

Moldavica. 9. Dr. bracteis lanceolatis : serraturis capillaceis. *Blackw. herb. t.* 551.

canescens. 10. Dr. bracteis oblongis : serraturis spinosis; foliis subtomentosis. *Mill. h. angl. t.* 129.

peltatum. 11. Dr. bracteis orbiculatis serrato-ciliatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 38.

grandiflorum. 12. Dr. foliis crenatis : radicalibus cordatis; caulinis orbiculatis sessilibus, bracteis acuminato-dentatis. *Suppl. p.* 274. *Laxmann act. Petrop.* 1770. *t.* 29. *f.* 3.

nutans. 13. Dr. bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majusculis nutantibus. *Gmel. flor. sib.* 3. *t.* 49.

thymiflorum. 14. Dr. bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis vix calice majoribus. *Gmel. flor. sib.* 3. *t.* 50. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 8.

730. **HORMINUM.** *Cal.* campanulatus: laciniis 4 subæqualibus; 5ta majore emarginata. *Corollæ* labium superius concavum.

pyrenaicum. 1. HORMINUM. *Jacq. h. Vind. 2. t.* 183.

831. **MELITTIS.** *Cal.* tubo corollæ amplior. *Cor.* labium superius erectum integrum; inferius trifidum. *Antheræ* cruciatæ.

Melissophyllum. 1. MELITTIS. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 26.

732. **OCYMUM.** *Cal.* labio superiore rotundato; inferiore 4fido. *Cor.* resupinatæ alterum labium 4fidum, alterum indivisum. *Filamenta* exteriora basi processum emittentia.

thyrsiflorum. 1. O. floribus paniculato-fasciculatis, caule ramosissimo. *Mant. p.* 84. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 72.

inflexum. 2. O. panicula terminali racemosa, caule ramisque flexuosis. *Thunb. flor. jap. p.* 249.

inodorum. 33. O. racemis paniculatis, foliis ovalibus denticulatis. *Burm. th. zeyl. t.* 80. *f.* 2.

rugosum. 3. O. racemis terminalibus, foliis ovatis acutis serratis subtus rugosis. *Thunb. flor. jap. p.* 249.

crispum. 4. O. racemis terminalibus, foliis ovatis serratis crispis, calicibus hispidis. *Thunb. flor. jap. p.* 248.

serphyllifolium. 5. O. racemis terminalibus, foliis oblongo-cuneatis acutiusculis complicatis subtus scabris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 110.

acutum. 6. O. racemis filiformibus, foliis ovatis acuminatis serratis, bracteis hirtis. *Thunb. flor. jap. p.* 248.

Plectanthrus. 34. O. racemis erectis: pedicellis ramosis; nectario gibbo; foliis cordato-ovatis acuminatis serratis. *Vahl symb. bot. 1. p. 43.*

scutellarioides. 7. O. racemis erectis, pedicellis ramosis, corollis falcatis. *Mant. p. 84. Rumpf amb. 5. t. 101.*

polystachyon. 8. O. racemis aphyllis apice nutantibus: corollis quadrifidis. *Mant. p. 567. Murray comm. Goett. 1772. t. 3.*

punctulatum. 9. O. racemis simplicibus erectis, foliis ovatis subtus punctatis. *Thunb. flor. jap. p. 249.*

gratissimum. 10. O. racemis teretibus, caule suffruticoso, foliis lanceolato-ovatis. *Mant. p. 414. Burm. zeyl. t. 80. f. 1.*

americanum. 11. O. racemis teretibus, caule subherbaceo, foliis sublanceolatis acuminatis subserratis. *Jacq. h. Vind. 3. t. 86.*

hadiense. 12. O. racemis aphyllis: nectario gibbo, caule æquali. *Forsk. flor. æg. arab. p. 109.*

virgatum. 13. O. racemis verticillatis virgatis, foliis oblongis serratis. *Thunb. flor. jap. p. 250.*

verticillatum. 14. O. racemo elongato nudo: floribus verticillato-quaternis pedunculatis, foliis ovatis obtusis. *Suppl. p. 276.*

album. 15. O. racemorum verticillis approximatis: nubilibus tetragonis, corollis crenatis, foliis ovatis obtusis. *Mant. p. 85.*

Zatarhendi. 16. O. racemis bracteatis, nectario gibboso, foliis ovatis carnosis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 109. an cum Plectanthro & hadiensi distincti generis?*

filamentosum. 17. O. foliis ovatis serratis; genitalibus longissimis, caule fruticoso. *Forsk. flor. æg. arab. p. 108. Herit. stirp. nov. 4. t. 43.*

prostratum. 18. O. caulibus prostratis, foliis ellipticis lineatis. *Mant. p. 566.*

punctatum. 19. O. caule herbaceo hirto, floribus spicatis, nectario gibboso. *Suppl. p. 275. Herit. stirp. nov. 4. p. 87. t. 42.*

fruticosum. 20. O. caule fruticoso lævigato, racemis compositis, pedunculis tripartitis, nectario calcarato. *Herit. stirp. nov. 4. p. 85. t. 41. an cum punctato distinctum genus constituit?*

tenuiflorum. 21. O. spicis filiformibus, bracteis cordatis reflexis concavis, foliis ovato-oblongis serratis. *Burm. zeyl. t. 70. f. 2.*

capitellatum. 22. O. floribus aggregatis, foliis ovatis; petiolis lateralibus. *Suppl. p.* 276.

monachorum. 23. O. staminibus edentulis: alternis basi barbatis. *Mant. p.* 85.

Basilicum. 24. O. foliis ovatis glabris, calicibus ciliatis. *Blackw. herb. t.* 104.

salinum. 25. O. foliis ovatis glabris, caule geniculato. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 116.

minimum. 26. O. foliis ovatis integerrimis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 85.

menthoides. 27. O. foliis lineari-lanceolatis serratis.

sanctum. 28. O. foliis oblongiusculis obtusis serratis undulatis, caule hirto, bracteis cordatis. *Mant. p.* 85.

Vaalæ. 29. O. caule tetragono brachiato, calicibus pilosis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 111.

holosericeum. 30. O. foliis ovato-acuminatis tomentosis undulatis mollibus, calicis labio inferiore quinquedentato semina tegente, bracteis persistentibus. *Medic. act. palat.* 4. *phys. p.* 199. *t.* 7.

molle. 31. O. foliis ovatis cordatis acutis serratis rugosis: sinubus clausis, bracteis subrotundo-cuneiformibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 322.

zeylanicum. 23. O. foliis ellipticis planis nudis nitidis duris, calicis labio inferiore quinquedentato semina tegente, bracteis deciduis. *Medic. act. palat.* 4. *phys. p.* 197. *t.* 6.

733. TRICHOSTEMA. *Cor.* labium superius falcatum. *Stamina* longissima.

dichotomum. 1. Tr. staminibus longissimis exsertis, foliis lanceolatis.

lineare. 2. Tr. staminibus exsertis, foliis linearibus. *Walt. flor. Carol. p.* 164.

brachiatum. 3. Tr. staminibus brevibus inclusis. *Dill. h. Elth. t.* 285. *f.* 369.

734. SCUTELLARIA. *Calix* ore ſubintegro : poſt floreſcentiam clauſo, operculato.

orientalis. 1. Sc. foliis inciſis ſubtus tomentoſis, ſpicis rotundato-tetragonis. *Tournef. it.* 3. *t.* 306.

albida. 2. Sc. foliis ſubcordatis ſerratis rugoſis opacis, ſpicis ſecundis: bracteis ovatis. *Mant. p.* 248. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 29.

peregrina. 3. Sc. foliis ſubcordatis ſerratis, ſpicis elongatis ſecundis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 189.

Columnæ. 18. Sc. villoſa, foliis cordatis, caule erecto brachiato, floribus racemoſis internodio longioribus. *Allion. flor. pedem. t.* 84. *f.* 2.

lupulina. 4. Sc. foliis cordatis inciſo-ſerratis acutis glabris, ſpicis imbricatis rotundato-tetragonis.

alpina. 5. Sc. foliis cordatis inciſo-ſerratis crenatis, ſpicis imbricatis rotundato-tetragonis. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 87.

cretica. 6. Sc. villoſa, foliis cordatis obtuſis obtuſeque ſerratis, ſpicis imbricatis: bracteis ſetaceis.

altiſſima. 7. Sc. foliis cordato-oblongis acuminatis ſerratis, ſpicis ſubnudis.

purpuraſcens. 8. Sc. foliis cordato-ovatis dentatis petiolatis, racemis nudis terminalibus, corollæ labio utroque trifido. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 89.

havanenſis. 9. Sc. foliis cordato-ovatis crenatis, floribus ſolitariis axillaribus, corollæ labio utroque trifido. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 165.

minor. 10. Sc. foliis cordato-ovatis ſubintegerrimis, floribus axillaribus. *Curt. flor. Lond. t.* 283.

caroliniana. 11. Sc. foliis cordato-ovatis obtuſe ſerratis, ſpicis terminalibus ſubhirſutis. *Walt. flor. carol. p.* 163.

galericulata. 12. Sc. foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Flor. dan. t.* 637.

lateriflora. 13. Sc. foliis cordato-lanceolatis lævibus carina ſcabris, racemis lateralibus folioſis.

hyſſopifolia. 14. Sc. foliis lanceolatis. *Mant. p.* 414.

ovata. 19. Sc. foliis ovatis, floribus axillaribus. *Hill. hort. Kew. t.* 8.

hastifolia. 15. Sc. foliis integerrimis: inferioribus hastatis; superioribus sagittatis. *Riv. monop. t.* 77.

integrifolia. 16. Sc. foliis sessilibus ovatis: inferioribus obsolete serratis; superioribus integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 313. *f.* 4.

indica. 17. Sc. foliis subovatis crenatis petiolatis, racemis nudiusculis. *Pluckn. amalth. t.* 441. *f.* 1.

GLANDULARIA. *Cal.* tubulatus: ore obliquo 5-fido, setaceo. *Germ.* 4partitum. *Stigma* 2fidum: glandula inter binas lacinias.

caroliniensis. 1. GLANDULARIA. *Walt. flor. carol. p.* 164.

735. PRUNELLA. *Filamenta* 2furca: altero apice antherifera. *Stigma* 2fidum.

indica. 7. Pr. foliis oblongis superne crenatis, spicis capitatis: bracteis ciliatis. *Burm. ind.*

vulgaris. 1. Pr. foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis, calicibus labio superiore truncato subtridentato. *Blackw. herb. t.* 24.

grandiflora. 2. Pr. foliis omnibus ovato-oblongis subserratis, calicis labio superiore profunde trilobo. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 377.

intermedia. 3. Pr. foliis inferioribus sinuato-dentatis: superioribus integris dentatis, calicibus summis coloratis. *Linck. Ann. Naturg.* 1. *p.* 32.

laciniata. 4. Pr. foliis ovato-oblongis petiolatis: inferioribus sinuato-dentatis: supremis laciniatis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 378.

hyssopifolia. 5. Pr. foliis lanceolatis integerrimis sessilibus, caule erecto basi procumbente. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 7.

parviflora. 6. Pr. foliis petiolatis ovato-lanceolatis subdentatis, spica sessili: floribus vix bracteas superantibus. *Poir. voy. en Barbar.* 2. *p.* 188.

736. CLEONIA. *Filamenta* 2furca : apice altero antherifera. *Stigmata* 4.

lusitanica. 1. CLEONIA. *Mant. p.* 414. *Mill. h. angl. t.* 70. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 7.

737. PRASIUM. *Sem.* epidermide molli baccata.

majus. 1. Pr. foliis ovato-oblongis serratis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 37. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 12.

minus. 2. Pr. foliis ovatis : crena utrinque duplici.

coccineum. 3. Pr. foliis subovatis. *Walt. flor. carol. p.* 166.

purpureum. 4. Pr. foliis lanceolatis sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 166.

incarnatum. 5. Pr. foliis subamplexicaulibus lanceolato-oblongis. *Walt. flor. carol. p.* 165.

738. PHRYMA. *Semen* 1, calice tectum.

Leptostachyon. 1. Phr. foliis ovatis serratis petiolatis, calice monophyllo quinquefido. *Suppl. p.* 277. *Pluckn. amalth. t.* 380. *f.* 5. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 5. *t.* 75. *f.* 10.

caroliniense. 2. Phr. foliis sessilibus obovato-oblongis serratis. *Walt. flor. carol. p.* 166.

ANGIOSPERMIA.

1408. CASTILLEJA. *Cal.* 1phyllus tubulosus ; anterius longitudinaliter fissus. *Cor.* ringens : Labium inferius glandulis 2. *Caps.* 2locularis : dissepimento contrario.

fissifolia. 1. C. foliis apice pinnato-incisis. *Suppl. p.* 293. *Mutis amer.* 1. *t.* 11. *Smith plant. ic. ined. fasc.* 2. *t.* 40.

integrifolia. 2. C. foliis lineari-lanceolatis integris. *Mutis amer.* 1. *t.* 12. *Smith plant. ic. ined. fasc.* 2. *t.* 39.

TALIGALEA. *Cal.* 1phyllus, 4-5dentatus. *Cor.* infundibuliformis: tubo longo 5angulari. *Antheræ* basi 2fidæ. *Stigm.* 2. *Bacca* 1locularis, 2-pyrena: ossiculis 1spermis.

campestris. 1. TALIGALEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 625. *t.* 252. *utrum distincti generis, an Amasoniæ species?*

739. BARTSIA. *Cal.* 2lobus, emarginatus, apice coloratus. *Cor.* calice minus colorata; labio superiore longiore. *Capf.* 2locularis.

coccinea. 1. B. foliis alternis linearibus utrinque bidentatis. *Pluckn. alm. t.* 102. *f.* 5.

pallida. 2. B. foliis alternis lanceolatis integerrimis: floralibus ovatis dentatis. *Gmel. flor. fib.* 3. *t.* 42.

viscosa. 3. B. foliis superioribus alternis serratis, floribus distantibus lateralibus. *Pluckn. alm. t.* 27. *f.* 5.

alpina. 4. B. foliis oppositis cordatis obtuse serratis. *Flor. dan. t.* 43.

Gymnandra. 5. B. diandra, foliis radicalibus binis petiolatis, caule subdiphyllo unispicato: spica lineari obtusa, verticillis bracteatis coarctatis. *Suppl. p.* 278. *Pall. it.* 3. *t.* 4. *f.* 1.

740. RHINANTHUS. *Cal.* 4fidus, inflatus. *Capf.* 2locularis, obtusa, compressa. *Semina* pauca.

orientalis. 1. Rh. corollis labio superiori subulato incurvo. *Tournef. it.* 2. *p.* 299. *it.*

Elephas. 2. Rh. corollis labio superiori subulato recto. *Col. ecphr.* 1. *t.* 188.

Crista galli. 3. Rh. corollis labio superiori compresso breviori, calicibus glabris. *Bulliard herb. Franc. t.* 125. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 1.

Alectoro-lophus. 4. Rh. corollarum labio superiore compresso breviori: auriculis truncatis, calicibus villosis. *Hall. hist. stirp. helv.* I. *p.* 137. *n.* 314.

virginicus. 5. Rh. corollis fauce patentibus, foliis sinuato-dentatis.

trifidus. 11. Rh. corollis fauce patentibus, foliis trifidis. *Buxb. cent.* I. *p.* 5. *t.* 8.

capensis. 6. Rh. calicibus tomentosis bracteis ovatis, foliis lanceolatis dentatis. *Sp. pl. p.* 879. Buchnera africana. *Pluckn. alm. t.* 310. *f.* 3.

Trixago. 7. Rh. calicibus hirsuto-tomentosis, foliis oppositis obtuse serratis, caule simplicissimo. *Col. ecphr.* I. *t.* 197.

indicus. 8. Rh. foliis sublanceolatis pilosis integerrimis. *Burm. ind. t.* 39. *f.* I. β) *Pluckn. alm. t.* 113. *f.* 2.

maximus. 9. Rh. foliis ovato-lanceolatis serratis sessilibus: superioribus alternis, calicibus tubulosis acutis. *La Mark dict. bot. n.* 10.

versicolor. 10. Rh. foliis subcompositis lanceolato-linearibus serratis, serraturis distantibus, calicibus brevibus oppositis. *La Mark dict. bot. n.* 11.

741. EUPHRASIA. *Cal.* 4fidus, cylindricus. *Antheræ* inferiores altero lobo basi spinosæ. *Caps.* 2locularis, ovato-oblonga. *Semina* pauca deorsum incumbentia.

latifolia. 1. Eu. foliis dentato-palmatis, floribus subcapitatis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 7.

officinalis. 2. Eu. foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Zorn pl. med. ic. t.* 39. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 8.

rubra. 9. Eu. foliis cordato-ovatis acute serratis, calice obtuse dentato, caule ramoso. *Hoffm. bot. Taschenb.* 1791. *p.* 215.

tricuspidata. 3. Eu. foliis linearibus tridentatis. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* I.

Odontites. 4. Eu. foliis linearibus: omnibus serratis. *Flor. dan.* 655.

lutea. 5. Eu. foliis linearibus serratis; superioribus integerrimis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 398.

linifolia. 6. Eu. foliis linearibus: omnibus integerrimis, calicibus glabris. *Col. ecphr.* 2. *t.* 69.

viscosa. 7. Eu. foliis linearibus, calicibus glutinoso-hispidis. *Mant. p.* 86. *Garid. aix. t.* 78.

cuneata. 8. Eu. foliis subcuneiformibus incisis. *Forst. flor. austr. p.* 43.

742. MELAMPYRUM. *Cal.* 4fidus. *Cor.* labium superius compressum: margine replicato. *Caps.* 2locularis, compressa, obliqua, hinc dehiscens. *Sem.* solitaria gibba.

cristatum. 1. M. spicis quadrangularibus: bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. *Pluckn. alm. t.* 99. *f.* 2.

arvense. 2. M. spicis conicis laxis: bracteis dentato-setaceis coloratis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 8. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 1.

nemorosum. 3. M. floribus secundis lateralibus: bracteis dentatis; summis coloratis sterilibus, calicibus lanatis. *Flor. dan. t.* 305.

pratense. 4. M. floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis clausis. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 1.

silvaticum. 5. M. floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Flor. dan. t.* 145.

743. LATHRÆA. *Cal.* 4–5partitus. *Glandula* depressa ad angulum alterum germinis. *Capsula* 1locularis: receptaculis fungosis lateralibus.

Clandestina. 1. L. caule ramoso subterrestri, floribus erectis solitariis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 15.

Phelypæa. 2. L. corollis campanulato-patentibus.

Anblatum. 3. L. corollarum labiis indivisis.

quinquefida. 4. L. caule simplici, spica undique imbricata, calice corollaque quinquefidis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 111.

Squamaria. 5. L. caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis: labio inferiori trifido. *Flor. dan. t.* 136. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 3. *t.* 52. *f.* 3.

744. SCHWALBEA. *Cal.* 4fidus: lacinia ſuperiore minima; infima maxima apice bifida. *Capſ.* 2locularis: diſſepimento duplicato. *Semina* paleacea.

americana. 1. SCHWALBEA. *Mant. p.* 414. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 3.

PATTERSONIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* infundibuliformis. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* in utriſque loculis 4 imbricata.

caroliniensis. 1. PATTERSONIA. *Walt. flor. carol. p.* 167.

745. TOZZIA. *Cal.* 5dentatus. *Capſ.* 1locularis, globoſa, 1ſperma.

alpina. 1. TOZZIA. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 165.

746. PEDICULARIS. *Cal.* 5fidus. *Capſ.* 2locularis, mucronata, obliqua. *Semina* tunicata, pauca.

paluſtris. 1. P. caule ramoſo, calicibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis. *Flor. dan. t.* 225.

ſilvatica. 2. P. caule ramoſo, calicibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato. *Flor. dan. t.* 225.

roſtrata. 3. P. caule declinato ſubramoſo, corollis galea roſtrato-acuminatis, calicibus criſtatis ſubhirſutis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 205.

myriophylla. 4. P. caule ſubſimplici, foliis quaternis verticillatis pinnatifidis: laciniis crenulatis, calicibus truncato-bilobis. *Pallas it.* 3. *p.* 738. *t.* S. *f.* 2. B.

Sceptrum Carolinum. 5. P. caule simplci, floribus terno-verticillatis, corollis clausis, calicibus cristatis, capsulis regularibus. *Flor. dan. t.* 26.

verticillata. 6. P. caule simplici, foliis quaternis pinnatis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 206. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 5.

resupinata. 7. P. caule simplici, foliis lanceolatis serratis crenulatis, floribus resupinatis. *Gmel. flor. sib.* 3. *t.* 44.

recutita. 8. P. caule simplici, foliis pinnatifidis serratis, spica foliosa: calicibus coloratis, corollis obtusis. *Jacq flor. austr.* 3. *t.* 258.

flava. 9. P. caule simplici angulato, foliis bipinnatifidis dentatis, spica foliosa, calicibus pentandris quinquedentatis, galeæ mucrone truncato-emarginato. *Pall. it.* 3. *p.* 736. *t.* R. *f.* 1. A. B.

tristis. 10. P. caule simplici, corollarum galeis margine villosis.

flammea. 11. P. caule simplici, foliis pinnatis retro imbricatis. *Flor. lapp. t.* 11. *f.* 2.

hirsuta. 12. P. caule simplici, foliis dentato-pinnatis linearibus, calicibus hirsutis. *Flor. lapp. t.* 4. *f.* 3.

rosea. 13. P. caule simplici, foliis pinnatis: pinnis oblongis pinnatifidis, calicibus hirsutis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 40.

incarnata. 14. P. caule simplici, foliis pinnatis serratis, calicibus rotundatis glabris, corollis galea uncinata acuta. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 140.

cristata. 23. P. caule simplici, foliis pinnatis obtuse dentatis, galea rostrata. *Hall. hist. stirp. Helv. n.* 324.

lapponica. 15. P. caule simplici, foliis pinnatifidis serratis, calicibus bifidis obtusis. *Flor. dan. t.* 2.

comosa. 16. P. caule simplici, spica foliosa, corollis galea acuta emarginata, calicibus quinquedentatis. *Allion. fl. pedem. t.* 12. *f.* 1.

foliosa. 17. P. caule simplici, spica foliosa, corollis galea obtusissima integra. *Mant. p.* 80. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 139.

canadensis. 18. P. caule simplici, spica subfoliosa, corollis galea setaceo-bidentata, calicibus deorsum truncatis. *Mant. p.* 86.

tuberosa. 19. P. caule simplici, calicibus cristatis, corollis galea rostrato adunca. *Bocc. mus. t.* 8.

ſtriata. 20. P. caule ſimpliciſſimo, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus ſerrulatis, calicibus cylindricis quinquedentatis corolla triplo brevioribus, galea obtuſe bidentata. *Pall. it.* 3. *p.* 737. *t.* R. *f.* 2. C.

ſpicata. 21. P. caule ſimpliciſſimo rectiſſimo, foliis ternis verticillatis pinnatifidis: laciniis crenulatis, calicibus truncato-bilobis. *Pall. it.* 3. *p.* 738. *t.* S. *f.* 2. B.

acaulis. 22. P. pedunculis radicalibus unifloris flore brevioribus, labii tripartiti lobo intermedio baſi bicarinato. *Wulfen apud Jacquin coll.* 1. *p.* 207. *t.* 14.

AFZELIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata. *Capſ.* rotundata, acuminata, 2locularis, apice dehiſcens polyſperma: receptaculis hemiſphæricis.

caſſioides. 1. AFZELIA. *Walt. flor. carol. p.* 171.

747. GERARDIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 2labiata: labio inferiore 3partito; laciniis emarginatis, medio 2partito. *Capſ.* 2locularis, baſi dehiſcens.

tuberoſa. 1. G. foliis ſubovatis tomentoſis repandis longitudine caulis. *Plum. ic.* 75. *f.* 2.

glutinoſa. 2. G. foliis ovatis ſerratis, bracteis linearibus hiſpidis. *Osb. it. t.* 9.

japonica. 3. G. foliis ovatis-inciſo-pinnatifidis petiolatis, caule ſimplici. *Thunb. flor. jap. p.* 251.

ſcabra. 4. G. hiſpida ſcabra, foliis oblongis pinnatifidis. *Suppl. p.* 279.

pedicularia. 5. G. foliis oblongis duplicato-ſerratis, caule paniculato, calicibus crenatis.

nigrina. 6. G. ſcabra, foliis lanceolatis inferne ſerratis, caule tetragono. *Suppl. p.* 278. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 154. Nigrina viſcoſa. *Berg. fl. cap. t.* 3. *f.* 4. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 4.

flava. 7. G. foliis lanceolatis pinnato-dentatis, caule ſimpliciſſimo. *Pluckn. mant. t.* 368.

delphinifolia. 8. G. foliis linearibus pinnatifidis, caule subramoso.

tubulosa. 9. G. lævis, foliis linearibus integris acutis, tubo calice longiore. *Suppl. p. 279.*

purpurea. 10. G. foliis linearibus integerrimis, floribus oppositis. *Pluckn. phyt. 12. f. 2.*

erecta. 11. G. foliis linearibus pedunculo brevioribus, floribus axillaribus. *Walt. flor. carol. p. 170.*

setacea. 12. G. foliis setaceis, caule ramosissimo, floribus terminalibus. *Walt. flor. carol. p. 170.*

748. CHELONE. *Cal.* 5partitus. *Rudimentum* filamenti quinti inter suprema stamina. *Caps.* 2locularis: dissepimento duplicato. *Sem.* bracteata, membranaceo-marginata.

glabra. 1. Ch. foliis petiolatis lanceolatis serratis: summis oppositis. *Gaertn. de fr. & sem. cent. 4. t. 54. f. 6.*

obliqua. 2. Ch. foliis petiolatis lanceolatis serratis oppositis. *Mill. h. angl. t. 93. an satis distincta a glabra?*

hirsuta. 3. Ch. caule foliisque hirsutis. *Mill. h. angl. t. 252. an varietas pentstamonis?*

Pentstamon. 4. Ch. foliis amplexicaulibus, panicula dichotoma. *Mant. p. 415. Arduin. spec. t. 5. β) Moris. hist. pl. 3. t. 21. f. 3. an cum præcedente distincti generis?*

ruellioides. 5. Ch. foliis radicalibus petiolatis ovatis serratis: caulinis oppositis amplexicaulibus, pedunculis elongatis, calicibus ciliatis. *Suppl. p. 279. nonne distincti generis planta, rudimento filamenti quinti destituta?*

260. BRUNSFELSIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* tubo longissimo. *Filamentum* 5tum sterile. *Capsula* exterius baccata, 1locularis, polysperma: conceptaculo maximo.

americana. 1. Br. foliis ellipticis acuminatis: petiolis longioribus, corollæ tubo erecto, limbo integro. *Plum. ic.* 65.

undulata. 2. Br. foliis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis: petiolis brevissimis, corollæ tubo curvo, limbo undulato. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 90.

749. GESNERIA. *Cal.* 5fidus, germini insidens. *Cor.* incurva, recurvaque. *Caps.* infera; subbilocularis.

ventricosa. 1. G. foliis ellipticis acuminatis crenatis glabris, pedunculis subquadrifloris, calicis laciniis subulatis elongatis, corollis ventricosis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 90.

pulchella. 2. G. herbacea, foliis ternatis ovatis acutis serratis villosis, pedunculis axillaribus unifloris. *Brown. jam. p.* 270. *t.* 30. *f.* 1.

corymbosa. 3. G. foliis ovatis acutis serratis scariosis asperis, pedunculis multipartitis, floribus corymbosis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 89.

pumila. 4. G. acaulis, foliis ovato-cuneiformibus crenatis subsessilibus, pedunculis subunifloris, foliis brevioribus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 90.

scabra. 5. G. foliis ovato-lanceolatis serratis scabris, pedunculis axillaribus, corollis cylindricis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 89.

exserta. 6. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla duplo longioribus, capsulis ovatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 89.

tomentosa. 7. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis hirsutis, pedunculis lateralibus longissimis corymbiferis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 47.

acaulis. 8. G. foliis lanceolato-ovatis serratis subpetiolatis terminalibus confertis, pedunculis trifloris, folio brevioribus. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 102. *f.* 1.

calicina. 9. G. foliis lanceolato-ovatis acuminatis serratis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla longioribus, calice campanulato, capsula cylindrica. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 90.

grandis. 10. G. foliis lato-lanceolatis longissimis denticulatis superne hirtis subtus scabris, pedunculis terminalibus, caule arborescente. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 89.

humilis. 11. G. foliis lanceolatis serratis sessilibus, pedunculis ramosis multifloris. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 104. *f.* 2.

750. ANTIRRHINUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* basi gibba aut calcarata. *Caps.* 2locularis, polysperma, apice in lacinulas reflexas dehiscens.

* *corollis calcaratis.*

† *clausis.*

† *aphylla.*

aphyllum. 1. A. scapo aphyllo capillari. *Suppl. p.* 280.

†† *foliosa.*

‡ *foliis alternis.*

Cymbalaria. 2. A. foliis cordatis quinquelobis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 55.

dalmaticum. 3. A. foliis cordatis amplexicaulibus. *Buxb. cent.* 1. *t.* 24.

pilosum. 4. A. foliis reniformibus pilosissimis, caulibus procumbentibus. *Mant. p.* 149. *Jacq. obs. bot.* 2. *t.* 48.

reflexum. 5. A. foliis ovatis glabris, pedunculis axillaribus: fructiferis elongatis recurvis, caule procumbente. *Allion. corf.* 205. *f.* 1.

spurium. 6. A. foliis ovatis villosis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 205.

7. A.

Elatine. 7. A. foliis haſtatis, caulibus procumbentibus. *Flor. dan. t.* 426. *Siliqua breviſſima ſpuria.*

cirrhoſum. 8. A. foliis haſtatis: petiolis paſſim cirrheſcentibus, caulibus patulis. *Mant. p.* 249. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 82.

ægyptiacum. 9. A. foliis haſtatis, caule erecto ramoſiſſimo, pedunculis rigeſcentibus.

hirtum. 10. A. foliis lanceolatis hirtis, floribus ſpicatis: foliolo calicino ſupremo maximo. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 30.

geniſtifolium. 11. A. foliis lanceolatis acuminatis, panicula virgata flexuoſa. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 244.

linifolium. 12. A. foliis lanceolatis trinerviis, floribus racemoſis: pedunculis diſtantibus bractea brevioribus. *Buxb. cent.* 1. *t.* 25. *f.* 2.

Linaria. 13. A. foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *) *Knorr del. hort.* 2. *t.* L. 6. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7.

chalepenſe. 14. A. foliis lineari-lanceolatis, floribus racemoſis, calicibus corolla longioribus, caule erecto. *Riv. monop. t.* 80. *f.* 2.

junceum. 15. A. foliis linearibus, caule paniculato virgato, floribus racemoſis.

pedunculatum. 16. A. foliis linearibus remotis, floribus paniculatis: pedunculis folio longioribus ſtrictis.

minus. 17. A. foliis plurimis alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo. *Flor. dan. t.* 502. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 1.

┼ ┼ *foliis oppoſitis.*

peliſſerianum. 18. A. foliis caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis ternis, floribus corymboſis. *Mant. p.* 416. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 4.

---

*) PELORIA *Amœn. acad.* 1. *p.* 55. *t.* 3. LINARIÆ *proles hybrida, ejuſdemque qualitatis & conſtans, radicibus infinite ſeſe multiplicans charactere fructificationis diverſiſſima corolla regulari, quinquecorniculata pentandra, ut genus proprium abſolute conſtitueret & diſtinctiſſimum, niſi fructus frequentiſſime abortiret. Naturæ prodigium. Ita quidem a Linné. Veriſimilior autem videtur ea opinio, quæ peloriam pro peculiari degeneratione monſtroſa floris habet, in quam inclinare hoc genus præ aliis, ſimilis a forma deflexio in aliis ſpeciebus e. g. ſpurio, Elatine, Cymbalaria, obſervata, teſtatur. Merk Goett. gel. Anz.* 1774. *n.* 121. *Linck Annal. Naturg.* 1. *p.* 32.

Hælava. 19. A. foliis linearibus alternis: infimis ternis, floribus racemoso-capitatis: galea bifida, labio tridentato. *Forsk. fl. ægy. arab. p.* 111.

viscosum. 20. A. foliis caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis quaternis, calicibus villosis cauli approximatis.

saxatile. 21. A. foliis lanceolato-linearibus sparsis villosis: inferioribus quaternis, caule decumbente, floribus spicatis. *Mant. p.* 416.

origanifolium. 22. A. foliis (plurimis) oppositis oblongis, floribus alternis. *Barr. pl. rar. ic.* 598.

triste. 23. A. foliis linearibus sparsis: inferioribus oppositis, nectariis subulatis, floribus subsessilibus. *Mill. h. angl. t.* 166.

villosum. 24. A. foliis ovatis villosis, caulibus simplicibus, floribus oppositis lateralibus. *Barr. pl. rar. ic.* 597.

macrocarpon. 53. A. foliis ovatis serratis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris, capsulis compressis carinatis truncatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 335.

bicorne. 25. A. foliis ovato-oblongis serratis, caule erecto, floribus racemosis, capsulis bicornibus. *Burm. afr. t.* 75. *f.* 3.

hexandrum. 26. A. foliis cordato-ovatis serratis, pedunculis axillaribus unifloris. *Forst. flor. austr. p.* 43.

pinnatum. 27. A. foliis pinnatifidis, caule erecto, floribus racemosis. *Suppl. p.* 280.

versicolor. 28. A. foliis lineari-lanceolatis: inferioribus ternis, caule erecto spicato. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 31.

sparteum. 29. A. foliis subulatis canaliculatis carnosis: inferioribus ternis, caule paniculato corollisque glaberrimis.

triphyllum. 30. A. foliis ternis ovatis. *Bocc. sic. t.* 22. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. H.

viscosum. 31. A. foliis radicalibus quaternis lanceolatis: caulinis linearibus alternis, calicibus villosis cauli approximatis.

arvense. 32. A. foliis sublinearibus: inferioribus quaternis, calicibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 5.

bipunctatum. 33. A. foliis linearibus glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus spicato-capitatis.

repens. 34. A. foliis linearibus confertis: inferne quaternis, calicibus capſulam æquantibus. *Dill. h. Elth. t. 163. f. 197.*

æragineum. 54. A. foliis linearibus inferioribus quaternis, floribus racemoſis: calicis lacinia ſuprema ceteris duplo longiori. *Gouan. illuſtr.*

ſupinum. 35. A. foliis ſubquaternis linearibus, caule diffuſo, floribus racemoſis: calcari recto.

purpureum. 36. A. foliis quaternis linearibus, caule erecto ſpicato. *Mant. p. 416. Rivin. monop. t. 85. f. 1. Gaertn. de fr. & ſem. cent. 4. t. 53. f. 7.* k.

alpinum. 37. A. foliis quaternis lineari-lanceolatis glaucis, caule diffuſo, floribus racemoſis: calcari recto. *Jacq. flor. auſtr. 1. t. 58.*

triornithophorum. 38. A. foliis quaternis lanceolatis, caule erecto ramoſo, floribus pedunculatis. *Herm. par. Lugdb. t. 377.*

glaucum. 39. A. foliis quaternis ſubulatis carnoſis, caulibus erectis, floribus ſpicatis. *Buxb. cent. 4. t. 37.*

multicaule. 40. A. foliis quinis linearibus carnoſis, floribus capitatis. *Bocc. ſic. t. 19. f. 1.*

monſpeſſulanum. 41. A. foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis ſpicatis nitidis.

flavum. 42. A. foliis inferioribus ternis ſubovatis: ſuperioribus ſparſis linearibus. *Poir. voy. en Barbar. 2. p. 191. Corollæ intenſe flavæ.*

virgatum. 43. A. foliis ovato-lanceolatis ſparſis: inferioribus ternis, caule ſimpliciſſimo. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 192.*

††† *foliis ſparſis.*

lagopodioides. 44. A. foliis mollibus apice recurvis, ſpicis ovatis villoſis. *Suppl. p. 279.*

pinifolium. 45. A. foliis filiformibus, floribus ſpicatis: pedunculis calicibuſque hirſutis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 193.*

‡‡ *corollis hiantibus.*

bellidifolium. 46. A. foliis radicalibus lingulatis dentatis lineatis, caulinis partitis integerrimis. *Mant. p. 417.*

canadenſe. 47. A. foliis linearibus alternis, corollæ labio inferiore explanato.

** *corollis ecaudatis.*

unilabiatum. 48. A. caule paniculato, foliis alternis pinnatis, corollæ callis duobus. *Suppl. p.* 279.

molle. 49. A. caulibus procumbentibus, foliis oppositis ovatis tomentosis. *Barr. pl. rar. ic.* 598.

Asarina. 50. A. caulibus procumbentibus, foliis oppositis cordatis crenatis. *Lob. ic.* 601.

papilionaceum. 51. A. foliis carnosis, floribus axillaribus: calicibus papilionaceis. *Mant. p.* 86.

Orontium. 52. A. floribus subspicatis: calicibus corolla longioribus. *Curt. flor. Lond. t.* 234. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. H.

majus. 53. A. floribus spicatis: calicibus rotundatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* L. 12. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. G.

751. CYMBARIA. *Cal.* 10dentatus. *Caps.* ovata, 2locularis.

daurica. 1. CYMBARIA. *Amm. ruth.* 47. *t.* 1. *f.* 2. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 12.

1407. THUNBERGIA. *Cal.* duplex: exterior 2-phyllus; interior multipartitus. *Caps.* globosa, rostrata, 2locularis.

capensis. 1. THUNBERGIA. *Suppl. p.* 292. *Retzius act. Lund.* 1. *p.* 163. *ic.*

752. CRANIOLARIA. *Cal.* duplex: *perianth.* 4-phyllum; *spatha* 1phylla. *Cor.* tubus longissimus. *Caps.* lignosa; corticata: rostro hamato, 3locularis, 2valvis.

fruticosa. 1. Cr. foliis lanceolatis dentatis. *Plum. gen. t.* 137. *an Gesneriæ jungenda?*

annua. 2. Cr. foliis cordatis angulatis, calice exteriore diphyllo. *Mant. p. 417. Jacq. stirp. amer. pict. t. 166. an Martyniæ potius species?*

753. MARTYNIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* campanulata. *Rudimentum* filamenti 5ti. *Caps.* lignosa, corticata; rostro hamato, 2valvis.

perennis. 1. M. caule simplici, foliis serratis. *Ehret pl. sel. t. 9. f. 1.*

longiflora. 2. M. caule simplici, foliis orbiculatis repandis. *Meerburgh Afbeeld. t. 7.*

annua. 3. M. caule ramoso, foliis cordato-orbiculatis dentatis. *Ehret pl. sel. t. 1. f. 5.*

proboscidea. 4. M. caule ramoso, foliis cordato-ovatis integerrimis, capsulæ rostro longissimo. *Schmidel icon pl. & anal. t. 12. 13. Gaertn. de fr. & sem. fasc. 7. t. 110. f. 1.*

754. TORENIA. *Cal.* 2labiatus: labio superiori 3cuspide. *Filamenta* inferiora ramulo sterili. *Caps.* 2locularis.

asiatica. 1. TORENIA. *Rheed. h. malab. 9. t. 53.*

755. BESLERIA. *Cal.* 5partitus. *Bacca* supera, 1locularis, subglobosa, polysperma.

melittifolia. 1. B. pedunculis ramosis, foliis ovatis. *Plum. ic. 48.*

lutea. 2. B. pedunculis simplicibus confertis, foliis lanceolatis. *Plum. ic. 49. f. 1. Gaertn. de fr. & sem. cent. 2. t. 52. f. 2.*

cristata. 3. B. pedunculis simplicibus solitariis, calicibus serrato-cristatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 180.*

bivalvis. 4. B. calicibus bivalvibus laceris. *Suppl. p. 280.*

violacea. 5. B. caule scandente, foliis ovatis acutis integerrimis, floribus spicatis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 630. t. 254.* β) Besleria cærulea. *Aubl. pl. guj. 2. p. 631.*

coccinea. 6. B. caule ſcandente, foliis ovato-acuminatis involucro diphyllo, calicibus coccineis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 632. *t.* 255.

incarnata. 7. B. foliis ovatis crenatis utrinque tomentoſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 635. *t.* 256.

MONTIRA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* tubo ventricoſo, incurvo; limbo 5lobo. *Germen* 2dymum. *Capſ.* 2ventricoſa, 2-locularis, 4valvis, polyſperma.

guianenſis. 1. MONTIRA. *Aubl. pl. guj.* 1. *p.* 637. *t.* 257.

CONOBEA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* ringens, 2labiata: labio 3fido. *Stigma* 2lobum. *Capſ.* 1locularis, 4valvis, polyſperma.

aquatica. 1. CONOBEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 639. *t.* 257.

MYOPORUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata; limbo patente ſubæquali 5-partito. *Bacca* 1-2ſperma: ſeminibus 2locularibus.

lætum. 1. M. foliis oblongis apice ſubſerratis lævibus glabris nitidis, corollis hirſutis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

craſſifolium. 2. M. foliis oblongis ſubſerratis carnoſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

pubeſcens. 3. M. foliis oblongo-ellipticis ſerratis pubeſcentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

tenuifolium. 4. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, corollis brevibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

NEMIA. *Cal.* 5partitus, ſuperus. *Cor.* infundibuliformis: limbo ſubæquali, 5partito. *Capſ.* 2locularis, 2valvis.

capenſis. 1. NEMIA. *Berg. fl. cap. p.* 160.

GALVESIA. *Cal.* 5fidus, parvus. *Cor.* tubulosa, basi subventricosa: galea 2loba; labio 3partito. *Caps.* globosa, 2locularis.

fruticosa. 1. GALVESIA. *Jussieu gen. plant. p.* 119.

756. SCROPHULARIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5partita: tubo globoso; lacinia infima reflexa. *Caps.* 2locularis, dissepimento duplicato.

marilandica. 1. Scr. foliis cordatis serratis acutis basi rotundatis, caule obtusangulo. *Kniph. bot. orig. cent.* 2. *n.* 80.

Scorodonia. 2. Scr. foliis cordatis duplicato-serratis, racemo composito foliis interstincto. *Pluckn. alm. t.* 59. *f.* 5.

glabrata. 20. Scr. foliis oblongo-lanceolatis cordatis duplicato-serratis glabris, paniculis racemosis terminalibus trichotomis, caule suffruticoso. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 342.

arguta. 21. Scr. foliis cordatis glabris duplicato-serratis, paniculis axillaribus dichotomis, capsulis acuminatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 342.

altaica. 3. Scr. foliis cordatis duplicate serrato-dentatis ovatis: dentibus basin respicientibus, racemo composito aphyllo. *Murray comm. Goett.* 1781. *p.* 35. *t.* 2.

betonicifolia. 4. Scr. foliis cordatis oblongis dentatis: dentibus integerrimis, baseos profundioribus. *Mant. p.* 87. *Barr. pl. rar. ic.* 274.

nodosa. 5. Scr. foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Blackw. herb. t.* 87.

aquatica. 6. Scr. foliis cordatis obtusis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Flor. dan. t.* 507. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 8.

auriculata. 7. Scr. foliis cordatis subtus tomentosis basi appendiculatis, racemis terminalibus. *Lob. ic.* 533.

vernalis. 8. Scr. foliis cordatis: caulinis ternis, pedunculis axillaribus solitariis bifidis. *Flor. dan. t.* 411.

peregrina. 9. Scr. foliis cordatis lineatis lucidis, pedunculis axillaribus bifloris, caule sexangulari. *Mant. p.* 418. *Cam. hort. t.* 43.

orientalis. 10. Scr. foliis lanceolatis serratis petiolatis: caulinis ternis, ramis oppositis. *Kniph. bot. orig. cent.* 5. *n.* 80.

sinensis. 11. Scr. foliis ovato-oblongis serratis pubescentibus. *Mant. p.* 250.

meridionalis. 12. Scr. foliis oblongo-ovatis serratis glabris, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 280.

coccinea. 13. Scr. foliis quaternis ovatis, floribus verticillatis spicatis.

frutescens. 14. Scr. foliis subcarnosis sessilibus laevibus apice recurvis. *Mant. p.* 418. *Herm. par. Lugdb. t.* 547.

trifoliata. 15. Scr. foliis glabris: inferioribus ternato-pinnatis obtusis; superioribus simplicibus, pedunculis subtrifloris axillaribus. *Pluckn. alm. t.* 313. *f.* 6.

sambucifolia. 16. Scr. foliis interrupte pinnatis cordatis inaequalibus, racemo terminali: pedunculis axillaribus geminis dichotomis. *Mill. h. angl. t.* 231.

viridiflora. 17. Scr. foliis glabris interrupte pinnatis: pinnis ovato-oblongis serratis, racemo terminali subnudo longissimo. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 194.

lucida. 18. Scr. foliis inferioribus bipinnatis subramosis glaberrimis, racemis bipartitis. *Tournef. it.* 1. *t.* 85.

canina. 19. Scr. foliis pinnatifidis, racemo terminali nudo: pedunculis bifidis. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 90.

757. CELSIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata, semiquinquefida. *Filamenta* extrorsum lanata. *Capf.* 2locularis.

orientalis. 1. C. foliis bipinnatis. *H. Upf. t.* 1. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 7.

Arcturus. 2. C. foliis radicalibus lyrato-pinnatis, pedunculis flore longioribus. *Mant. p.* 339. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 170. Verbascum Arcturus. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 117.

cretica. 3. C. foliis radicalibus lyratis: caulinis subcordatis amplexicaulibus, floribus subsessilibus. *Suppl. p.* 281. *Mill. ic. t.* 273.

linearis. 4. C. foliis lineari-lanceolatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 270. *pl. rar. ic. cent.* 2. *fasc.* 1. *t.* 13

1405. HEMIMERIS. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata: *lacinia* una majore obcordata. *Fossula* laciniarum nectarifera.

montana. 1. H. diandra, foliis oppositis ovatis serratis, caule erecto. *Suppl. p.* 280.

sabulosa. 2. H. diandra, foliis oppositis pinnatifidis, caule prostrato. *Suppl. p.* 280.

diffusa. 3. H. foliis alternis oppositisque pinnatifidis, caule patulo. *Suppl. p.* 280.

MATUREA. *Cal.* 4partitus. *Cor.* 2labiata: labio superiori 2fido; inferiori 3fido. *Stigm.* 2lamellatum. *Caps.* 1locularis, 2valvis, polysperma.

pratensis. 1. MATUREA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 642. *t.* 259. *an distincti generis?*

758. DIGITALIS. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata: 5fida, ventricosa. *Caps.* ovata, 2locularis, polysperma.

purpurea. 1. D. calicis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiori integro. *Flor. dan. t.* 74. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 6.

minor. 2. D. calicis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiori subbilobo, foliis lævibus. *Mant. p.* 567.

Thapsi. 3. D. calicis foliolis ovatis acutis, foliis decurrentibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1185.

obscura. 4. D. calicis foliolis ovatis acutiusculis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis basi adnatis. *Mant. p.* 418. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 91.

ferruginea. 5. D. calicis foliolis ovatis obtusis patentibus, corollarum labio inferiori barbato. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 86.

lutea. 6. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis acutis; labio superiori bifido. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 105.

ambigua. 7. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis galea emarginata, foliis subtus pubescentibus. *Suppl. p.* 282. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 57.

canariensis. 8. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoso. *Mill. h. angl. t.* 120.

Sceptrum. 9. D. calicis foliolis subulatis, corollis quadrifidis, foliis oblongis spatulatis serratis, spicis terminalibus ovatis pedunculatis coma bractearum terminatis, caule fruticoso. *Suppl. p.* 282. *Herit. sert. angl. t.* 24.

TOURRETTIA. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* 2labiata: tubo inæquali, ventricoso. *Rudimentum* sæpe filamenti 5ti. *Caps.* 4locularis, hispida, ungue elastico terminata. *Semina* alata, imbricata.

volubilis. 1. TOURRETTIA. *Fougeroux de Bonderoy act. Paris. ann.* 1784. *p.* 200. *t.* 1.

759. BIGNONIA. *Cal.* 5fidus, cyathiformis. *Cor.* fauce campanulata, 5fida, subtus ventricosa. *Caps.* siliquosa 2locularis. *Sem.* membranaceo-alata.

* *foliis simplicibus.*

Catalpa. 1. B. foliis ternis cordatis, caule erecto, floribus diandris. *Catesb. Car.* 1. *t.* 29.

tomentosa. 2. B. foliis cordatis subtus tomentosis, floribus axillaribus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 262. *Kaempf. am. exot.* 5. *p.* 859. 860. *ic.*

sempervirens. 3. B. foliis lanceolatis, caule volubili. *Catesb. Car.* 1. *t.* 53. *Jacq. coll.* 3. *p.* 259. *an forsan distincti generis?*

citrifolia. 30. B. foliis ovato-lanceolatis: petiolo alato, caule scandente. *Barrel. fr. equin.* 23.

longissima. 4. B. arborea, foliis oblongis acuminatis, floribus diandris, capsulis filiformibus: seminibus lanatis. *Jacq. stirp. amer. p.* 182. *t.* 176. *f.* 78.

** *foliis compositis.*

unguis. 5. B. foliis conjugatis: cirrho brevissimo arcuato tripartito. *Pluckn. alm. t.* 163. *f.* 2.

dichotoma. 31. B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis ovatis; imis ternatis, floribus racemosis: pedunculo communi dichotomo. *Jacq. am. p.* 183.

æquinoctialis. 6. B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis ovato-lanceolatis, pedunculis bifloris, capsulis linearibus. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 85.

paniculata. 7. B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordato-ovatis, floribus racemosis, pedunculis trifloris. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 175.

pubescens. 8. B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordato-ovatis subtus pubescentibus.

crucigera. 9. B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordatis, caule muricato. *Plum. ic. t.* 58.

capreolata. 10. B. foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordato-lanceolatis, foliis imis simplicibus. *Du Hamel arbr.* 1. *t.* 40.

alliacea. 11. B. foliis conjugatis: foliolis ellipticis integris coriaceis, pedunculis quinquefloris axillaribus: calicibus integris. *Aubl. guj. p.* 659. *n.* 14.

echinata. 12. B. foliis inferioribus ternatis: superioribus conjugatis; petiolis dichotomis cirrhosis, capsulis echinatis. *Aubl. guj.* 2. *t.* 263. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 3. *t.* 52. *f.* 1.

incarnata. 13. B. foliis inferioribus ternatis: superioribus conjugatis, petiolis cirrhigeris, capsulis glabris. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 645. *t.* 261.

Kerere. 14. B. foliis binatis ternatisque, floribus corymbosis axillaribus, capsulis ovatis subcompressis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 644. *t.* 260.

triphylla. 15. B. foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis, caule fruticoso erecto.

alta. 16. B. foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis, caule scandente. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 653. *t.* 266.

fluviatilis. 17. B. foliis digitatis: foliolis ovato-oblongis glabris integerrimis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 655. *t.* 267.

penta-phylla. 18. B. foliis digitatis : foliolis integerrimis obovatis. *Cateſb. Car.* 1. *t.* 37.

Leucoxylon. 19. B. foliis digitatis : foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Pluckn. alm. t.* 200. *f.* 4. *β?*) Bignonia orbiculata. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 77.

radiata. 20. B. foliis digitatis : foliolis pinnatifidis. *Feuill. peruv.* 1. *t.* 22.

radicans. 21. B. foliis pinnatis : foliolis inciſis, caule geniculis radicans. *Mill. h. angl.* 65. *β*) *Cateſb. Car.* 1. *t.* 65.

ſtans. 22. B. foliis pinnatis : foliolis ſerratis, caule erecto firmo, floribus racemoſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 176.

grandiflora. 23. B. foliis pinnatis : foliolis ovatis acuminatis ſerratis, caule volubili, calice ſemiquinquefido. *Thunb. flor. jap. p.* 253. *Banks ic. Kaempf. t.* 21.

Chelonoides. 24. B. foliis impari-pinnatis : foliolis ovatis integerrimis acuminatis pubeſcentibus, floribus barbatis ſemipentandris. *Suppl. p.* 282.

ſpathacea. 25. B. foliis impari-pinnatis : foliolis ovatis hirtis, calice monophyllo ſpathaceo, corolla hypocrateriformi. *Suppl. p.* 283.

peruviana. 26. B. foliis decompoſitis : foliolis inciſis, caule geniculis cirrhoſis.

indica. 27. B. foliis bipinnatis : foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Rheed. h. malab.* 1. *t.* 43. 45.

cærulea. 28. B. foliis bipinnatis : foliolis lanceolatis integris. *Cateſb. Car.* 1. *t.* 42.

Copaja. 29. B. foliis bipinnatis : foliolis ovatis ſeſſilibus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 650. *t.* 265. *an ſatis diſtincta ab indica?*

760. CITHAREXYLUM. *Cal.* 5dentatus, campanulatus. *Cor.* infundibuliformi-rotata : laciniis æqualibus ſupra villoſis. *Bacca* 2pyrena : oſſiculis 2locularibus.

cinereum. 1. C. ramis teretibus, racemis lateralibus, calicibus dentatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 178.

erectum. 2. C. ramis teretibus, racemis erectis terminalibus, calicibus dentatis. *Browne jam. t. 28. f. 2.*

caudatum. 3. C. ramis teretibus, calicibus truncatis.

villosum. 4. C. ramis teretibus: junioribus tetragonis; novellis villosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 82.*

quadrangulare. 5. C. ramis tetragonis, racemis erectis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 22.*

subserratum. 6. C. ramis tetragonis, racemis axillaribus nutantibus, calicibus dentatis, foliis ellipticis subserratis venosis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 91.*

Melanocardium. 7. C. ramis tetragonis, racemis terminalibus compositis, floribus tetrandris. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 91.*

paniculatum. 8. C. floribus paniculatis. *Gaertn. de fr. & sem. cent. 4. t. 56. f. 8.*

761. HALLERIA. *Cal.* 3fidus. *Cor.* 4fida, filamentis brevior. *Bacca* infera, 2locularis.

lucida. 1. Halleria. *Burm. afr. t. 89. f. 3. β) Burm. afr. t. 89. f. 1.*

TANÆCIUM. *Cal.* cylindricus, truncatus. *Cor.* tubulosa, subæqualis, 5fida. *Rudimentum* filamenti quinti. *Bacca* corticosa maxima.

Jaroba. 1. T. foliis inferioribus ternatis: superioribus geminatis; cirrhis interpetiolaribus terminalibus, caule scandente. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 92.*

parasiticum. 2. T. foliis ovatis coriaceis, caule scandente fruticoso radicante. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 92.*

762. CRESCENTIA. *Cal.* 2partitus, æqualis. *Cor.* gibba. *Bacca* pedicellata, 1locularis. *Semina* multa 2locularia.

Cujete. 1. Cr. foliis cuneato-lanceolatis. *Jacq. stirp. amer. p. 3. t. 167.*

cucurbitina. 2. Cr. foliis lanceolato-ovatis. *Mant. p.* 250. *Pluckn. alm. t.* 171. *f.* 2.

pinnata. 3. Cr. foliis pinnatis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 203. *t.* 18.

763. GMELINA. *Cal.* obſolete 4dentatus. *Cor.* 4-fida, campanulata. *Antheræ* 2 2partitæ, 2 ſimplices. *Drupa* baccata : *putamine* 3loculari ; loculamento inferiori ſterili.

aſiatica. 1. Gm. ſpinis oppoſitis horizontalibus. *Rumpf amb.* 1. *t.* 40. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 5.

coromandelica. 2. Gm. ſpinis oppoſitis erectiuſculis. *Sloan. jam. t.* 207. *f.* 1.

indica. 3. Gm. ſpinis alternis folio longioribus. *Burm. fl. ind. p.* 132.

764. PETREA. *Cal.* 5partitus, maximus, coloratus. *Cor.* rotata. *Capſ.* 2locularis in fundo calicis. *Sem.* ſolitaria.

volubilis. 1. PETREA. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 173.

1316. PREMNA. *Cal.* campanulatus, integerrimus, aut obſolete 2lobus, vel obiter 4dentatus. *Cor.* 4fida. *Drupa* baccata : putamine 4-loculari. *Semina* ſolitaria.

integrifolia. 1. Pr. foliis integerrimis. *Mant. p.* 252. *Burm. ind. t.* 41. *f.* 1.

ſerratifolia. 2. Pr. foliis ſerratis. *Mant. p.* 253. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 6.

GALIPEA. *Cal.* 4 - 5angulus, 4 - 5dentatus. *Cor.* 4-5fida : tubo brevi. *Filam.* 2 ſterilia, 2 fertilia. *Germen* 4-5gonum. *Stigma* 4partitum. *Peric.* - - -

trifoliata. 1. GALIPEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 662. *t.* 269.

AMBULIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* tubulosa, 4fida: laciniis inæqualibus. *Caps.* 5gona, 1locularis, 1sperma.

monosperma. 1. AMBULIA. *la Marck encycl.* 1. *p.* 128.

765. LANTANA. *Cal.* obsolete 4dentatus. *Cor.* limbus subquadrifidus inæqualis. *Stigma* uncinato-refractum. *Drupæ congregatæ* (plurimis) 3loculares, loculamento inferiori sterili.

salvifolia. 1. L. foliis oppositis subsessilibus, floribus racemosis. *Mant.* *p.* 419.

aculeata. 2. L. foliis oppositis, caule aculeato ramoso, spicis hemisphæricis. *Mant.* *p.* 419. *Pluckn. alm. t.* 233. *f.* 5. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 4.

Camara. 3. L. foliis oppositis, caule inermi ramoso, floribus capitato-umbellatis aphyllis. *Dill. h. Elth. t.* 56. *f.* 65.

annua. 4. L. foliis oppositis, caule inermi herbaceo, spicis oblongis. *Mant. p.* 419. *Sloan. hist. jam.* 2. *t.* 195.

mista. 5. L. foliis oppositis acuminatis, floribus capitatis: involucris longitudine florum. *Dill. h. Elth. t.* 56. *f.* 64.

Radula. 6. L. foliis oppositis ovatis acutis serratis rugosis asperis subhirsutis, caule subinermi aspero, capitulis oblongis: bracteis ovatis acutis. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 92.

stricta. 7. L. foliis oppositis oblongo-lanceolatis acutis, caule inermi, capitulis subrotundis: bracteis ovato-lanceolatis squarrosis. *Sloan. hist. jam.* 2. *t.* 195. *f.* 4.

melissæfolia. 8. L. foliis oppositis ovato-oblongis villosis mollibus, caule aculeato, spicis hemisphæricis: bracteis tubo dimidio brevioribus. *Dill. h. Elth. t.* 57. *f.* 66.

scabrida. 9. L. foliis oppositis ovato-ellipticis scabris, caule aculeato, spicis hemisphæricis; bracteis tubo dimidio brevioribus lanceolatis acutis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 352.

viburnoides. 14. L. foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule inermi, floribus capitato-spicatis, involucris lanceolatis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 117 Charactera viburnoides. β) Charactera tetragona. *Forsk.* l. m. c.

odorata. 10. L. foliis oppositis ternisque lanceolato-ellipticis, caule inermi.

involucrata. 11. L. foliis oppositis ternisque cuneato-obovatis obtusis lineatis tomentosis, capitulis squarrosis. *Medic. act. palat.* 3. *phys. t.* 16. *an proprii generis?*

trifolia. 12. L. foliis ternis, spicis oblongis imbricatis. *Plum. ic.* 70.

africana. 13. L. foliis alternis sessilibus, floribus solitariis. *Commel. rar. t.* 6. *an distincti generis? Drupa* 2*locularis : loculis* 1*pyrenis.*

NEPHRANDRA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* galea trifida : media involuta ; labium 2fidum. *Drupa* nuce 2loculari : loculis 1spermis.

dubia. 1. NEPHRANDRA. *Willden. ap. Cothen. disp. pl. meth. p.* 8.

766. CORNUTIA. *Cal.* 5dentatus. *Stamina* corolla longiora. *Stil.* longissimus. *Bacca* 1sperma.

pyramidata. 1. CORNUTIA. *Plum. ic.* 106. *f.* 1.

767. LOESELIA. *Cal.* tubulosus, 4fidus. *Cor.* profunde 5fida : laciniis oblongis ciliatis. *Rudimentum* staminis 5ti. *Caps.* 3locularis, apice dehiscens.

ciliata. 1. LOESELIA. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 62. *f.* 3.

768. CAPRARIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata, 5fida, acuta. *Stigma* 2valve. *Caps.* 2locularis; polysperma.

biflora. 1. C. foliis alternis, floribus geminis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 174. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 9.

lucida. 2. C. foliis oppositis oblongis acutis argute serrulatis lævibus alatis, pedunculis trifloris. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 353.

undulata. 3. C. foliis alternis ovatis undulatis, racemis secundis. *Suppl. p.* 284. *Herit. sert. angl. t.* 25.

durantifolia. 4. C. foliis ternis dentatis, pedunculis solitariis, ramis alternis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 124. *f.* 2.

uniflora. 8. C. foliis oppositis cordatis, floribus solitariis. *Burm. ind. t.* 19. *f.* 3.

lanceolata. 5. C. foliis oppositis lanceolatis, corymbo terminali composito. *Suppl. p.* 284.

crustacea. 6. C. repens, foliis oppositis ovatis subpetiolatis crenatis. *Mant. p.* 87. *Rumpf amb.* 5. *t.* 170. *f.* 3. *an Linderniæ species?*

humilis. 7. C. pubescens; foliis oppositis ternisve ovatis serratis petiolatis, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 354.

1315. LINDERNIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens: labio superiori brevissimo. *Stam.* 2 inferiora dente terminali antheraque sublaterali. *Caps.* 1locularis.

pyxidaria. 1. L. foliis ovalibus integerrimis sessilibus, pedunculis solitariis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 419. Capraria gratioloides. *Lindern fl. alsat. t.* 1. 2.

japonica. 2. L. foliis obovatis dentatis: insignis petiolatis. *Thunb. flor. jap. p.* 253.

dianthera. 3. L. foliis petiolatis ovato-subrotundis subserratis, caule repente. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 92.

769. SELAGO. *Cal.* 5fidus. *Cor.* tubus filiformis: limbus subæqualis. *Sem.* 2 nuda, inversa.

corymbosa. 1. S. corymbo multiplici, floribus disjunctis, foliis filiformibus fasciculatis. *Commel. h. amst. 2. t. 40.*

fasciculata. 2. S. corymbo multiplici, foliis obovatis glabris serratis. *Mant. p. 250. Gaertn. de fr. & sem. cent. 3. t. 51. f. 6. Jacq. coll. 3. p. 246.*

cinerea. 3. S. corymbo composito, foliis linearibus fasciculatis glabris: margine reflexo. *Suppl. p. 285.*

rotundifolia. 4. S. corymbo composito, foliis ovatis glabris obtusis. *Suppl. p. 285.*

polystachya. 5. S. corymbo spicis fasciculatis, foliis filiformibus aggregatis. *Mant. p. 250.*

coccinea. 6. S. spicis corymbosis, foliis inferioribus linearibus integerrimis: superioribus lanceolato-subulatis subdentatis.

spuria. 7. S. spicis corymbosis, foliis linearibus denticulatis. *Burm. afr. t. 42. f. 3.*

rapunculoides. 8. S. spicis corymbosis, foliis dentatis. *Burm. afr. t. 42. f. 1.*

serrata. 20. S. spicis corymbosis, foliis oppositis cuneiformibus obtusis serratis glabris decurrentibus. *Berg. flor. cap.*

stricta. 21. S. spicis paniculatis subrotundis, foliis fasciculatis filiformibus hirsutis. *Berg. flor. cap.*

verbenacea. 9. S. spicis fasciculatis, foliis oblongis glabris, caule tetragono rectangulo. *Suppl. p. 285.*

hirta. 10. S. hirta, spicis longissimis, foliis obovatis. *Suppl. p. 285.*

geniculata. 11. S. spicis terminalibus, foliis linearibus fasciculatis glabris margine reflexo. *Suppl. p. 284.*

triquetra. 12. S. spicis terminalibus, foliis triquetris imbricatis recurvato-reflexis glabris. *Suppl. p. 284.*

hispida. 13. S. spicis terminalibus, foliis linearibus sparsis reflexis hispidis. *Suppl. p. 284.*

polygaloides. 14. S. spicis terminalibus: bracteis calicibusque carinatis, foliis linearibus glabris: margine reflexo. *Suppl. p. 284.*

canescens. 15. S. spicis terminalibus, foliis filiformibus fasciculatis glabris. *Suppl. p.* 284.

ciliata. 16. S. floribus spicatis, foliis ovatis ciliatis acutis. *Suppl. p.* 285.

divaricata. 17. S. capitulis terminalibus, foliis filiformi-linearibus fasciculatis glabris. *Suppl. p.* 284.

fruticosa. 18. S. capitulis subrotundis terminalibus, foliis sparsis linearibus obtusis integerrimis, caule fruticoso. *Mant. p.* 87.

capitata. 19. S. capitulo terminali, foliis fasciculatis linearibus carnosis glabris. *Mant. p.* 568. *an cum universo genere gymnospermis accensenda?*

1264. MANULEA. *Cal.* 5partitus *Cor.* subinfundibuliformis: limbo 5partito; laciniis subulatis, superioribus 4 magis connexis. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

Cheiranthus. 1. M. foliis nudis, caulibus subaphyllis, pedicellis alternis unifloris. *Mant. p.* 88.

tomentosa. 2. M. foliis tomentosis, caulibus foliosis, pedunculis multifloris. *Mant. p.* 420. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 419. Selago tomentosa.

microphylla. 3. M. foliis ovatis fasciculatis glabris integris. *Suppl. p.* 285.

integrifolia. 4. M. foliis ovatis sparsis glabris integris. *Suppl. p.* 285.

plantaginis. 5. M. foliis ovatis subdentatis integrisque glabris, capitulis ovatis, ramis diffusis. *Suppl. p.* 285.

capitata. 6. M. foliis ovatis serratis villosis, capitulis globosis, ramis diffusis. *Suppl. p.* 285.

antirrhinoides. 7. M. foliis ovatis dentatis glabris, floribus alternis. *Suppl. p.* 285.

pinnatifida. 8. M. foliis ovatis inciso-pinnatifidis: pinnis dentatis. *Suppl. p.* 286.

cuneifolia. 9. M. foliis elliptice ovatis glabris dentatis, spicis oblongis. *Suppl. p.* 285.

thyrsiflora. 10. M. foliis obovatis tomentosis dentatis corymbo terminali elongato composito. *Suppl. p.* 285.

argentea. 11. M. foliis obovatis cuneiformibus serratis argenteo-punctatis, floribus axillaribus. *Suppl. p.* 286.

capillaris. 12. M. foliis caulinis obovatis glabris dentatis; rameis linearibus, spicis ovatis. *Suppl. p.* 285.

heterophylla. 13. M. foliis linearibus sparsis villosis integris dentatisve. *Suppl. p.* 285.

cærulea. 14. M. foliis linearibus oppositis tomentosis dentatis, floribus racemosis. *Suppl. p.* 285.

corymbosa. 15. M. foliis oblongis dentatis glabris, corymbo fastigiato. *Suppl. p.* 286.

altissima. 16. M. foliis lanceolatis subdentatis villosis, spica ovata. *Suppl. p.* 286.

rubra. 17. M. foliis lanceolatis villosis serratis, floribus racemosis remotis. *Suppl. p.* 286.

770. HEBENSTREITIA. *Cal.* subtus longitudinaliter dehiscens. *Cor.* 1. labiata: labio extrorsum ampliato apice trilobo; lobo medio 2fido, lateralibus emarginatis. *Stamina* margini limbi corollæ inserta. *Caps.* 1locularis, 2valvis, 2sperma.

dentata. 1. H. foliis linearibus dentatis, spicis lævibus. *Burm. afr. t.* 41. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 3. *t.* 51. *f.* 5.

integrifolia. 2. H. foliis linearibus integerrimis.

ciliata. 3. H. foliis linearibus dentatis, calicibus trivalvibus ciliatis. *Mant. p.* 420.

cordata. 4. H. foliis subcarnosis cordatis sessilibus. *Mant. p.* 420.

erinoides. 5. H. foliis oblongis serratis pilosis, bracteis integris hispidis. *Suppl. p.* 286.

fruticosa. 6. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, bracteis integris, caule fruticoso. *Suppl. p.* 287.

771. ERINUS. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* inæqualis: limbo 5partito subæquali, laciniis obcordatis. *Caps.* 2locularis, polysperma.

alpinus. 1. E. floribus racemosis, foliis spatulatis. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 5. *Bulliard herb. Franc. t.* 5.

africanus. 2. E. floribus lateralibus sessilibus, foliis lanceolatis, subdentatis. *Burm. afr. t.* 50. *f.* 1.

maritimus. 3. E. foliis lanceolatis integerrimis glabris, limbi laciniis semibifidis. *Suppl. p.* 287.

Lychnidea. 4. E. foliis lanceolatis serratis, limbi laciniis semibifidis. *Sup. p.* 287. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 419. Selago lychnidea.

peruvianus. 5. E. foliis lanceolato-ovatis serratis. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 25. *f.* 3.

tristis. 6. E. foliis oblongis incisis dentatis. *Suppl. p.* 287.

capensis. 7. E. foliis linearibus dentatis, floribus spicatis. *Mant. p.* 252. *Burm. afr. t.* 49. *f.* 4. *an idem cum lychnidea?*

laciniatus. 8. E. foliis laciniatis. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 35. *t.* 25.

772. BUCHNERA. *Cal.* obsolete 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5fido æquali; laciniis 3 infimis cordatis. *Caps.* 2locularis, polysperma.

americana. 1. B. foliis dentatis lanceolatis trinerviis. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 2.

cernua. 2. B. foliis cuneatis quinquedentatis glabris, floribus spicatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 251.

cuneifolia. 3. B. foliis cuneiformibus glabris apice septemdentatis. *Suppl. p.* 288.

cordifolia. 4. B. caule tetragono, foliis oppositis cordatis trinerviis serratis, racemis terminalibus subspicatis. *Suppl. p.* 287.

grandiflora. 5. B. scabra, foliis oppositis sessilibus oblongis integris, pedunculis axillaribus unifloris diphyllis, calice infundibuliformi. *Suppl. p.* 287.

elongata. 6. B. foliis integris oppositis, calicibus subpilosis capsula longioribus. *aubl. pl. guj. p.* 627. *t.* 253. Peripea palustris.

æthiopica. 7. B. foliis tridentatis, floribus pedunculatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 251.

capensis. 8. B. foliis dentatis linearibus, calicibus pubescentibus. *Mant. p.* 88. *Burm. afr. t.* 30. *f.* 2.

coccinea. 9. B. foliis oblongis crenatis villosis. *Scop. del. ins.* 2. *p.* 10. *t.* 5.

asiatica. 10. B. foliis integerrimis linearibus, calicibus scabris.

pinnatifida. 11. B. foliis pinnatifidis glabris. *Suppl. p.* 288.

773. BROWALLIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5fido, umbilico clauso antheris 2 majoribus. *Caps.* 2locularis, apice 4valvis. *Semina* parva, angulata.

demissa. 1. Br. pedunculis unifloris. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 100. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 4.

elata. 2. Br. pedunculis unifloris multiflorisque.

humifusa. 3. Br. hispida prostrata, floribus axillaribus sessilibus. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 112.

alienata. 4. Br. foliis superioribus oppositis, staminibus duobus longitudine corollæ. *Mill. h. angl. t.* 69.

774. LINNÆA. *Cal.* duplex: fructus 4phyllus; floris 5partitus superus. *Cor.* campanulata. *Bacca* sicca, 3locularis.

borealis. 1. LINNÆA. *Flor. dan. t.* 3.

775. SIBTHORPIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata, 5partita. *Stamina* paribus remotis. *Capſ.* compreſſa, orbiculata, 2locularis: diſſepimento tranſverſo. *Semina* pauca.

europæa. 1. S. foliis reniformi-ſubpeltatis crenatis. *Mant. p.* 421. *Pluckn. alm. t.* 7. *f.* 6. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 6.

africana. 2. S. foliis orbiculatis integris crenatis, pedunculis ſolitariis; *an hujus generis?*

776. LIMOSELLA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5fida æqualis. *Stamina* per paria approximata. *Germen* 2loculare. *Capſ.* ſubunilocularis, 2valvis, polyſperma.

aquatica. 1. L. foliis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 69. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 3. *t.* 50. *f.* 3.

diandra. 2. L. foliis ſublinearibus. *Mant. p.* 252.

calicina. 3. L. calice exteriore parvo diphyllo: interiore pentaphyllo, corolla campanulata ſubæquali. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 112. *an hujus generis?*

1265. VANDELLIA. *Cal.* quadripartitus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2 exteriora e diſco labii corollæ. *Antheræ* per paria connexæ. *Capſ.* 1locularis, polyſperma.

diffuſa. 1. VANDELLIA. *Mant. p.* 89.

777. STEMODIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* subbilabiata. *Stamin.* 4: filamentis singulis 2fidis, 2antheris. *Caps.* 2locularis. *Semina.* minutula.

maritima. 1. St. foliis sessilibus denticulatis hastatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 48.

ruderalis. 2. St. foliis petiolatis serratis ovatis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 5. *p.* 25.

778. OBOLARIA. *Cal.* bracteæ 2. *Cor.* 4fida, campanulata. *Stamina* ex divisuris corollæ. *Caps.* 1locularis, 2valvis, polysperma.

virginica. 1. OBOLARIA. *Pluckn. alm. t.* 209. *f.* 6. β) Obolaria caroliniana. *Walt. flor. carol. p.* 166.

779. OROBANCHE. *Cal.* subbifidus. *Cor.* ringens. *Glandula* sub basi germinis. *Caps.* 1locularis, 2valvis, polysperma.

purpurascens. 1. O. caule simplicissimo pubescente, staminibus inclusis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 276. *an satis distincta a lævi?*

major. 2. O. caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. *Curt. flor. Lond. t.* 232.

fœtida. 3. O. caule simplicissimo pubescente, antheris exsertis mucronato-spinosis. *Poir. voy. en. Barb.* 2. *p.* 195.

lævis. 4. O. caule simplicissimo lævi, staminibus exsertis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 2.

tinctoria. 5. O. caule simplicissimo bracteis imbricato, floribus spirali ductu caulem cingentibus: corollæ limbo quinquefido. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 112.

americana. 6. O. caule simplicissimo, foliis imbricato, corollis recurvatis, staminibus exsertis. *Mant. p.* 88.

cernua. 7. O. caule simplicissimo, nudiusculo, corollis recurvatis, bractea ovata longioribus.

Æginetia. 8. O caule unifloro, flore ſubſpathaceo. *Rheed. h. malab.* 11. *t.* 47.

uniflora. 9. O caule unifloro, calice nudo. *Pluckn. mant. t.* 348. *f.* 3.

crenata. 10. O. caule ſimplici villoſo, corolla quinqueloba denticulato-crenata ſtamina includente. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 113.

purpurea. 11. O. caule ſimplici ramoſoque, corollis quadrifidis, ſtaminibus calcaratis. *Suppl. p.* 288.

ramoſa. 12. O. caule ramoſo, corollis quinquefidis. *Bull. herb. Franc. t.* 399.

virginiana. 13. O. caule ramoſo, corollis quadridentatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 9.

1317. HYOBANCHE. *Cal.* 7phyllus. *Cor.* ringens: labio inferiori 0. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

ſanguinea. 1. HYOBANCHE. *Mant. p.* 253. *Pet. gaz. t.* 37. *f.* 4.

780. DODARTIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* ringens: labio inferiori duplo longiori. *Stigma* 2fidum. *Capſ.* ſubgloboſa, 2locularis. *Semina* plura, angulata.

orientalis. 1. D. foliis linearibus integerrimis glabris. *Mill. h. angl. t.* 127. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 3.

indica. 2. D. foliis ovatis ſerratis villoſis.

781. LIPPIA. *Cal.* 4dentatus, ſeminibus maturis 2-valvis. *Cor.* ſubinfundibuliformis, 4fida. *Sem.* 2 oſſea, calice corticata.

americana. 1. L. capitulis pyramidatis. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 2.

hemiſphærica. 2. L. capitulis hemiſphæricis. *Mant. p.* 89. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 179. *f.* 100.

ovata. 3. L. capitulis ovatis, foliis linearibus integerrimis. *Mant. p. 89. Gaertn. de fr. & sem. cent. 3. t. 51. f. 2. Distincti prorsus generis.*

hirsuta. 4. L. hirsuta, foliis oblongis satis rugosis serratis subtus tomentosis, paniculis axillaribus, capitulis ovatis. *Suppl. p. 288.*

cymosa. 5. L. floribus cymosis, foliis ovatis subintegris. *Sloane hist. jam. 2. p. 30. t. 174. f. 3. 4. Nonne potius cum universo genere ad gymnosperma amandanda?*

DOMBEYA. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* 1labiata: labio concamerato. *Caps.* 4locularis, turgida. *Semina* pauca, imbricata, marginata.

lappacea. 1. DOMBEYA. *Herit. nov. stirp. 2. p. 133. t. 17.*

782. SESAMUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata, 5fida: lacinia infima paulo longiore. *Rudimentum* filamenti 5ti. *Stigma* lanceolatum. *Caps.* 4locularis.

prostratum. 1. S. caule depresse diffuso, foliis orbiculatis crenatis hispidis. *Pluckn. amalth. t. 373. f. 2.*

orientale. 2. S. foliis ovato-oblongis integris. *Burm. zeyl. t. 38. f. 1.*

javanicum. 3. S. foliis lanceolatis serratis-sessilibus. *Burm. ind. p. 133. Rheede h. malab. 9. t. 37.*

indicum. 4. S. foliis inferioribus trifidis. *Rumpf amb. 5. t. 76. f. 1.*

783. MIMULUS. *Cal.* prismaticus, 4-5dentatus. *Cor.* ringens: labio superiore lateribus reflexo. *Caps.* ovalis, 2locularis, apice dehiscens, polysperma.

ringens. 1. M. erectus, foliis oblongis linearibus sessilibus. *Pluckn. phyt. 393. f. 3. Gaertn. de fr. & sem. cent. 4. t. 53. f. 2.*

alatus. 2. M. erectus, foliis ovatis petiolatis, caule tetragono alato. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 361.

luteus. 3. M. repens, foliis ovatis. *Feuill. peruv.* 2. *t.* 34.

784. RUELLIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* irregularis. *Stamina* per paria approximata. *Stigma* 2fidum. *Caps.* 2locularis. *Semina* 3na-4na: retinaculis uncinulatis.

Blechum. 1. R. foliis ovatis integerrimis, spicis ovatis: bracteis interioribus geminis, floribus binis sessilibus. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 109. *f.* 1.

rubra. 2. R. foliis ovato-oblongis sinuatis glabris sessilibus, corymbis axillaribus pedunculatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 666. *t.* 270.

violacea. 3. R. foliis ovato-oblongis acutis tomentosis subsinuatis subpetiolatis, pedunculis solitariis unifloris alternatim axillaribus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 668. *t.* 271.

blechioides. 4. R. foliis oblongis subdentatis glabris, spicis ovatis; floribus bracteis longioribus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 93.

alternata. 33. R. foliis oblongis cordatis crenatis petiolatis, spicis alternis foliosis: bracteis crenatis. *Rumpf amb.* 6. *t.* 13. *f.* 2. 3.

angustifolia. 5. R. foliis lineari-lanceolatis, spicis oblongis: bracteis ovatis hirsutis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 93.

repanda. 6. R. foliis lanceolatis obtuse dentatis petiolatis, caule repente. *Burm. ind. t.* 40. *f.* 2.

repens. 7. R. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, floribus sessilibus, bracteis petiolatis calice longioribus, caule repente. *Mant. p.* 89. *Burm. ind. t.* 41. *f.* 1.

Anagallis. 34. R. foliis lanceolatis serratis, caule procumbente, floribus axillaribus solitariis. *Rumpf amb.* 5. *t.* 170. *f.* 2.

guttata. 8. R. foliis ovato-lanceolatis, spicis terminalibus imbricatis; bracteis ternis calice longioribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 114.

crispa. 9. R. foliis lanceolato-ovatis subcrenatis, capitulis ovatis foliosis hispidis, caule repente.

adhærens. 10. R. foliis ovatis acutis petiolatis profunde crenatis [illegible] hispidis, spicis terminalibus: floribus subsessilibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 114.

longiflo-ra. 36. R. foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis longiſſimis, caule fruticoſo. *Vahl. ſymb. bot. 4. p. 45. t. 15.*

piloſa. 11. R. foliis ovatis oppoſitis integris ciliatis, floribus terminalibus ſolitariis. *Suppl. p. 290.*

tuberoſa. 12. R. foliis ovatis crenatis, pedunculis unifloris. *Sloan. hiſt. jam. 1. t. 95. f. 1.*

patula. 13. R. fruticoſa villoſa viſcoſa, foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus aggregatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 41.*

erecta. 35. R. foliis ovalibus integerrimis, caule erectiuſculo, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Burm. ind. t. 41. f. 3.*

panicula-ta. 14. R. foliis integerrimis, pedunculis dichotomis lateralibus, calicibus ſeſſilibus: lacinia ſuprema majore. *Sloan. hiſt. jam. 1. t. 100. f. 2.*

ringens. 15. R. foliis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis ſeſſilibus, caule procumbente. *Vog. ſuppl. pl. Ehr. ſel. t. CX.*

uliginoſa. 16. R. diffuſa hirſuta, foliis ſeſſilibus oblongis integris, ſpicis terminalibus tetragonis. *Suppl. p. 290.*

fragrans. 17. R. foliis ſeſſilibus oblongis obtuſe ſerratis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Forſt. flor. auſtr. p. 44.*

reptans. 18. R. foliis petiolatis ovatis obtuſis obtuſe ſerratis, pedunculis terminalibus ſubſpicatis. *Forſt. flor. auſtr. p. 44.*

faſcicula-ta. 19. R. decumbens, foliis petiolatis lanceolatis dentatis oppoſitis: alterno minore, floribus faſciculatis. *Koenig apud Retz. obſ. bot. 4. p. 28.*

balſami-ca. 20. R. erecta glabra, foliis petiolatis lanceolatis ſerratis, verticillis ſeſſilibus. *Suppl. p. 289.*

ſtrepens. 21. R. foliis petiolatis, pedunculis trifloris brevibus. *Mant. p. 422. Sabb. h. rom. 2. t. 92. Gaert n. de fr. & ſem. cent. 4. t. 54. f. 3.*

clandeſti-na. 22. R. foliis petiolatis, pedunculis longis ſubdiviſis nudis. *Dill. h. Elth. t. 248. f. 320.*

depreſſa. 23. R. foliis petiolatis oppoſitis obovatis integris, caule arcte depreſſo. *Suppl. p. 290.*

tentacu-lata. 24. R. foliis obovatis, verticillis obvallatis ſpinis inermibus bifurcatis. *Pluckn. phyt. 279. f. 7.*

japonica. 25. R. foliis ellipticis, floribus ſpicatis: bracteis oblongis obtuſis. *Thunb. flor. jap. p. 254.*

littoralis. 26. R. fruticosa cana, foliis cuneiformibus serratis glabris, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. *Suppl. p.* 289.

antipoda. 27. R. foliis mucronato-serratis, caule repente, floribus subspicatis terminalibus quinis ternisve. *Mant. p.* 422. *Rumpf amb.* 5. *t.* 170. *f.* 2.

difformis. 28. R. diffusa hirsuta, foliis linearibus dentato-sinuatis integris, floribus verticillatis axillaribus. *Suppl. p.* 289. *Rheede h. mal.* 2. *t.* 46.

imbricata. 29. R. floribus in axillis foliorum summorum congestis secundis sessilibus: bractea obliqua subrotunda. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 113.

biflora. 30. R. floribus geminis subsessilibus.

intrusa. 31. R. foliis petiolatis ovatis pilosis, floribus spicatis secundis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 113.

acaulis. 32. R. foliis petiolatis oblongis crenato-undulatis, scapis erectis multifloris. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 93.

785. BARRELIERA.

Cal. 4partitus: laciniis 2 majoribus. *Stam.* 2 longe minora. *Stigm.* 2fidum. *Caps.* angulata, 2locularis. *Semina* gemina: retinaculis uncinatis.

longifolia. 1. B. spinis verticillorum senis, foliis ensiformibus longissimis scabris. *Pluckn. alm. t.* 133. *f.* 4.

solanifolia. 2. B. spinis axillaribus, foliis lanceolatis denticulatis. *Plum. ic.* 43. *f.* 2.

Hystrix. 3. B. spinis axillaribus geminis simplicibus, foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Mant. p.* 89. *Seb. mus.* 1. *t.* 13. *f.* 1.

acanthoides. 13. B. spinis axillaribus geminis foliaceis, spicis axillaribus secundis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 47.

Prionitis. 4. B. spinis axillaribus pedatis quaternis, foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 41.

buxifolia. 5. B. spinis axillaribus oppositis solitariis, foliis subrotundis integerrimis. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 47.

noctiflora. 6. B. ſpinis axillaribus ramoſis, foliis lanceolatis integerrimis cuſpidatis, bracteis ovatis ſcarioſis, tubo elongato. *Suppl. p.* 20.

triſpinoſa. 14. B. ſpinis axillaribus compoſitis triradiatis, ſpicis terminalibus imbricatis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 6. Juſticia triſpinoſa.

biſpinoſa. 15. B. ſpinis axillaribus biradiatis floriferis, foliis ovatis ſubtus piloſis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 6. Juſticia biſpinoſa.

criſtata. 7. B. foliis oblongis integerrimis, calicis laciniis duabus latioribus ciliatis, duabuſque linearibus acutis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 23. *f.* 7.

coccinea. 8. B. inermis, foliis ovatis denticulatis petiolatis. *Plum. ic.* 43. *f.* 1.

nitida. 9. B. inermis, foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque nitidis. *Jacq. ſtirp. amer.*

pungens. 10. B. inermis, foliis ovatis acutis pungentibus, bracteis ciliatis. *Suppl. p.* 290.

longiflora. 11. B. inermis, foliis ovatis ſericeis, bracteis cordatis ſcarioſis corolliis longiſſimis. *Suppl. p.* 290. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 2?

hirſuta. 12. B. inermis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis, caule hirſuto. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 192.

786. DURANTA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* infundibuliformis, 5fida. *Drupa* 1locularis, 4pyrena: oſſiculis 2locularibus.

Plumieri. 1. D. calicibus fructiferis contortis. *Plum. ic.* 79. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 53. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 3.

Elliſia. 2. D. calicibus fructiferis erectis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.*179.

Mutiſii. 3. D. foliis ellipticis integerrimis. *Suppl. p.* 291.

787. OVIEDA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* fupera, tubo longiffimo; limbo 3lobo. *Bacca* 1locularis, 4pyrena: *offcula* 1locularia.

fpinofa. 1. O. foliis ovalibus dentatis. *Plum. ic.* 256.

mitis. 2. O. foliis lanceolatis fub repandis. *Burm. ind. t.* 40. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & fem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 2.

1406. MILLINGTONIA. *Cal.* margine 5dentatus, reflexus. *Cor.* longiffima: limbo 4partito. *Antheræ* 2partitæ, vaginantes. *Capfula* filiquofa.

hortenfis. 1. MILLINGTONIA. *Suppl. p.* 291.

788. VOLKAMERIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* ringens, 5partita: laciniis fecundis. *Stigm.* 2fidum. *Drupa* 2-pyrena: officulis 2locularibus.

aculeata. 1. V. fpinis petiolorum rudimentis. *Jacq. ftirp. amer. pict. t.* 177. *Gaertn. de fr. & fem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 3.

inermis. 2. V. ramis inermibus, foliis floribufque fubternis. *Pet. gaz. t.* 42. *f.* 7. *Gaertn. de fr. & fem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 1. *an Clerodendri fpecies?*

ferrata. 3. V. inermis, foliis lato-lanceolatis ferratis feffilibus. *Mant. p.* 90.

fcandens. 4. V. inermis, foliis petiolatis cordatis ovatis integerrimis, panicula corymbofa terminali: ramulis dichotomis. *Suppl. p.* 292.

japonica. 5. V. inermis, foliis cordatis ovatis acutis dentatis, racemis fecundis. *Thunb. flor. jap. p.* 255.

Kaempferi. 6. V. inermis, foliis cordatis acutis fubintegerrimis, panicula terminali erecta. *Jacq. coll.* 3. *p.* 207. *Banks ic. Kaempf. t.* 58.

789. CLERODENDRUM. *Cal.* 5partitus, campanulatus. *Cor.* irregularis: tubo filiformi; limbo 5partito æquali. *Stamina* longissima inter corollæ lacinias hiantes. *Bacca* 1locularis, 4pyrena: *Ossicula* 1locularia.

infortunatum. 1. Cl. foliis cordatis tomentosis. *Rumpf amb.* 4. *t.* 49. *β*) *Burm. zeyl. t.* 29.

fortunatum. 2. Cl. foliis lanceolatis integerrimis. *Osb. it. t.* 11.

Phlomidis. 3 Cl. foliis ovatis serratis canis *Suppl. p.* 292.

calamitosum. 4. Cl. foliis ovalibus subdentatis nudis. *Mant. p.* 90. *Burm. ind. t.* 44.

paniculatum. 5. Cl. foliis lobatis serratis, panicula amplissima. *Mant. p.* 90. *Burm. ind. t.* 45. *f.* 1.

trichotomum. 6. Cl. foliis ovatis indivisisque lato-ovatis integris, panicula trichotoma. *Thunb. flor. jap. p.* 256. *Banks ic. Kaempf. t.* 22.

790. VITEX. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* ringens, 2labiata. *Stigm.* 2. *Drupa* baccata: putamine 4loculari. *Sem.* solitaria.

ovata. 1. V. foliis simplicibus ovatis. *Suppl. p.* 294. *Thunb. flor. jap. p.* 257.

altissima. 2. V. foliis ternatis integerrimis, panicula verticillata, bacca trisperma. *Suppl. p.* 294.

divaricata. 3. V. foliis ternatis integerrimis utrinque glabris, panicula dichotoma divaricata. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 93.

trifolia. 4. V. foliis ternatis quinatisque: foliolis ovatis acutis integerrimis subtus canescentibus, panicula rhachi recta: pedicellis dichotomis. *Suppl. p.* 293. *Rumpf amb.* 4. *t.* 18.

5. V.

Negundo. 5. V. foliis quinatis ternatisque serratis, floribus racemoso-paniculatis. *Mill. ic.* 275. *f.* 1. 2.

umbrosa. 6. V. foliis quinatis integerrimis utrinque glabris, racemis compositis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 93.

Leucoxylon. 7. V. foliis digitatis quinatis: foliolis petiolatis oblongis integerrimis, paniculis dichotomis, bacca monosperma. *Suppl. p.* 293.

Agnus-castus. 8. V. foliis digitatis serratis, spicis verticillatis. *Blackw. herb. t.* 139. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 7.

sinuata. 9. V. foliis digitatis sinuatis, verticillis pedunculatis corymbosis cauli adpressis. *Medic. act. Palat.* 4. *phys. p.* 202. *t.* 8.

pinnata. 10. V. foliis pinnatis integerrimis, paniculis trichotomis. *Burm. ind. t.* 43. *f.* 2.

791. BONTIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 2labiata: labio inferiori semitrifido, revoluto. *Drupa* ovata, 1sperma: apice obliquo.

daphnoides. 1. B. foliis alternis, pedunculis unifloris. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 161. *f.* 57.

1237. AVICENNIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 2labiata: labio superiore quadrato. *Caps.* coriacea, rhomboidea, 1sperma.

tomentosa. 1. A. foliis cordato-ovatis subtus tomentosis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 46.

resinifera. 2. A. foliis ovato-lanceolatis subtus tomentosis. *Forst. pl. escul. p.* 44. *flor. austr. p.* 45.

nitida. 3. A. foliis lanceolatis utrinque nitidis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 169.

792. COLUMNEA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens: labio ſuperiori ſæpe 3partito; lacinia intermedia fornicata ſupra baſin gibba. *Antheræ* connexæ. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* nidulantia.

ſcandens. 1. C. foliis ovatis acutis integris ſubvilloſis, calicis foliolis integris corolliſque pubeſcentibus: labio ſuperiori indiviſo. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 48.

hirſuta. 2. C. foliis ovatis acuminatis ſuperne hirtis, calicis foliolis denticulatis lanceolatis corolliſque hirſutis: labio ſuperiori bifido. *Brown. hiſt. jam. t.* 30. *f.* 3.

hiſpida. 3. C. foliis ovatis obtuſis denticulatis hiſpido-hirſutis, calicis foliolis lanceolatis integris piloſis, caule piloſo ſcabro. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 94.

rutilans. 4. C. foliis ovato-lanceolatis villoſis denticulatis, calicis foliolis laciniatis, corollis villoſis: labio ſuperiori bipartito. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 94.

longifolia. 5. C. foliis lanceolatis longiſſimis ſubſerratis glabris. *Mant. p.* 90. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 87.

793. ACANTHUS. *Cal.* foliolis trium parium alternantium. *Cor.* 1labiata, plana, 3loba. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* ſolitaria: retinaculis uncinatis.

mollis. 1. A. foliis ſinuatis inermibus. *Blackw. herb. t.* 89. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 1.

arboreus. 2. A. foliis ſinuato-dentatis ſpinoſis glabris, caule fruticoſo. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 115.

carduifolius. 3. A. foliis ſerrato-dentatis ſpinoſis, ſpica florum radicali. *Suppl. p.* 294.

ſpinoſus. 4. A. foliis pinnatis ſpinoſis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 14.

edulis. 5. A. foliis quaternis lineari-lanceolatis dentato-spinulosis, caule fruticuloso. *Mant. p.* 89. Ruellia ciliaris. *Burm. fl. ind. t.* 42. *f.* 1.

Dioscoridis. 6. A. foliis lanceolatis integerrimis margine spinosis.

ilicifolius. 7. A. foliis repandis dentato-spinosis, caule fruticoso aculeato. *Rumpf amb.* 6. *t.* 71.

integrifolius. 8. A. foliis oblongis integris, caule herbaceo procumbente. *Suppl. p.* 294.

procumbens. 9. A. foliis oblongis serrato-ciliatis, caule procumbente fruticoso. *Suppl. p.* 294.

furcatus. 10. A. foliis oblongis dentato-spinosis, caule fruticoso, bracteis spina trifurcata terminatis. *Suppl. p.* 295.

capensis. 11. A. foliis oblongis dentato-spinosis, caule fruticoso erecto, bracteis spina simplici terminatis. *Suppl. p.* 295.

maderaspatensis. 12. A. foliis quaternis, floribus axillaribus: calicibus ciliatis. *Burm. ind. t.* 42. *f.* 2.

794. PEDALIUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* subringens: limbo 5fido. *Drupa* corticosa, 4spinosa, 2locularis. *Sem.* solitaria, arillata.

Murex. 1. PEDALIUM. *Burm. ind. t.* 45. *f.* 2. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 58. *f.* 1.

1409. AMASONIA. *Cal.* campanulatus, semiquinquefidus. *Cor.* tubulosa: limbo parvo 5fido. *Nux* ovata, 1locularis.

erecta. 1. AMASONIA. *Suppl. p.* 294.

TAMONEA. *Cal.* 5aristatus. *Cor.* ringens: limbo 5fido. *Nux* carnosa, 4locularis. *Sem.* solitaria.

mutica. 1. TAMONEA. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 94. *Aublet pl. guj.* 2. *p.* 660. *t.* 268.

GEVUINA. *Cal.* o. *Cor.* 4petala. *Caps.* coriacea, 1locularis.

Avellana. 1. GEVUINA. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 159.

795. MELIANTHUS. *Cal.* 5partitus: lacinia infima gibba. *Petala* 4: nectario infra infima. *Caps.* 4locularis.

major. 1. M. stipulis solitariis petiolo adnatis. *Mill. illustr. ic.*

minor. 2. M. stipulis geminis distinctis. *Commel. rar. t.* 4.

CLASSIS XIV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

** ſilicula apice non emarginata.*

800. DRABA.	*Silic.* valvis planiuſculis. *Stilus* o.
MOENCHIA.	*Silic.* ovata, ſtilo coronata: valvis convexiuſculis.
809. LUNARIA.	*Silic.* valvis planis, pedicellata. *Stilus* exſertus.
799. SUBULARIA.	*Silic.* valvis ſemiovatis. *Stilus* ſilicula brevior.
796. MYAGRUM.	*Silic.* valvis concavis. *Stilus* perſiſtens.
797. VELLA.	*Silic.* valvis diſſepimento dimidio brevioribus.

*** Silicula apice emarginata.*

804. IBERIS.	*Petala* 2 exteriora majora.
805. ALYSSUM.	*Filamenta* quædam latere interiore dente notata. *Silicula* 2locularis.
807. CLYPEOLA.	*Silicula* orbiculata, decidua: valvis planis.
806. PELTARIA.	*Silicula* orbiculata, compreſſo-plana, non dehiſcens.
803. COCHLEARIA.	*Silicula* cordata: valvis obtuſis gibbis.
801. LEPIDIUM.	*Silicula* cordata: valvis acute carinatis.
802. THLASPI.	*Silicula* obcordata: valvis marginato-carinatis.
808. BISCUTELLA.	*Silicula* biloba ſupra infraque: margine carinato.
798. ANASTATICA.	*Silicula* retuſa: valvis diſſepimento mucronato longioribus.

SILIQUOSÆ.

** calice clauſo: foliolis longitudinaliter conniventibus.*

822. RAPHANUS.	*Siliqua* articulata.
MNEMOSILLA.	*Siliqua* toroſo-articulata, articulatim decidua.
814. ERYSIMUM.	*Siliqua* tetragona.
CHAMIRA.	*Cal.* baſi cornutus. *Glandul.* extra ſtamina breviora.

815. CHEIRANTHUS.	*Germen* utrinque glandula notatum.
817. HESPERIS.	*Glandulæ* intra ſtamina breviora. *Petala* obliqua.
818. ARABIS.	*Glandulæ* 4 intra foliola calicina. *Stigma* ſimplex.
820. BRASSICA.	*Glandulæ* 2 intra ſtamina breviora, 2 extra ſtamina longiora.
819. TURRITIS.	*Petala* erecta.
811. DENTARIA.	*Siliqua* valvis revoluto-dehiſcentibus.
810. RICOTIA.	*Siliqua* unilocularis.

** *calice hiante : foliolis ſuperne diſtantibus.*

825. CRAMBE.	*Siliqua* decidua, globoſa, ſicco-baccata. *Filamenta* 4 apice 2 furca.
824. ISATIS.	*Siliqua* decidua, lanceolata, monoſperma.
823. BUNIAS.	*Siliqua* decidua, ſubrotunda, muricata.
826. CLEOME.	*Siliqua* dehiſcens, 1locularis.
812. CARDAMINE.	*Siliqua* dehiſcens: valvis revolutis.
827. SINAPIS.	*Siliqua* dehiſcens. *Cal.* horizontaliter patens.
813. SISYMBRIUM.	*Siliqua* dehiſcens: valvis rectiuſculis. *Cal.* patulus.
816. HELIOPHILA.	*Siliqua* dehiſcens. *Nectaria* 2 recurvata.

SILICULOSA.

796. MYAGRUM. *Silicula* evalvis ſtilo conico terminata : loculo ſubmonoſpermo.

perenne. 1. M. ſiliculis biarticulatis monoſpermis, foliis extrorſum ſinuatis denticulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 414.

orientale. 2. M. ſiliculis ſulcatis lævibus, foliis oblongis dentato-ſinuatis.

rugoſum. 3. M. ſiliculis ſulcatis piloſis rugoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis.

rigidum. 4. M. ſiliculis didymis ſeſſilibus ſulcatis piloſiſſimis bilocularibus diſpermis, foliis ovali-oblongis dentatis. *Pallas. it.* 3. *p.* 741. *t.* L l. *f.* 1. & *t.* M m. *f.* 2.

hiſpanicum. 5. M. ſiliculis lævibus ſubtoroſis, foliis lyratis.

auſtriacum. 6. M. ſiliculis ſubrotundis glabris, foliis oblongis amplexicaulibus, radice repente. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 111.

perfoliatum. 7. M. ſiliculis obcordatis ſubſeſſilibus, foliis amplexicaulibus. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 3. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 13.

paniculatum. 8. M. ſiliculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugoſis. *Flor. dan. t.* 204. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 9. *an diſtincti generis?*

ſaxatile. 9. M. ſiliculis lentiformibus obovatis glabris, foliis petiolatis oblongis ſerratis ſcabris, caule paniculato. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 128.

ægyptium. 10 M. ſiliculis angulatis, foliis tripartitis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 4.

797. VELLA. *Silicula* ſ. potius *Antrum* ſiliquoſum globoſum diſſepimento valvis duplo majore extrinſecus in laminam cochleariformem producto.

annua. 1. V. foliis pinnatifidis, ſiliculis pendulis. *Trew. ic.* 10. *t.* 8. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 8. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 10.

Pseudo-cytisus. 2. V. foliis integris obovatis ciliatis, siliculis erectis. *Lob. ic.* 2. *p.* 49.

tenuissima. 3. V. foliis lanceolatis obtusis margine pilosis, siliculis remotissimis. *Pallas it.* 3. *p.* 740. *t.* U. *f.* 2.

798. ANASTATICA. *Silicula* s. potius *Antrum* siliquosum subglobosum retusum margine coronatum, valvis dissepimento duplo longioribus, *stilo* intermedio mucronato obliquo, loculis 1spermis.

hierochuntica. 1. A. foliis obtusis, spicis axillaribus brevissimis, siliculis ungulatis spinosis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 58. *Gaertn. de fruct. & sem. pl.* 9. *t.* 141. *f.* 11.

syriaca. 2. A. foliis acutis, spicis folio longioribus, siliculis ovatis rostratis. *Mant. p.* 424. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 4. *Gaertn. de fr. & sem. fasc.* 9. *t.* 141. *f.* 11. *an potius buniades species?*

799. SUBULARIA. *Silicula* integra, ovata: valvis ovatis, concavis, dissepimento contrariis. *Stilus* silicula brevior.

aquatica. 1. S. foliis teretiusculis. *Flor. dan. t.* 53.

purpurea. 2. S. foliis cordato-oblongis subdentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 117.

800. DRABA. *Silicula* integra, elliptico-oblonga compressiuscula: valvis planiusculis dissepimento parallelis. *Stilus* o.

verna. 1. Dr. scapis nudis, foliis subserratis. *Curt. flor. Lond. t.* 7. *Gaertn. de fr. & sem. fasc.* 9. *t.* 141. *f.* 11.

pyrenaica. 2. Dr. ſcapo nudo, foliis cuneiformibus palmatis trilobis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 228.

alpina. 3. Dr. ſcapo nudo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis. *Flor. dan. t.* 56.

caroliniana. 9. Dr. ſcapo nudo ſimplici lævi, foliis hirſutis ovatis. *Walt. flor. carol. p.* 171.

hirta. 4. Dr. ſcapo unifolio, foliis ſubhirſutis, ſiliculis obliquis pedicellatis. *Flor. dan. t.* 142. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 432.

fladnizenſis. 5. Dr. ſcapo bifolio, foliis glabris ciliatis, ſiliculis rectis pedicellatis. *Wulfen apud Jacq. miſcell.* 1. *p.* 147. *t.* 17. *f.* 1.

ciliaris. 6. Dr. caule ſubnudo, foliis linearibus margine carinaque ciliatis, petalis integris. *Mant. p.* 91. *Ger. flor. prov. t.* 13. *f.* 1.

muralis. 7. Dr. caule ramoſo, foliis ovatis ſeſſilibus dentatis. *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 15. *β*) Draba nemoroſa. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 432. *Col. ecphr.* 1. *t.* 272.

incana. 8. Dr. foliis caulinis numeroſis incanis, ſiliculis oblongis obliquis ſubſeſſilibus. *Flor. dan. t.* 130.

MOENCHIA. *Silicula* integra, ovata, ſtilo coronata: valvis convexiuſculis diſſepimento parallelis; loculis polyſpermis.

aizoides. 1. M. ſcapo nudo ſimplici, foliis enſiformibus carinatis ciliatis. *Mant. p.* 91. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 432. Draba aizoides. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 192.

ſativa. 2. M. floribus racemoſis, petalis integerrimis, ſiliculis obovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 431. Myagrum ſativum. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 78. *β*) *Lindern flor. alſ. t.* 1.

campeſtris. 3. M. floribus racemoſis, petalis bifidis, filamentis quatuor in medio denticulatis, ſiliculis ovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 436. Alyſſum campeſtre.

incana. 4. M. floribus corymboſo-racemoſis, petalis bifidis, ſiliculis ovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 436. Alyſſum incanum.

801. LEPIDIUM. *Silicula* emarginata, compressa: valvis argute carinatis; loculis 1spermis.

* *floribus tetradynamis.*

vesicarium. 1. L. caulium geniculis inflatis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 26.

procumbens. 2. L. scapo nudo, foliis sinuato-pinnatifidis: extremo majore, caulibus prostratis racemiferis. *Mant. p.* 424. *Magn. fl. monsp. t.* 184.

spinosum. 3. L. foliis pinnatis: foliolis lanatis; exterioribus elongatis, ramis mucronatis. *Mant. p.* 253. *Arduin. spec.* 2. *t.* 16.

petræum. 4. L. foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis, calice minoribus. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 131.

suffruticosum. 5. L. foliis lanceolato-linearibus tenuibus integerrimis, caulibus suffruticosis. *Mant. p.* 91.

Piscidium. 6. L. foliis elliptico-oblongis acutis integerrimis. *Forst. pl. esc. p.* 39. *flor. austr. p.* 46.

latifolium. 7. L. foliis ovato-lanceolatis integris serratis. *Flor. dan. t.* 557.

subulatum. 8. L. foliis subulatis indivisis sparsis, caule suffruticoso.

lyratum. 9. L. foliis lyratis crispis. *Tournef. ic.* 1. *p.* 339. *ic.*

sativum. 10. L. foliis oblongis multifidis. *Korn pl. med. ic. t.* 16. *Gaertn. de fr. & sem.* 9. *t.* 141. *f.* 5. β) *C. Bauh. pr. th. bot. p.* 43. *ic.*

chalepense. 11. L. foliis sagittatis sessilibus dentatis. *Cent.* 169.

Draba. 12. L. foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 435. Cochlearia Draba. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 315.

perfoliatum. 13. L. foliis caulinis pinnato-multifidis ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 346.

cardamines. 14. L. foliis radicalibus pinnatis, caulinis lyratis. *Arduin. spec.* 1. *t.* 8.

** *floribus hexandris.*

graminifolium. 15. L. foliis linearibus: superioribus integerrimis, caule paniculato virgato.

**** floribus tetrandris.*

alpinum. 16. L. foliis pinnatis integerrimis, ſcapo ſubradicato, ſiliculis lanceolatis mucronatis. *Jacq. flor. auſt. t.* 137.

nudicaule. 17. L. ſcapo nudo ſimpliciſſimo, foliis pinnatifidis. *Magn. fl. monſp. t.* 186.

oleraceum. 18. L. foliis elliptico-oblongis acutis ſerratis. *Forſt. pl. eſc. p.* 38. *flor. auſtr. p.* 46.

***** floribus ſubtriandris.*

virginicum. 19. L. foliis linearibus pinnatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 123. *f.* 3.

****** floribus diandris.*

ruderale. 20. L. foliis radicalibus dentato-pinnatis: rameis linearibus integerrimis, floribus ſubapetalis. *Flor. dan. t.* 184.

Iberis. 21. L. foliis inferioribus lanceolatis ſerratis: ſuperioribus linearibus integerrimis. *Mant. p.* 425.

bonarienſe. 22. L. foliis omnibus pinnato-multifidis. *Dill. h. Elth. t.* 286. *f.* 370.

didymum. 23. L. foliis pinnatifidis, caule erecto, fructibus didymis. *Mant. p.* 92.

******* incertæ tribus.*

divaricatum. 24. L. foliis pinnatifidis, caule ramoſiſſimo, ſiliculis ovatis ſubemarginatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 375.

802. THLASPI. *Silicula* emarginata, obcordata: valvis navicularibus carinatis, (ſæpius) alato-marginatis, loculis polyſpermis.

peregrinum. 1. Thl. ſiliculis ſuborbiculatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 18. *f.* 30.

arvenſe. 2. Thl. ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Flor. dan. t.* 793. *Gaertn. de fr. & ſem. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 3.

alliaceum. 3. Thl. ſiliculis ſubovatis ventricoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis glabris. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 18. *f.* 28.

ſaxatile. 4. Thl. ſiliculis ſubrotundis, foliis lanceolato-linearibus obtuſis carnoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 236.

hirtum. 5. Thl. ſiliculis ſubrotundis piloſis, foliis caulinis ſagittatis villoſis. *C. Bauh. prodr. th. bot. t.* 47.

[illegible]ſtre. 6. Thl. ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. *β) Blackw. herb. t.* 407.

montanum. 7. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus ſubcarnoſis obovatis integerrimis; caulinis amplexicaulibus, corollis calice majoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 237.

alpinum. 8. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus ſubcarnoſis obovatis integerrimis, caulinis ſeſſilibus, corollis calice majoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 238.

perfoliatum. 9. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris ſubdentatis, petalis longitudine calicis, caule ramoſo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 337.

alpeſtre. 10. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis ſubdentatis: caulinis amplexicaulibus, petalis longitudine calicis, caule ſimplici. *Ard. ſpec.* 2. *t.* 15. *f.* 2. *an mera perfoliati varietas?*

præcox. 11. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis carnoſis glaucis ſubcrenulatis decurrentibus: caulinis ſemiamplexicaulibus, obtuſe cordato-ſagittatis, petalis calice longioribus. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 2. *p.* 124. *t.* 9.

Schranckii. 12. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis ſubhiſpidis integris, radicalibus petiolatis caulinis amplexicaulibus, calice petalis minore. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 182.

Burſa paſtoris. 13. Thl. ſiliculis compreſſis obcordato-triangulis: valvis dorſo nudis obtuſis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Flor. dan. t.* 729. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 3. *an diſtincti generis?*

ceratocarpon. 14. Thl. ſiliculis oblongis ſurſum utrinque membranaceo cornutis, foliis ſuperioribus oblongis ſagittatis amplexicaulibus: inferioribus ovalibus petiolatis. *Murray comm. Goett.* 1774. *t.* 1.

803. COCHLEARIA. *Silicula* emarginata, turgida, ſcabra, polyſperma: valvis gibbis obtuſis.

officinalis. 1. C. foliis radicalibus cordato-ſubrotundis: caulinis oblongis ſubſinuatis. *Flor. dan. t.* 135.

danica. 2. C. foliis haſtato-angulatis: omnibus deltoidibus. *Mant. p.* 425. *Flor. dan. t.* 100.

anglica. 3. C. foliis omnibus ovato-lanceolatis. *Flor. dan. t.* 329.

groenlandica. 4. C. foliis reniformibus integris carnofis. *Barthol. act. Hafn.* 3. *t.* 144.

Coronopus. 5. C. foliis pinnatifidis, caule depreffo. *Flor. dan. t.* 202. *Gaertn. de fr. & fem. pl. fafc.* 9. *t.* 142. *f.* 5.

Armoracia. 6. C. foliis radicalibus lanceolatis crenatis: caulinis incifis. *Blackw. herb. t.* 415.

glaftifolia. 7. C. foliis caulinis cordato-fagittatis amplexicaulibus. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 12.

fœtida. 8. C. foliis caulinis ftriatis lanceolato-fagittatis dentatis, filiculis cochleariformibus repandis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 185.

804. IBERIS. *Cor.* inæqualis: petalis 2 exterioribus majoribus. *Silicula* fubrotunda compreffa: fepto contrario, loculis 1fpermis.

* *frutefcentes.*

femperflorens. 1. I. foliis cuneiformibus integerrimis obtufis. *Seb. muf.* 1. *t.* 13. *f.* 4.

fempervirens. 2. I. foliis linearibus acutis integerrimis. *Rivin. tetrap.* 224. *f.* 1.

gibraltarica. 3. I. foliis apice dentatis. *Dill. h. Elth. t.* 287. *f.* 37.

** *fuffrutefcens.*

faxatilis. 4. I. foliis lanceolato-linearibus carnofis acutis integerrimis ciliatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 277. *f.* 1.

*** *herbaceæ.*

rotundifolia. 5. I. foliis ovatis: caulinis amplexicaulibus lævibus fuccofis, floribus fubregularibus. *Arduin. fpec.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

cepæfolia. 6. I. foliis ovatis: caulinis feffilibus lævibus fuccofis. *Jacq. mifcell.* 2. *p.* 28. *t.* 1.

arabica. 7. I. foliis ovatis glabris aveniis integerrimis, filiculis bafi apiceque bilobis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 2. *f.* 1.

amara. 8. I. foliis lanceolatis acutis fubdentatis, floribus racemofis. *Rivin. tetrap.* 112.

umbellata. 9. I. foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus ſerratis; ſuperioribus integerrimis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 7.

linifolia. 10. I. foliis linearibus integerrimis: caulinis ſerratis, caule paniculato, corymbis hemiſphæricis. *Garid. fl. aix. t.* 105.

odorata. 11. I. foliis linearibus ſuperne dilatatis ſerratis.

nudicaulis. 12. I. foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici. *Flor. dan. t.* 323.

pinnata. 13. I. foliis pinnatifidis. *Lob. ic.* 218.

805. ALYSSUM.

Filamenta quædam introrſum dente notata. *Cor.* æqualis. *Silicula* ſubgloboſa, leviter emarginata, ſtilo perſiſtente coronata: loculis ſubdiſpermis.

* *ſiliculis compreſſis.*

† *ſuffruticoſa.*

ſpinoſum. 1. A. ramis ſenilibus ſpiniformibus nudis. *Barr. pl. rar. ic.* 808.

halimifolium. 2. A. caulibus procumbentibus perennantibus, foliis lanceolato-linearibus acutis integerrimis. *Herm. par. Lugdb. t.* 595.

ſaxatile. 3. A. caulibus fruteſcentibus paniculatis, foliis lanceolatis molliſſimis repandis. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 7. *Mill. h. angl. t.* 20. *f.* 1.

alpeſtre. 4. A. caulibus diffuſis, foliis ſubrotundis incanis, calicibus coloratis. *Mant. p.* 92. *Gerard. fl. prov. t.* 13. *f.* 2.

†† *herbacea.*

hyperboreum. 5. A. foliis incanis dentatis, ſtaminibus quatuor bifurcatis. *Kraſchenninck. act. Petrop. t.* 15. *f.* 1.

minimum. 6. A. caulibus diffuſis, foliis lanceolato-linearibus ſubhiſpidis.

calicinum. 7. A. ſtaminibus omnibus dentatis, calicibus perſiſtentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 338. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 4.

montanum. 8. A. caulibus diffuſis, foliis ſublanceolatis punctato-echinatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 37.

clypeatum. 9. A. caule erecto, ſiliculis ſeſſilibus, ovalibus, petalis linearibus; *an potius lunariæ ſpecies?*

** *ſiliculis inflatis.*

ſinuatum. 10. A. caule herbaceo, foliis lanceolato-deltoidibus. *Sabb. h. rom. 4. t.* 20.

gemonenſe. 11. A. caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis radicalibus obovatis ſubtomentoſis. *Mant. p.* 92. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 61.

utriculatum. 12. A. caule herbaceo erecto, foliis lævibus lanceolatis integerrimis. *Mant. p.* 92.

Veſicaria. 13. A. foliis linearibus dentatis, ſiliculis angulatis acutis. *Tournef. it.* 2. *t.* 14.

deltoideum. 14. A. caulibus ſuffruteſcentibus proſtratis, foliis lanceolato-deltoidibus, ſiliculis hirtis.

creticum. 15. A. caule fruticoſo, foliis lanceolatis ſubdentatis tomentoſis, ſiliculis globoſis. *Mant. p.* 92. *Alp. exot. t.* 118.

807. CLYPEOLA. *Silicula* ſubemarginata, orbiculata, compreſſo-plana, decidua.

Jonthlaſpi. 1. Cl. ſiliculis unilocularibus monoſpermis. *Mant. p.* 426. *Col. ecphr.* 1. *t.* 284. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 6.

tomentoſa. 2. Cl. ſiliculis bilocularibus, foliis ſubtomentoſis. *Mant. p.* 92. *Ard. ſpec.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

maritima. 3. Cl. perennis, ſiliculis bilocularibus ovatis diſpermis. *Mant. p.* 426. *Barr. pl. rar. ic.* 844.

caroliniana. 4. Cl. ſiliculis bilocularibus, foliis duplicato-ſerratis ſubſcabris. *Walt. flor. carol. p.* 173.

806. PELTARIA. *Silicula* ſ. potius *Pericarpium* ſimplex 1 loculare integrum, ſuborbiculatum, compreſſo-planum non dehiſcens.

alliace 1. P. foliis amplexicaulibus oblongis indiviſis. *Suppl. p.* 295. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 123. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 7.

capenfis. 2. P. foliis caulinis quinato-pinnatis linearibus fubcarnofis. *Suppl. p.* 296.

808. BISCUTELLA. *Silicula* f. potius *Pericarpium* 1loculare gemellum compreffo-planum, rotundatum, fupra infraque bilobum: lobis 1fpermis evalvibus. *Cal.* foliola bafi gibba.

auriculata. 1. B. calicibus nectario utrinque gibbis, filiculis in ftilum coëuntibus. *Col. ecphr.* 2. *t.* 61. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 1.

apula. 2. B. filiculis fcabris, foliis lanceolatis feffilibus ferratis. *Mant. p.* 254. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 437. Bifcutella didyma. *Col. ecphr.* 1. *t.* 284. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 1.

lyrata. 3. B. filiculis fcabris, foliis lyratis. *Mant. p.* 254. *Bocc. fic. t.* 23. *β?*) Bifcutella raphanifolia. *Poir. it.* 2. *p.* 198.

fempervirens. 4. B. filiculis fcabriufculis, foliis lanceolatis tomentofis. *Mant. p.* 255. *Barr. pl. rar. ic. t.* 841.

coronopifolia. 5. B. filiculis glabris, foliis dentatis hirtis. *Mant. p.* 255.

lævigata. 6. B. filiculis glabris, foliis lanceolatis ferratis.

apetala. 7. B. floribus apetalis, calicibus margine fcabris. *Walt. flor. carol. p.* 174.

809. LUNARIA. *Silicula* integra, compreffo-plana, fubovata pedicellata: valvis diffepimento æqualibus, parallelis planis. *Cal.* foliolis 2 faccatis.

rediviva. 1. L. foliis alternis, filiculis lanceolatis. *Befl. h. Eyft. vern.* 7. *f.* 2. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 1.

annua. 2. L. foliis oppofitis, filiculis ellipticis. *Mill. illuftr. ic. Sabb. h. rom.* 4. *t.* 22.

SILI-

SILIQUOSA.

810. RICOTIA. *Siliqua* 1locularis, oblonga, compressa: valvis planis.

ægyptiaca. 1. RICOTIA. *Mill. h. angl.* 169. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 1. *an lunariæ jungenda?*

811. DENTARIA. *Siliqua* teres, marginata, elastice dissiliens: valvis revolutis, dissepimento fungoso paulo brevioribus, *Stigma* emarginatum. *Cal.* longitudinaliter connivens.

enneaphylla. 1. D. foliis ternis ternatis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 316.

bulbifera. 2. D. foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus. *Flor. dan. t.* 361.

pentaphylla. 3. D. foliis summis digitatis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 30. *β) Gesn. fasc.* 1. *t.* 1. *f.* 1.

812. CARDAMINE. *Siliqua* longa, anceps elastice dehiscens: valvis revolutis, dissepimento membranaceo parallelo. *Stigma* integrum, capitatum. *Cal.* subhians.

* *foliis simplicibus.*

bellidifolia. 1. C. foliis ovatis integerrimis, petiolis longis. *Flor. dan. t.* 20.

nivalis. 2. C. foliis radicalibus ovatis inæqualiter serratis: caulinis sublanceolatis sessilibus alternis. *Pall. it.* 2. *p.* 740. *t.* U.

nudicaulis. 3. C. foliis lanceolaris sinuato-dentatis, caulibus nudis.

petræa. 4. C. foliis oblongis dentatis. *Flor. dan. t.* 386.

asarifolia. 5. C. foliis subcordatis. *Herm. par. Lugdb. t.* 203.

resedifolia. 6. C. foliis inferioribus indivisis : superioribus trilobis pinnatisque. *Jacq. flor. austr. 5. app. t. 21.*

** *foliis ternatis.*

africana. 7. C. foliis ternatis acuminatis, caule ramosissimo. *Herm. par. Lugdb. t. 202.*

trifolia. 8. C. foliis ternatis obtusis, caule subnudo. *Jacq. flor. austr. 1. t. 27.*

*** *foliis pinnatis.*

hirsuta. 9. C. floribus interdum tetrandris. *Curt. flor. Lond. t. 277. An satis constanterque distincta a pratensi ?*

amara. 10. C. axillis stoloniferis. *Curt. flor. Lond. t. 158.*

impatiens. 11. C. foliis incisis stipulatis, floribus apetalis. *Flor. dan. t. 735.*

parviflora. 12. C. foliis exstipulatis : foliolis lanceolatis obtusis.

virginica. 13. C. foliolis lanceolatis basi unidentatis. *Pet. gaz. t. 105. f. 18.*

chelidonia. 14. C. foliolis quinis incisis. *Herm. par. Lugdb. t. 204.*

græca. 15. C. foliolis palmatis æqualibus petiolatis. *Mant. p. 427. Bocc. mus. 2. t. 166. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 9. t. 143. f. 1.*

pratensis. 16. C. foliolis radicalibus subrotundis : caulinis lanceolatis. *Curt. flor. Lond. t. 175.*

813. SISYMBRIUM. *Siliqua* teres, dehiscens : valvis rectiusculis dissepimento fere æqualibus. *Cal.* patens. *Cor.* patens.

* *siliquis declinatis brevibus.*

Nasturtium. 1. S. foliis pinnatis : foliolis subcordatis. *Flor. dan. t. 690.*

silvestre. 2. S. siliquis oblongo-ovatis, foliolis lanceolatis serratis. *Curt. flor. Lond. t. 153.*

islandicum. 3. S. foliis lyrato-pinnatis : foliolis ovalibus dentatis. *Flor. dan. t. 403.*

amphibium. 4. S. siliquis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis serratis, petalis calice longioribus. *Tabernaem. Kræuterb. p. 408.*

palustre. 5. S. siliquis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis serratis, petalis calice minoribus. *C. Bauh. prodr. th. bot. t. 38.*

pyrenaicum. 6. S. siliquis subovatis, foliis inferioribus lyratis: superioribus bipinnatifidis amplexicaulibus, stilis filiformibus. *de la Chanal act. helv. 4. t. 15.*

tanacetifolium. 7. S. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis inciso-serratis: extimis confluentibus. *Moris. hist. pl. 2. t. 6. f. 19.*

tenuifolium. 8. S. foliis integerrimis: infimis tripinnatifidis; supremis integris. *Blackw. herb. t. 266.*

salsugineum. 9. S. foliis oblongo-cordatis sessilibus subcarnosis. *Pallas it. 2. p. 740.*

molle. 10. S. siliquis subcylindricis, foliis mollibus denticulatis: caulinis hastatis oblongis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 85.*

lippizense. 11. S. foliis inferioribus pinnatis: summis inferiorumque pinnis integerrimis. *Wulf. ap. Jacq. coll. 2. p. 161. pl. rar. ic. cent. 2. t. 62.*

sagittatum. 41. S. pubescens, siliquis subcylindricis recurvis, foliis obovato-oblongis sagittatis dentatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 390.*

** *siliquis sessilibus axillaribus.*

supinum. 12. S. siliquis subsessilibus solitariis, foliis dentato-sinuatis. *Isnard act. Paris. 1724. t. 18.*

hispanicum. 13. S. siliquis cylindricis breviusculis erectis, foliis lanceolatis serratis sessilibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 84.*

polyceratium. 14. S. siliquis subulatis aggregatis, foliis repando-dentatis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 79.*

bursifolium. 15. S. racemo flexuoso, foliis lyratis, caule erecto folioso. *Dill. h. Elth. t. 148. f. 177.* β) Hesperis dentata. *Sp. pl. 2. p. 928.*

*** *caule nudo, aut nullo.*

vimineum. 16. S. acaule, foliis lyratis lævibus, scapis adscendentibus, floribus minutis. *Bocc. sic. t. 10.*

monense. 17. S. acaule, foliis pinnato-dentatis subpilosis, scapis lævibus. *Dill. h. Elth. t. 111. f. 135.*

murale. 18. S. subacaule, foliis lanceolatis sinuato-serratis læviusculis, scapis subscabris adscendentibus. *Barr. pl. rar. ic. t. 131.*

Barrelieri. 19. S. caule subnudo ramoso, foliis radicalibus runcinatis dentatis hispidis. *Barr. pl. rar. ic. 1016.*

arenosum. 20. S. caule subfolioso ramoso, foliis lyratis rectangulo-dentatis hispidis: pilis ramosis. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *t.* 40.

valentinum. 21. S. caule simplici erecto superne glabro, foliis lanceolatis hispidis antrorsum dentatis. *Bocc. mus.* 2. *t.* 80.

simplicissimum. 22. S. caule simplicissimo, foliis radicalibus ovatis ciliato-hispidis petiolatis integerrimis. *S. G. Gmel. it.* 3. *p.* 303. *t.* 36. *f.* 3.

**** *foliis divisis aut compositis.*

altissimum. 23. S. foliis runcinatis flaccidis: foliolis linearibus integerrimis, pedunculis laxis. *Buxb. cent.* 5. *t.* 51.

Parra. 24. S. caulescens, foliis runcinatis muricatis. *Mant. p.* 255.

Columnæ. 25. S. foliis runcinatis dentatis cauleque villosis subincanis, siliquis erectis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 323.

Loeselii. 26. S. foliis runcinatis acutis hirtis, caule hispido. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 324.

orientale. 27. S. foliis runcinatis tomentosis, caule lævi.

Irio. 28. S. foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, siliquis erectis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 322.

sinapios. 29. S. foliis radicalibus runcinatis dentatis hirtis: caulinis incisis linearibus glabris, siliquis patentibus. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 37.

pinnatifidum. 30. S. foliis lyrato-pinnatifidis, siliquis glabris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 118.

album. 31. S. siliquis lineari-teretibus lævibus, foliis pinnatifidis incanis: laciniis oblongo-linearibus obtusis subintegris. *Pallas it.* 3. *p.* 739. *t.* U. *f.* 1.

asperum. 32. S. siliquis scabris, foliis pinnatifidis: pinnis lineari-lanceolatis subdentatis, corollis calice longioribus.

Sophia. 33. S. petalis calice minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Flor. dan. t.* 528.

catholicum. 34. S. siliquis filiformibus lævibus, foliis pinnatis denticulatis caulinis. *Mant. p.* 93.

heterophyllum. 35. S. foliis pinnatifidis: foliolis reniformibus subtrilobis; infimis pinnatifidis pilosis. *Forst. flor. austr. p.* 46.

pannonicum. 36. S. foliis caulinis superioribus glabris pinnatis: pinnis linearibus integerrimis; extima elongata. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 83.

***** *foliis ſimplicibus indiviſis.*

barbareæ. 37. S. foliis ſpatulato-ovatis dentatis amplexicaulibus nudis.

indicum. 38. S. foliis lanceolato-ovatis ſerratis petiolatis lævibus, ſiliquis ſubarcuatis. *Mant. p.* 93.

ſtrictiſſimum. 39. S. foliis lanceolatis dentato-ſerratis caulinis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 194.

integrifolium. 40. S. foliis linearibus integerrimis, pedunculis glutinoſo-hiſpidis. *Gmel. flor. ſibir.* 3. *t.* 63.

814. ERYSIMUM. *Siliqua* linearis ſtricta, exacte tetraëdra. *Cal.* clauſus. *Stigma* capitatum.

officinale. 1. E. ſiliquis ſpicæ adpreſſis, foliis runcinatis. *Flor. dan. t.* 560. *annon potius ſiſymbrio adſcribendum?*

Barbarea. 2. E. ſiliquis obſolete tetragonis, foliis lyratis: extimo ſubrotundo. *Regn. bot. t.* 202.

Alliaria. 3. E. foliis cordatis. *Zorn pl. off. ic. t.* 91.

polyceraton. 4. E. foliis repando-dentatis, ſiliquis piloſis ſeſſilibus patentibus. *Pallas it.* 3. *p.* 741. *t.* M m. *f.* 1. A. *an ſatis diſtinctum a cheiranthoide?*

cheiranthoides. 5. E. caule ramoſiſſimo, foliis lanceolatis obliquis repando-dentatis, ſiliquis patentibus. *Flor. dan. t.* 731. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 23. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 7.

repandum. 6. E. foliis lanceolatis dentatis, racemis oppoſitifoliis, ſiliquis ſubſeſſilibus, corollis minutis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 22.

hybridum. 7. E. foliis lanceolatis denticulatis glaberrimis, ſiliquis calice triplo longioribus ſuperne incraſſatis. *Weber ſuppl. flor. holſ. p.* 9.

hieracifolium. 8. E. foliis lanceolatis ſerratis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 73.

pinnatum. 9. E. foliis pubeſcentibus pinnatis: pinnis pinnatifidis. *Walt. flor. carol. p.* 174.

bicorne. 10. E. foliis lanceolatis piloſis, ſiliquis apice bicornibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 394.

CHAMIRA. *Cal.* basi cornutus. *Glandula* extra stamina breviora.

cornuta. 1. CHAMIRA. *Thunb. nov. pl. gen. p.* 49.

815. CHEIRANTHUS. *Germen* utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clausus: foliolis 2 basi gibbis. *Semina* plana.

erysimoides. 1. Ch. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto simplicissimo, siliquis tetragonis. *Flor. dan. t.* 229. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 74. *annon potius erysimi species?*

helveticus. 2. Ch. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto, siliqua tetragona stilo acuminata. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 9.

callosus. 3. Ch. foliis lanceolatis integris callosis, caule angulato fruticoso. *Suppl. p.* 296.

incanus. 4. Ch. foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *Mill. illustr. ic.*

scapiger. 5. Ch. foliis lanceolatis integerrimis, caule florifero aphyllo: sterilibus simplicibus. *Will. denow fl. Beror. n.* 663. *an distincta species?*

salinus. 6. Ch. foliis lanceolatis obtusis integerrimis, caule erecto, antheris inclusis. *Mant. p.* 93.

fenestralis. 7. Ch. foliis conferto-capitatis recurvatis undatis, caule indiviso. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 179.

annuus. 8. Ch. foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. *Kniph. bot. orig. cent.* 12. *n.* 26.

littoreus. 9. Ch. foliis lanceolatis subdentatis subtomentosis subcarnosis, petalis emarginatis, siliquis tomentosis.

sinuatus. 10. Ch. foliis tomentosis obtusis subsinuatis: rameis integris, siliquis muricatis.

trilobus. 11. Ch. foliis dentatis obtusis, calicibus lævibus, siliquis nodosis mucronatis filiformibus lævibus.

fruticulosus. 12. Ch. foliis lanceolatis acutis glabris subserratis, caule fruticoso. *Mant. p.* 94. *Barr. pl. rar. ic.* 1228.

Cheiri. 13. Ch. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. *Knorr del. hort.* 1. *t.* V. 1. *Regn. bot. t.* 204.

mutabilis. 14. Ch. frutescens, foliis lanceolatis laxe serratis. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 92.

Farsetia. 15. Ch. foliis lineari-lanceolatis, caule fruticoso erecto, siliquis ovalibus compressis. *Mant. p.* 94. *Forsk. flor. æg. arab. ic. t.* 16. β) Cheiranthus linearis. *Forsk. fl. p.* 120.

montanus. 16. Ch. foliis linearibus integris, siliquis sessilibus oblongis tetragonis. *Pallas it.* 1. *p.* 496. *Herit. stirp. nov. p.* 91. *t.* 44.

villosus. 17. Ch. foliis linearibus villoso-scabris remote dentatis, caulibus decumbentibus, floribus sessilibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 120.

alpinus. 18. Ch. foliis linearibus integris subtomentosis, caule ramoso. *Mant. p.* 93. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 75.

canus. 19. Ch. foliis linearibus integris subtomentosis, caule ramoso teretiusculo scabro subtomentoso, siliquis brevibus tomentosis scabris subtetraëdris. *Pill. & Mitterp. it. p.* 146.

strictus. 20. Ch. foliis linearibus acutis glabris, caule fruticoso erecto. *Suppl. p.* 296.

tristis. 21. Ch. foliis linearibus subsinuatis, floribus sessilibus: petalis undatis, caule fruticoso. *Bocc. mus. t.* 111.

tenuifolius. 22. Ch. frutescens, foliis linearibus integerrimis. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 92.

maritimus. 23. Ch. foliis ellipticis obtusis nudis scabriusculis, caule diffuso scabro. *Mant. p.* 568. *Barr. pl. rar. ic.* 1127.

chius. 24. Ch. foliis obovatis aveniis emarginatis, siliquis apice subulatis. *Dill. h. Elth. t.* 147. *f.* 178.

tricuspidatus. 25. Ch. foliis lyratis, siliquis apice tridentatis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 25. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 3.

816. HELIOPHILA. *Nectaria* 2 recurvata versus calicis basin vesicularem.

integrifolia. 1. H. foliis lanceolatis supra pilosis. *Mant. p.* 428. *Seb. mus.* 1. *t.* 17. *f.* 5. *Jacq. coll.* 3. *p.* 219.

amplexicaulis. 2. H. foliis amplexicaulibus integris glabris, siliquis moniliformibus. *Suppl. p.* 296.

circæoides. 3. H. foliis cordatis. *Suppl. p.* 298.

filiformis. 4. H. foliis subulatis filiformibus glabris, ramis divaricatis; siliquis pendulis. *Suppl. p.* 296.

pusilla. 5. H. foliis linearibus, siliquis moniliformibus erectis. *Suppl. p.* 297.

flava. 6. H. foliis linearibus, caulibus fruticosis junceis. *Suppl. p.* 297.

coronopifolia. 8. H. foliis linearibus pinnatifidis. *Herm. par. Lugdb. t.* 367.

digitata. 8. H. foliis palmato-pinnatifidis villosis: laciniis linearibus. *Suppl. p.* 296.

pinnata. 9. H. foliis trifidis pinnatisque: foliolis linearibus, siliquis moniliformibus erectis. *Suppl. p.* 297.

817. HESPERIS. *Petala* oblique flexa. *Glandula* intra stamina breviora. *Cal.* clausus. *Siliqua* stricta. *Stigma* basi 2furcum: apice connivente.

tristis. 1. H. caule hispido ramoso-patente. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 102.

matronalis. 2. H. caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 58. β) Hesperis sibirica. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 442.

inodora. 3. H. caule simplici erecto, foliis subhastatis dentatis, petalis obtusis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 347.

tatarica. 4. H. caule nudo flexuoso decumbente, foliis radicalibus crassiusculis lanatis ovali-oblongis lacero-dentatis. *Pallas it.* 1. *p.* 497. *t.* L. *f.* 1. 2.

africana. 5. H. caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis petiolatis acute dentatis scabris, siliquis sessilibus. *Bocc. sic. t.* 42. *f.* 1.

verna. 6. H. caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexicaulibus serratis villosis. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 8. *f.* 5.

lacera. 7. H. foliis runcinatis, siliquis tricuspidatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 442. Cheiranthus lacerus. *Herm. par. Lugdb. t.* 193.

acris. 8. H. foliis oblongo-ovatis dentato-sinuatis glabris: inferioribus petiolatis, petalis subrotundis obtusis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 118.

818. **ARABIS.** *Glandulæ* nectariferæ 4, singulæ intra calicis foliola, squamæ instar reflexæ. *Siliqua* longa, compressa, linearis: apice integro, capitato.

alpina. 1. A. foliis amplexicaulibus dentatis. *Flor. dan. t.* 62.

lucida. 2. A. foliis amplexicaulibus lucidis. *Suppl. p.* 298.

pendula. 3. A. foliis amplexicaulibus, siliquis ancipitibus linearibus, calicibus subpilosis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 34.

turrita. 4. A. foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis planis linearibus, calicibus subrugosis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 11.

grandiflora. 5. A. caule nudo. *Amœn. acad. vol.* 4. *t.* 4. *f.* 10.

ovirensis. 6. A. caule subnudo, foliis glabris petiolatis subovatis repando-denticulatis. *Wulfen apud Jacquin collect.* 1. *p.* 196.

lyrata. 7. A. foliis glabris: radicalibus lyratis; caulinis linearibus.

hispida. 8. A. foliis hispidis: radicalibus runcinatis; caulinis lanceolatis.

bellidifolia. 9. A. foliis subdentatis: radicalibus obovatis; caulinis lanceolatis. *Mant. p.* 94. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 280. β) Arabis pumila. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 281.

Halleri. 10. A. foliis caulinis sublyratis: rameis lanceolatis incisis. *Haller. opusc. t.* 1. *f.* 1.

canadensis. 11. A. foliis caulinis lanceolatis dentatis glabris, floribus pendulis. *Pluckn. alm. t.* 86. *f.* 8.

Thaliana. 12. A. foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Curt. flor. Lond. t.* 73.

cærulea. 13. A. foliis radicalibus obovato-cuneiformibus acutis glabris margine superiori dentatis, racemo paucifloro nutante. *Allion. flor. pedem. n.* 981. *t.* 40. *f.* 2.

819. **TURRITIS.** *Siliqua* longissima, angulata, stricta, stigmata 2 colli terminata. *Cal.* connivens, erectus. *Cor.* erecta.

glabra. 1. T. foliis radicalibus dentatis hispidis: caulinis amplexicaulibus integerrimis glabris. *Curt. flor. Lond. t.* 253. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 8.

alpina. 2. T. foliis radicalibus dentatis hiſpidis; caulinis ſemiamplexicaulibus integerrimis glabris.

hirſuta.* 3. T. foliis omnibus hiſpidis: caulinis amplexicaulibus. *C. Bauh. prodr. th. bot. t. 42. nonne potius arabis?*

820. BRASSICA. *Cal.* erectus, connivens. *Glandula* inter ſtamina breviora & piſtillum, interque longiora & calicem. *Sem.* globoſa.

* *ſtilo obtuſiuſculo.*

orientalis. 1. Br. foliis amplexicaulibus cordatis glabris: radicalibus ſcabris integerrimis, ſiliquis tetragonis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 282.

auſtriaca. 2. Br. foliis amplexicaulibus cordatis glabris integerrimis, ſiliquis tetragonis ſtriatis erectis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 283.

arvenſis. 3. Br. foliis amplexicaulibus ſpatulatis repandis: ſummis cordatis integerrimis. *Mant. p.* 95. 568. *Bocc. ſic. t.* 25. *f.* 3. 4.

alpina. 4. Br. foliis caulinis amplexicaulibus cordato-ſagittatis: radicalibus ovatis, petalis erectis. *Mant. p.* 95.

campeſtris. 5. Br. foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus, radice cauleque tenui. *Flor. dan. t.* 550.

Napus. 6. Br. radice caulescente fuſiformi. *Blackw. herb. t.* 224.

Rapa. 7. Br. radice caulescente orbiculari depreſſa carnoſa. *Blackw. herb. t.* 226.

oleracea. 8. Br. radice caulescente tereti carnoſa. *Regn. bot. t.* 207. 209. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 2.

ſinenſis. 9. Br. foliis ovalibus ſubintegerrimis: floralibus amplexicaulibus lanceolatis, calicibus ungue petalorum longioribus.

violacea. 10. Br. foliis lanceolato-ovatis glabris indiviſis dentatis.

muralis. 11. Br. foliis lanceolatis ſinuato-ſerratis læviuſculis, caule erecto glabro. *Hudſ. flor. angl.* 290.

polymorpha. 12. Br. foliis inferioribus lineari-lanceolatis pinnatifido-dentatis: ſuperioribus ſubulatis integris. *Murray comm. Goett.* 1776. *t.* 6.

craſſifolia. 13. Br. foliis craſſis pinnatifidis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 118. *An hujus tribus?*

** *ſtilo enſiformi*, Erucæ.

Eruca. 14. Br. foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis glabris. *Blackw. herb. t.* 242.

Erucaſtrum. 15. Br. foliis runcinatis, caule hiſpido, ſiliquis lævibus. *Bulliard herb. Franc. t.* 331.

veſicaria. 16. Br. foliis runcinatis, ſiliquis hiſpidis tectis calice tumido.

821. SINAPIS. *Cal.* patens. *Cor.* ungues erecti. *Glandula* inter ſtamina breviora & piſtillum, interque longiora & calicem. *Siliqua* roſtrata dehiſcens: valvis diſſepimento brevioribus.

alba. 1. S. ſiliquis hiſpidis: roſtro obliquo longiſſimo enſiformi. *Mant. p.* 429. *Blackw. herb. t.* 29. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 4.

orientalis. 2. S. ſiliquis retrorſum hiſpidis apice ſubtetragonis compreſſis.

pyrenaica. 3. S. ſiliquis ſtriatis ſcabris, foliis runcinatis lævibus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 97.

pubeſcens. 4. S. ſiliquis pubeſcentibus erectis: roſtro compreſſo, foliis lyratis villoſis. *Mant. p.* 95. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 9.

Allioni. 5. S. ſiliquis ovato-oblongis patulis, foliis pinnatifidis: laciniis inciſis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 168.

nigra. 6. S. ſiliquis glabris, racemo adpreſſis. *Blackw. herb. t.* 446.

arvenſis. 7. S. ſiliquis multangulis toroſo-turgidis lævibus roſtro ancipiti longioribus. *Flor. dan. t.* 753.

ſinenſis. 8. S. ſiliquis lævibus ſubarticulatis patulis, foliis lyrato-runcinatis ſubhirſutis. *Mant. p.* 95. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 10.

incana. 9. S. ſiliquis racemo adpreſſis lævibus: foliis inferioribus lyratis ſcabris: ſummis lanceolatis, caule ſcabro. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 169.

erucoides. 10. S. ſiliquis lævibus æqualibus, foliis lyratis oblongis glabris, caule ſcabro. *Mant. p.* 429. *Jacq. h. Vindob.* 2. *t.* 170.

lævigata. 11. S. ſiliquis lævibus patulis, foliis lyratis glabris: ſummis lanceolatis, caule lævi.

cernua. 12. S. siliquis lævibus patulis, folio radicali lyrato: lobo terminali maximo ovato inciso-dentato. *Thunb. flor. jap. p.* 261.

japonica. 13. S. siliquis lævibus erectis, foliis inciso-pinnatifidis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 262.

frutescens. 14. S. siliquis lævibus linearibus, foliis inferioribus oblongis dentatis: superioribus lanceolatis integerrimis, caule glabro frutescente. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 404.

millefolia. 15. S. foliis bipinnatis: pinnulis ovatis serratis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 41. *p. rar. ic. cent.* 1. *t.* 57.

hispanica. 16. S. foliis duplicato-pinnatis; laciniis linearibus.

brassicata. 17. S. foliis obovatis denticulatis lævibus. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 631.

Harra. 18. S. foliis ovalibus sinuatis calicibusque hispidis, caule glabro. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 118.

juncea. 19. S. ramis fasciculatis, foliis summis lanceolatis integerrimis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 171.

822. RAPHANUS. *Cal.* clausus erectus. *Glandulæ* melliferæ 2 inter stamina breviora & pistillum, totidem inter stamina longiora & calicem. *Siliqua* s. potius *Pericarpium* loculamentosum torosum, subarticulatum, teres.

caudatus. 1. R. siliquis decumbentibus tota planta longioribus. *Mant. p.* 95. *Linn. dec.* 3. *t.* 10.

Raphanistrum. 2. R. siliquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Flor. dan. t.* 678. *Curt. flor. Lond. t.* 267. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 6. *an distincti generis?*

sativus. 3. R. siliquis teretibus torosis bilocularibus. *Blackw. herb. t.* 81. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 5.

sibiricus. 4. R. siliquis teretibus torulosis villosis, foliis linearibus pinnatifidis. *Murray comm. Goett.* 1775. *t.* 11.

lyratus. 5. R. siliquis teretibus hispidis, foliis lyratis, caule basi procumbente. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 119.

erucoides. 6. R. siliquis ovatis gibbis: rostro longitudine siliquæ. *Suppl. p.* 299. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1016.

tenellus. 7. R. *Pallas it.* 1. *p.* 497. & 3. *t.* L. *f.* 3.

Erucaria. 8. R. siliqua biarticulata: articulo inferiori polyspermo; superiori substerili. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 9. *an distincti generis?*

823. BUNIAS. *Silicula* s. potius *Drupa* decidua, 4-edra: angulis inæqualibus acuminatis, muricata: ossiculo loculamentoso.

spinosa. 1. B. racemis spinascentibus. *Forsk. flor. æg. arab. ic. t.* 17. & 18. *f.* A. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

cornuta. 2. B. siliculis divaricato-bicornibus basi spinosis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 3. *an distincti generis? Ossiculum, uti in plurimis reliquis, 2loculare.*

Erucago. 3. B. siliculis tetragonis: angulis bicristatis, ossiculo quadriloculari. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 340. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

ægyptiaca. 4. B. siliculis tetragonis undique verrucoso-muricatis, foliis runcinatis. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 231. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 145. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

aspera. 5. B. siliculis muricatis quadrangulis, foliis lanceolatis subdentatis: pilis furcatis. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 21.

orientalis. 6. B. siliculis ovatis gibbis verrucosis. *Gmel. flor. sib.* 3. *t.* 57. *Gaertn. de fr. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

balearica. 7. B. siliculis hispidis, foliis pinnatis: foliolis subdentatis. *Mant. p.* 429. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 144.

myagroides. 8. B. siliculis biarticulatis ancipitibus superne torulosis, foliis pinnatis: sinubus reflexis. *Mant. p.* 96.

Cakile. 9. B. siliculis ovatis lævibus ancipitibus biarticulatis. *Mant. p.* 430. *Lob. ic.* 223. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 12. *an distincti generis?*

cochlearioides. 10. B. siliculis cordato-ovatis lævibus inflexis. *Murray comm. Goett.* 1771. *t.* 3. *nonne potius genus hoc ad siliculosas referendum?*

824. ISATIS. *Silicula* s. *Pericarpium* simplex ovali-lanceolatum, compressum, stilo coronatum, 1loculare, 1spermum.

tinctoria. 1. I. foliis radicalibus crenatis: caulinis sagittatis, siliculis oblongis. *Regn. bot. t.* 211. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 6. *β) Blackw. herb. t.* 246.

lusitanica. 2. I. foliis radicalibus crenatis: caulinis sagittatis, pedunculis subtomentosis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 5.

aleppica. 3. I. foliis radicalibus lyratis, caulinis sagittatis, siliculis emarginatis villosis incurvis. *Scop. del. ins.* 2. *p.* 31. *t.* 16.

armena. 4. I. foliis integerrimis cordatis posterius obtusis, siliculis cordatis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 4.

ægyptia. 5. I. foliis omnibus dentatis.

pinnata. 6. I. foliis carnosis pinnatis subdentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 121. *Totum genus potius siliculosis inserendum.*

825. CRAMBE. *Filamenta* 4 longiora, apice 2fida: altero antherifero. *Pericarpium* simplex, globosum, deciduum, 2articulatum.

maritima. 1. Cr. foliis cauleque glabris. *Flor. dan. t.* 316. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 4.

caspica. 2. Cr. foliis villosis, baccis bilocularibus dispermis. *S. G. Gmel. it.* 4. *p.* 184.

orientalis. 3. Cr. foliis scabris, caule glabro. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 93.

hispanica. 4. Cr. foliis cauleque scabris. *Jacq. obs. bot.* 2. *t.* 41. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 4.

Tataria. 5. Cr. foliis decomposito-multifidis. *Jacq. misc.* 2. *t.* 25.

fruticosa. 6. Cr. fruticosa, foliis ovatis pinnatifidis serratis canis, racemis in panicula effusa dichotoma. *Suppl. p.* 299. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 50. *Nonne potius cum universo genere ad siliculosas pertinet?*

826. CLEOME. *Glandulæ* nectariferæ 3, ad singulos calicis sinus singulæ, excepto infimo. *Petala* omnia adscendentia. *Siliqua* 2valvis. *Semina* reniformia, globosa.

* *floribus hexandris.*

† *foliis septenatis.*

gigantea. 1. Cl. caule inermi. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 232. *Mant. p.* 430. *Jacq. obs. bot.* 1. *t.* 76. *Receptaculum infra cum valvis siliquæ coalitum?*

spinosa. 2. Cl. foliis septenatis quinatisque, caule spinoso. *Marcgr. bras. t.* 34. *Jacq. coll.* 3. *p.* 216.

†† *foliis digitatis.*

angustifolia. 3. Cl. foliis septenatis, ternatisque filiformibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 120.

digitata. 4. Cl. foliis inferioribus digitatis: superioribus ternatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 120.

††† *foliis ternatis.*

aculeata. 5. Cl. foliis integerrimis: stipulis spinascentibus. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 232.

serrata. 6. Cl. foliolis lineari-lanceolatis serratis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 73.

ornithopodioides. 7. Cl. foliolis ovali-lanceolatis. *Dill. h. Elth. t.* 266. *f.* 345.

arabica. 8. Cl. foliolis lanceolatis obtusis, siliquis fusiformibus viscoso-scabris. *Linn. dec.* 3. *t.* 8.

violacea. 9. Cl. foliis ternatis solitariisque: foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Barr. pl. rar. ic.* 866.

†††† *foliis simplicibus.*

monophylla. 10. Cl. foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Burm. zeyl. t.* 100. *f.* 2.

procumbens. 11. Cl. foliis lanceolatis petiolatis: caulibus procumbentibus. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 181.

capensis. 12. Cl. foliis sessilibus lineari-lanceolatis, caule angulato.

guianensis. 13. Cl. foliis sessilibus linearibus, floribus solitariis axillaribus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 675. *t.* 273.

** *floribus dodecandris.*

dodecandra. 14. Cl. foliis ternatis. *Burm. zeyl. t.* 100. *f.* 1.

viscosa. 15. Cl. foliis quinatis ternatisque. *Mant. p.* 430. *Martyn cent.* 25. *t.* 25.

*** *floribus polyandris.*

felina. 16. Cl. foliis ternatis cuneiformibus strigosis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis, siliquis linearibus compressis. *Suppl. p.* 300.

icosandra. 17. Cl. foliis quinatis. *Burm. zeyl. t.* 99. *Stamina.* 24.

Chelidonii. 18. Cl. foliis quinatis septenatisve cuneiformibus scabris, racemis terminalibus, siliquis filiformibus. *Suppl. p.* 300.

**** *floribus gynandris.*

heptaphylla. 19. Cl. foliis subseptenatis, caule aculeato.

pentaphylla. 20. Cl. foliis quinatis, caule inermi. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 24. *Recept. siliq. fenestratum.*

triphylla. 21. Cl. foliis ternatis, caule inermi. *Herm. par. Lugdb. t.* 565.

fruticosa. 22. Cl. foliis simplicibus, caule fruticoso, floribus tetrandris. *Burm. ind. t.* 46. *f.* 3.

juncea. 23. Cl. aphylla, corymbis lateralibus: floribus octandris; genitalibus elongatis, siliqua lineari tomentosa, caule fruticoso. *Suppl. p.* 300. *Sparrm. nov. act. Ups.* 3. *p.* 192.

***** *floribus polygamis.*

polygama. 24. Cl. floribus superioribus tetrandris masculis, foliis ternatis: foliolis sessilibus margine subaculeatis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 124. *f.* 1.

****** *incertæ tribus.*

tenella. 25. Cl. foliis ternatis filiformibus linearibus. *Suppl. p.* 300.

CLAS-

CLASSIS XV.

MONADELPHIA.

DIANDRIA.

1278. GNETUM. *Flores* monoici. *Amentum* ex calicibus peltatis. *Cor.* o.
♀. *Stil.* 3fidus. *Drupa* 1ſperma.

1279. STILLINGIA. *Flores* monoici.
♂. *Cal.* multiflorus. *Cor.* 1petala.
♀. *Cal.* 1florus. *Stilus* 3fidus. *Germen* 3coccum inter calicem & corollam.

1088. HIPPOMANE. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 2fidus. *Antheræ* 2fidæ.
♀. *Cal.* 3fidus. *Stigma* 3plex. *Drupa* 1ſperma, aut *Capſ.* 3cocca.
* *Omphalea.*

TRIANDRIA.

1134. JUNIPERUS. *Flores* dioici.
♂. *Cal* Amentum. *Cor.* o.
♀. *Cal.* 3partitus. *Cor* 3petala. *Stil.* 3. *Bacca* infera, 3ſperma calicina.

1410. APHYTEIA. *Cal.* magnus, infundibuliformis, ſemitrifidus. *Petala* 3, fauci calicis inſerta, illoque breviora.

GALAXIA. *Cor.* 1petala, 6fida.

GYMNANTHES. *Flores* diclini. *Amentum* nudum. *Cal.* o. *Cor.* o.
♂. *Pedicell.* 3partitus, antherifer.
♀. *Germen* pedicellatum. *Stilus* 3fidus. *Capſ.* 3cocca, 3locularis
* *Siſyrinchium*, *Ferraria*, *Moreæ multæ. Myriſtica.*

TETRANDRIA.

1138. CISSAMPELOS. *Flores* dioici. *Cal.* o.
♂. *Cor.* 4petala.
♀. *Cor.* o. *Stigm.* 2. *Bacca* 1ſperma.

1078. THUJA. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* 0.
♀. *Ament.* ſtrobilaceum. *Piſt.* 2. *Nux* ala cincta.

1070. CUPRESSUS. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* 0.
♀. *Ament.* ſtrobilac. *Stigm.* 2. *Nux* angulata.

PENTANDRIA.

CAOUTCHOUA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* ſemiquinquefidus, globoſo-campanulatus.
♀. *Cal.* ſubpyriformi-campanulatus, 5-dentatus, circumſciſſus. *Piſt.* 1. *Stigm.* 3. *Capſ.* oſſea, 3cocca, 3locularis, 2valvis. *Semina* ſolitaria.

KIRGANELIA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus.
♀. *Bacca*, ſubtrilocularis, 6ſperma.

SECURINEGA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* 5partitus.
♂. *Columm.* filamentorum exterius corona crocea cincta.

ABRONIA. Monogyna. *Sem.* 1. imo calice tectum.

1318. LERCHEA. Monogyna. *Capſ.* 3locularis, polyſperma.

827. WALTHERIA. Monogyna. *Capſ.* 1locularis, 1ſperma.

1411. SYMPHONIA. Monogyna. *Cor.* globoſa. *Bacca* 5locularis.

MUTABEA. Monogyna. *Bacca* ſphærica, 3locularis, 3ſperma.

TICOREA. Monogyna. *Petala* 5 unguibus longiſſimis, in tubum conjuncta. *Capſ.* 5locularis.

828. HERMANNIA. Pentagyna. *Petala* cucullata, obliqua. *Capſ.* 5locularis, 1ſperma.

829. MELOCHIA. Pentagyna. *Capſ.* 5locularis, 1ſperma.

OCHROMA. *Cal.* 2plex : exterior 3phyllus. *Antheræ* connatæ anfractuoſæ. *Capſ.* 5locularis, polyſperma.

HEXANDRIA.

PHILESIA. *Cal.* 0. *Cor.* campanulata, 6partita : laciniis 3 interioribus duplo longioribus. *Stigm.* 3. *Bacca* ſubtrigona, polyſperma.

NOTHRIA. *Cal.* cylindr. 5angul. 5fidus. *Cor.* infundibulif. 5petala. *Stigm.* 3fidum.

* *Celosia marilandica, margaritacea. Ayenia. Passiflora. Linum narbonense. Gerania multa. Byttneria. Makernium. Xanthium.*

HEPTANDRIA.

1136. EPHEDRA. *Flores* dioici *Cor.* o.
♂. *Amentum* 2fidum.
♀. *Cal.* imbricatus. *Pist.* 2. *Bacca* 2-sperma; calicina.

* *Gerania multa.*

OCTANDRIA.

1080. PLUKENETIA. *Flores* monoici. *Cal.* o. *Cor.* 4petala.
♀. *Stil.* 1. *Caps.* 4cocca.

ALCHORNEA. *Flores* dioici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 3-5phyllus.
♀. *Cal.* 5dentatus. *Stilus* 2partitus. *Caps.* baccata, 2cocca.

1412. AITONIA. *Cor.* 4petala. *Pist.* 1. *Bacca* sicca, 4angularis, inflata.

ENNEANDRIA.

DRYANDRA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 5petala.

QUARARIBEA. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 5petala. *Stigma* 2lobum. *Caps.* 2locularis. *Sem.* solitaria.

DECANDRIA.

830. CONNARUS. *Stam.* alterna, brevissima. *Pist.* 1. *Legumen* 1loculare.

832. GERANIUM.* *Pist.* 1. *Receptac. commune* rostratum. *Cocculi* 5 cauda longissima tortili.

SERRA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus; *interior* semiquinquepartitus. *Fructus* ovatus 10spermus.

CRINODENDRON. *Cal.* o. *Caps.* coriacea, obtuse trigona, 1locularis, apice elastice dehiscens, 3sperma.

HUGONIA. *Stam.* in urceolum. *Pist.* 5. *Drupa* baccata: putamine 10loculari.

ÆRVA. *Stamina* 5 sterilia. *Cal.* 5phyllus inferus. *Caps.* oblonga, 1sperma.

PLAGIANTHUS. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5fidus. *Germen* ovatum. *Stigma* clavatum. *Bacca.*

1084. JATROPHA. *Flores* monoici. *Cal.* 0.
♂. *Cor.* 5fida.
♀. *Cor.* 5petala. *Stil.* 3. *Caps.* 3cocca.

SUTHERLANDIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* campanulatus 5dentatus.
♀. *Pist.* 5. *Drupæ* exsuccæ 1loculares.

* *Kleinhovia. Styrax.*

ENDECANDRIA.

BROWNÆA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* exterior 5fida: interior 5petala. *Pist.* 1.

DODECANDRIA.

ACIOJA. *Stamina* inferne in membranam carnosam coalita. *Pist.* 1. *Drupa* sicca, coriacea, fibrosa, 1locularis. *Nux* 1.

835. PENTAPETES. *Stam.* 5. elongata, colorata. *Pist.* 1. *Caps.* 5locularis, polysperma.

WALCUFFA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata 5petala. *Stigma* 5fidum.

1083. CROTON. *Flores* monoici. *Cal.* 5phyllus.
♂. *Cor.* 5petala. *Stam.* 15.
♀. *Cor.* 0. *Stil.* 3. *Caps.* 3cocca.

1082. ACALYPHA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 4phyllus.
♀. *Cal.* 3phyllus. *Stil.* 3. *Caps.* 3cocca.

1086. STERCULIA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 0.
♂. *Stam.* circiter 15.
♀. *Pist.* 1. *Caps.* 5.

ALEURITES. *Flores* monoici. *Cor.* 5petala, calice triplo longior. *Nectarium* squamis 5. *Cal.* 3fidus.
♀. *Stil.* 0. *Stigm.* 2. *Bacca* globosa, 2cocca.

LATANIA. *Flores* dioici.
♂. *Spatha* polyphylla: foliolis imbricatis. *Spadix* ramosus: ramis apice digitato-ramulosis; ramulis amentiformibus, squamis 1floris. *Cal.* 6partitus.

* *Halesia.*

ICOSANDRIA.

1087. HURA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 2phyllus. *Antheræ* sessiles.
♀. *Cal.* cylindricus. *Pist.* 1. *Caps.* 10cocca.

1137. ADELIA. *Flores* dioici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 3partitus.
♀. *Cal.* 5partitus. *Stil.* 3. *Caps.* 3cocca.

CROSSOSTYLIS. *Cal.* 4partitus. 4angularis. *Petala* 4. *Stigma* 4partitum. *Bacca* hemisphærica, supera, 1locularis, polysperma.

ASSONIA. *Cal.* 2plex: exterior apice 3crenatus; interior profunde 5partitus. *Petala* 5. *Stil.* 5. *Caps.* 5, 1loculares, 2spermæ, in globum aggregatæ.

CAVANILLA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus, deciduus; interior 5partitus persistens. *Petala* 5. *Caps.* 5 in orbem coalitæ, 2valves, 1loculares.

POLYANDRIA.

* *pistillo uno.*

1414. GUSTAVIA. *Cal.* 0. *Petala* plura. *Bacca* multilocularis. *Semina* appendiculata.

SASSA. *Cal.* 0. *Cor.* 5fida. *Tub.* stamineus longissimus.

1344. GORDONIA. *Cal.* simplex, 5phyllus. *Caps.* 5loculares. *Sem.* bina, alata.

642. MORISONIA. *Cal.* simplex, 2fidus. *Petala* 4. *Stil.* 1. *Bacca* corticata, pedicellata.

MYRODIA. *Cal.* simplex, 1phyllus. *Petala* 5. *Drupa* sicca. *Nuces* binæ.

665. MESUA. * *Cal.* simplex, 4phyllus. *Petala* 4. *Nux* 4gona, 1sperma.

SOLANDRA.	*Cal.* ſimplex. *Capſ.* toruloſa, 5locularis. *Sem.* multa, duplici ordine.
835. BOMBAX.	*Cal.* ſimplex. *Stil.* indiviſus. *Capſ.* 5locularis. *Semina* multa, lanata.
836. ADANSONIA.	*Cal.* ſimplex. *Capſ.* loculamentoſa polyſperma: pulpa farinacea.
1413. BARRINGTONIA.	*Cal.* ſimplex, 2phyllus ſuperus. *Drupa. Nux* 1-vel 4locularis.
CURUPITA.	*Cal.* ſimplex, 6partitus, ſuperus. *Capſ.* ſphærica, operculata, incluſa, 6locularis, polyſperma.
1415. CAROLINEA.	*Cal.* ſimplex, tubuloſus, truncatus. *Petala* enſiformia. *Pomum* 5ſulcatum, 2loculare.
LAGUNA.	*Cal.* ſimplex, 1phyllus, 5cuſpidatus. *Petala* 5, tubo ſtaminifero inſerta. *Stigma* peltatum. *Capſ.* 5valvis, 5locularis: loculis polyſpermis.
1081. DALECHAMPIA.	*Flores* monoici. *Cor.* 0. ♂. *Cal.* 6phyllus. *Nectarium* lamellatum. ♀. *Cal.* 10phyllus. *Stil.* 1. *Capſ.* 3cocca.
1135. TAXUS.	*Flores* dioici. *Cal.* 4phyllus. *Cor.* 0. ♂. *Antheræ* 8fidæ. ♀. *Stigm.* 1. *Bacca* 1ſperma, recutita.
845. GOSSYPIUM.	*Cal.* exterior 3fidus. *Capſ.* loculamentoſa, polyſperma, coadunata.
844. URENA.	*Cal.* exterior 5fidus. *Arilli* 1ſpermi, muricati quini.
CIENFUEGOSIA.	*Cal.* exterior ſetulis 12 conſtans. *Stigm.* clavatum. *Capſ.* 3valvis, 3locularis: loculis 1ſpermis.
CAMELLIA.	*Cal.* exterior imbricatus. *Stilus* indiviſus. *Capſ.* loculis polyſpermis.
PAVONIA.	*Cal.* exterior polyphyllus. *Cor.* patens. *Stigm.* 8-10. *Capſ.* 5 in orbem poſitæ, 1loculares, 2valves, 1ſpermæ.
846. HIBISCUS.	*Cal.* exterior polyphyllus aut multifidus. *Cor.* patens. *Stigm.* 5. *Capſ.* 5valvis, 5locularis: loculis polyſpermis, raro 1ſpermis.
MALVAVISCUS.	*Cal.* exterior 8phyllus. *Cor.* tubuloſa: petalis baſi auriculatis. *Stilus* apice 10fidus. *Stigm* globoſa. *Drupa* ſphærica, 5locularis: loculis 1ſpermis.

ANODA. *Cal.* ſimplex. ſemiquinquefidus. *Petala* 5. *Stil.* multifidus. *Capſ.* ſubtus hemiſphærica, ſupra ſtellato-plana, multilocularis: loculis 1ſpermis.

PALAVA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Petala* 5. *Stilus* multifidus. *Capſ.* plures, 1ſpermæ receptaculo centrali conico glomeratim impoſitæ.

837. SIDA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Petala* 5, baſi connata. *Germ.* ſtriatum. *Stil.* multifidus aut plures. *Capſ.* numero quatuor excedentes, in orbem poſitæ, 1loculares, 1-3ſpermæ.

CURATARI. *Cal.* --- *Cor.* --- *Piſt.* --- *Stam.* --- *Capſ.* oblonga, operculata, obtuſe 3gona, 3ſperma. *Semina* alata.

** *piſtillis duobus.*

1077. PINUS. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 4phyllus.
♀. *Amentum* ſtrobilaceum. *Nuces* 2 alatæ.

*** *piſtillis tribus.*

1085. RICINUS. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 5partitus.
♀. *Cal.* 3partitus. *Capſ.* 3cocca.

**** *piſtillis quinque.*

847. STEWARTIA. *Cal.* ſimplex, patens. *Capſ.* loculamentoſa. *Sem.* ſolitaria.

MALACHODENDRON. *Cal.* ſimplex, 5-6partitus. *Cor.* 5-6petala patens. *Capſ.* 5 coadunatæ, 2valves, 1ſpermæ.

***** *ſtilis decem.*

RUIZIA. *Cal.* exterior 3phyllus, deciduus. *Petala.* 5falcata. *Capſ.* 10 in orbem poſitæ, membranaceæ, 1loculares, 2ſpermæ.

****** *pistillis pluribus.*

838. NAPÆA.	*Flores* interdum dioici. *Cal.* simplex, 5fidus. *Cor.* 5petala. ♀. *Stam.* effœta. *Arilli* 10 in orbem positi.
842. LAVATERA.	*Cal.* exterior 3fidus. *Arilli* 1spermi, verticillati.
840. ALCEA.	*Cal.* exterior 6fidus. *Arilli* 1spermi, plures.
839. ALTHÆA.	*Cal.* exterior 9fidus. *Arilli* 1spermi, verticillati.
841. MALVA.	*Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 1spermi, verticillati, plures.
843. MALOPE.	*Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 1spermi, conglomerati.
1266. MALACHRA.	*Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 5 monospermi.

DIANDRIA.

1278\. GNETUM. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* squama amenti.
♂. *Filamentum* 1 antheris 2.
♀. *Stigma* 3fidum. *Drupa* 1-sperma.

Gnemon. 1. GNETUM. *Mant. p.* 125. *Rumpf amb.* 1. *t.* 71.

1279\. STILLINGIA. *Flores* monoici.
♂. *Cal.* hemisphæricus, multiflorus. *Cor.* tubulosa, lacera.
♀. *Cal.* 1florus, inferus. *Cor.* supera. *Stigm.* 3. *Caps.* 3cocca.

silvatica. 1. STILLINGIA. *Mant. p.* 126.

1088\. HIPPOMANE. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* o.
♂. *Perianth.* 2partitum vel 4fidum.
♀. *Perianth.* 2-3fidum. *Stigmata* 3. *Drupa* vel *Caps.* 3cocca.

Mancinella. 1. H. foliis ovatis crenatis basi biglandulosis. *Jacq stirp. amer. pict. t.* 238.

biglandulosa. 2. H. foliis ovato-oblongis basi biglandulosis. *Jacq stirp. amer. pict. t.* 237.

spinosa. 3. H. foliis subovatis dentato-spinosis. *Pluckn. alm. t.* 196.

TRIANDRIA.

1134. JUNIPERUS. *Flores* diclini.

♂. *Cal.* ſquama amenti. *Cor.* 0. *Drupa* ſucculenta, clauſa, polypyrena.

♀. *Cal.* 3partitus. *Petala* 3. *Piſt.* 3. calicis tuberculis 3 inæqualis, 1 locularis, glandulis balſamiferis ad baſin externam ſtipata.

thurifera. 1. J. foliis quadrifariam imbricatis acutis.

barbadenſis. 2. J. foliis omnibus quadrifariam imbricatis: junioribus ovatis, ſenioribus acutis. *Hort. angl. t.* 1. *f.* 1.

Sabina. 3. J. foliis oppoſitis erectis decurrentibus: oppoſitionibus pyxidatis. *Blackw. herb. t.* 214.

ſinenſis. 4. J. foliis decurrentibus imbricato-patentibus confertis: caulinis ternis; rameis quaternis. *Mant. p.* 127.

bermudina. 5. J. foliis inferioribus ternis: ſuperioribus binis decurrentibus ſubulatis patulis acutis. *Herm. par. Lugdb. t.* 347.

virginiana. 6. J. foliis ternis: omnibus patentibus. *du Roi harbk. Baumz.* 1. *p.* 346.

caroliniana. 7. J. foliis ternis baſi adnatis: junioribus imbricatis: ſenioribus patulis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 660. Juniperus virginiana. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 157. *f.* 3.

communis. 8. J. foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Mill. ill. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* W. 8. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 3.

Oxycedrus. 9. J. foliis ternis patentibus mucronatis bacca brevioribus. *Mant. p.* 499. *du Hamel. arbr.* 2. *t.* 128.

phœnicea. 10. J. foliis ternis obliteratis imbricatis obtuſis.

lycia. 11. J. foliis ternis undique imbricatis ovatis obtuſis. *Lob. ic.* 221. (*ined.*)

1410. APHYTEIA. *Cal.* magnus, infundibuliformis, superus semitrifidus. *Petala* 3 fauci tubi calicis inserta, eoque breviora. *Antheræ* maximæ, persistentes. *Stigm.* 3gonum. *Bacca* 1locularis.

Hydnora. 1. APHYTEIA. *Suppl. p.* 301. *Thunb. act. Stockh.* 1775. *t.* 2. & 1777. *t.* 4. *f.* 1. 2. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 137. *f.* 3.

GYMNANTHES. *Flores* diclini. *Amentum* nudum. *Cal.* 0. *Cor.* 0.
♂. *Pedicellus* 3partitus, antherifer.
♀. *Germen* pedicellatum. *Stigm.* 3subsessilia. *Caps.* 3cocca, 3locularis.

elliptica. 1. G. dioica, staminibus tripartitis, floribus femineis amentaceis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 96.

lucida. 2. G. monoica, staminibus trichotomis, floribus femineis solitariis pedicellatis. *Swarts nov. pl. gen. & spec. p.* 96.

GALAXIA. *Spatha* 1valvis. *Cor.* 1petala, 6fida.

ovata. 1. G. foliis ovatis. *Thunb. nov. pl. gen. p.* 51. *ic. Suppl. p.* 93. Ixia Galaxia.

graminea. 2. G. foliis lineari-filiformibus, tubo longissimo. *Suppl. p.* 94. Ixia fugacissima. *Jacq. collect.* 2. *p.* 366. *t.* 18. *f.* 2.

obscura. 3. G. foliis subulato-canaliculatis, corollæ tubo brevi. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 341. *n.* 603. *t.* 189. *f.* 4.

TETRANDRIA.

1138. CISSAMPELOS. *Flores* dioici. *Cal.* o.
♂. *Cor.* 4petala. *Nectarium* rotatum.
♀. *Nectar.* extrorsum dilatatum. *Cor.* o. *Stil.* 3 *Bacca* 1sperma.

Caapeba. 1. C. foliis basi petiolatis integris. *Plum. ic. 67. f. 2.*

Pareira. 2. C. foliis peltatis cordatis emarginatis integrisque. *Plum. amer. t. 93. Swarts obs. bot. t. 10. f. 5.*

smilacina. 3. C. foliis cordatis acutis angulatis. *Catesb. Car. 1. t. 51.*

fruticosa. 4. C. foliis ovatis petiolatis integris, caule erecto fruticoso. *Suppl. p. 432.*

capensis. 5. C. foliis ovatis obtusis petiolatis integris, caule volubili. *Suppl. p. 432.*

1078. THUJA. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* squama amenti.
♀. *Cal.* squama strobili 2flora. *Pist.* 1. *Nux* 1locularis cincta ala emarginata.

occidentalis. 1. Th. strobilis lævibus: squamis obtusis. *Blackw. herb. t. 210. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 6. t. 91. f. 2.*

orientalis. 2. Th. strobilis squarrosis: squamis acutis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 6. t. 92. f. 2.*

dolabrata. 3. Th. strobilis squarrosis, foliis trifariam imbricatis subtus excavatis niveis. *Suppl. p. 420. Thunb. flor. jap. p. 266.*

aphylla. 4. Th. strobilis quadrivalvibus, foliis turbinatis vaginantibus hinc mucronatis. *β)* Thuja cupressoides. *Syst. nat. XII. 3. p. 633. Mant. p. 125.*

1079. CUPRESSUS. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* squama 1flora.
♂. *Cal.* amenti squama. *Antheræ* sessiles.
♀. *Cal.* strobili squama. *Nux* angulata, 1locularis, evalvis.

sempervirens. 1. C. foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Regn. bot. t.* 373. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 5. β) *Blackw. herb. t.* 127.

lusitanica. 2. C. foliis imbricatis glandulosis, frondibus quadrangulis, ramis dependentibus. *Herit. stirp. nov. fasc.* 1. *p.* 15. *t.* 8.

thyoides. 3. C. foliis imbric. frond. ancipitibus. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 1.

columnaris. 4. C. foliis imbricatis subulatis sulcatis, strobilis cylindricis elongatis. *Forst. flor. austr. p.* 67.

disticha. 5. C. foliis distichis patentibus. *Catesb. Car.* 1. *t.* 11.

japonica. 6. C. foliis quadrifariis falcatis compressis sulcatis decurrentibus. *Suppl. p.* 421. *Banks ic. Kaempf. t.* 48. *Thunb. flor. jap. p.* 265? *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 5.

juniperoides. 7. C. foliis oppositis decussatis subulatis patulis.

pendula. 8. C. foliis oppositis ovatis, ramulis dichotomis pendulis. *Thunb. flor. jap. p.* 265.

PENTANDRIA.

CAOUTCHOUA *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* globoso-campanulatus, semiquinquefidus. *Antheræ* infra apicem dorso columnæ longitudinaliter adhærentes, subovatæ, 2loculares.
♀. solitar. terminal. *Cal.* subpyriformi-campanulatus, 5fidus, circumscissus. *Pist.* 1. *Stigm.* 3 depresso-2loba. *Caps.* 3cocca, ossea, 3locularis: loculis 2valvibus, 1spermis.

elastica. 1. CAOUTCHOUA. *Suppl. p.* 422. *Aubl. pl. guj. p.* 871. *t.* 335.

KIRGANELLA. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus.
♀. *Bacca* parva, ſubtrilocularis, 6ſperma.

virginea. 1. KIRGANELLA. *Juſſieu gen. plant. p.* 387.

SECURINEGA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus. *Cor.* o.
♂. *Columm.* filament. exterius corona crocea cincta.

duriſſima. 1. SECURINEGA. *Juſſieu gen. plant. p.* 388.

ABRONIA. *Cal.* tubuloſus: limbo hypocrateriformi 5partito; laciniis obcordatis. *Antheræ* incluſæ. *Sem.* 1. imo calice tectum.

californica. 1. ABRONIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 449.

1318. LERCHEA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 5fido. *Antheræ* germinis tubo inſidentes. *Stilus* 1. *Capſ.* 3locularis, polyſperma.

longicauda. 1. LERCHEA. *Mant. p.* 257.

OCHROMA. *Cal.* duplex: exterior 3phyllus. *Antheræ* connatæ, anfractuoſæ. *Capſ.* 5locularis, polyſperma.

Lagopus. 1. OCHROMA. *Cavanill. diſſ. bot.* 5. *t.* 153. Bombax pyramidale.

827. WALTHERIA. Monogyna. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, 1ſperma.

americana. 1. W. foliis ovatis plicatis dentato-crenatis tomentoſis, capitulis pedunculatis. *Cavan. diſſ. bot.* 6. *t.* 170. *f.* 1.

anguſtifolia. 2. W. foliis ovatis minimis plicatis ſerratis nudis, floribus axillaribus glomeratis. *Cavan. diſſ. bot.* 6. *t.* 180. *f.* 2.

indica. 3. W. foliis ovatis ferratis plicatis, capitulis sessilibus. *Jacq. plant. rar. ic. 1. t. 65. nonne specie conjungenda cum americana?*

caroliniana. 4. W. foliis ovatis nervosis caulibusque teretibus hirsutis, floribus solitariis. *Walt. flor. Carol. p. 175.*

ovata. 5. W. foliis lato-ovatis acuminatis serrato-dentatis tomentosis crassis, floribus racemosis congestis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 317. n. 456. t. 171. f. 1.*

elliptica. 6. W. caule fruticoso, foliis ellipticis oblongis serratis plicatis tomentosis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 316. n. 454. t. 171. f. 2.*

1411. SYMPHONIA. Monogyna. *Cor.* globosa. *Bacca* 5locularis.

globulifera. 1. SYMPHONIA. *Suppl. p. 302.*

MUTABEA. Monogyna. *Bacca* sphærica, 3locularis, 3sperma. *Cal.* tubulatus, 5fidus: *Cor.* 5partita: tubo brevissimo. *Filamentum* apice 5dentatum. *Stigma* capitatum.

guianensis. 1. MUTABEA. *Aubl. plant. guj. 2. p. 680. t. 274.*

TICOREA. *Cal.* minimus, 5dentatus. *Petala* 5 unguibus longissimis: inferne in tubum conjuncta. *Filamenta* in tubum coalita, apice 5cuspidatum. *Caps.* 5locularis.

fœtida. 1. TICOREA. *Aubl. plant. guj. 2. p. 689. t. 277.*

828. HERMANNIA. Pentagyna. *Caps.* 5locularis. *Petala* basi semitubulata, obliqua.

althæifolia. 1. H. foliis ovatis plicatis crenatis tomentosis, calicibus florentibus campanulatis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 179. f. 2.*

incana. 2. H. foliis ovatis plicatis tomentoso-incanis: stipulis parvis subulatis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 328. n. 473.*

plicata. 3. H. foliis cordato-ovatis denticulatis plicatis tomentosis, calicibus florentibus oblongo ovatis subcylindricis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 411.*

odorata. 4. H. foliis oblongo-lanceolatis tomentosis subtus rugosis: inferioribus truncato-denticulatis, calicibus urceolatis angulosis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 412.*

salvifolia. 5. H. foliis ovatis integris rugosis tomentoso-hispidis, floribus cernuis. *Suppl. p. 302. Cavanill. diss. bot. 6. t. 180. f. 2.*

involucrata. 6. H. foliis ovatis acutis tomentosis, floribus solitariis involucratis corollis revolutis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 328. n. 475. t. 177. f. 1.*

candicans. 7. H. foliis ovatis subcordatis obtusis tomentosis, calicibus florentibus patulis subangulatis, stipulis subulatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 412.*

scabra. 8. H. foliis lanceolato-ovatis dentatis scabris, pedunculis bifloris: calicibus brevibus. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 331. n. 481. t. 182. f. 2.*

biserrata. 9. H. foliis ovato-lanceolatis inæqualibus serratis glabris, floribus cernuis. *Suppl. p. 302. Cavanill. diss. bot. 6. t. 200. f. 2. an cum glabrata, pulchella & diffusa Mahemiæ potius species?*

trifurca. 10. H. foliis lanceolatis integris tridentatisque, racemis secundis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 178. f. 2.*

hyssopifolia. 11. H. foliis lanceolatis obtusis serratis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 181. f. 3.*

lavendulifolia. 12. H. foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Dill. h. Elth. t. 147. f. 176.*

denudata. 13. H. foliis lanceolatis acutis lævibus superne serratis. *Suppl. p. 301. Cavanill. diss. bot. 6. t. 181. f. 1.*

glabrata. 14. H. foliis lanceolatis acutis inciso-serratis glabris; floribus cernuis. *Suppl. p. 301. Cavanill. diss. bot. 6. t. 200. f. 1.*

ciliaris. 15. H. foliis lanceolatis acutis integris serratisque ciliatis. *Suppl. p. 302. Cavanill. diss. bot. 6. t. 176. f. 1. an eadem cum Mahemia verticillata?*

grossularifolia. 16. H. foliis lanceolatis pinnatifidis. *Characterem augeant autoptæ.*

17. H.

pulchella. 17. H. foliis lanceolatis pinnatifidis : pinnis integris incisisque, caule erecto laevi. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 177. f.* 3.

diffusa. 18. H. foliis lanceolatis pinnatifidis : pinnis integris dentatisque, pedunculis capillaribus bifloris, caule procumbente. *Suppl. p.* 302.

procumbens. 19. H. foliis inciso-pinnatifidis : inferioribus ovatis; superioribus elongatis, floribus racemosis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 329. n. 477. t. 177. f.* 2.

vesicaria. 20. H. caule tomentoso, foliis confertis pinnatifidis subtus piloso-stellatis, capsulis magnis inflatis terminalibus. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 331. n. 483. t. 181. f.* 2.

alnifolia. 21. H. foliis cuneiformibus lineatis plicatis crenato-emarginatis. *Mill. illustr. ic.*

capensis. 22. H. foliis oblongis obtusis incisis sessilibus, floribus axillaribus subsolitariis. *Paters. it. cap. p. 60. ic.*

linifolia. 23. H. foliis linearibus, pedunculis unifloris.

filifolia. 24. H. foliis lineari-triquetris integerrimis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill, diss. bot. 6. t. 180. f.* 3.

trifoliata. 25. H. foliis ternatis sessilibus plicatis retusis tomentosis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 182. f.* 1.

triphylla. 26. H. foliis ternatis petiolatis planis obovatis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 178. f.* 3.

829. MELOCHIA. Pentagyna. *Caps.* 5 1loculares, 1spermae.

depressa. 1. M. floribus solitariis, capsulis depressis pentagonis : angulis obtusis ciliatis. *Mill. h. angl. t. 3. f.* 2.

venosa. 2. M. pedunculis distinctis terminalibus multifloris, foliis ovatis serratis venosis subtus tomentosis, caule piloso. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 97.

odorata. 3. M. paniculis pedunculatis compositis, foliis ovatis subcordatis sublobatis, biserratis glabris. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 173. f.* 2.

concatenata. 4. M. racemis confertis terminalibus, capsulis globosis sessilibus. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 175. f.* 2.

lupulina. 5. M. racemis confertis axillaribus, calicibus inflatis membranaceis, foliis ovato-cordatis inciso-ferratis subtus tomentosis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 97.

tomentosa. 6. M. floribus umbellatis axillaribus, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis mucronatis, foliis tomentosis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 172. *f.* 2.

pyramidata. 7. M. floribus umbellatis, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis inferne muricatis, foliis glabris. *Jacq. h. Vindob. t.* 30. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 7. *t.* 113. *f.* 7.

supina. 8. M. floribus capitatis, foliis ovatis serratis, caulibus procumbentibus. *Pluckn. almag. t.* 132. *f.* 4.

caracassana. 9. M. floribus capitatis, foliis alternis cordatis crenatis villosis petiolatis, caule erecto fruticoso. *Jacq. Collect.* 2. *p.* 369. *plant. rar. ic.* 2. *t.* 63.

corchorifolia. 10. M. floribus capitatis sessilibus, capsulis subrotundis, foliis subcordatis sublobatis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 174. *f.* 2.

nodiflora. 11. M. floribus conglobatis axillaribus, capsulis globosis, foliis ovatis acuminatis glabris. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 135. *f.* 2.

borbonica. 12. M. floribus axillaribus glomeratis, fructu quinquecapsulari, foliis ovato-lanceolatis cuspidatis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 321. *n.* 462. *t.* 174. *f.* 1.

hirsuta. 13. M. spicis terminalibus densis hirsutis, foliis ovatis inaequaliter serratis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 323. *n.* 465. *t.* 175. *f.* 1.

HEXANDRIA.

PHILESIA. *Cal.* 0. *Cor.* regularis, campanulata, 6partita: laciniis 3 interioribus duplo longioribus. *Stigmata* 3. *Bacca* subtrigona, polysperma.

magellanica. 1. PHILESIA. *Jussieu gen. plant. p.* 41.

NOTHRIA. *Cal.* prismat. 5angul. 5fidus. *Cor.* infundibuliformis, 5petala. *Stigm.* 3fidum. *Siliqua.*

capensis. 1. NOTHRIA. *Berg. flor. cap. p.* 171.

HEPTANDRIA.

1136. EPHEDRA. *Flores* dioici amentacei. *Cor.* o.
♂. *Cal.* semibifidus. *Antheræ* 4 inferiores, 3 superiores.
♀. *Cal.* 2partitus, 5plex. *Pist.* 2. *Sem.* 2. calice baccato tecta.

distachya. 1. E. pedunculis oppositis: amentis geminis. *Cam. hort. t.* 46.

monostachya. 2. E. pedunculis pluribus: amentis solitariis. *Gmel. flor. sib.* 1. *t.* 38. *f.* 1.

aphylla. 3. E. ramis patentissimis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 170.

OCTANDRIA.

1080. PLUCKNETIA. *Flores* monoici. *Cor.* 4petala.
♂. *Nectaria* 4barbata. *Cal.* o.
♀. *Cal.* 4phyllus. *Stilus* longissimus: stigmate peltato 4fido. *Caps.* 4angularis, 4locularis.

volubilis. 1. PLUCKNETIA. *Suppl. p.* 421. *Rumpf amb.* 1. *t.* 79. *f.* 2.

ALCHORNEA. *Flores* dioici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 3-5phyllus.
♀. *Cal.* 4-5dentatus. *Stilus* 2partitus. *Caps.* baccata, 2cocca.

latifolia. 1. ALCHORNEA. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 98.

1412. AITONIA. *Cal.* 4partitus. *Cor.* 4petala. *Pist.* 1. *Bacca* sicca, 4angularis, 1locularis, polysperma.

capensis. 1. AITONIA. *Suppl. p.* 303. *Thunb. act. Lund.* 1. *p.* 166. *ic.*

ENNEANDRIA.

DRYANDRA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 5petala.

cordata. 1. DRYANDRA. *Thunb. flor. jap. p.* 267. *t.* 27.

QUARARIBEA. *Cal.* 3-5dentatus, perſiſtens. *Cor.* 5petala. *Stil.* longiſſimus, tubo vaginatus. *Stigma* 2lobum. *Capſ.* coriacea, ovata, 2locularis. *Sem.* ſolitaria, ovata.

guianenſis. 1. QUARARIBEA. *Aubl. pl. guj. p.* 691. *t.* 278.

DECANDRIA.

830. CONNARUS. *Piſt.* 1. *Stigm.* ſimplex. *Capſ.* 2valvis, 1locularis, 1ſperma.

monocarpus. 1. C. foliis ovatis uninerviis ternatis. *Burm. zeyl. t.* 89.

africanus. 2. C. foliis ternatis ſubtus nervoſis, floribus paniculatis: petalis imberbibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 375. *t.* 221.

pentagynus. 3. C. foliis ternatis trinerviis, floribus pentagynis. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 376. *t.* 223.

pinnatus. 4. C. foliis ternatis aut quinato-pinnatis, petalis baſi biſetis. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 375. *t.* 222.

831. HUGONIA. *Cor.* 5petala. *Stili* 5. *Drupa* baccata: putamine ſtriato 10loculari.

Myſtax. 1. H. caule fruticoſo, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, ſpinis oppoſitis revolutis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 73. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 58. *f.* 7.

tomentoſa. 2. H. foliis ovatis tomentoſis obſolete dentatis baſi anguſtatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 73. *f.* 2.

832. GERANIUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Pist.* 1. *Stigm.* 5. *Receptac.* commune rostratum. *Cocculi* 5: cauda longissima tortili.

* *corollis regularibus, glandulis* 5.

† *pedunculis unifloris.*

spinosum. 1. G. caule carnoso nodoso, spinis subulatis, foliis cuneiformibus reflexis. *Mant. p.* 98. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 75. *f.* 2. *Paterson journ. into Caffraria p.* 116. *ic.*

sanguineum. 2. G. caule articulato rubro hispido, foliis orbiculatis, profunde subseptempartitis: laciniis trifidis, pedunculis solitariis longissimis articulatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 12.

prostratum. 3. G. caule prostrato nodoso, foliis oppositis profunde quinquelobis: lobis trifidis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 196. *t.* 76. *f.* 3.

ranunculoides. 4. G. radice tuberosa, foliis orbiculatis multifidis, pedunculis longissimis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 197. *n.* 271.

sessiliflorum. 5. G. radice napiformi squamosa, foliis subrotundis septempartitis: laciniis trifidis, floribus subsessilibus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 198. *n.* 273. *t.* 77. *f.* 2.

emarginatum. 6. G. foliis emarginatis ovatis crenatis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 193. *t.* 113. *f.* 1. *an monsoniæ potius species?*

Reichardi. 7. G. foliis plerisque oblongis inciso-crenatis trilobis vel quinquelobis, scapis unifloris. *Murray comm. Goett.* 1780. *t.* 3. *Curtis bot. mag. t.* 18.

parvulum. 8. G. foliis cordatis obtusis villosis subtrilobis, scapis radicalibus nudis unifloris, floribus pentandris. *Scop. del. ins.* 1. *t.* 3. *f.* B.

sibiricum. 9. G. caule herbaceo villosissimo, foliis oppositis quinquepartitis, pedunculis subunifloris. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 77. *f.* 1.

†† *pedunculis bifloris*, Batrachia.

† *petalis bifidis, incisis aut emarginatis.*

arabicum. 10. G. foliis rotundis incisis, pedunculis binis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 126.

tuberosum. 11. G. foliis albicantibus multipartitis: laciniis linearibus subpinnatis obtusis, pedunculis binis aut bifloris, petalis emarginatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 78. *f.* 1.

montanum. 12. G. foliis petiolatis orbicularis subseptemlobatis: lobis incisis venosis calicibusque pilosis, petalis emarginatis. *Hablizl ap. S. G. Gmel. it. 4. p. 173.*

dissectum. 13. G. caule villoso erectiusculo, foliis quinquepartito-trifidis pedunculos excedentibus, petalis emarginatis. *Cavanill. diss. 4. t. 78. f. 2.*

columbinum. 14. G. caule procumbente, foliis oppositis palmatis: laciniis pinnatis, pedunculis solitariis longissimis. *Cavanill. diss. 4. t. 82. f. 1.*

incanum. 15. G. caule procumbente, foliis palmatis subtus incanis: laciniis pinnato-linearibus, pedunculis longissimis, cocculis hirsutis. *Cavanill. diss. 4. t. 82. f. 2.*

pusillum. 16. G. caule herbaceo ramoso, foliis subrotundo-lobatis: lobis trifidis, floribus pentandris. *Mant. p. 435. Cavanill. diss. 4. t. 83. f. 1.*

humile. 17. G. caule humili, foliis orbiculatis incisis lobatis, petalis bifidis æqualibus. *Cavanill. diss. 4. p. 202. n. 280. t. 83. f. 2.*

molle. 18. G. caule suberecto, foliis orbiculatis subseptemlobatis trifidis obtusis: caulinis oppositis, superioribus alternis. *Flor. dan. t. 679.*

pyrenaicum. 19. G. caule herbaceo villoso, foliis oppositis subpeltatis orbiculatis: lobis trifidis obtusis. *Cavanill. diss. 4. t. 79. f. 2. Curt. flor. Lond. t. 159.*

cinereum. 20. G. radice crassa, foliis orbiculatis cinereis profunde quinquelobis: radicalibus longissime petiolatis; caulinis oppositis. *Cavanill. diss. 4. t. 89. f. 1.*

lupinoides. 21. G. radice tuberosa, foliis orbiculatis tomentosis multipartitis: laciniis linearibus incisis, scapis radicalibus. *Burm. de geran. n. 65.*

argenteum. 22. G. radice crassa, foliis tomentoso-sericeis subpeltatis subseptempartitis: laciniis trifidis, scapis radicalibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 65.*

bohemicum. 23. G. caule villoso viscoso, foliis oppositis rugosis glaucis viscosis, filamentis ciliatis. *Mant. p. 434. cent. 176. Cavanill. diss. 4. t. 81. f. 2.*

carolinianum. 24. G. caule herbaceo dichotomo: geniculis inflatis rubescentibus, foliis oppositis quinquepartitis trifidis cocculis hirsutis. *Cavanill. diss. 4. t. 124. f. 2. β) Mant. p. 434. Cavanill. diss. 4. t. 84. f. 1.*

ſtriatum. 25. G. caule herbaceo decumbente, foliis quinquelobis: lobis dentatis medio dilatatis, petalis bilobis venoſo-reticulatis. *Cavanill. diſſ. 4. t. 79. f. 1. Curtis bot. magaz. t. 55.*

nodoſum. 26. G. caule quadrangulari erecto, foliis ſubquinquelobis dentatis ſupra ſcabris ſubtus lucidis, petalis ſtriatis bifidis. *Mant. p. 434. Cavanill. diſſ. 4. t. 80. f. 1.*

reflexum. 27. G. caule herbaceo, foliis alternis ſubſeptemlobis acutis, petalis reflexis laciniatis baſi hiantibus, calicibus muticis. *Mant. p. 256. Cavanill. diſſ. 4. t. 81. f. 1.*

ibericum. 28. G. caule herbaceo dichotomo villoſo, foliis oppoſitis quinquepartitis inciſis, petalis trilobis: medio breviore cuſpidato. *Cavanill. diſſ. 4. p. 209. t. 124. f. 1.*

ſilvaticum. 29. G. caule erecto, foliis ſubpeltatis quinquelobis inciſo-ſerratis, petalis emarginatis. *Flor. dan. t. 124.*

††. *petalis integris.*

fuſcum. 30. G. caule herbaceo erecto, foliis alternis hirſutis palmato quinquelobis dentatis inciſis, floribus ſubſpicatis: calicibus mucronatis. *Mant. p. 97. Cavanill. diſſ. 4. t. 89. f. 2.*

phæum. 31. G. caule erecto, pedunculis ſolitariis, calicibus ſubariſtatis, petalis undulatis. *Kniph. bot. or. cent. 5. t. 35. an vere diſtincta a fuſco ſpecies?*

pratenſe. 32. G. caule herbaceo erecto, foliis oppoſitis ſubpeltatis multipartitis rugoſis: lobis pinnatis acutis. *Curt. flor. Lond. t. 250.*

paluſtre. 33. G. foliis oppoſitis quinquelobis inciſis cauleque herbaceo villoſis, pedunculis longiſſimis declinatis. *Flor. dan. t. 596.*

batrachioides. 34. G. caule herbaceo erecto dichotomo, foliis oppoſitis quinquepartitis inciſis, calicibus inflatis. *Cavanill. diſſ. 4. p. 211. n. 295. t. 85. f. 2.*

macrorhizum. 35. G. foliis oppoſitis quinquelobis, calicibus inflatis ſphæricis, piſtillo declinato longiſſimo. *Mant. p. 434. Cavanill. diſſ. 4. t. 85. f. 1.*

maculatum. 36. G. caule erecto herbaceo, foliis oppoſitis quinquepartitis inciſis: ſummis ſeſſilibus, petalis integerrimis rotundatis. *Cavanill. diſſ. 4. t. 86. f. 2.*

aſphodeloides. 37. G. radice tuberoſa, foliis multipartitis orbiculatis: laciniis acutis. *Burm. de geran. n. 27.*

lucidum. 38. G. caule herbaceo, foliis oppositis pilosis lucidis rotundato-lobatis, calicibus pyramidatis transversim rugosis. *Flor. dan. t.* 213.

rotundifolium. 39. G. caule prostrato, foliis oppositis: inferioribus subrotundis; superioribus subcuneatis, petalis integerrimis caule paulo longioribus. *Mant. p.* 434. *Regn. bot. t.* 214.

robertianum. 40. G. foliis ternatis pinnatis incisis, calicibus decemstriatis pilosis. *Flor. dan. t.* 694.

palmatum. 41. G. caule dichotomo: internodiis aphyllis longissimis, foliis radicalibus palmatis: lobis pinnatis; superioribus hastato-trilobis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 216. *n.* 302. *t.* 84. *f.* 2.

gruinum. 42. G. caule crasso herbaceo erecto piloso, foliis radicalibus cordatis ovatis indivisis: caulinis oppositis subternatis; media longissima, floribus pentandris sæpissime binis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 88. *f.* 2.

lacerum. 43. G. foliis runcinato-pinnatifidis: laciniis dentatis. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 21.

Botrys. 44. G. caule supino, foliis cordatis oblongis sinuato-pinnatifidis hirsutis, fructibus longis erectis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 218. *n.* 304. *t.* 90. *f.* 2.

præcox. 45. G. acaule, foliis pinnatis, scapis bifloris. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 272. *n.* 392. *t.* 126. *f.* 2.

bipinnatum.* 46. G. caule decumbente, foliis oppositis inæqualibus bipinnatis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 273. *n.* 399. *t.* 126. *f.* 3.

maritimum. 47. G. caule procumbente, foliis cordatis ovatis crenatis incisis scabris, floribus pentandris raro ternis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 88. *f.* 1.

††† *pedunculis multifloris*, Myrrhina.
† *foliis subintegris aut lobatis.*

crassifolium. 48. G. caule humifuso, foliis cordatis subrotundis rugosis crassis, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 219. *n.* 306. *t.* 90. *f.* 1.

malacoides. 49. G. caule herbaceo, foliis oppositis cordatis subovatis lobatis crenatis, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 91. *f.* 1.

heliotropioides. 50. G. caule fruticoso, foliis oppositis incanis subrotundo-ovatis crenato-dentatis, floribus umbellatis, cucculorum cauda longissima. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 220. *n.* 308. *t.* 113. *f.* 1.

glaucophyllum. 51. G. foliis oblongis lineatis crenato-sublobatis crassis, floribus pentandris umbellatis, rostris plumosis. *Mant. p.* 433. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 92. *f.* 2.

murcicum. 52. G. caulibus gracilibus herbaceis ramosis, foliis oppositis trilobis: lobo medio longiore obtuso crenato. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 272. *n.* 397. *t.* 126. *f.* 1.

chium. 53. G. caule herbaceo erecto, foliis oppositis cordatis incisis; superioribus trilobis; lobis pinnatifidis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 92. *f.* 1.

littoreum. 54. G. caule, foliis cordato-ovatis subtrilobis crenatis. *Burm. de geran. n.* 60.

arduinum. 55. G. scapis radicalibus, floribus pentandris, foliis cordatis quinquelobis.

incarnatum. 56. G. foliis incisis quinquelobis punctatis: petiolis longissimis, pedunculis trifloris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 91. *f.* 2.

trifolium. 57. G. caule herbaceo crasso ramoso, foliis lobatis: radicalibus ternatis; caulinis simplicibus oppositis, petalis venosis: superioribus maculatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 223. *n.* 314. *t.* 97. *f.* 3.

triangulare. 58. G. foliis triangularibus subpinnatifidis dentatis subvillosis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 123.

†† *foliis pinnatis.*

pulverulentum. 59. G. caulibus reclinato-erectis, foliis oppositis pinnatifidis: laciniis incisis, pedunculis elongatis umbelliferis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 272. *n.* 396. *t.* 125. *f.* 1.

laciniatum. 60. G. caule herbaceo, foliis oppositis profundissime trifidis: laciniis pinnatis linearibus, pedunculis elongatis umbelliferis, receptaculo longissimo. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 228. *n.* 321. *t.* 113. *f.* 3.

ciconium. 61. G. caule herbaceo reclinato, foliis pinnatis: pinnulis incisis, petalis duobus superioribus latioribus. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 18.

moschatum. 62. G. caule procumbente, foliis pinnatis: pinnulis ovatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis, floribus umbellatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 551

chaerophyllum. 63. G. caule erectiusculo, foliis oppositis pinnatis incisis, cotyledonibus trilobis, pedunculis elongatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 226. *n.* 319. *t.* 95. *f.* 1.

cicutarium. 64. G. caule ramoso prostrato, foliis pinnatis: pinnulis subovatis, floribus pentandris. *Curt. flor. Lond. t.* 53.

romanum. 65. G. acaule, foliis bipinnatis hirsutis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 94. *f.* 2.

rupestre. 66. G. radice crassa lignosa, foliis inodoris bipinnatis supra tomentoso-incanis, scapis subtrifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 225. *n.* 316. *t.* 90. *f.* 3.

petræum. 67. G. subacaule, foliis oppositis numerosis bipinnatis, scapis axillaribus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 224. *n.* 315. *t.* 96. *f.* 2.

alpinum. 68. G. caule herbaceo, foliis bipinnatis, floribus umbellatis rugosis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 229. *n.* 323. *t.* 96. *f.* 1.

hirtum. 69. G. foliis subbipinnatifidis caule ramoso, floribus pentandris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 123.

glandulosum. 70. G. acaule, foliis tripinnatis longissime petiolatis, petalis duobus latioribus maculatis plumosis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 271. *n.* 395. *t.* 125. *f.* 2.

** *corollis irregularibus, cuniculo per pedunculum excurrente.*

† *foliis zona notatis.*

zonale. 71. G. caule fruticoso, foliis orbiculatis crenatis obtuse lobatis: zona nigricante, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 98. *f.* 2. *Martyn plat. t.* 10. *ill. Linn. syst. t.* 22. *f.* 3.

marginatum. 72. G. caule frutescente, foliis rotundato-lobatis albolimbatis vetustate scariosis, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 230. *n.* 325.

tetragonum. 73. G. caule tetragono fruticoso, foliis lobatis carnosis, pedunculis bifloris, corollis tetrapetalis. *Suppl. p.* 305. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 99. *f.* 2. *Flores heptandri.*

peltatum. 74. G. caule fruticoso, foliis quinquelobis integerrimis subpeltatis glabris. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 100. *f.* 1. *Mill. h. angl. t.* 140.

tabulare. 75. G. caule fruticoso, foliis peltatis rotundatis angulosis dentatis glabris. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 100. *f.* 2.

elongatum. 76. G. caule herbaceo prostrato hispido, foliis longissime petiolatis quinquelobis, pedunculis elongatis erectis, fructibus cernuis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 233. *n.* 329. *t.* 101. *f.* 3.

alchimilloides. 77. G. caule herbaceo, foliis orbiculatis pilofis quinquepartitis: lobis trifidis, umbellis longiffimis. *Cavanill. diff.* 4. *t.* 98. *f.* 1.

†† *foliis unicoloribus.*

† *integris vel fubintegris.*

ciliatum. 78. G. acaule, radice tuberofa, foliis ovatis ciliatis integerrimis, fcapo umbellifero. *Cavanill. diff.* 4. *p.* 234. *n.* 331. *t.* 98. *f.* 2.

glaucum. 79. G. acaule, foliis ovato-oblongis ferratis incano tomentofis. *Cavanill. diff.* 4. *p.* 237. *n.* 336. *t.* 103. *f.* 2. *Curtis bot. magaz. t.* 5[illegible].

auritum. 80. G. acaule, foliis ovalibus fimpliciufculis, umbella compofita divifa. *Mant. p.* 433. *Commel. h. Amft.* 2. *t.* 61.

longifolium. 81. G. acaule, foliis lanceolatis longiffime petiolatis, fcapo ramofo, umbellis multifloris. *Cavanill. diff.* 4. *p.* 235. *n.* 332. *t.* 102. *f.* 1.

lanceolatum. 82. G. caule fruticofo, ramis virgatis, foliis lanceolatis oppofitis fubintegerrimis glaucis, pedunculis axillaribus fubunifloris. *Suppl. p.* 306. Geranium glaucum. *Cavanill. diff.* 4. *t.* 102. *f.* 2.

œnotheræ. 83. G. foliis oppofitis lanceolatis ferrato-dentatis molliffime tomentofis, umbella pauciflora. *Suppl. p.* 305.

oxaloides. 84. G. radice rapacea, foliis ovato-haftatis carnofis. *Cavanill. diff.* 4. *p.* 237. *n.* 337. *t.* 97. *f.* 2.

ovatum. 85. G. caule brevi fuffruticofo, foliis ovatis dentatis tomentofis, pedunculis terminalibus paucifloris. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 66.

betulinum. 86. G. caule fruticofo, foliis ovatis inæqualiter ferratis planis. *Burm. afr. t.* 33. *f.* 1.

acetofum. 87. G. caule fruticofo, foliis cuneato-ovatis crenatis carnofis, petalis fuperioribus anguftioribus. *Cavanill. diff.* 4. *t.* 104. *f.* 3.

hybridum. 88. G. caule fruticofo fucculento, foliis alternis orbiculatis crenatis, umbellis elongatis. *Mant. p.* 97. *Cavanill. diff.* 4. *t.* 105. *f.* 2.

cordifolium. 89. G. caule fruticofo, foliis cordatis fubrotundo-acutis denticulatis tomentofis, umbellis numerofis terminalibus. *Cavanill. diff.* 4. *p.* 240. *n.* 342. *t.* 107. *f.* 3.

hermannifolium. 90. G. caule fruticoſo, foliis cuneiformibus plicatis ſcabris ſuperne ſerratis. *Mant. p.* 569.

cotyledonis. 91. G. foliis cordato-orbiculatis peltatis cucullatis crenatis pubeſcentibus. *Mant. p.* 569.

cucullatum. 92. G. caule fruticoſo, foliis cucullatis dentatis. *Mant. p.* 432. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 106. *f.* 1.

odoratiſſimum. 93. G. caule carnoſo brevi, ramis herbaceis longis, foliis cordatis molliſſimis fragrantiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 103. *f.* 1.

acerifolium. 94. G. caule erecto fruticoſo, foliis anguloſis acutis dentatis ſubcucullatis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 243. *n.* 349. *t.* 112. *f.* 2.

althæoides. 95. G. caule herbaceo tomentoſo, foliis oppoſitis cordato-ovatis ſinuatis crenatis, umbella longiſſime pedunculata. *Mant. p.* 433. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 123. *f.* 2.

bifolium. 96. G. radice rapacea, foliis binis cordato-angulatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 254. *t.* 115. *f.* 3.

inquinans. 97. G. caule fruticoſo ſucculento, foliis cordatis orbiculatis lucidis ſublobatis crenatis. *Mill. illuſtr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 19. a.

groſſularioides. 98. G. caule proſtrato lævi herbaceo, foliis cordatis ſubrotundis lobato-inciſis crenatis, pedunculis capillaribus. *Mant. p.* 432. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 119. *f.* 2. *Antheræ* 4-5.

biflorum. 99. G. radice craſſa nodoſa, foliis binis lobato-inciſis acutis, pedunculis terminalibus bifloris. *Burm. afr. p.* 95. *t.* 37. *f.* 1.

ſtipulaceum. 100. G. caule breviſſimo imbricato, foliis ſublobatis crenato-inciſis, ſtipulis reflexis lanceolatis apice bifidis, pedicellis longiſſimis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 122. *f.* 3.

piloſum. 101. G. radice napiformi, ſcapis radicalibus proliferis, foliis ſubovatis ſubtrilobis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 273. *n.* 400. 6. *t.* 199.

africanum. 102. G. foliis alternis cordatis dentatis villoſis: inferioribus orbiculatis; ſuperioribus ſubtrilobis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 242. *n.* 347. *t.* 104. *f.* 1.

†† *foliis diviſis.*

papilionaceum. 103. G. caule fruticoſo, foliis alternis cordatis lobatis rugoſis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 112. *f.* 1.

vitifolium. 104. G. caule fruticoso, foliis oppositis cordatis rugosis pubescentibus, floribus capitatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 111. *f.* 2.

capitatum. 105. G. caule diffuso, foliis lobatis undatis villosis, floribus capitatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 105. *f.* 1.

crispum. 106. G. caule fruticoso, foliis cordatis lobatis dentatis crispis, stipulis cordatis, pedunculis subunifloris. *Mant. p.* 257. *Cavanill. diss. t.* 109. *f.* 2.

exstipulatum. 107. G caule fruticoso, ramis erectis, foliis alternis duplicato-trilobis crenatis glabris subexstipulatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 253. *n.* 367. *t.* 123. *f.* 1. & 5. *p.* 271.

trifidum. 108. G. acaule, radice rapacea, foliis ternis trilobis trifidisque. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 254. *n.* 371. *t.* 115. *f.* 1.

articulatum. 109. G. radice squamosa lignosa articulata, foliis radicalibus quinquelobis incisis, umbella subquadriflora: radiis longissimis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 252. *n.* 365. *t.* 122. *f.* 1.

variegatum. 110. G. foliis alternis quinquelobis: lobis trifidis serrato-dentatis: stipulis latis cordatis, pedunculis subbifloris. *Suppl. p.* 305. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 118. *f.* 3.

viscosum. 111. G. caule fruticoso, foliis cordatis quinquelobis acutis dentatis viscosis sinuatis, floribus umbellatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 85. *plant. rar. ic. cent.* 2. *t.* 35.

quercifolium. 112. G. caule fruticoso, foliis sinuatis: laciniis rotundatis crenatis oblongis, floribus umbellatis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 119. *f.* 1.

terebinthinaceum. 113. G. caule arborescente, foliis duplicato-trifidis: laciniis latis incisis crenatis, umbellis multifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 250. *n.* 362. *t.* 114. *f.* 1. *an distinctum satis a quercifolio?*

scabrum. 114. G. caule fruticoso exsucco, foliis cuneiformi-trifidis multifidisque scabris; umbellis paucifloris. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 64.

hirsutum. 115. G. acaule, radice turbinata, foliis ovatis laciniatis rugosis hirsutis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 247. *n.* 357. *t.* 101. *f.* 2.

hispidum. 116. G. foliis palmatis dentato-laceris, cauleque fruticoso hispidis, umbellis compositis: involucris reflexis. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 110. *f.* 1.

bicolor. 117. C. caule brevi fruticoso, ramis teretibus, foliis oppositis hirsutis tripartitis: laciniis crispis dentatis, umbellis multifloris capitatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 39.

fulgidum. 118. G. caule fruticoso succulento, foliis tripartitis incisis: intermedio majore, umbellis geminis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 116. *f.* 2.

revolutum. 119. G. foliis multipartitis: laciniis revolutis, calicibus profundissime partitis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 84. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 33.

aculeatum. 120. G. foliis oblongis inciso-lobatis, umbellis trifloris, caule spinoso. *Paterson journ. into Caffraria. p.* 67. *ic.*

††† *foliis ternatis.*

lobatum. 121. G. radice tuberosa, foliis ternatis crassis tomentosis, scapis radicalibus divisis umbelliferis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 114. *f.* 2.

ternatum. 122. G. caule fruticoso hispido, foliis oppositis ternatis: foliolis cuneatis inciso-trifidis serratis scabris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 107. *f.* 2.

laevigatum. 123. G. caule fruticoso glabro, foliis ternatis sublinearibus trifidis glaucis, pedunculis bifloris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 121. *f.* 1.

alceoides. 124. G. foliis ternatis trifidis laciniatis, caule herbaceo hirto.

abrotanifolium. 125. G. caule fruticoso, foliis ternatis trifidis: laciniis linearibus, floribus umbellatis. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 117. *f.* 1.

†††† *foliis pinnatis.*

gibbosum. 126. G. caule fruticoso carnoso: geniculis gibbis, foliis pinnato-lobatis glaucis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 103. *f.* 1.

betonicum. 127. G. foliis subovatis lobato-pinnatis crenatis obtusis, umbellis paucifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 264. *n.* 391. *t.* 118. *f.* 1.

carnosum. 127. G. caule fruticoso: articulis carnoso-gibbosis, foliis alternis pinnatifidis laciniatis, petalis linearibus. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 99. *f.* 1.

arenarium. 129. G. acaule, foliis pinnatifidis: laciniis oblongis inciso serratis. *Burm. de geran. n.* 63.

pinnatifidum. 130. G. acaule, radice turbinata, foliis duplicato-pinnatifidis: laciniis linearibus obtusis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 260. *n.* 382. *t.* 120. *f.* 1.

pinnatum. 131. G. acaule, radice turbinata tuberosa, pinnis ovatis sessilibus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 257. *n.* 376. *t.* 115. *f.* 2.

astragalifolium. 132. G. radice crassa, pinnis ovato-acuminatis incanis hirsutis, scapis subradicalibus elongatis umbelliferis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 257. *n.* 377. *t.* 104. *f.* 2.

capillare. 133. G. foliis oppositis: pinnis linearibus, pedunculis axillaribus solitariis subunifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 258. *n.* 378. *t.* 97. *f.* 1.

proliferum. 134. G. radice turbinata, pinnis tri- & quinquepartitis linearibus. *Burm. de geran. n.* 70. *t.* 2.

minimum. 135. G. foliis radicalibus cespitosis, caulinis oppositis, floribus terminalibus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 260. *n.* 384. *t.* 121. *f.* 3.

ferulaceum. 136. G. pinnis lobatis incisis revolutis, petalo superiore erecto; reliquis dependentibus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 265. *n.* 392. *t.* 110. *f.* 2.

villosum. 137. G. caule brevi hirto, foliis duplicato-pinnatis: pinnulis capillaribus, umbellis pluribus terminalibus elongatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 258. *n.* 379. *t.* 117. *f.* 2.

appendiculatum. 138. G. radice rapacea, foliis radicalibus tomentoso-lanatis duplicato-pinnatis: stipulis longe decurrentibus apice dilatatis, umbellæ radiis scapo subæqualibus. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 121. *f.* 2.

ramosissimum. 139. G. caule frutescente, foliis bipinnatis: pinnulis subrotundis glabris. *Burm. fl. afr. t.* 34. *f.* 2.

triste. 140. G. radice tuberosa, foliis longissimis bipinnatis hirtis, floribus umbellatis: corollis subæqualibus. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 19.

fruticosum. 141. G. caule fruticoso exsucco, foliis oppositis bipinnatis, pedunculis bifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 263. *n.* 389. *t.* 122. *f.* 2.

coriandrifolium. 142. G. ramis reclinato-erectis nodosis, foliis bipinnatis linearibus, umbellis paucifloris. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 116. *f.* 1.

myrrhifolium. 143. G. foliis bipinnatis: inferioribus cordatis lobatis, caule herbaceo, calicibus strigosis. *Mant. p.* 433. *Herm. par. Lugdb. t.* 281.

daucifolium. 144. G. foliis hirtis alternatim tripinnatis: foliolis pinnatifidis. *Murr. comm. Goett.* 1780. *t.* 4.

flavum. 145. G. foliis trifariam alternatim pinnatis: foliolis pinnatifidis, scapis hirtis. *Mant. p.* 257. *an satis distinctum a daucifolio?*

SERRA. *Cal.* 2plex, persistens: exterior 3phyllus; interior semiquinquepartitus. *Stil.* 5-partitus. *Stigm.* globosa. *Capsula?* 10sperma.

incana. 1. SERRA. *Cavanill. dist.* 2. *p.* 83. *t.* 35. *f.* 3.

CRINODENDRON. *Cal.* o. *Cor.* campanulata, patens, 6petala. *Caps.* coriacea, 1locularis, apice elastica vi dehiscens, 3-sperma.

Patagua. 1. CRINODENDRON. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 300. *n.* 435. *t.* 158. *f.* 1.

ÆRVA. *Flores* polygami. *Cal.* 5phyllus, patens. *Stamina* hermaphroditis 5 sterilia. *Caps.* oblonga, 1sperma, calice vallata.

ægyptiaca. 1. ÆRVA. *Forsk. flor. ægypt. arab. p.* 170.

PLAGIANTHUS. *Cal.* 5fidus, brevis. *Cor.* 5petala. *Germen* ovatum. *Stigma* clavatum. *Bacca.*

divaricatus. 1. PLAGIANTHUS. *Forst. char. gen. p.* 43. *t.* 43.

1084. JATROPHA. *Flores* monoici. *Cal.* o.
♂. *Cor.* 1petala, infundibuliformis. *Stam.* alterna breviora.
♀. *Cor.* 5petala, patens, *Stil.* 3 2fidi. *Caps.* 3cocca. *Sem.* subsolitaria.

moluccana. 1. J. foliis ovatis integerrimis subdentatis. *an distincti generis?*

variegata. 9. J. caliculata, foliis lanceolatis integerrimis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 79. *t.* 21.

Curcas. 2. J. foliis cordatis quinqueangulatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 63. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 7. *t.* 108. *f.* 1.

spinosa. 10. J. caliculata, foliis tripartitis: lobis sursum angulatis integerrimis, caule fruticoso aculeato. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 79.

herbacea. 3. J. aculeata, foliis trilobis, caule herbaceo.

urens. 4. J. foliis palmatis dentatis aculeatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 21.

Manihot. 5. J. foliis palmatis: lobis lanceolatis integerrimis lævibus. *Merian. surin.* 4. *f.* 4. 5.

Janipha. 6. J. foliis palmatis: lobis integerrimis; intermediis utrinque sinu lobatis. *Mant. p.* 126. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 77.

glandulosa. 11. J. caliculata, foliis villosis quinquelobis: lobis denticulatis glandulosis, caule fruticoso exstipulato. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 80.

glauca. 12. J. caliculata, foliis quinquefidis trifidisque serrato-dentatis: petiolis nudis, stipulis palmatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 78.

globosa. 13. J. capsulis globosis tetracoccis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 7. *t.* 109. *f.* 3. *utrum hujus, an distincti generis?*

gossypifolia. 7. J. foliis quinquepartitis: lobis ciliatis petiolisque, setis glandulosis ramosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 23.

multifida. 8. J. foliis multifidis lævibus: stipulis setaceis multifidis. *Dill. h. Elth. t.* 173. *f.* 213.

SUTHERLANDIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* campanulatus, 5dentatus.
♂. *Anth.* 5–10 in cylindr. connatæ.
♀. *Anth.* 10 geminæ. *Pist.* 5. *Stigm.* clavatis. *Drupæ* exsuccæ, 1loculares, 1-spermæ.

littoralis. 1. SUTHERLANDIA. *Rheed. h. malab.* 6. *p.* 37. *t.* 21.

ENDECANDRIA.

833. BROWNÆA. *Cal.* inæqualiter 2fidus. *Cor.* 2plex : exterior 5fida ; interior 5petala. *Legumen* 2-loculare.

coccinea. 1. Br. foliis ſimplicibus, floribus lateralibus. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 121.

grandiceps. 2. Br. foliis pinnatis, ſpicis terminalibus. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 287. *t.* 22. *f.* a-i. *an hujus generis quoque Palove Aubl. pl. guj. p.* 365. *t.* 141 ?

DODECANDRIA.

ACIOJA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala, inæqualis. *Filamenta* 11-12. *Drupa* ſicca, ovata, coriacea, fibroſa, 1locularis. *Nux* 1.

guianenſis. 1. Acioja. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 698. *t.* 280.

834. PENTAPETES. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 20, quorum 5 caſtrata, longa. *Capſ.* lignoſa 5locularis : loculis 2valvibus. *Semina* alata.

acerifolia. 1. P. foliis cordatis repandis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 44. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 133. *f.* 2.

velutina. 2. P. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, floribus pentandris. *Forsk. fl. æg. ar. p.* 64. Melhania velutina.

ſuberifolia. 3. P. foliis oblongis repandis apice ſinuatis acuminatis ſubtus incanis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 43. *f.* 2.

Erythroxylon. 4. P. foliis cordatis ſubcrenatis ſubtus tomentoſis ſubtus rugoſis, floribus ſubumbellatis decandris. *Pluckn. mant. p.* 6. *t.* 333. *f.* 1.

WALCUFFA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata 5-petala. *Stam.* 15. *Stigm.* 5fidum.

torrida. 1. WALCUFFA. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub. 5. app. p. 67. ic.*

1083. CROTON. *Flores* monoici, rarius dioici.

♂. *Cal.* cylindricus, 5dentatus aut 5phyllus. *Cor.* 5petala aut o. *Glandul.* 5. *Stam.* 10-15.

♀. *Cal.* polyphyllus. *Cor.* o. *Stil.* 3. semibifidi. *Capf.* 3cocca. *Sem.* folitaria.

variegatum. 1. Cr. foliis lanceolatis integerrimis glabris pictis petiolatis. *Rumpf amb. 4. t. 25-27.*

Cafcarilla. 2. Cr. foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis fubtus tomentofis, caule arboreo. *Catesb. Car. 2. t. 46. β?)* Croton lineare. *Jacq. amer. 256. t. 162. f. 2.*

caftaneifolium. 3. Cr. foliis lanceolatis obtufis ferratis petiolatis glabris.

paluftre. 4. Cr. foliis ovato-lanceolatis plicatis ferratis fcabris. *Mant. cent. t. 38.*

balfamiferum. 5. Cr. foliis ovato-lanceolatis fcabris integerrimis fubtus tomentofis. *Mant. p. 125. Jacq. h. Vind. 3. t. 46.*

obliquum. 40. Cr. foliis ovato-lanceolatis integerrimis, cauleque herbaceo tomentofis. *Valh. fymb. bot. 1. p. 78.*

plicatum. 41. Cr. foliis ovatis plicatis crenatis hirfutis, caule herbaceo. *Vahl. fymb. bot. 1. p. 78.*

cyanofpermum. 42. Cr. capfulis globofis glabris: feminibus glaberrimis violaceis. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent. 7. t. 107. f. 6. an diftincta hujus generis fpecies?*

cardiofpermum. 43. Cr. capfulis globofis apice trituberculatis: feminibus cordiformibus. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent. 7. t. 107. f. 6.*

feffiliflorum. 6. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris, floribus feffilibus axillaribus dioicis pentandris. *Swarts nov. pl. gen. & fp. p. 100.*

pallens. 7. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque glabris, racemis ſolitariis erectis terminalibus, calicibus fructu majoribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

maturenſe. 8. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus candido-ſericeis baſi biglandulosis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 879. *t.* 338.

guianenſe. 9. Cr. foliis ovatis acuminatis ſerratis ſubtus ferrugineo-tomentoſis baſi biglandulosis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 882. *t.* 339.

acutum. 10. Cr. foliis ovatis ſerratis acuminatis biglandulosis, caule herbaceo. *Thunb. flor. jap. p.* 269.

Tiglium. 11. Cr. foliis ovatis glabris acuminatis ſerratis, caule herbaceo. *Rumpf amb.* 4. *t.* 42. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 5.

hirtum. 12. Cr. foliis ovatis ſerratis baſi pilis glanduliferis, ſpicis ſeſſilibus, caule hiſpido. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 17. *t.* 9.

lacciferum. 13. Cr. foliis ovatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, calicibus tomentoſis. *Rumpf amb.* 3. *t.* 127. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

lucidum. 14. Cr. foliis ovatis glabris, floribus ſpicatis, ſtilis multifidis depreſſo-pubeſcentibus, caule frutescente. *Mant. p.* 497. *Berg. act. angl.* 1768. *t.* 7.

punctatum. 15. Cr. foliis alternis ovatis integerrimis petiolatis coriaceis incanis punctatis, pedunculis extrichotomia erectis ſolitariis racemoſis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 166.

maritimum. 38. Cr. foliis ovatis integerrimis obtuſis ſupra rugoſis, ſubtus petiolis calicibuſque tomentoſis, caule ſuffruticoſo. *Walt. flor. carol. p.* 239.

glabellum. 16. Cr. foliis ovatis obtuſiuſculis integerrimis lævibus, capſulis pedunculatis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 174. *f.* 3. 4.

globoſum. 17. Cr. foliis ovatis obtuſis integris, pedunculis geminis, floribus dioicis, capſulis globoſis echinato-hiſpidis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

populifolium. 18. Cr. foliis lato-ovatis acuminatis ſerrato-dentatis ſubhirtis: petiolis longitudine foliorum, racemis terminalibus erectis ſolitariis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 101.

Inophyllum. 19. Cr. foliis obovatis integerrimis, caule arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 67.

ſebiferum. 20. Cr. foliis rhombeo-ovatis acuminatis integerrimis glabris. *Pet. gaz. t.* 34. *f.* 3.

argenteum. 21. Cr. foliis cordato-ovatis subtus tomentosis integris serratis. *Murray comm. Goett.* 1781. *t.* 4.

Ricinocarpos. 22. Cr. foliis subcordatis crenatis, pedunculis racemosis oppositifoliis, caule herbaceo.

astroites. 39. Cr. foliis ovalibus subcordatis integerrimis utrinque stellato-tomentosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 375.

aromaticum. 23. Cr. foliis cordatis scabris subserratis petiolatis, caule arboreo. *Rumpf amb.* 3. *t.* 126. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

moluccanum. 24. Cr. foliis cordatis angulatis scabris subtus tomentosis. *Pluckn. alm. t.* 220. *f.* 5.

humile. 25. Cr. foliis cordatis integerrimis scabris subciliatis subtus incanis caule fruticoso.

flavens. 26. Cr. foliis cordatis oblongis integerrimis utrinque tomentosis, ramulis densius tomentosis.

macrophyllum. 27. Cr. foliis cordato-subrotundis acuminatis integris crassis tomentosis subtus nervosis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 100.

nitens. 28. Cr. foliis cordato-ellipticis acuminatis subintegris glabris supra nitidis subtus punctato-argenteis, racemis axillaribus folio brevioribus erectis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 100.

nutans. 29. Cr. foliis rhombeo-subrotundis acuminatis undulatis glabris nutantibus. *Forst. flor. austr. p.* 67.

tinctorium. 30. Cr. foliis rhombeis repandis capsulis pendulis, caule herbaceo. *Burm. ind. t.* 62. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

glandulosum. 31. Cr. foliis oblongis serratis basi biglandulosis, capsulis sessilibus.

divaricatum. 32. Cr. foliis oblongis obtusis serratis hirtis basi biglandulosis racemis terminalibus solitariis, caule fruticoso, ramis dichotomis divaricatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 100.

laurinum. 33. Cr. foliis oblongis acutis integerrimis consistentibus glabris subtus una cum petiolis scabris punctatis, racemis axillaribus longissimis patulis, caule arborescente. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 100.

capense. 34. Cr. foliis hastatis indivisisque lanceolatis integerrimis glaberrimis. *Suppl. p.* 433.

japonicum. 35. Cr. foliis indivisis trilobisque ovatis acuminatis integris glabris. *Suppl. p.* 422. *Thunb. flor. jap. p.* 270. *t.* 28. 29.

lobatum. 36. Cr. foliis inermi serratis: inferioribus quinquelobis; superioribus trilobis. *Mart. cent. t.* 46.

spinosum. 37. Cr. foliis palmatis quinquelobis trilobisque spinoso-serratis, floribus cauli appressis subsessilibus. *Pluckn. alm. t.* 108. *f.* 3.

1082. ACALYPHA. *Flores* declini. *Cal.* 3-4phyllus. *Cor.* 0.
♂. *Stam.* 8-16.
♀. *Stil.* 3. *Caps.* 3sulca, 3locularis valvis bifariam dehiscentibus: *Sem.* solitaria.

* *caule fruticoso.*

fruticosa. 1. A. involucris femineis cordatis crenatis foliis ovatis acutis serratis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 161.

** *caule herbaceo.*

† *floribus monoicis.*

decidua. 2. A. involucris femineis cucullatis serratis deciduis, foliis lanceolato-ovatis petiolo sesquilongioribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 161.

spicata. 3. A. involucris femineis cucullatis serratis, foliis lanceolatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 161.

ciliata. 4. A. involucris femineis urceolatis ciliatis spicis brevissimis, foliis ovatis acuminatis petiolum æquantibus. *Vahl. symb. bot.* 1. *p.* 77. *t.* 20.

australis. 5. A. involucris femineis integerrimis, foliis lanceolatis obtusis.

villosa. 6. A. involucris femineis minimis dentatis villosissimis, spicis elongatis, foliis ovatis acuminatis serratis petiolo longioribus. *Suppl. p.* 422. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 47.

indica. 7. A. involucris femineis cordatis subcrenatis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 81. 82.

virginica. 8. A. involucris femineis cordatis incisis, foliis ovato lanceolatis petiolo longioribus.

carolinia-na. 20. A. ſpicis femineis involucris villoſis ſubcordatis crenatis: ſpicis maſculis baſi involucri inſertis, foliis ovatis ſerratis. *Walt. flor. carol. p.* 238.

virgata. 9. A. ſpicis femineis involucris cordatis ſerratis: maſculis diſtinctis aphyllis, foliis lanceolato-ovatis.

hercan-difolia. 10. A. ſpicis femineis longiſſimis: involucris cordatis ſerratis; maſculis diſtinctis aphyllis, foliis ſubcordatis ſerratis: petiolis longiſſimis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

elliptica. 11. A. ſpicis femineis involucris germinibus brevioribus dentatis hirſutis: maſculis aphyllis laxis, foliis ellipticis acuminatis dentatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

lævigata. 12. A. ſpicis femineis involucris multipartitis: maſculis laxis aphyllis, foliis cuneato-ovatis acuminatis ſerrulatis glaberrimis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

tomento-ſa. 13. A. ſpicis femineis terminalibus ſolitariis involucris multipartitis: maſculis erectis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris ſubtus villoſo-tomentoſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

corenſis. 14. A. floribus femineis terminalibus diſtinctis involucris triphyllis: ſpicis maſculis axillaribus involucratis, foliis ovatis ſerratis. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 254. *t.* 161.

alopecu-roidea. 21. A. ſpicis ſolitariis: maſculis lateralibus patentiſſimis; femineis terminalibus erectis: involucro ſetaceo tripartito. *Jacq. coll.* 3. *p.* 196.

anguſti-folia. 15. A. floribus femineis ſubſeſſilibus terminalibus involucris ſerratis: maſculis ſpicatis, foliis linearibus ſerratis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

reptans. 16. A. ſpicis terminalibus erectis androgynis: floribus femineis inferioribus involucris cordatis ſerratis; maſculis aphyllis, foliis ovatis ſerratis, caule reptante. *Sloane hiſt. jam.* 1. *p.* 125. *t.* 82. *f.* 3.

ſupera. 17. A. amentis axillaribus maſculis flore femineo terminatis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 162.

†† *floribus dioicis.*

ſcabroſa. 18. A. ſpicis femineis involucris cordatis inciſis, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſcabris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

betulæfolia. 19. A. floribus femineis axillaribus sessilibus: involucris cordatis crenatis; masculis spicatis, foliis subrotundis crenatis glabris. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 100.

1086. STERCULIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* 5partitus. *Nectarium* columnæ cylindricæ insidens, 5dentatum.

♂. *Filamenta* 15.

♀. *Germen* globosum, 5-sulcatum. *Caps.* 5, 1loculares, polyspermæ.

Balanghas. 1. St. foliis ovatis integerrimis alternis petiolatis, floribus paniculatis. *Cavanill. diss.* 5. *t.* 144. *an Crataçuæ species?*

Ivira. 2. St. foliis ovatis integerrimis alternatim sparsis, capsulæ basi crinita. *Aubl. pl. guj. p.* 693. *t.* 279.

lanceolata. 3. St. foliis lanceolatis integerrimis, feminibus paucis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 287. *n.* 416. *t.* 143. *f.* 1.

cordifolia. 4. St. foliis cordatis latis acuminatis septemnerviis venosis, capsulis extrinsecus tomentosis intus hispidis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 286. *n.* 414. *t.* 143. *f.* 2.

Fiorniana. 5. St. foliis cordatis lobatis, floribus paniculatis. *Suppl. p.* 423. Sterculia platanifolia. *Marsil. act. Pad.* 1. *p.* 106. *t.* 1. 2. *Cavanill. diss.* 5. *t.* 145.

fœtida. 6. St. foliis digitatis, floribus laxe racemosis. *Sonner. it. ind.* 2. *t.* 132.

platanifolia. 7. St. foliis palmatis? paniculis terminalibus ramosis aphyllis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 352. *n.* 417. *t.* 145.

ALEURITES. *Flores* monoici. *Cal.* ſubtrifidus. *Cor.* 5petala, calice triplo longior. *Nectarium* ſquamis 5 angulatis ad baſin petalorum.
♀. *Stil.* 2 2partiti. *Drupa* 2locularis, ſicca. *Sem.* ſolitaria.

triloba. 1. ALEURITES. *Forſt. char. gen. p.* 56. *t.* 56. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 125. *f.* 2.

LATANIA. *Flores* dioici.
♂. *Spatha* polyphylla, imbricata. *Spadix* ramoſus: ramis apice digitato-ramuloſis, ramulis amentiformibus imbricatim ſquamuloſis, ſquamulis unifloris. *Cal.* ſeſſilis, 6partitus. *Antheræ* oblongæ 2loculares.
♀. *Bacca* globoſa 1locularis, 3pyrena.

Commerſonii. 1. LATANIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 39. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 120. *f.* 1.

ICOSANDRIA.

1087. HURA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Amentum* imbricatum. *Cal.* truncatus. *Filamenta* cylindrica, apice peltata, cincta *antheris* geminatis.
♀. *Cal.* 0. *Stil.* infundibuliformis. *Stigm.* 12fidum. *Capſ.* 12locularis. *Sem.* ſolitaria.

crepitans. 1. HURA. *Trew Ehret. t.* 34. 35. *f.* 1.

1137. ADELIA. *Flores* dioici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 3partitus.
♀. *Cal.* 5partitus. *Stil.* 3. divaricatis. *Caps.* 3cocca.

Bernardia. 1. A. foliis oblongis tomentosis serratis.

Ricinella. 2. A. foliis obovatis integerrimis.

Acidoton. 3. A. ramis flexuosis, spinis gemmaceis.

CROSSOSTYLIS. *Cal.* 4angularis, 4partitus, germini adnatus. *Cor.* 4petala. *Nectarium* corpusculis circiter 20, inter stamina. *Stil.* persistens. *Stigm.* patentissima 3fida. *Bacca* hemisphaerica, supera, 1locularis, polysperma.

biflora. 1. CROSSOSTYLIS. *Forst. char. gen. p.* 44. *t.* 44.

ASSONIA. *Cal.* 2plex, persistens: *exterior* apice 3crenatus; interior 5partitus. *Filamenta* basi in urceolum coalita, 5 sterilia. *Stil.* 5. *Caps.* 5 3quetrae, 1loculares, 2spermae in globum cortice tectum coalitae.

populnea. 1. ASSONIA. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 120. *n.* 173. *t.* 42. *f.* 1.

CAVANILLA. *Cal.* 2plex : exterior 3phyllus, deciduus; interior 5partitus persistens. *Filamenta* basi in urceolum coalita. *Stil.* 1. *Stigm.* 5 recurva. *Caps.* 5. 2valves, 1loculares, in orbem coalitæ.

* *calicis exterioris foliolis latis.*

palmata. 1. C. foliis cordatis palmatis septemlobis : lobis acutis serrato-crenatis, floribus corymbosis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 122. *n.* 174. *t.* 38. *f.* 1. Dombeya palmata. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 137. *f.* 1? Dombeya borbonica.

acerifolia. 2. C. foliis multipartitis calicibusque interioribus tomentosis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 131. *f.* 1. *an distincta hujus generis species?*

acutangula. 3. C. foliis cordatis subrotundo-tricuspidatis crenatis, floribus racemosis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 123. *n.* 175. *t.* 38. *f.* 2. Dombeya acutangula.

tiliæfolia. 4. C. foliis cordatis subrotundo-acutis crenatis, floribus racemoso-corymbosis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 124. *n.* 177. *t.* 39. *f.* 2. Dombeya tiliæfolia.

tomentosa. 5. C. foliis cordatis subrotundis crenatis tomentosis venosis : venis subcircularibus, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 125. *n.* 178. Dombeya tomentosa.

angulata. 6. C. foliis cordatis subrotundis supra angulatis serrato-dentatis tomentosis, umbellis numerosis : pedunculis communibus petiolo brevioribus. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 123. *n.* 176. *t.* 39. *f.* 1. Dombeya angulata.

** *calicis exterioris foliolis angustissimis.*

umbellata. 7. C. foliis cordatis ovato-oblongis acuminatis repandis glabris, floribus umbellatis globosis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 127. *n.* 181. *t.* 41. *f.* 1. Dombeya umbellata.

punctata. 8. C. foliis ovato lanceolatis longis integerrimis subtus tomentosis, supra punctato-scabris, floribus dioicis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 125. *n.* 179. *t.* 40. *f.* 1. Dombeya punctata.

decanthera. 9. C. foliis ovatis acuminatis repando-crenatis, floribus umbellatis : staminibus quinque diantheris, quinque steri-

libus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 126. *n.* 180. *t.* 40. *f.* 2. Dombeya decanthera.

ovata. 10. C. foliis ovatis dentatis quinquenerviis tomentoſis, ſtilo minimo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 127. *n.* 182. *t.* 41. *f.* 2. Dombeya ovata.

ferruginea. 11. C. foliis ovato-oblongis ſeptemnerviis ſubtus ferrugineis: petiolis, pedunculis calicibuſque tomentoſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 128. *n.* 183. *t.* 42. *f.* 2. Dombeya ferruginea.

phœnicea. 12. C. foliis ſubhaſtatis elongatis anguſtis crenato-ſerratis, floribus cernuis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 456. Pentapetes phœnicea. *Mill. illuſtr. ic. Trew rar.* 7. *t.* 5. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 134. *f.* 4.

POLYANDRIA.

1414. GUSTAVIA. *Cal.* o. *Petala* 4-8. *Bacca* 4-6-locularis. *Sem.* appendiculata.

anguſta. 1. GUSTAVIA. *Suppl. p.* 313. *Aubl. pl. guj. t.* 192. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 138. *f.* 1. *β*) *Aubl. pl. guj. t.* 193.

SASSA. *Cal.* o. *Cor.* 5fida. *Tubus* ſtamineus longiſſimus.

gummifera. 1. SASSA. *Bruce trav. in Eg. Arab. Ab. and Nub.* 5. *app. p.* 28. *ic.*

836. ADANSONIA. *Cal.* ſimplex, deciduus. *Stil.* longiſſimus. *Stigm.* plura. *Capſ.* lignoſa, 10locularis, polyſperma: pulpa farinacea.

digitata. 1. ADANSONIA. *Cavanill. diſſ.* 5. *t.* 157. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 5.

1413. **BARRINGTONIA.** *Cal.* 2phyllus, superus. *Drupa* nuce 1-4locular.

speciosa. 1. BARRINGTONIA. *Suppl. p.* 312. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 362. Mammea asiatica. *Forst. char. gen. t.* 43.

CURATARI. *Cal.* - - - *Cor.* - - - *Caps.* infera, operculata, 3gona, 3sperma. *Sem.* alata, plana.

guianensis. 1. CURATARI. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 724. *t.* 290.

1415. **CAROLINEA.** *Cal.* simplex, campanulatus, truncatus. *Petala* ensiformia. *Caps.* sulcata, 1-locularis multivalvis, ovata.

princeps. 1. C. foliis subquinatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Suppl. p.* 314. *Aubl. pl. guj. t.* 291. 292.

insignis. 2. C. foliis subseptenatis: foliolis obovato-oblongis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 101. *Cavanill. diss. bot.* 5. *t.* 154. Bombax grandiflorum.

LAGUNA. *Cal.* simplex, 5cuspidatus, deciduus. *Stil.* simplex. *Stigma* peltatum. *Caps.* 5locularis, 5valvis.

aculeata. 1. LAGUNA. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 173. *n.* 258. *t.* 71. *f.* 1.

835. **BOMBAX.** *Cal.* 3-5fidus. *Petala* utplurimum 5. *Recept.* 5gonum. *Caps.* lignosa, 5locularis, 5valvis. *Semina* lanata.

pentandrum. 1. B. foliis septenatis, floribus pentandris: antheris lunatis binis aut ternis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 182. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 133. *f.* 1.

Erianthos. 2. B. foliis septenatis lanceolatis glabris, corollis exterius lanatis, antheris adnatis, caule aculeato. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 294. *n.* 427. *t.* 152. *f.* 1.

heptaphyllum. 3. B. foliis feptenatis, ftaminibus pentadelphis. *Jacq. ftirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 55. *Rheed. h. malab.* 3. *t.* 52.

globofum. 4. B. foliis fubfeptenatis glaberrimis, floribus fafciculatis: calice cyathiformi. *Cavanill. diff. bot.* 6. *p.* 353. *n.* 432.

Ceiba. 5. B. foliis quinatis, corollis monopetalis, fructus apice concavo, caule aculeato. *Jacq. ftirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 54.

globiferum. 6. B. foliis quinatis emarginatis, fructu globofo. *Aubl. pl. guj. p.* 701. *t.* 281.

Goffypium. 7. B. foliis quinquelobis acuminatis fubtus tomentofis, calicibus pentaphyllis. *Sonner. it. ind.* 2. *t.* 133.

ANODA. *Cal.* fimplex, femiquinquefidus, perfiftens, fructu maturo patentiffimus. *Capf.* multilocularis, fupra hemifphærica, fubtus ftellato-plana, loculis 1fpermis.

Dilleniana. 1. A. foliis triangularibus: inferioribus lato-crenatis, fuperioribus obfolete crenatis longe petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris longiffimis. *Cavanill. diff.* 1. *p.* 40. *n.* 85. *t.* 11. *f.* 1.

haftata. 2. A. foliis cordatis angulatis: fuperioribus elongatis haftatis, pedunculis longiffimis axillaribus unifloris. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 458. Sida criftata. *Cavanill. diff.* 1. *t.* 11. *f.* 2.

triloba. 3. A. foliis inferioribus cordatis fubangulatis crenatis: fuperioribus trilobis, pedunculis axillaribus folitariis longiffimis unifloris. *Cavanill. diff.* 1. *p.* 39. *n.* 84. *t.* 10. *f.* 3. *Scop. del. infubr.* 1. *t.* 9.

PALAVA. *Cal.* fimplex, femiquinquefidus, perfiftens. *Stil.* 1 multifidus. *Capf.* plures 1fpermæ, non dehifcentes, receptaculo centrali conico glomeratim impofitæ.

malvifolia. 1. P. caulibus declinatis ramofiffimis, foliis cordatis fublobatis glabris pedunculis axillaribus unifloris petiolo longioribus. *Cavanill. diff.* 1. *p.* 40. *n.* 86. *t.* 11. *f.* 4. *Herit. ftirp. nov.* 5. *t.* 50.

moschata. 2. P. foliis cordatis ovato-crenatis tomentosis: stipulis lanceolatis parvis subnigris, pedunculis axiliaribus unifloris longissimis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 41. *n.* 87. *t.* 11. *f.* 5.

837. SIDA. *Cal.* simplex, semiquinquefidus, persistens. *Stili* plures, *vel* 1 multifidus. *Caps.* plures, quam 4, *in orbem* dispositæ, 1loculares, 1-3spermæ, dehiscendo sæpius 2rostres.

* *capsulis monospermis.*

† *quinque.*

r *foliorum longitudine latitudinem æquante aut paulisper superante.*

pusilla. 1. S. caule fruticoso reclinato, foliis ellipticis dentatis glabris. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 6. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 4. & *diss.* 5. *t.* 127. *f.* 1.

plumosa. 2. S. foliis ovatis dentatis retusis, floribus terminalibus glomeratis: bracteis linearibus ciliatis cancellatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 7. *n.* 2. *t.* 12. *f.* 4.

veronicæfolia. 3. S. caule hirto, foliis cordatis acutis inæqualiter dentatis, pedunculis longissimis suberectis pilosis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 7. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 3.

humilis. 4. S. caule spithamæo scabro, foliis cordatis crenatis orbiculatis villosis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 277. *n.* 402. *t.* 134. *f.* 2.

repens. 5. S. caule filiformi elongato prostrato, foliis cordatis crenatis utrinque hispidis, pedunculis unifloris. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 7. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 2.

hederæfolia. 6. S. caule nodoso radicante, foliis cordatis obtuse crenatis subhirsutis, capsularum corniculis erectis longis hamatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 8. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 3.

fœtida. 7. S. caule erecto atro-purpureo, foliis ovato-cordatis serratis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 349. *n.* 513. *t.* 196. *f.* 1.

ovata. 8. S. caule promato ramoso, foliis ovato-cordatis crenatis; pedunculis axillaribus solitariis unifloris. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 350. *n.* 514. *t.* 196. *f.* 2.

radicans. 9. S. caule repente, surculis radicantibus, foliis cordatis acutis pilosis dentatis: dentibus seta terminatis. *Rheed. h. malab.* 10. *f.* 79.

morifolia. 10. S. foliis subrotundo-acutis cordatis lato-crenatis: crenulis acuminatis, pedunculis annulatis petiolo paulo longioribus, calicibus pilosis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 9. *f.* 7. *t.* 1. *f.* 1.

borbonica. 11. S. caule erecto ramoso hirto, foliis cordatis subrotundo-acutis dentatis, floribus solitariis axillaribus: pedunculis petiolo paulo longioribus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 9. *n.* 8. *t.* 10. *f.* 2.

calicina. 12. S. foliis cordatis crenatis, calice insigni quinquepartito, corollis patentibus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 9. *n.* 9. *t.* 8. *f.* 2.

Retzii. 13. S. foliis subrotundis cordatis serratis supra pilosis, capsulis ecornibus. *Retz. obs. bot.* 1. *p.* 23. *n.* 76. *Herit. stirp. n.* 5. *t.* 56. *bis.*

pilosa. 14. S. caule ramoso piloso, foliis crenatis: inferioribus cordatis subrotundis; reliquis cordato-ovatis, pedunculis longis geniculatis pilosis, capsulis bicornibus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 9. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 8.

atro-sanguinea. 15. S. foliis cordato-ovatis acutis serratis utrinque villosis, pedunculis unifloris solitariis capillaribus, caule fruticoso. *Jacq. collect.* 1. *p.* 49. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 29. *β*) Sida paniculata. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 458. *n.* 11.

sapina. 16. S. foliis cordato-ovatis crenatis, caulibus filiformibus prostratis. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 109. *bis. t.* 52. *bis. Cavanill. diss.* 6. *t.* 196. *f.* 2.

fragrans. 17. S. foliis cordatis rotundatis ligulato-acuminatis dentatis, pedunculis solitariis petiolo brevioribus. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 111. *t.* 53. *an eadem cum althæifolia?*

multicaulis. 18. S. caulibus tenuibus tomentoso-incanis, foliis subrotundo-cordatis dentatis pulverulentis villosis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 10. *n.* 12. *t.* 1. *f.* 6.

javensis. 19. S. caule reclinato, foliis cordatis acutis sublobato-crenatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 10. *n.* 13. *t.* 1. *f.* 5.

pyramidata. 20. S. foliis cordatis subrotundis dentatis, panicula terminali numerosissima. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 11. *n.* 15. 6. *t.* 194. *f.* 1.

spinosa. 21. S. foliis cordato-oblongis serratis: stipulis setaceis, axillis subspinosis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 1. *f.* 9.

frutescens. 22. S. foliis ovato-oblongis serratis subtus albicantibus: pedunculis erectis unifloris, folio duplo minoribus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 12. *n.* 17. *t.* 10. *f.* 1.

alnifolia. 23. S. foliis serratis subvillosis: inferioribus rotundatis cordatis; mediis ellipticis, superioribus lanceolatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 12. *n.* 18. *t.* 1. *f.* 13.

verticillata. 24. S. caule piloso, foliis cordatis acuminatis crenatis, floribus subverticillatis sessilibus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 13. *n.* 19. *t.* 1. *f.* 12.

bivalvis. 25. S. foliis cordatis orbiculato-acuminatis tomentosis, floribus subsessilibus, fructu pentagono depresso glabro patente. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 13. *n.* 20. *t.* 11. *f.* 3.

prostrata. 26. S. caule prostrato, foliis cordatis latis crenatis tomentosis, floribus geminis, capsulis muticis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 13. *n.* 21. *t.* 13. *f.* 3.

† † *foliorum longitudine latitudinem duplo aut magis adhuc excedente.*

flavescens. 27. S. caule erecto, foliis cordatis oblongis crenatis tomentosis, floribus geminis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 14. *n.* 22. *t.* 13. *f.* 2.

truncata. 28. S. foliis cordato-oblongis retusis serratis, stipulis setaceis, geniculis ramorum subtrispinosis. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 107. *t.* 51.

viscosa. 29. S. foliis cordatis crenatis tomentosis, floribus subsolitariis, capsulis septemlocularibus rotundis depressis. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 53. *bis. vix hujus tribus.*

glutinosa. 30. S. caule tomentoso-glutinoso, foliis cordatis oblongis acuminatis subtus tomentosis, pedunculis capillaribus longissimis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 16. *n.* 28. *t.* 2. *f.* 8.

urens. 31. S. foliis cordatis acuminatis serratis hispidis, pedunculis multifloris axillaribus terminalibusque. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 2. *f.* 7.

ulmifolia. 32. S. foliis crenatis cordatis oblongis: acumine producto, capsularum rostris longis hamatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 15. *n.* 26. *t.* 2. *f.* 4.

jamaicensis. 33. S. foliis ovatis serratis tomentosis, floribus axillaribus subpedunculatis, capsulis birostratis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 2. *f.* 5.

glomerata. 34. S. foliis ovato-lanceolatis dentatis subsessilibus, floribus conglomeratis sessilibus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 18. *n.* 32. *t.* 2. *f.* 6.

acuta. 35. S. foliis lineari-lanceolatis dentatis inferne integris, floribus subsessilibus solitariis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 15. *n.* 25. *t.* 2. *f.* 3.

angustifolia. 36. S. foliis lineari-lanceolatis serratis subtus tomentosis, stipulis setaceis, axillis obtuse trispinosis. *Murr. flor. Goett. p.* 220. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 2. *f.* 2. *Scop. del. ins.* 1. *t.* 14. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 52.

linifolia. 37. S. foliis linearibus hirsutis integerrimis, floribus corymboso-spicatis: spicis terminalibus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 14. *n.* 23. *t.* 2. *f.* 1.

†† *capsulis septem.*

triloba. 38. S. foliis inferioribus cordatis crenatis: superioribus dentatis trilobatis: medio lanceolato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 11. *n.* 14. *t.* 1. *f.* 11. & 5. *t.* 131. *f.* 1.

ciliaris. 39. S. foliis ovalibus retusis serratis: stipulis linearibus ciliatis, capsulis muricatis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 3. *f.* 9. & 5. *t.* 127. *f.* 2.

microphylla. 40. S. foliis ovatis dentatis, caule erecto duro ramosissimo, floribus axillaribus apicem versus numerosis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 22. *n.* 44. *t.* 12. *f.* 2.

stipulata. 41. S. foliis lanceolatis dentatis acutis pilosis: stipulis longis linearibus ciliatis, flore longioribus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 22. *n.* 46. *t.* 3. *f.* 10.

††† *capsulis octo.*

carpinifolia. 42. S. foliis bifariis ovato-lanceolatis serratis: serraturis arctatis, umbellis axillaribus. *Suppl. p.* 307. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 51.

palmata. 43. S. foliis palmatis quinquangulis serratis exstipulatis, floribus subumbellatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 67. *β*) Sida ricinoides. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 115. *t.* 55.

ricinoides. 44. S. foliis quinquelobis serratis acuminatis, capsulis biaristatis. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 115. *t.* 55. *an eadem cum palmata?*

jatrophoides. 45. S. foliis palmatis peltatis: laciniis lanceolatis runcinato-lobatis. *Herit. stirp. nov. p.* 117. *t.* 56. *an satis distincta a ricinoide?*

†††† *capsulis novem.*

ſuberoſa. 46. S. foliis ovalibus ſubinciſo-dentatis, cortice ſuberoſo. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 113. *t.* 54.

retuſa. 47. S. foliis cuneiformibus retuſis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 3. *f.* 4. & 5. *t.* 131. *f.* 2.

multiflora. 48. S. foliis ovatis dentatis tomentoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis petiolo longioribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 18. *n.* 34. *t.* 3. *f.* 3.

herbacea. 49. S. caule erecto piloſo ramoſo, foliis ſubcordatis crenato-dentatis, pedunculis petiolo paulo brevioribus, capſulis biroſtratis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 19. *n.* 36. *t.* 13. *f.* 1.

micans. 50. S. foliis ſubcordatis ovato-lanceolatis dentatis tomento molliſſimo micantibus, calicibus globoſis decemangulatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 19. *n.* 37. *t.* 3. *f.* 1.

maculata. 51. S. foliis ovatis ſerratis tomentoſis, floribus ſpicatis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 20. *n.* 38. *t.* 3. *f.* 7.

rotundifolia. 52. S. foliis ſubcordatis ſubrotundis crenatis tomentoſis, capſularum roſtris faſciculatis hirtis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 20. *n.* 39 *t.* 3. *f.* 6. & 6. *t.* 194. *f.* 2.

planicaulis. 53. S. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, caule compreſſo, floribus ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 24. *n.* 50. *t.* 3. *f.* 11.

rhombifolia. 54. S. foliis lanceolato-rhomboidibus ſerratis: axillis ſubſpinoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 3. *f.* 12.

††††† *capſulis decem.*

alba. 55. S. foliis ovato-oblongis anguſtis ſerratis glabris: axillis inermibus, pedunculis longiſſimis erectis, ſtigmatibus purpureis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 22. *n.* 14. *t.* 3. *f.* 8.

orientalis. 56. S. foliis ovato-acutis inferne integris ſupra inæqualiter ſerratis: ſtipulis oblongis linearibus, capſulis muticis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 21. *n.* 41. *t.* 12. *f.* 1.

capenſis. 57. S. caule ramoſiſſimo, foliis ovato-lanceolatis dentatis: ſtipulis ciliatis, capſulis muticis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 23. *n.* 49. *t.* 12. *f.* 3.

caneſcens. 58. S. caule fruticoſo, foliis rhomboideis ſubſeſſilibus ſubtus villoſiſſimis: ſtipulis ſetaceis erectis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 23. *n.* 48. *t.* 8. *f.* 3.

cordifolia. 59. S. foliis cordatis ſubangulatis ſerratis villoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 3. *f.* 2.

calyptrata. 60. S. caule herbaceo glabro, foliis cordatis ovato-lanceolatis oblongis dentatis, floribus solitariis, seminibus calyptratis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 57. *n.* 93. & 5. *t.* 133. *f.* 1.

†††††† *capsulis numerum denarium superantibus.*

spicata. 61. S. foliis subcordatis acuminatis, floribus spicatis, pedunculis petiolum subæquantibus, capsulis pendulis obtusis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 24. *n.* 51. *t.* 8. *f.* 1.

exstipulata. 62. S. foliis cordatis obtusis acutis subtomentosis exstipulatis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris petiolo brevioribus. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 56. *n.* 91. *t.* 14. *f.* 2.

silvatica. 63. S. caule arborescente, foliis tomentosis cordatis cuspidatis, pedunculis binis axillaribus unifloris. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 56. *n.* 92. & 5. *t.* 133. *f.* 2.

occidentalis. 64. S. foliis cordatis sublobatis: stipulis patentibus, pedunculis petiolo brevioribus, capsulis pendulis obtusis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 4. *f.* 3.

multifida. 65. S. caule prostrato, foliis multifidis, floribus secundis, seminibus alatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 25. *n.* 53. *t.* 4. *f.* 2. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 57. *bis. an hujus generis?*

** *capsulis dispermis.*

coronata. 66. S. fruticosa, foliis cordatis serratis tomentosis, pedunculis lateralibus unifloris. *Scop. del. ins.* 3. *p.* 1. *t.* 1.

*** *capsulis trispermis.*

† *quinque.*

triquetra. 67. S. foliis cordatis subtomentosis, ramis triquetris. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 118. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 2. *t.* 134. *f.* 5.

periplocifolia. 68. S. foliis cordatis integerrimis subtus tomentoso-incanis, caule paniculato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 26. *n.* 55. *t.* 5. *f.* 2.

stellata. 69. S. foliis subrotundo-cordatis acutis integerrimis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 5. *f.* 4. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 59.

excelsior. 70. S. foliis cordato-acuminatis integris subtus villosis, floribus panicularis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 27. *n.* 57. *t.* 5. *f.* 3.

hermandioides. 71. S. foliis cordatis supeltatis acuminatis subintegris, pedunculis fructiferis productioribus. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 121. *t.* 58. *an hujus generis? an vere distincta species?*

†† capsulis sex.

ramosa. 72. S. foliis ovatis acutis inæqualiter dentatis, pedunculis ramosis, capsulis birostratis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 28. *n.* 58. *t.* 6. *f.* 1.

††† capsulis septem ad undecim.

lignosa. 73. S. foliis cordatis crenatis tomentosis orbiculato-acuminatis, capsulis durissimis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 28. *n.* 59. *t.* 6. *f.* 2.

umbellata. 74. S. foliis cordatis subangulatis subtomentosis, floribus umbellatis, capsulis birostratis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 56.

microsperma. 75. S. caule flexuoso ramoso, foliis cordatis orbiculato-acutis quinquenerviis, fructu vix calicem excedente. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 29. *n.* 61. *t.* 13. *f.* 4.

Sonnerati. 76. S. foliis cordatis crenatis acutis tomentosis, pedunculis crassis geniculatis erectis, folio duplo longioribus, fructu pilis stellatis ornato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 29. *n.* 62. *t.* 6. *f.* 4.

terminalis. 77. S. foliis cordatis sublobato-crenatis tomentosis, scapo longissimo spica terminato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 29. *n.* 63. *t.* 6. *f.* 6. & 6. *t.* 195. *f.* 2.

tricuspidata. 78. S. foliis cordatis subrotundo-tricuspidatis dentatis tomentoso-incanis, calicum laciniis introrsum carinatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 30. *n.* 64. *t.* 6. *f.* 5. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 60.

mollissima. 79. S. caule erecto tomentoso, foliis cordatis orbiculato-acuminatis dentatis mollissimis, floribus solitariis, calice fructifero decagono. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 49. *n.* 67. *t.* 14. *f.* 1. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 61.

†††† capsulis pluribus quam undecim.

crispa. 80. S. foliis cordatis crenatis scabriusculis, capsulis cernuis inflatis crenatis repandis. *Mant. p.* 445. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 7. *f.* 1. & 5. *t.* 135. *f.* 2.

indica. 81. S. foliis cordatis sublobatis, stipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis scabris calicem excedentibus. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 7. *f.* 10.

pubescens. 82. S. foliis cordatis sublobatis valde tomentosis, pedunculis erectis hirsutissimis unifloris, fructu tomentoso conico truncato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 33. *n.* 71. *t.* 7. *f.* 6.

asiatica. 83. S. foliis cordatis dentatis, pedunculis unifloris petiolo longioribus, fructu lanuginoso calicem paulisper superante. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 7. *f.* 2. & 5. *t.* 128. *f.* 1.

populifolia. 84. S. foliis cordatis crenatis subrotundo-acutis: stipulis spiralibus patulis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 32. *n.* 69. *t.* 7. *f.* 9. & 5. *t.* 128. *f.* 2.

hirta. 85. S. caule hirto, foliis cordatis subrotundis dentatis: stipulis horizontalibus corniformibus, floribus solitariis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 33. *n.* 70. *t.* 7. *f.* 5. & 5. *t.* 129. *f.* 1.

Abutilon. 86. S. foliis subrotundo-cordatis indivisis pedunculos excedentibus, capsularum corniculis bifidis. *Kniph. bot. orig. cent.* 4. *n.* 79. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 1.

obtusa. 87. S. foliis subrotundo cordatis sublobatis, pedunculis umbellatis. *Vogel apud Trew pl. rar. t.* 89.

planiflora. 88. S. foliis cordatis subrotundo-acuminatis dentatis tomentosis, capsularum rostris primum solitariis, tum binis longis villosis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 32. *n.* 68. *t.* 7. *f.* 4. & 5. *t.* 135. *f.* 1. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 62.

exstipularis. 89. S. foliis cordato-acuminatis crenatis mollissimis, pedunculis unifloris petiolo duplo brevioribus, stipulis capillaribus longis villosis caducis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 31. *n.* 67. *t.* 7. *f.* 3.

crassifolia. 90. S. foliis cordatis utrinque tomentosis, pedunculis petiolo æqualibus, capsulis calice quinquangulo vix majoribus. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 125. *t.* 60. *nonne eadem cum tricuspidata?*

*** *capsulis pentaspermis.*

vesicaria. 91. S. foliis cordatis dentatis subtrilobis, fructu inflato capsulis decem composito. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 55. *n.* 87. *t.* 14. *f.* 3.

**** *capsulis polyspermis.*

reflexa. 92. S. foliis subrotundo-cordatis acutis tomentosis obsolete crenatis, corollis reflexis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 36. *n.* 79. *t.* 7. *f.* 7. & 2. *p.* 54. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 64.

***** *capsularum seminumve numero aut nimis inconstanti aut nondum definito.*

sinensis. 93. S. foliis ovalibus serratis subtus tomentosis: stipulis filiformibus. *Retz. obs. bot.* 4. *p.* 29. *n.* 94.

truncatula. 94. S. foliis subovatis dentatis rugoso-tomentosis apice truncatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 35. *n.* 76. *t.* 6. *f.* 7.

lanceolata. 95. S. foliis lanceolatis serratis: stipulis linearibus acutis nervosis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 4. *p.* 28. *n.* 93.

persica. 96. S. foliis inferioribus petiolatis cordatis acuminatis: superioribus sessilibus lanceolatis dentatis, pedunculis solitariis unifloris. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 35. *n.* 75. *t.* 4. *f.* 1.

arborea. 97. S. foliis cordatis ovatis acuminatis crenatis quinquenerviis mollissime tomentosis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p.* 307.

biflora. 98. S. foliis cordatis crenatis tomentosis acuminatis: inferioribus oblongis tricuspidatis, floribus geminis axillaribus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 37. *n.* 80. *t.* 9. *f.* 1.

mauritiana. 99. S. foliis cordatis acutis holosericeis indivisis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis hirsutis, caule fruticoso. *Jacq. misc.* 2. *p.* 352. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 29.

dumosa. 100. S. foliis cordatis acuminatis serratis utrinque glabris, floribus paniculatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 101.

virgata. 101. S. foliis cordatis serratis apice attenuatis, caule virgato, pedunculis axillaribus filiformibus unifloris. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 101.

althaeifolia. 102. S. foliis cordatis subangulatis obtusis serrato-crenatis utrinque tomentosis, capsularum rostris calice brevioribus. *Sloan. hist. jam.* 2. *p.* 218. *t.* 136. *f.* 2.

procumbens. 103. S. foliis cordatis ovato-subrotundis serratis villosis, caule procumbente villoso. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 101.

americana. 104. S. foliis cordatis oblongis indivisis, fructibus longitudine calicis: capsulis lanceolatis. *Plum. ic.* 1. *t.* 2.

brasiliensis. 105. S. caule tomentoso, foliis subcordatis ovato-acutis crenatis: crenulis acuminatis, floribus numerosis breviter pedunculatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 37. *n.* 82. & 2. *t.* 34. *f.* 1.

peruviana. 106. S. foliis subrotundo-cordatis acutis crenatis tomentosis: stipulis lanceolatis ciliatis patulis, pedunculis axillaribus unifloris longis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 36. *n.* 78. *t.* 7. *f.* 8. & 5. *p.* 276. *t.* 130. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 63. *an eadem cum arborea?*

arabica. 107. S. foliis ovato-oblongis serratis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris petiolo brevioribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 124.

bicuspidata. 108. S. foliis serratis: inferioribus cordato-lanceolatis; superioribus linearibus, capsulis bicuspidatis. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 37. *n.* 73.

Phyllanthos. 109. S. foliis crassis tomentosis imbricatis duplicato trifidis: petiolis floriferis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 276. *n.* 401. *t.* 127. *f.* 4.

ternata. 110. S. foliis ternatis serratis. *Suppl. p.* 307. *an eadem cum triloba?*

838. NAPÆA.

Cal. simplex, 5fidus. *Petala* 5. *Stamina* in aliis floribus interdum sterilia, in aliis *stili*. *Caps.* 10 in orbem dispositæ, rotundato-3quetræ, dehiscendo subbirostratæ, 1spermæ.

lævis. 1. N. pedunculis nudis lævibus, foliis lobatis glabris. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 459. Napæa hermaphrodita. *Cavanill.* 5. *t.* 132. *f.* 1.

scabra. 2. N. pedunculis involucratis angulatis, foliis palmatis scabris. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 459. Napæa dioica. *Ehret. pict. t.* 8. & *t.* 7. *f.* 1. *Gaertn. de fr & sem. pl. cent. t.* 136. *f.* 4. *an potius utraque species sidis subjungenda?*

SOLANDRA.

Cal. simplex. *Caps.* oblonga, torulosa, 5locularis. *Sem.* multa duplici ordine in loculamentis disposita.

lobata. 1. S. foliis omnibus simplicibus. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 11. & 5. *t.* 136. *f.* 1. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 49.

ternata. 2. S. foliis inferioribus ternatis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 279. *n.* 405. *t.* 136. *f.* 2.

1266. MALACHRA. *Cal. communis* 3polyphyllus, multiflorus, major; *proprius* duplex. *Caps.* 5. 1spermæ, in orbem positæ.

fasciata. 1. M. foliis serratis trilobis: infimis quinquelobis, involucro communi triphyllo subquinquefloro. *Jacq. coll.* 2. *p.* 352. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 68.

capitata. 2. M. foliis cordatis, calice communi triphyllo septemfloro. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 33. *f.* 1.

alceæfolia. 3. M. foliis basi cordatis quinquelobis, involucro communi pentaphyllo subdecemfloro. *Jacq. coll.* 2. *p.* 350.

radiata. 4. M. foliis palmatis, calice communi subhexaphyllo multifloro: floribus ebracteatis. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 33. *f.* 3.

bracteata. 5. M. foliis palmatis, calice communi polyphyllo multifloro: floribus minimis bractea munitis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 98. *n.* 168. *t.* 34. *f.* 2.

839. ALTHÆA. *Cal.* exterior 9fidus. *Caps.* plures, 1spermæ, immarginatæ.

officinalis. 1. A. foliis indivisis tomentosis. *Flor. dan. t.* 530. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 3.

grandiflora. 2. A. foliis cordatis angulatis tomentosis patulis, pedunculis subtrifloris. *Scop. del. ins.* 2. *p.* 33. *t.* 17.

corymbosa. 3. A. foliis indivisis cordatis angulatisve glabris, pedunculis calicibusque pilosis, floribus corymbosis. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 101.

narbonensis. 4. A. caule tomentoso, foliis cordatis dentatis: inferioribus angulatis acutis; superioribus subhastatis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 94. *n.* 163. *t.* 29. *f.* 2.

hirsuta. 5. A. foliis cordatis piloso-hispidis supra glabris, caulinis tri- & quinquelobis, pedunculis solitariis unifloris. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 170.

Ludwigii. 6. A. foliis quinquelobis utrinque nudis, pedunculis congestis unifloris. *Mant. p.* 98. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 30. *f.* 3.

cannabina. 7. A. foliis inferioribus palmatis dentatis: superioribus hastatis lacinia media longissima. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 101. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 3.

840. ALCEA. *Cal.* exterior 6fidus. *Caps.* plures, 1spermae, margine membranaceo, sulcato cinctae.

rosea. 1. A. foliis rugosis cordatis quinque-vel septangulis crenatis. *Mill. illustr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* R. 15.

sinensis. 2. A. foliis cordatis scabris crenatis angulatis, caule inferne ramoso. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 92. *n.* 158. *t.* 29. *f.* 3.

acaulis. 3. A. foliis numerosis cordatis rotundo-lobatis, floribus spicatis, caule crasso minimo. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 93. *n.* 160. *t.* 27. *f.* 3.

coromandeliana. 4. A. foliis subtriangularibus crenatis obtusis quinquenerviis, subtrilobis, floribus solitariis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 93. *n.* 159.

ficifolia. 5. A. foliis inferioribus palmatis septemlobis crenatis: superioribus hastatis. *Blackw. herb. t.* 54.

841. MALVA. *Cal.* duplex: exterior utplurimum 3phyllus. *Caps.* 8 aut plures in verticillum dispositae, 1loculares, rarius 2loculares, 1spermae, rarius polyspermae.

* *capsulis bilocularibus: loculis monospermis.*

caroliniana. 1. M. caule repente radicante, foliis superioribus multifidis, fructu cristato. *Dill. h. Elth. t.* 4. *f.* 4

prostrata. 2. M. caule humifuso angulato, foliis palmato-multifidis, fructu glabro. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 59. *n.* 95. *t.* 16. *f.* 3.

** *capsulis unilocularibus.*

† *polyspermis.*

elegans. 3. M. foliis pinnatifidis crispis cauleque tomentosis, fructu globoso: capsulis trispermis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 59. *n.* 96. *t.* 16. *f.* 1. *Suppl. p.* 307. Malva abutiloides.

angustifolia. 4. M. foliis ovato-lanceolatis dentatis angustis, fructu globoso tomentoso; capsulis subtrispermis, calice exteriore minimo setaceo. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 64. *n.* 104. *t.* 20. *f.* 3.

abutiloides. 5. M. caule frutescente, foliis angulatis planis tomentosis, pedunculo axillari multifloro. *Dill. h. Elth. t.* 1. *f.* 1. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 16. *f.* 2.

† † *capsulis monospermis.*
† *calice exteriore diphyllo.*

ægyptia. 6. M. caule erecto scabro, foliis palmatis dentatis, corollis calice brevioribus. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 65.

trifida. 7. M. foliis duplicato-trifidis, calicibus piloso-scabris. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 280. *n.* 406. *t.* 137. *f.* 2.

spithamea. 8. M. caule spithameo, foliis subrotundis crenulatis, calice exteriore submonophyllo. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 61. *n.* 99. *t.* 18. *f.* 3.

hispanica. 9. M. caule erecto villoso, foliis crenato-dentatis: inferioribus semiorbiculatis. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 19. *f.* 3.

stipulacea. 10. M. foliis inferioribus trilobis: superioribus palmato-incisis, stipulis longissimis, calice exteriore setaceo. *de Asso stirp. Arragon. p.* 90. *n.* 647. *t.* 5. *f.* 1.

Papaver. 11. M. caule hirsuto, foliis quinatis ternatisque. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 64. *n.* 102. *t.* 15. *f.* 3.

cuneifolia. 12. M. foliis lato-cuneiformibus supra crenatis, floribus solitariis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 64. *n.* 103. *t.* 20. *f.* 1.

† † *calice exteriori triphyllo.*
⊥ *foliolis angustissimis.*

scabra. 13. M. caule virgato scabro, foliis cordatis crenatis subrugosis, pedunculis solitariis subbifloris. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 281. *n.* 408. *t.* 138. *f.* 1.

operculata. 14. M. foliis cordatis quinquelobis tomentosis, floribus racemoso-spicatis, fructu operculato. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 65. *n.* 105. *t.* 35. *f.* 1.

capitata. 15. M. caule arborescente, foliis sinuatis quinquelobis: medio longissimo, floribus corymboso-capitatis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 280. *n.* 407. *t.* 137. *f.* 1.

scoparia. 16. M. foliis ovatis crenato-serratis, floribus axillaribus confertis, caule fruticoso, ramis virgatis. *Heritier stirp. nov. 3. p. 53. t. 27.*

coromandeliana. 17. M. ramis procumbentibus, foliis oblongis subserratis, floribus subspicatis, capitulis decem tricuspidatis.

cretica. 18. M. caule hirsuto, foliis cordatis subrotundo-lobatis crenatis, floribus solitariis longe pedunculatis. *Cavanill. diss. 2. p. 67. n. 108. & 5. t. 138. f. 2.*

Sherardiana. 19. M. caulibus prostratis, foliis orbiculatis plicatis tomentosis crenatis, pedunculis solitariis unifloris arcuatis. *Sp. pl. 1674. Jacq. h. Vind. 2. t. 142.*

parviflora. 20. M. caule patulo, foliis angulatis, floribus axillaribus sessilibus glomeratis; calicibus glabris patentibus. *Jacq. h. Vind. 1. t. 39.*

peruviana. 21. M. caule erecto herbaceo, foliis palmatis, spicis secundis axillaribus, capsulis denticulatis. *Jacq. h. Vind. 2. t. 156.*

limensis. 22. M. caule erecto scabro ramosissimo, foliis septemlobis rugosis, spicis axillaribus, capsulis lævibus. *Jacq. h. Vind. 2. t. 111.*

bryonifolia. 23. M. caule fruticoso tomentoso, foliis pinnatis scabris, pedunculis multifloris.

lactea. 54. M. frutescens, foliis angulatis acutis cordatis villosis, petalis obcordatis calice brevioribus, pedunculis paniculatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 448.*

bonariensis. 24. M. caule tomentoso, foliis trilobis, floribus glomeratis axillaribus subsessilibus. *Cavanill. diss. 2. p. 69. n. 114. t. 22. f. 1.*

virgata. 25. M. caule frutescente, foliis basi angustatis multiformibus partitis: laciniis inciso-crenatis, pedunculis unifloris. *Murray comm. Goett. 1779. p. 20. t. 6. β) Cavanill. diss. 2. t. 17. f. 3.*

grossulariæfolia. 26. M. caule hirsuto frutescente, foliis subsinuato-lobatis serratis rugosis, floribus solitariis, fructu hirsuto. *Dill. h. Elth. t. 169. f. 207. Cavanill. diss. 2. t. 24. f. 2.*

tridactylites. 27. M. caule frutescente ramosissimo, foliis cuneiformibus supra trilobis. *Cavanill. diss. 2. p. 73. n. 121. t. 21. f. 2.*

verticillata. 28. M. caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis sessilibus, calicibus scabris. *Jacq. h. Vind. 1. t. 40. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 8. t. 136. f. 1.*

rotundifolia. 29. M. caule proſtrato, foliis cordatis orbiculatis plicatis quinquelobis ſeptemlobiſque, pedunculis fructiferis declinatis. *Flor. dan. t.* 721.

americana. 30. M. caule erecto ramoſo, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus ſolitariis: terminalibus ſpicatis, capſulis tridentatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 22. *f.* 2.

†† *foliolis calicis latioribus, ovatis aut lanceolatis.*

fragrans. 31. M. caule fruteſcente viſcoſo, foliis cordatis crenatis quinque-vel ſeptemlobis, pedunculis ſolitariis unifloris capillaribus folio brevioribus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 33.

ſubhaſtata. 32. M. caule pilis adpreſſis, foliis ſubhaſtatis, floribus ſolitariis breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 72. *n.* 119. *t.* 21. *f.* 3.

retuſa. 33. M. foliis ſublanceolatis retuſis dentato-crenatis obtuſe trilobis, floribus ſubſpicatis, fructu glabro. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 73. *n.* 120. *t.* 21. *f.* 1.

Tournefortiana. 34. M. caule decumbente, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus ciliatis apice trifidis, pedunculis unifloris ſolitariis folio longioribus. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 17. *f.* 3.

criſpa. 35. M. caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 23. *f.* 1.

faſtigiata. 36. M. caule tomentoſo, foliis cordatis quinquelobis: lobis acutis; medio productiore, floribus faſtigiatis conglomeratis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 75. *n.* 124. *t.* 23. *f.* 2.

Alcea. 37. M. caule erecto glabro, foliis cordatis: ſuperioribus profunde quinquepartitis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 48. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

moſchata. 38. M. caule erecto, foliis radicalibus reniformibus inciſis: caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Mill. h. angl. t.* 17. *Curt. flor. Lond. n.* 42. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

lobata. 39. M. foliis ſubcordatis quinquelobis crenatis tomentoſis, floribus axillaribus faſtigiatiſque. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 76. *n.* 127. *t.* 18. *f.* 4.

abulenſis. 40. M. caule ſcabro-tomentoſo, foliis inferioribus baſi concavo-arcuatis: ſuperioribus cuneiformibus, floribus breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 76. *n.* 128. *t.* 34. *f.* 3.

ſinenſis. 41. M. caule herbaceo reclinato glaberrimo, foliis quinquelobis obtuſis crenatis, floribus axillaribus numeroſis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 77. *n.* 129. *t.* 25. *f.* 4.

mauritiana. 42. M. caule erecto ſubglabro, foliis cordatis crenatis quinquelobis; ſtipulis connatis, floribus numeroſis axillaribus pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 25. *f.* 2.

ſilveſtris. 43. M. caule ſcabro, foliis quinque-vel ſeptemlobis dentatis, calice exteriori ſubmonophyllo. *Curt. flor. Lond. t.* 89. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

nicæenſis. 44. M. caule decumbente calicibuſque glomeratis piloſis, foliis quinquelobis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 79. *n.* 134. *t.* 25. *f.* 1.

polyſtachya. 45. M. caule fruticoſo, foliis ovato-acuminatis ſerratis ſcabris, floribus ſpicatis, capſulis glabris muticis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 281. *n.* 409. *t.* 138. *f.* 3.

ſpicata. 46. M. foliis ſubcordatis crenatis ſubtrilobis ſcabriuſculis, floribus axillaribus ſolitariis: terminalibus denſe ſpicatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 20. *f.* 4.

ovata. 47. M. caule tomentoſo, foliis ovatis dentatis, ſpica denſiſſima oblonga. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 138. *f.* 1. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 81. *n.* 137. *t.* 20. *f.* 2.

calicina. 48. M. foliis cordatis crenatis indiviſis piloſo-hiſpidis, floribus ſolitariis longe pedunculatis: calice exteriori maximo. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 81. *n.* 138. *t.* 22. *f.* 4.

tomentoſa. 49. M. foliis cordatis crenatis tomentoſis, floribus lateralibus congeſtis, caule fruticoſo.

gangetica. 50. M. foliis cordatis obtuſis ſcabris, floribus ſeſſilibus glomeratis, capſulis denis muticis crenulatis. *Pluckn. phyt.* 74. *f.* 6.

acaulis. 51. M. acaulis, foliis lobatis denticulatis, ſcapis bi-vel quadrifloris. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 82. *n.* 141. *t.* 35. *f.* 2.

††† *calice exteriori tretraphyllo.*

capenſis. 52. M. caule fruticoſo, foliis glutinoſis crenato-dentatis quinquelobis: ſuperioribus trilobis, floribus binis cernuis, pedunculis fructiferis erectis petiolo longioribus. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 24. *f.* 3. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

pumila. 53. M. caule erecto, foliis quinquepartito-trifidis, calice exteriore filiformi. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 37.

842. LAVATERA. *Cal.* 2plex : exterior 3fidus. *Capf.* plures in orbem pofitæ, 1fpermæ, ftigmatum numero refpondentes.

* *caule arboreo.*

arborea. 1. L. foliis feptemangularibus tomentofis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *Cavanill. diff.* 5. *t.* 139. *f.* 2. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 2.

micans. 2. L. foliis feptemangularibus acutis crenatis plicatis tomentofis, racemis terminalibus. *Morif. hift. pl.* 1. *t.* 17. *f.* 9.

** *caule fruticofo.*

lufitanica. 3. L. foliis feptemangularibus tomentofis plicatis, racemis terminalibus. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 55.

africana. 4. L. foliis incanis quinquelobis crenatis, floribus cernuis geminis. *Cavanill. diff.* 5. *p.* 282. *n.* 410. *t.* 139. *f.* 1. *Mill. h. angl. t.* 161. *f.* 2.

olbia. 5. L. foliis dentatis : inferioribus quinquelobis; fuperioribus trilobis acutis, medio duplo longiore, floribus folitariis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 73.

triloba. 6. L. foliis fubcordatis fubtrilobis rotundatis crenatis: ftipulis cordatis, pedunculis aggregatis unifloris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 74.

maritima. 7. L. foliis cordatis fubrotundo-lobatis crenatis tomentofis, floribus folitariis. *Gouan. illuftr. t.* 25. *f.* 2.

americana. 8. L. foliis cordatis indivifis crenatis acuminatis tomentofis, pedunculis folitariis unifloris. *An potius Sidæ fpecies?*

*** *caule herbaceo.*

thuringiaca. 9. L. foliis inferioribus cordatis crenatis fubrotundo-lobatis; fummis haftatis, pedunculis longis folitariis unifloris. *Jacq. flor. auftr.* 4. *t.* 311. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 2.

cretica. 10. L. caule erecto fcabro, foliis cordatis feptemangulatis: fuperioribus acutis, floribus confertis axillaribus: pedunculis erectis unifloris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 41.

trimestris. 11. L. caule scabro, foliis inferioribus subrotundis: mediis quinquelobis; summis lobo medio longiore fructibus orbiculo tectis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 72. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 8. t. 136. f. 2.*

843. MALOPE. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus, *Caps.* plures in capitulum conglomeratæ, 1spermæ, subrotundæ.

malacoides. 1. M. foliis cordatis ovatis crenatis, floribus solitariis longissime pedunculatis. *Cavanill. diss. 2. t. 32. f. 1.*

multiflora. 2. M. foliis subrotundis crenatis villosis, floribus subquaternis axillaribus. *Cavanil. diss. 2. p. 85. n. 145.*

trifida. 3. M. foliis crassis trinerviis trifidis dentatis, floribus solitariis axillaribus longissime pedunculatis. *Cavanill. diss. 2. p. 85. n. 144. t. 27. f. 2.*

844. URENA. *Cal.* duplex: exterior 5fidus. *Caps.* 5 1loculares, echinatæ, 1spermæ.

lobata. 1. U. foliis triglandulosis angulatis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 185. f. 1. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 8. t. 135. f. 2.*

tricuspis. 2. U. foliis uniglandulosis ovato-angulatis: angulis acuminatis serratis, caule piloso. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 334. n. 489. t. 183. f. 1.*

sinuata. 3. U. foliis triglandulosis sinuato-palmatis sinubus obtusis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 185. f. 2.*

procumbens. 4. U. foliis oblongis sinuatis serratis, caule procumbente.

leptocarpa. 5. U. foliis lanceolatis serratis. *Suppl. p. 308.*

reticulata. 6. U. foliis sinuato-serratis uniglandulosis reticulatis: inferioribus trilobis, reliquis lanceolatis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 335. n. 491. t. 183. f. 2.*

multifida. 7. U. foliis uniglandulosis sinuato-multifidis: sinubus rotundatis denticulatis, caule ramosissimo. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 336. n. 493. t. 184. f. 2.*

americana. 8. U. foliis trifidis basi integris. *Suppl. p. 308. nonne mera sinuatæ varietas?*

9. U.

viminea. 9. U. foliis uniglandulosis, inferioribus rotundato-acutis sublobatis, superioribus lanceolatis serratis, calice exteriore majore. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 335. n. 492. t. 184. f. 1.*

Typhalæa. 10. U. foliis lato-lanceolatis, capsularum mucronibus tribus retro denticulatis. *Mant. 258. Cavanill. diss. bot. 6. t. 197. an cum leptocarpa potius ad pavoniam amandanda ?*

845. GOSSYPIUM. *Cal.* duplex, exterior 3fidus. *Caps.* 3-4locularis. *Sem.* lana obvoluta.

arboreum. 1. G. foliis palmatis, lobis lanceolatis, caule fruticoso. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 165.*

rubrum. 2. G. foliis quinquelobis, venis rubentibus, caule fruticoso. *Forsk. flor. æg. arab. p. 125. an distincta species ?*

herbaceum. 3. G. foliis quinquelobis subtus uniglandulosis, caule herbaceo. *Regn. botan. t. 376.*

eglandulosum. 4. G. foliis quinquelobis eglandulosis, lobis tribus oblongis acuminatis, caule villoso. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 354. n. 518. an vere distinctum ab herbaceo ?*

micranthum. 5. G. foliis quinquelobis uniglandulosis glaberrimis, calice corollam superante. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 311. n. 445. t. 193.*

peruvianum. 6. G. foliis quinquelobis acutis triglandulosis, calicibus exterioribus triphyllis triglandulosis. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 313. n. 449. t. 168.*

hirsutum. 7. G. foliis subquinquelobis subtus uniglandulosis, ramulis petiolisque hirsutis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 167.*

vitifolium. 8. G. foliis quinquelobis palmatis uniglandulosis acutis, calice exteriori profunde laciniato. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 311. n. 447. t. 166.*

indicum. 9. G. foliis subtrilobis, subtus eglandulosis, lobis cuneatis brevibus. *Cavanill. diss. bot. 6. p. 314. n. 451. t. 169.*

religiosum. 10. G. foliis superioribus trilobis acutis subtus triglandulosis, ramulis nigro-punctatis. *Cavanill. diss. bot. 6. t. 164. f. 1. Gaertn. de fr. et sem. pl. cent. 8. t. 134. f. 1.*

barbadense. 11. G. foliis superioribus trilobis integerrimis subtus triglandulosis. *Pluckn. alm. t. 188. f. 1.*

latifolium. 12. G. foliis acutis, infimis indivisis, reliquis trilobis subtus uniglandulosis. *Murray comm. Goett.* 1776. *p.* 32. *t.* 1.

CIENFUEGOSIA. *Cal.* 2plex, exterior 12phyllus. *Caps.* globoso-acuminata, 3valvis, 3locularis: loculis 1spermis.

digitata. 1. CIENFUEGOSIA. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 174. *n.* 259. *t.* 72. *f.* 2.

PAVONIA. *Cal.* 2plex, exterior polyphyllus. *Caps.* 5 in orbem positæ, articulatim dehiscentes, 2valves, 1loculares, 1spermæ.

* *capsulis spinosis.*

spinifex. 1. P. caule arborescente, foliis ovato-lanceolatis inæqualiter dentatis, tubo stigmatibusque decumbentibus, capsulis aristatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 463. Hibiscus spinifex. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 103.

aristata. 2. P. caule fruticoso humili, foliis cordatis ovato-lanceolatis crenatis scabriusculis, floribus solitariis, capsulis aristatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 133. *n.* 189. *t.* 45. *f.* 3.

** *capsulis muticis.*

† *calice interiori breviori, exteriore cancellato.*

zeylanica. 3. P. caule herbaceo hirto, foliis cordatis crenato-dentatis, inferioribus subrotundis, superioribus profunde tri-vel quinquefidis, pedunculis elongatis geniculatis unifloris. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 134. *n.* 191. *t.* 48. *f.* 2.

cancellata. 4. P. caule debili hirto, foliis cordatis serratis, calicibus globosis, radiis vicenis subulatis hirtis. *Suppl. p.* 311. Hibiscus cancellatus.

paniculata. 5. P. caule hirto ramoso, foliis cordatis subrotundis acuminatis crenato-dentatis sæpe tricuspidatis, floribus paniculatis, genitalibus declinatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 135. *n.* 193. *t.* 46. *f.* 2.

†† *calice interiore exteriorem superante.*

spicata. 6. P. foliis cordatis ovato-acuminatis serratis hirtis rugosis, thyrso terminali. *Vogel apud Trew pl. rar. t.* 90. *an forsan altheæ potius species ?*

urens. 7. P. caule fruticofo fuburente, foliis palmatis, floribus axillaribus glomeratis fubfeffilibus. *Cavanill. diff.* 3. *p.* 137. *n.* 195. *t.* 49. *f.* 1. & 5. *p.* 283.

haftata. 8. P. foliis haftatis crenato-dentatis fupra punctatis, floribus folitariis longe pedunculatis. *Cavanill. diff.* 3. *p.* 138. *n.* 196. *t.* 47. *f.* 2.

Columella. 9. P. foliis dentatis angulatis, inferioribus latis; fuperioribus oblongis, floribus axillaribus folitariis: pedunculo brevi. *Cavanill. diff.* 3. *p.* 138. *n.* 197. *t.* 45. *f.* 3.

cuneifolia. 10. P. caule fruticofo, foliis obfolete cordatis ovato-truncatis crenatis, floribus folitariis erectis longe pedunculatis, calicibus glabris. *Cavanill. diff.* 3. *p.* 139. *n.* 198. *t.* 45. *f.* 1.

præmorfa. 11. P. hirfuta, foliis ovatis bafi angufiato-cordatis apice præmorfis crenatis, calicibus tomentofis, capfulis tuberculatis. *Suppl. p.* 309. Hibifcus præmorfus.

coccinea. 12. P. foliis cordatis fubtrilobis pubefcentibus, floribus folitariis revolutis. *Cavanill. diff.* 3. *p.* 140. *n.* 200. *t.* 47. *f.* 1.

papilionacea. 13. P. caule tereti tomentofo, foliis cordatis dentatis fubrotundo-acuminatis, floribus folitariis, genitalibus declinatis. *Cavanill. diff.* 3. *p.* 140. *n.* 201. *t.* 49. *f.* 1.

MALVAVISCUS. *Cal.* 2plex, exterior 8phyllus, interior 1phyllus, tubulofus, 10ftriatus, apice 5dentatus. *Petala* bafi auriculata. *Tubus* ftamina fuftinens, longiffimus, contortus. *Drupa* 5locularis, loculis 1fpermis.

arboreus. 1. M. foliis fcabriufculis acuminatis, calicis exterioris foliolis erectis. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 463. Hibifcus Malvavifcus. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 54.

pilofus. 2. M. foliis pilofis obtufis acutifque. *Swartz nov. pl. gen. & fp. p.* 102. Achenia pilofa.

mollis. 3. M. foliis tomentofis, calicis foliolis externis patulis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 459.

846. HIBISCUS. *Cal.* 2plex, exterior polyphyllus aut multifidus. *Capſ.* 5valvis, 5locularis, loculis polyſpermis, ramis 1ſpermis.

* *capſularum loculis monoſpermis.*

lævis. 1. H. inermis herbaceus glaber, foliis ovalibus trilobis, pedunculis ſolitariis articulatis unifloris. *Scop. del. inſ.* 3. *p.* 33. *t.* 17.

pentacarpos. 2. H. caule annuo glaberrimo, foliis cordatis ſubhaſtatis acuminatis ſerratis, floribus ſubnutantibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 66. *f.* 3.

militaris. 3. H. foliis ſerratis haſtatis acutiſſimis, floribus magnis, petalis bifidis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 352. *n.* 399. *t.* 198. *f.* 2.

virginicus. 4. H. foliis inferioribus cordatis acuminatis ſerratis, ſuperioribus haſtatis. *Pluckn. phyt.* 6. *f.* 4. *an ſatis diſtinctus a pentacarpo?*

haſtatus. 5. H. foliis haſtatis ſerratis oblongis anguſtis, floribus ſolitariis, capſula tomentoſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 144. *n.* 203. *t.* 50. *f.* 1.

acuminatus. 6. H. caule tomentoſo, foliis cordatis ſubrotundo-acuminatis, capſula pentagona tomentoſa depreſſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 144. *n.* 204. *t.* 50. *f.* 2.

ovatus. 7. H. foliis ovatis integerrimis ciliatis trinerviis ſubtus villoſis, floribus axillaribus ſolitariis, pedunculis folio brevioribus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 143. *n.* 202. *t.* 50. *f.* 3.

** *capſularum loculis polyſpermis.*

† *caule aculeato.*

vitifolius. 8. H. caule herbaceo, foliis quinquangulis crenatis villoſis, floribus ſolitariis cernuis, capſula pentaptera. *Mant. p.* 569. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 58. *f.* 2. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 4.

ſtriatus. 9. H. caule ſulcato, foliis haſtatis glabris ſerratis, calice interiori ſtriato, inflato inermi. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 146. *n.* 207. *t.* 54. *f.* 1.

bifurcatus. 10. H. caule fruticoso, foliis serratis, inferioribus trilobis, mediis hastatis, superioribus lanceolatis, calicis exterioris foliolis bifurcatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 146. *n.* 208. *t.* 51. *f.* 1.

trilobus. 11. H. caule arboreo, foliis trilobis serratis, floribus solitariis, pedunculis inermibus. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 147. *n.* 209. *t.* 53. *f.* 2.

sinuatus. 12. H. foliis cordatis dentatis quinquelobis, calicibus deciduis, interioribus latere rumpendis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 147. *n.* 210. *t.* 52. *f.* 2.

speciosus. 71. H. foliis glabris palmatis, laciniis lanceolatis serratis, caule pedunculis calicibusque lævibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 456.

ficulneus. 13. H. caule fruticoso verrucoso ramosissimo, foliis quinquefido-palmatis, superioribus oblongis ovato-lanceolatis, floribus subspicatis terminalibus. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 51. *f.* 2.

cannabinus. 14. H. caule herbaceo glabro, foliis superioribus palmatis quinquepartitis serratis uniglandulosis, floribus sessilibus, calicibus glandulosis. *Ehret. pict. t.* 6. *f.* 1.

surattensis. 15. H. aculeis recurvis, foliis digitatis, calicibus appendiculatis. *Mant. p.* 436. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 53. *f.* 1.

radiatus. 16. H. caule frutescente, foliis palmatis, lobis lanceolatis dentatis, floribus breviter pedunculatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 150. *n.* 214. *t.* 54. *f.* 2.

digitatus. 17. H. foliis digitatis, foliolis inæqualibus lanceolatis serratis, floribus solitariis subsessilibus, calicibus monophyllis inermibus. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 151. *n.* 215. *t.* 70. *f.* 2.

diversifolius. 18. H. caule arboreo, foliis inferioribus quinquelobis, superioribus trilobis, summis indivisis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. *Jacq. coll.* 2. *p.* 307.

domingensis. 70. H. caule arboreo senescente inermi, foliis omnibus quinquelobis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. *Jacq. coll.* 3. *p.* 213.

†† *caule inermi.*

ΓΓ *calice exteriori monophyllo.*

tiliaceus. 19. H. caule arboreo, foliis cordatis subrotundis indivisis acuminatis crenatis, calice exteriori decemdentato. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 55. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 4.

tricuspis. 20. H. caule arboreo, foliis trilobis, lobis acutis productis; stipulis magnis acutis, floribus racemosis. *Suppl. p.* 310. Hibiscus hastatus. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 55. *f.* 2.

††*calice exteriori polyphyllo.*
†*interiori hemisphærico.*

populneus. 21. H. caule arboreo, foliis cordatis acuminatis integerrimis, calice exteriori triphyllo deciduo. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 56. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 3.

liliiflorus. 22. H. caule arboreo, foliis lanceolato-ovatis oblongis trinerviis, paucis tripartitis, corolla insigni, tubo longissimo. *Cavanill. diss.* 3 *p* 154. *n.* 219. *t.* 57 *f.* 1.

Lampas. 23. H. foliis subcordatis latis acuminatis trilobis supra punctatis, calice exteriori minimo setaceo, interiori laciniis longissimis angustissimis terminato. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 154. *n.* 220. *t.* 56. *f.* 2.

††*calice interiori tubulato-dentato, aut semiquinquepartito.*

⊥ *foliis integris aut vix lobatis.*

micranthus. 24. H. foliis subrotundis serratis, corollis reflexis obliquis. *Suppl. p.* 308. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 66. *f.* 1.

æthiopicus. 25. H. caule fruticoso minimo, foliis ovato-retusis apice dentatis, floribus axillaribus terminalibusque. *Mant. p.* 258. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 61. *f.* 1.

rhombifolius. 26. H. caule fruticoso glabro, foliis rhomboideis, lateribus superioribus crenatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 156. *n.* 223. *t.* 69. *f.* 3.

rigidus. 27. H. suffruticosus hirsutus, ramis simplicibus, foliis oblongis serratis, corollæ limbo reflexo, seminibus lanatis. *Suppl. p.* 310.

hirtus. 28. H. caule herbaceo scabro, foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis, floribus solitariis, calice exteriori longiori. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 67. *f.* 3.

microphyllus. 72. H. foliis ovalibus hirtis anterius serratis, caule fruticoso. *Vahl. symb. bot.* 1. *p.* 50. *an hujus tribus?*

ovalifolius. 73. H. foliis ovalibus subangulatisque, calicibus exterioribus pentaphyllis. *Vahl. symb. bot.* 1. *p.* 50.

phoeniceus. 29. H. caule fruticoso hirsuto, foliis serratis acuminatis saepe subtrilobis, floribus rubris, seminibus lanatis. *Suppl. p.* 310. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 14.

unilateralis. 30. H. caule fruticoso, foliis ovato-acutis mollibus, tubo staminifero altera parte longitudinaliter nudo. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 158. *n.* 227. *t.* 67. *f.* F. 2.

Rosa sinensis. 31. H. caule arboreo, foliis ovatis acuminatis serratis glabris. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 16. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 69. *f.* 2.

membranaceus. 32. H. foliis cordatis oblongo-acuminatis obsolete denticulatis, calice interiori tubuloso membranis quinque instructo. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 159. *n.* 229. *t.* 57. *f.* 2.

cordifolius. 33. H. arboreus tomentosus, foliis cordatis ovatis serratis, floribus pedunculatis terminalibus, calice elongato. *Suppl. p.* 309.

lasiocarpos. 34. H. foliis ovato-lanceolatis crenato-serratis tomentosis subtus incanis, capsula ovato-acuminata setosa. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 159. *n.* 231. *t.* 70. *f.* 1.

sororius. 35. H. foliis cordatis crenatis scabris, calice exteriori tereti apice dilatato. *Suppl. p.* 311.

senegalensis. 36. H. foliis cordatis subangulosis tomentosis, calice interiori breviori, exteriori cancellato. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 160. *n.* 233. *t.* 68. *f.* 1.

tubulosus. 37. H. caule frutescente hirsuto, foliis cordatis angulatis crassis tomentosis, floribus solitariis, calicis exterioris apicibus spatulatis recurvis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 161. *n.* 234. *t.* 68. *f.* 2.

urens. 38. H. tomentosus, foliis reniformibus crenatis, calicibus lanatis corolla longioribus. *Suppl. p.* 309. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 67. *f.* 1.

ferrugineus. 39. H. caule tomentoso-ferrugineo, foliis cordatis oblongis obtusis scabris basin versus latioribus, floribus solitariis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 162. *n.* 236. *t.* 60. *f.* 1.

‡ ‡ *foliis angulatis aut lobatis.*

Moscheutos. 40. H. foliis ovatis acuminatis serratis, petiolis floriferis, caule simplicissimo. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 65. *f.* 1.

palustris. 41. H. caule herbaceo simplicissimo, foliis ovatis subtrilobis subtus tomentosis, floribus axillaribus. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 65. *f.* 2.

pedunculatus. 42. H. caule fruteſcente, foliis quinquelobis trilobisque hirſutis, pedunculis axillaribus unifloris elongatis. *Suppl. p.* 309. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 66. *f.* 2.

ſpicatus. 43. H. caule hirto, foliis cordatis quinque-vel ſeptemlobis valde tomentoſis, ſtipulis utrinque ſex, floribus ſpicatis ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 163. *n* 240. *t.* 69. *f.* 1.

flaveſcens. 44. H. caule pilis aureis hirſuto, foliis palmato-quinquelobis hirſutis, floribus numeroſis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 164. *n.* 242. *t.* 70. *f.* 3.

braſilienſis. 45. H. foliis cordatis denticulatis, calicibus exterioribus duplo longioribus, caule fruticoſo, ramis hirtis.

mutabilis. 46. H. caule arboreo, foliis cordatis quinquangulis, acuminibus productis acutis, capſula obovata rugoſa. *Merian. ſurin. t.* 31.

clypeatus. 47. H. foliis cordatis angulatis, capſulis turbinatis truncatis hirſutiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 58. *f.* 1.

columnaris. 48. H. foliis cordatis rotundato-angulatis ſubtomentoſis, calicibus monophyllis, tubo ſtamina ſuſtinente longiſſimo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 166. *t.* 69. *f.* 2.

micans. 49. H. foliis cordatis latis quinquangulis tomento lucidis, calice exteriori monophyllo ſexpartito, corolla extrinſecus tomontoſa nervoſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 167. *t.* 60. *f.* 2.

Abelmoſchus. 50. H. foliis ſubpeltato-cordatis ſeptangulis, caule hiſpido. *Merian. ſurin. t.* 42.

palmatus. 51. H. radice craſſa alba fungoſa, foliis cordatis palmato-lobatis, pedunculis nutantibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 168. *n.* 249. *t.* 63. *f.* 1.

eſculentus. 52. H. caule herbaceo craſſo, foliis quinquelobis crenatis ſubpedatis, calice utroque deciduo, capſula corniculata. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 35.

ſyriacus. 53. H. caule fruticoſo, foliis cuneiformi-ovatis trilobis inæqualiter dentatis glabris ſubcordatis, ſeminibus zona hiſpida. *Knorr. del. hort.* 1. *t. K.* 2. a. & b.

Sabdariffa. 54. H. caule herbaceo glaberrimo, foliis crenatis, inferioribus ovatis, ſuperioribus tripartitis, floribus ſolitariis axillaribus ſubſeſſilibus. *Jacq. obſ.* 2. *t.* 35.

elatus. 55. H. foliis cordatis ſubrotundis integris, pedunculis breviſſimis unifloris, calice decemdentato. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 95. *t.* 134. *f.* 2. 3.

┴ ┴ ┴ *foliis profundius fissis.*

fraternus. 56. H. calicibus exterioribus radiis teretibus, apice mucronato-concavo, foliis trilobis. *Suppl. p.* 311. *Merian. surin. t.* 37. *an distinctus satis a Sabdariffa?*

Manihot. 57. H. foliis palmato-digitatis septempartitis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 56.

vesicarius. 58. H. caule herbaceo hispido urente, foliis imis subrotundo-crenatis indivisis, reliquis quinquelobis obtusis crenatis, calicibus inflatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 17. *n.* 253. *t.* 64. *f.* 2.

Trionum. 59. H. caule herbaceo scabro, foliis tripartitis dentato-serratis lobo medio longissimo lanceolato, calicibus inflatis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 55. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 134. *f.* 6.

ternatus. 60. H. caule humili herbaceo, foliis ternatis, calicibus inflatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 172. *n.* 255. *t.* 64. *f.* 3.

*** *tribus incertae.*

calyphyllus. 61. H. foliis cordatis crenatis latis subtrilobis, calice exteriore folioso maximo. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 283. *n.* 411. *t.* 140.

arenarius. 62. H. glutinosus, foliis profunde trilobis, lobis lateralibus inaequalibus bilobis, calice exteriori foliolis setaceis glanduloso-pilosis. *Scop. del. ins.* 3. *t.* 2.

praecox. 63. H. caule suffruticoso, capsula hispida. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 125. *n.* 92. *an distincta species?*

purpureus. 64. H. foliis cordato-oblongis acutis serratis, stigmatibus quinque longis apice capitatis, capsula superne septemalata. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 126.

tripartitus. 65. H. acauleato hispidus, foliis tripartitis, lobis lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus, capsulis pilosis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 126.

hispidulus. 66. H. caule hispido, foliis palmatis dentatis glabris, calicis exterioris laciniis linearibus. *Forks. flor. aeg. arab. p.* 126.

trilobatus. 67. H. foliis trilobis serratis, caule aculeato. *Burm. amer. p.* 152. *t.* 159.

gujanensis. 68. H. foliis ovato-oblongis denticulatis, capsulis aculeatis, aculeis recurvis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 708.

aculeatis. 69. H. pilosus, foliis infimis cordatis angulatis serratis, supremis palmatis lobatis, calicibus aculeatis. *Walt. flor. carol. p.* 177.

RUIZIA. *Cal.* 2plex, exterior 3phyllus, deciduus, interior perſiſtens, 5partitus. *Petala* 5 falcata. *Filamenta* baſi in urceolum coalita. *Stili* 10 *Capſ.* 10 in orbem poſitæ, dorſo lignoſæ, 1loculares, 2ſpermæ.

cordata. 1. R. foliis cordatis oblongo-acuminatis ſinuato-crenatis incanis ſubtus pulverulentis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 117. *n.* 169. *t.* 36. *f.* 2.

lobata. 2. R. foliis cordatis oblongis crenatis tri-vel quinquelobis, lobo medio productiore acuminato. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 118. *n.* 170. *t.* 36. *f.* 1.

palmata. 3. R. foliis incanis palmatis inciſis quinquepartitis, lobis acuminatis ſinuato-crenatis, medio productiore. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 119. *n.* 171. *t.* 37. *f.* 1.

laciniata. 4. R. foliis ad petiolum uſque laciniatis, laciniis ſeptem anguſtiſſimis linearibus pinnatifidis, pinnulis decurrentibus. *Cavanill. diſſ. p.* 119. *n.* 172. *t.* 37. *f.* 2.

CURUPITA. *Cal.* ſimplex, 6partitus, ſuperus. *Cor.* 6fida, inæqualis. *Stigma* 6ſtriatum. *Capſ.* ampliſſima, ſphærica, includens alteram globoſam pulpa fartam, 6locularem, polyſpermam.

gujanenſis. 1. Curupita. *Aubl. pl. guj* 2. *p.* 708. *t.* 282.

347. **STEWARTIA.** *Cal.* ſimplex, 1phyllus, ſemiquinquefidus. *Germen* orbiculatum, hirſutum. *Stil.* ſimplex, filiformis. *Fructus* conicus lignoſus, in pyramides 5 3angulares partibilis, inter quarum ſuperficies *ſem.* 2.

virginica. 1. Stewartia. *Catesb. Car.* 3. *t.* 13.

MALACHODENDRON. *Cal.* ſimplex, 1phyllus, ſubquinquefidus. *Petala* lacero-fimbriata. *Filamenta* baſi in urceolum brevem connata. *Stil.* 5. *Capſ.* 5. coadunatæ 2valves, 1ſpermæ.

ovatum. 1. M. foliis glabris. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 102. *n.* 437. *t.* 158. *f.* 2.

corchoroides. 2. M. foliis villoſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 126. *n.* 98. Stewartia corchoroides.

1344. GORDONIA. *Cal.* ſimplex. *Stil.* 5gonus, apice 5fidus. *Capſ.* 5locularis. *Semina* bina, ala foliacea.

Laſianthus. 1. G. foliis utrinque glabris, floribus pedunculatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 509. Hypericum. Laſianthus. *Ellis act. angl. p* 60. *ad ann* 1770. *p.* 518. *t.* 11. *Catesb. Car.* 1. *t.* 44.

pubeſcens. 2. G. foliis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſeſſilibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 308. *n.* 442. *t.* 162. *an cum. Laſiantho polyandriarum potius claſſi inſerenda?*

848. CAMELLIA. *Cal.* imbricatus, polyphyllus, foliolis interioribus majoribus.

japonica. 1. C. foliis acute ſerratis acuminatis. *Jacq. pl. ar. ic. bot.* 2. *t.* 43.

Saſanqua. 2. C. foliis ovatis obtuſe ſerratis emarginatis. *Thunb. flor. jap. p.* 263. *t.* 29.

665. MESUA. *Cal.* ſimplex, 4phyllus. *Cor.* 4petala. *Piſt.* 1. *Nux* 4gona, 1ſperma.

Ferrea. 1. M. foliis lanceolatis. *Rumpf. amd.* 7. *t.* 2.

glabra. 2. M. foliis orbiculato-retuſis crenatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 100. *n.* 9.

MYRODIA. *Cal.* ſimplex, 1phyllus. *Petala* 5. *Drupa* ſicca: *Nuces* binæ.

turbinata. 1. MYRODIA. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 102. *an diſtinctum a Quararibea genus?*

642. MORISONIA. *Cal.* ſimplex, 2fidus. *Cor.* 4petala. *Piſt.* 1. *Bacca* corticata, 1locularis, polyſperma, pedicellata.

americana. 1. MORISONIA. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 144. *Gærtn. de fr. & ſem. cent.* 5. *t.* 78. *f.* 1. *an capparidis forſan ſpecies?*

1081. DALECHAMPIA. *Flores* monoici. *Involucrum* commune exterius foliolis 4, interius foliolis 2 3fidis. *Cor.* o.

♂. *Umbellula* 10flora: *involucello* 2phyllo; paleis numeroſis. *Perianthium proprium* 5phyllum.

♀. *Floſculi* 3: *involucello* 3phyllo. *Perianthium proprium* 11phyllum. *Stil.* filiformis. *Capſ.* 3cocca.

colorata. 1. D. foliis integerrimis. *Suppl. p.* 421.

ſcandens. 2. D. foliis trifidis ſerratis. *Mant. p.* 496. *Suppl. p.* 421. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 239.

1135. TAXUS. *Flores* dioici. *Cor.* o. *Cal.* gemmæ 4phyllus, *aut* 7phyllus.
♂. *Antheræ* peltatæ, 8fidæ.
♀. *Stil.* o. *Sem* 1. receptaculo baccante, integerrimo, ſeminudum.

verticillata. 1. T. foliis verticillatis linearibus falcatis. *Thunb. flor. jap. p.* 276.

baccata 2. T. foliis ſolitariis linearibus cuſpidatis approximatis, receptaculis maſculis ſubgloboſis. *Blackw. herb. t.* 572. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 6.

elongata. 3. T. foliis lineari-lanceolatis, receptaculis maſculis filiformi-cylindricis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 415.

nucifera. 4. T. foliis ſolitariis linearibus cuſpidatis remotis. *Kæmpf. amoen. exot.* 5. *p.* 814. 815. *ic. Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 6.

macrophylla. 5. T. foliis ſolitariis lanceolatis remotis. *Thunb. flor. jap. p.* 276. *Banks ic. Kaempf. t.* 24.

1077. PINUS. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* gemmæ ſquamæ hiantes. *Antheræ* nudæ.
♀. *Cal.* ſtrobili: *Squama* 2flora. *Piſt.* 1. *Nux* ala membranacea excepta, 1locularis, evalvis.

* *foliis pluribus ex eadem vagina.*

ſilveſtris. 1. P. foliis geminis rigidis, ſtrobilis ovato-conicis ſubgeminis foliorum longitudine, ſquamis oblongis obtuſis. *Oelhaf. Abb. t.* 1-4. β) Pinus montana. *Brückn. ſpec.* 1. *f.* 1. γ) Pinus rubra. *du Hamel arbr.* 2. *t.* 30.

Pinaſter. 2. P. foliis geminis margine ſubaſperis, ſtrobilis oblongo-conicis folio brevioribus, ſquamis echinatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367.

virginiana. 3. P. foliis geminis, ſtrobilis ſolitariis conicis longitudine foliorum oblongo, ſquamarum aculeis rectis. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 35. *n.* 3. β) Pinus echinata.

resinosa. 4. P. foliis geminis, strobilis ovato-conicis basi rotundatis solitariis folio dimidio brevioribus, squamis inermibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367.

halepensis.* 5. P. foliis geminis, strobilis ovato-conicis basi rotundatis folio subbrevioribus, squamis obtusis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367. *Mill. h. angl. t.* 208.

glabra. 6. P. foliis geminis, strobilis oblongo-ovatis brevibus, cortice glabro. *Walt. flor. carol. p.* 237.

Pinea. 7. P. foliis geminis primordialibus ciliatis, strobilis ovatis obtusis subinermibus folio longioribus lucidis, squamis oblongis obtusis, nucibus duris ovatis ala destitutis. *Blackw. herb. t.* 189. *Regn. bot. t.* 276.

maritima. 8. P. foliis geminis, strobilis pyramidatis, squamis oblongis obtusis apice lucidis. *du Hamel arbr.* 2. *t.* 29. *β*) *du Hamel arbr.* 2. *t.* 28. *an mera varietas silvestris?*

squarrosa. 9. P. foliis geminis glabris brevibus, strobilis ovatis squarrosis, cortice scabro. *Walt. flor. carol. p.* 237.

lutea. 10. P. foliis ternis pedalibus, strobilis ovato-subulatis, spinis rectis. *Walt. flor. Carol. p.* 237.

rigida. 11. P. foliis ternis, strobilis pyramidatis confertis, squamis oblongis acutis. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 46. *Hort. angl. t.* 16. *an mera tædæ varietas?*

Tæda. 12. P. foliis ternis, strobilis oblongo-conicis folio brevioribus aggregatis, squamis oblongis obtusis echinatis.

palustris. 13. P. foliis ternis longissimis, strobilis subcylindricis echinatis, ramis stipulis ramentaceis asperis.

occidentalis. 14. P. foliis quinis margine scabris longissimis, strobilis oblongis, squamis apice truncatis. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 103. *Plum. ic. t.* 161.

strobus. 15. P. foliis quinis margine scabris, strobilis cylindricis folio longioribus pendulis, squamis ovalibus planis laxis. *Hort. angl. t.* 17.

Cembra. 16. P. foliis quinis, strobilis ovatis obtusis erectis, squamis appressis ovalibus concavis, nucibus duris cuneiformibus ala destitutis. *Pallas flor. ross. t.* 2. *Trew cedr. liban. mant. t.* 7.

Larix. 17. P. foliis fasciculatis mollibus obtusiusculis deciduis, strobilis ovato-oblongis, bracteis extra squamas ovatas

subscabra margine laceras exstantibus. *Pallas flor. ross. t.* 1. *Blackw. herb. t.* 477.

laricina. 18. P. foliis fasciculatis deciduis, strobilis subglobosis, squamis laxis orbiculatis glabris. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 83. *t.* 3. *f.* 5-7.

pendula. 19. P. foliis fasciculatis mollibus obtusiusculis, strobilorum squamis bracteas obtegentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 369.

Cedrus. 20. P. foliis fasciculatis perennibus, strobilis ovatis obtusis erectis, squamis appressis rotundis, cortice lævi. *Trew Ehret. t.* 1. 60. 61. & *Cedr. hist. apol. cum mant. t.* 1-4.

** *foliis solitariis basi distinctis.*

Abies. 21. P. foliis planis emarginatis pectinatis, strobilis oblongis erectis, squamis obtusissimis appressis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 632. Pinus Picea. *Blackw. herb. t.* 203. *Gaert. de fr. et sem. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1.

Balsamea. 22. P. foliis planis emarginatis subpectinatis supra suberectis, strobis ovato-oblongis erectis, florentis squamis reflexis acuminatis. *Hort. angl. t.* 6.

americana. 23. P. foliis obtusis, strobilis subrotundis, squamis subrotundis planis, cortice lævi. *Pluckn. alm.* 2. *t.* 121. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1.

Picea. 24. P. foliis subtetragonis acutiusculis distichis, ramis infra nudis, strobilis subcylindricis, squamis ovalibus planis margine undulatis lacerisque. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 633. Pinus Abies. *Flor. dan. t.* 193. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1.

alba. 25. P. foliis tetragonis lateralibus incurvis, ramis subtus nudiusculis, conis subcylindricis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 371.

canadensis. 26. P. foliis subulatis bifariam versis, ramulis glabris, cicatricibus sub foliis decurrentibus, strobilis ovato-oblongis pendulis laxis, squamis subrotundis. *Miller hort. angl. t.* 1. *an eadem cum americana?*

mariana. 27. P. foliis subulatis bifariam versis, ramulis pubescentibus, cicatricibus sub foliis sessilibus, strobilis ovalibus pendulis, squamis ovalibus margine laceris undulatisque. *Seligm. av.* 5. *t.* 1. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 91. *f.* 1.

arauca-na. 28. P. foliis turbinatis imbricatis hinc mucronatis, ramulis quaternis cruciatis, ſtrobilis globoſis pendulis, nucibus conicis hyalinis ala deſtitutis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 157. *utrum hujus, an diſtincti generis?*

cupreſ-ſoides. 29. P. foliis imbricatis acutis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 144. *an diſtincta ſpecies.*

1085. RICINUS. *Flores* diclini. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 5partitus.
♀. *Cal.* 3partitus. *Stil.* 3. 2partiti.
Capſ. duplicatæ, aggregatæ.
Pericarpia intus nidulantia.

medicus. 1. R. foliis palmatis ſeptemlobis, lobis lanceolatis, infimis divaricatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 164.

inermis. 2. R. foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis, petiolis glanduloſis, capſulis inermibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 28.

communis. 3. R. foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis cauleque coloratis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 27.

Tanarius. 4. R. foliis peltatis repandis. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 121.

Mappa. 5. R. foliis peltatis indiviſis. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 108.

dioicus. 6. R. foliis cordatis acuminatis. *Forſt. fl. auſtr. p.* 67.

CLASSIS XVI.

DIADELPHIA.

PENTANDRIA.

851. MONNIERIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens. *Filamentum* superius antheris 2 : inferius 3. *Capsulæ* 5.

HEXANDRIA.

849. FUMARIA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* ringens basi gibbosa, nectarifera. *Filamenta* antheris 3.

1267. SARACA. *Cal.* o. *Cor.* 4fida. *Filamenta* utrinque 3 connexa.

OCTANDRIA.

850. POLYGALA. *Cal.* laciniæ 2 alæformes. *Cor.* vexillum cylindricum. *Stamina* connexa. *Caps.* obcordata, 2locularis.

851. SECURIDACA. *Cal.* 3phyllus. *Vexillum* o. *Legumen* 1spermum : ala ligulata.

1416. DALBERGIA. *Staminum filamenta* 2 apice 4fida. *Fructus* pedicellatus, non dehiscens, leguminosus membranaceo-compressus.

CUMARUNA. *Cal.* 3partitus. *Cor.* 5petala : petalis 3 erectis, 2 declinatis. *Legumen* 1 loculare, 1 spermum.

DECANDRIA.

* *staminibus omnibus connexis.*

853. NISSOLIA. *Legumen* 1spermum terminatum ala ligulata.

VOLUBILES. *Phaseolus. Dolichos. Clitoria. Glycine.*
PINNATÆ absque impari *Orobus, Pisum, Lathyrus, Vicia, Ervum; Arachus, Abrus.*
PINNATÆ cum impari. *Biserrula, Astragalus, Phaca, Hedysarum, Glycyrrhiza, Indigofera, Galega, Colutea, Amorpha, Piscidia, Müllera.*
TRIFOLIATÆ. *Trifolium, Lotus, Medicago, Erythrina, Genista, Cytisus Ononis Trigonella, Phaseolus, Dolichos Clitoria.*
UMBELLATÆ. *Lotus, Coronilla, Ornitopus, Scorpiurus, Hippocrepis.*

GALEDUPA.	*Legumen* 1-2spermum ellipticum subfalcatum planum acuminatum.
ANDIRA.	*Legumen* 1spermum pedunculatum carnosum punctatum hinc sulcatum.
ZORNIA.	*Antheræ* alternatim oblongæ & globosæ.
854. PTEROCARPUS.	*Stamina* bina 3 anthera. *Legumen* foliaceum.
AMERIMNON.	*Cal.* 2labiatus. *Legumen* compresso-foliaceum, 2valve, dehiscens.
TARALEA.	*Cal.* 5partitus $\frac{2}{3}$. *Cor.* 5petala : vexillo 2-petalo. *Germen* pedicellatum. *Legumen* subrotundum depressum, 2valve, 1loculare, 1spermum.
MUTUCHI.	*Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala. *Car.* 2petala. *Germen* pedicellatum. *Legumen* rugosum, compressum, alatum, 1loculare, 1spermum.
DEGUELIA.	*Cal.* 2labiatus $\frac{1}{3}$. *Cor.* 5petala : vexillo 2-petalo. *Legumen* globosum, 1loculare, 1spermum.
ACUROA.	*Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala : petalis 2 inferioribus conniventibus. *Germen* pedicellatum. *Legumen* subrotundum, 1loculare : 1spermum.
PARIVOA.	*Petalum* 1 tubi modo convolutum.
861. AMORPHA.	*Alæ Carina*que 0.
TETRAMNUS.	*Carina* minima, calice recondita. *Stamina* alterna 5 sterilia. *Stigma* sessile, capitatum.
895. EBENUS.	*Alæ* 0. *Legum.* 1spermum.
855. ERYTHRINA.	*Alæ carina*que brevissimæ. *Cal.* poro mellifero.
1286. ABRUS.	*Filamenta* 9 basi infima connexa latere superiori distincta. *Sem.* sphærica.
858. SPARTIUM.	*Filamenta* adhærentia germini. *Stigma* adnatum villosum.
859. GENISTA.	*Pistillum* deprimens carinam. *Stigma* involutum.
865. LUPINUS.	*Antheræ* alternæ rotundæ oblongæque. *Legumen* coriaceum.
864. ANTHYLLIS.	*Cal.* turgidus, includens legumen.
856. PISCIDIA.	*Legumen* alis 4 longitudinalibus.
857. BORBONIA.	*Legumen* mucronatum. *Stigma* emarginatum.

881. ULEX. *Cal.* 2phyllus. *Legumen* vix calice longius.
876. ARACHIS. *Cor.* resupinata. *Legumen* coriaceum.
860. ASPALATHUS. *Legumen* muticum, ovatum, subdispermum.
863. ONONIS. *Vexillum* striatum. *Legumen* rhombeum, sessile.
862. CROTALARIA. *Legumen* pedicellatum, turgidum.
VATAIREA. *Legumen* subrotundum, compressum, hinc rugosum, marginibus membranaceis exaratum, 1loculare, 1spermum.

** *stigmate pubescente* (nec priorum sequentiumve notæ.)

880. COLUTEA. *Legumen* inflatum, supra basin dehiscens.
866. PHASEOLUS. *Carina stilusque* spirales.
867. DOLICHOS. *Vexillum* basi callis 2.
871. OROBUS. *Stilus* linearis, teretiusculus, supra villosus.
870. PISUM. *Stilus* supra carinatus villosusque.
872. LATHYRUS. *Stilus* supra planus villosusque.
873. VICIA. *Stilus* sub stigmate barbatus.

*** *legumine subbiloculari* (nec priorum sequentiumve notæ.)

892. ASTRAGALUS. *Legumen* 2loculare, rotundatum.
893. BISERRULA. *Legumen* 2loculare, planum, dentatum.
891. PHACA. *Legumen* semibiloculare.

**** *legumine submonospermo* (nec priorum sequentiumve notæ.)

894. PSORALEA. *Cal.* punctis glandulosis.
DIPHYSA. *Legumen* 1loculare, polyspermum, utrinque vesica membranacea inflata longitudinaliter aucta.
896. TRIFOLIUM. *Flores* (sæpius) capitati. *Legumen* calice longius, 1-2spermum.
882. GLYCYRRHIZA. *Cal.* 2labiatus: labio superiori 3fido.

***** *legumine subarticulato.*

888. ÆSCHYNOMENE. *Cal.* 2labiatus. *Legumen* articulis 1spermis.
STILOSANTHES. *Cal.* tubulosus, longissimus, corailifer. *Germen* infra corollam. *Legumen* articulis 2, hamatum.
887. HEDYSARUM. *Carina* obtusissima. *Legumen* articulis subrotundis, compressis.
883. CORONILLA. *Legumen* isthmis interceptum, rectum.
884. ORNITHOPUS. *Legumen* articulatum, arcuatum.
886. SCORPIURUS. *Legumen* isthmis interceptum, teretiusculum, involutum.

PETAGNANA. *Legumen* articulis distinctis 1spermis stilo connexis.

885. HIPPOCREPIS. *Legumen* compresso-membranaceum : altera sutura sinubus ad medium excisa.

899. MEDICAGO. *Pistillum* carinam deflectens. *Legumen* spirale, membranaceo-compressum.

****** *legumine uniloculari polyspermo* (nec priorum sequentiumve notæ.)

898. TRIGONELLA. *Vexillum alæ*que patula, quasi 3petala. *Carina* minuta.

868. GLYCINE. *Carina* vexillum reflectens.

CYLISTA. *Vexillum* basi utrinque lobulo auctum. *Carina* basi & apice fissa.

869. CLITORIA. *Vexillum* amplum alas obtegens. *Corolla* resupinata.

879. ROBINIA. *Vexillum* reflexo-patens, subrotundum.

889. INDIGOFERA. *Carina* utrinque denticulo.

875. CICER. *Calicis* laciniæ 4 superiores vexillo incumbentes.

874. ERVUM. *Calix* 5partitus subæqualis, longitudine fere corollæ.

1319. LIBARIA. *Calicis* lacinia infima elongata. *Alæ* inferius 2lobæ.

877. CYTISUS. *Calix* 2labiatus. *Legumen* pedicellatum.

1417. MULLERA. *Pericarpium* elongatum, carnosum, moniliforme : *globulis* 1spermis.

890. GALEGA. *Legumen* lineare striis oblique transversis.

FALCATA. *Legumen* falcatum, compressum, utrinque acuminatum.

897. LOTUS. *Legumen* teres, farctum seminibus cylindricis.

878. GEOFFROYA. *Drupa* nucleo ligneo.

PENTANDRIA.

850. MONNIERIA. *Cal.* 5partitus: lacinia ſuperiori longa. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2: ſuperius antheris connatis 2; inferius 3. *Capſulæ* 5 1ſpermæ.

trifolia. 1. MONNIERIA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 730. *t.* 293.

HEXANDRIA.

1267. SARACA. *Cal.* 0. *Cor.* infundibuliformis, 4fida. *Filamenta* 3 utrinque ad faucem. *Legumen* pedicellatum.

indica. 1. SARACA. *Mant. p.* 98. *Burm. ind. t.* 25. *f.* 2.

849. FUMARIA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2 membranacea: ſingula antheris 3. *Capſ.* 1locularis, 1ſperma.

* *corollis bicalcaratis.*

Cucullaria. 1. F. ſcapo nudo. *Mant. p.* 437. *Pluckn. alm. t.* 90. *f.* 3.

ſpectabilis. 2. F. floribus poſterius bilobis, caule folioſo. *Amœn. acad.* 7. *t.* 7.

fungoſa. 18. F. floribus baſi bigibbis, capſulis linearibus ancipitibus corolla fungoſo-inflata rectis, foliis ſcandentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 1.

** *corollis unicalcaratis.*

nobilis. 3. F. caulibus ſimplicibus bracteis flore brevioribus indiviſis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 116. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 2.

intermedia. 19. F. radice bulboſa, caulibus ſimpliciſſimis, bracteis ſubrotundis indiviſis. *Ehrh. Beytr.* 6. *p.* 146.

bulbosa. 4. F. radice bulbosa, caule simplici, bracteis ovato-lanceolatis integerrimis flore brevioribus. *Flor. dan. t.* 605. *β*) *Knorr del. hort.* 1. *t.* H. 9.

minor. 5. F. radice bulbosa solida, caule simplici, bracteis pinnatis longitudine florum.

Schangini. 6. F. radice tuberosa, caule simplici folioso, bracteis flore dimidio brevioribus. *Pallas act. Petrop. ad* 1779. 2. *p.* 267. *t.* 14. *f.* 1-3.

sempervirens. 7. F. leguminibus linearibus paniculatis, caule erecto. *Mill. h. angl. t.* 78. *Siliqua receptaculo fenestrato.*

acaulis. 17. F. scapis nudis longitudine foliorum, foliis pinnatis: pinnis trilobis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 203.

lutea. 8. F. leguminibus teretibus, caulibus diffusis: angulis obtusis. *Mant. p.* 258. *Mill. h. angl. t.* 136. *f.* 1. *Siliqua longa: receptaculo cum valvis infra coalito.*

sibirica. 9. F. leguminibus ovalibus, caulibus patulis, foliolis oblongis. *Suppl. p.* 314. *Amm. rar. t.* 20.

capnoides. 10. F. leguminibus linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 46. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 3.

enneaphylla. 11. F. foliis triternatis: foliolis cordatis. *Bocc. mus.* 2. *t.* 73.

officinalis. 12. F. leguminibus monospermis racemosis, caule diffuso. *Zorn pl. off. ic. t.* 14.

capreolata. 13. F. leguminibus monospermis racemosis, foliis scandentibus subcirrhosis. *Flor. dan. t.* 340. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 2.

spicata. 14. F. leguminibus monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *β*) *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 12. *f.* 13.

claviculata. 15. F. leguminibus linearibus, foliis cirrhiferis. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 12. *f.* 3.

vesicaria. 16. F. leguminibus globosis acutis inflatis, foliis cirrhosis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 1. *Pluckn. alm. t.* 335. *f.* 3. *Capsul. duplicatæ: seminibus intus nidulantibus.*

OCTANDRIA.

851. POLYGALA. *Cal.* 5phyllus: foliolis 2 majoribus alæformibus, ante maturitatem feminis coloratis. *Capſula* obcordata, 2locularis. *Semina* ſolitaria.

* *appendice florum penicilliformi*, criſtatæ.

aſpalatha. 1. P. floribus capitatis, caulibus ſimpliciſſimis, foliis ſetaceis ſparſis. *Mant. p.* 99.

braſilienſis. 2. P. floribus ſubſpicatis, caulibus ſimpliciſſimis, foliis lanceolatis ſparſis. *Mant. p.* 99.

incarnata. 3. P. floribus ſpicatis, caule herbaceo ramoſo erecto, foliis alternis ſubulatis. *Pluckn. mant. t.* 438. *f.* 5.

trichoſperma. 4. P. floribus ſpicatis, caulibus virgatis ſtriatis, foliis linearibus. *Mant. p.* 259. *Jacq. obſ. bot.* 3. *t.* 67.

amara. 5. P. floribus racemoſis, caulibus erectiuſculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 412.

vulgaris. 6. P. floribus racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Flor. dan. t.* 516.

major. 7. P. floribus racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus ſuberectis, foliis lineari-lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 413.

monſpeliaca. 8. P. floribus racemoſis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus acutis; *an mera vulgaris varietas?*

bracteolata. 9. P. floribus racemoſis: bracteis triphyllis, foliis lineari-lanceolatis, caule fruticoſo. *Buxb. cent.* 3. *t.* 71.

paniculata. 10. P. racemis nudis, caulibus herbaceis erectis ſuperne ramoſis, foliis linearibus. *Swarts obſerv. bot. t.* 6. *f.* 2.

ſibirica. 11. P. racemo laterali nudo, caulibus herbaceis, foliis lanceolatis. *Gmel. flor. ſibir.* 4. *t.* 32.

ſpinoſa. 12. P. floribus lateralibus, caule ſpinoſo fruticoſo, foliis ovalibus mucronatis. *Mant. p.* 437.

teretifolia. 13. P. floribus lateralibus, caule fruticoſo ramoſo, foliis filiformibus falcatis. *Suppl. p.* 316.

umbellata. 14. P. floribus ſubumbellatis, foliis linearibus ſubciliatis. *Mant. p.* 259. *Burm. afr. t.* 73. *f.* 5.

myrtifolia. 15. P. floribus carina lunulata, caule fruticoso, foliis lævibus oblongis obtusis. *Mill. illustr. ic.*

violacea. 42. P. spicis terminalibus, foliis lanceolatis hirsutis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 735. t. 294.*

Timutu. 43. P. spica terminali, foliis lanceolatis: inferioribus ternis verticillatis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 737. t. 295.*

tinctoria. 44. P. villosa, bracteis triphyllis, foliis obovatis, caule fruticoso. *Vahl symb. bot. 1. p. 5.*

oppositifolia. 16. P. caule fruticoso, foliis oppositis ovatis acutis. *Mant. p. 259.*

** *florum appendice nulla*, Imberbes.

† *caule arboreo.*

Penæa. 17. P. floribus lateralibus solitariis, foliis obtusis petiolatis. *Plum. ic. 214. f. 1.*

diversifolia. 18. P. floribus axillaribus confertis, foliis senioribus oblongo-ovatis: recentibus subovatis. *Brown. jam. t. 5. f. 3.*

Heisteria. 19. P. caule arborescente, floribus lateralibus, floribus triquetris mucronato-spinosis. *Pluck. alm. t. 229. f. 5.*

†† *caule fruticoso.*

theezans. 20. P. pedunculis unifloris, foliis alternis lanceolatis. *Mant. p. 260. Burm. zeyl. t. 85.*

trinervia. 21. P. pedunculis unifloris, caule angulato, foliis alternis cordatis cuspidatis trinerviis. *Suppl. p. 315.*

microphylla. 22. P. floribus racemosis, foliis minutissimis ellipticis.

æstuans. 23. P. floribus racemosis, foliis lanceolatis petiolatis. *Suppl. p. 315.*

Chamæbuxus. 24. P. floribus sparsis: carinæ apice subrotundo, foliis lanceolatis. *Jacq. flor. austr. 3. t. 233.*

alopecuroides. 25. P. floribus sessilibus, floribus confertis ovatis acutis carinatis pilosis. *Mant. p. 260.*

mixta. 26. P. floribus sessilibus, foliis teretibus mucronatis confertissimis. *Suppl. p. 316.*

squarrosa. 27. P. foliis aggregatis lanceolatis patulis. *Suppl. p. 315.*

††† *caule suffruticoso.*

sinensis. 28. P. floribus spicatis axillaribus, foliis ovalibus

stipulacea. 29. P. floribus lateralibus, foliis ternis linearibus acutis. *Mant. p. 260. Seb. muf. 2. t. 62. f. 2.*

† † † † *caule herbaceo.*

† *simplicissimo.*

Senega. 30. P. floribus spicatis, caule erecto, foliis lato-lanceolatis. *Amœn. acad. 2. t. 2.*

lutea. 31. P. floribus oblongo-capitatis, caule erecto, foliis lanceolatis acutis. *Pluckn. amalth. t. 438. f. 6.*

viridescens. 32. P. floribus globoso-capitatis, caule erecto, foliis lanceolatis obtusiusculis.

triflora. 33. P. pedunculis subtrifloris, caule erecto, foliis linearibus alternis.

grandiflora. 39. P. caule subsimplici, foliis confertis ovato-lanceolatis. *Walt. flor. carol. p. 179.*

† † *caule ramoso.*

polygama. 40. P. spicarum terminalium floribus corollatis, reliquarum apetalis. *Walt. flor. carol. p. 179.*

cymosa. 41. P. caule subramoso, cymis terminalibus, foliis subulatis. *Walt. flor. carol. p. 179.*

glaucoides. 34. P. pedunculis multifloris lateralibus, caulibus diffusis, foliis acutis.

ciliata. 35. P. caule erecto, capsulis ciliato-dentatis.

sanguinea. 36. P. pedunculis squarrosis, caule erecto. *Pluckn. mant. p. 437. f. 5.*

verticillata. 37. P. floribus spatio remotis, foliis linearibus verticillatis. *Pluckn. mant. t. 438. f. 4.*

cruciata. 38. P. foliis quaternis.

852. SECURIDACA. *Cal.* 3phyllus. *Cor.* papilionacea: vexillo 2phyllo intra alas. *Legumen* ovatum, 1loculare, 1spermum, desinens in alam ligulatam.

erecta. 1. S. caule erecto. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 261. f. 56.*

ſcandens. 2. S. caule ſcandente, foliis oblongis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 186.

virgata. 3. S. caule ſcandente: ramis virgatis, foliis ſubrotundis. *Plum. ic.* 144. *f.* 1.

1416. DALBERGIA. *Filamenta* 2, apice 4fida. *Fructus* pedicellatus, non dehiſcens, leguminoſus, membranaceo-compreſſus.

Lanceolaria. 1. D. foliis pinnatis ſubtus piloſis: pinnis ellipticis, fructibus lanceolatis. *Suppl. p.* 316.

Monetaria. 2. D. foliis ternatis glabris: foliolis ovatis, fructibus ovalibus aveniis. *Suppl. p.* 317.

CUMARUNA. *Cal.* turbinatus, 3partitus $\frac{1}{2}$. *Petala* 5, quorum 2 inferiora. *Legumen* 1loculare, 1ſpermum.

odorata. 1. CUMARUNA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 740. *t.* 296.

DECANDRIA.

853. NISSOLIA. *Cal.* 5dentatus. *Legumen* articulatum 1ſpermum, deſinens in alam ligulatam.

arborea. 1. N. caule arboreo erecto. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 60.

fruticoſa. 2. N. caule fruticoſo volubili. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 167. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 5.

TARALEA. *Cal.* 5partitus $\frac{2}{3}$. *Cor.* 5petala: petalis 2 inferioribus. *Germen* pedicellatum. *Legumen* 1loculare, 2valve, 1ſpermum.

oppoſitifolia. 1. TARALEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 745. *t.* 298. *an diſtincti generis?*

MUTUCHI. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala : carina 2petala. *Germen* pedicellatum. *Legumen* alatum, non dehiſcens, 1loculare, 1ſpermum.

ſuberoſa. 1. MUTUCHI. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 748. *t.* 299.

DEGUELIA. *Cal.* 2labiatus $\frac{1}{3}$. *Cor.* 5petala : petalis 2 inferioribus. *Legumen* globoſum, 1loculare, 1ſpermum.

ſcandens. 1. DEGUELIA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 750. *t.* 300.

ACUROA. *Cal.* 5dentatus. *Petala* 5, quorum 2 inferiora. *Legumen* ſubrotundum, coriaceum, non dehiſcens, 1loculare, 1ſpermum.

violacea. 1. ACUROA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 753. *t.* 301.

VATAIREA. *Cal.* - - - *Cor.* - - - *Legumen* ſubrotundum coriaceum, compreſſum, non dehiſcens, margine membranaceum, uno latere rugoſum, 1loculare, 1ſpermum.

gujanenſis. 1 VATAIREA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 755. *t.* 302.

PARIVOA. *Cal.* 3-4partitus. *Petal.* 1. convolutum margine undulatum. *Germen* pedicellatum. *Stilus* longiſſimus. *Legumen* oblongum, lignoſum, 2valve, 1loculare, 1ſpermum.

grandiflora. 1. P. foliis trijugis glabris. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 757. *t.* 303.

tomentoſa. 2. P. foliis tomentoſis ternis quiniſque. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 759. *t.* 304.

GALEDUPA. *Cal.* cyathiformis, oblique truncatus integer. *Petala* unguiculata. *Legumen* ellipticum, ſubfalcatum planum, acuminatum. *Sem.* 1-2- compreſſa, reniformia.

Pungam. 1. GALEDUPA. *Rumpf herb. amb. 2. t. 13.*

ANDIRA. *Cal.* urceolatus ſubinteger, aut 5dentatus. *Car.* 2petala. *Legumen* carnoſum, punctatum ovoideum hinc ſulcatum, 1ſpermum.

Piſonis. 1. ANDIRA. *Juſſieu gen. plant. p. 363. An congener Vourcapoa Aubl. pl. guj. t. 373?*

1286. ABRUS. *Cal.* obſolete 4lobus: lobo ſuperiori latiori. *Filamenta* 9, baſi infima connata, dorſo hiantia. *Stigma* capitatum. *Semina* ſubgloboſa.

precatorius. 1. ABRUS. *Sp. pl. p.* 1025. Glycina. Abrus *Rheede h. malab. 8. t. 39. Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent. 9. t. 151. f. 5.*

854. PTEROCARPUS. *Cal.* 5dentatus. *Capſ.* falcata, foliacea, varicoſa. *Sem.* aliquot ſolitaria.

Draco. 1. Pt. foliis pinnatis, caule arboreo inermi. *Jacq. ſtirp. amer. t. 264. f. 91. Plum. ic. 246. f. 1. 2. an idem cum Mutuchi?*

lunatus. 2. Pt. foliis pinnatis, ſpinis ſtipularibus, fructibus lunatis, caule fruticoſo. *Suppl. p. 317.*

ſantalinus. 3. Pt. foliis ternatis ſubrotundis retuſis glaberrimis, petalis crenatis undulatis. *Suppl. p. 318.*

Ecaſtaphyllum. 4. Pt. foliis ſimplicibus ovatis acuminatis ſubtus ſericeis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 493. Hedyſarum Ecaſtaphyllum. *Brown. jam. t. 32. f. 1.*

buxifolius. 5. Pt. foliis ſimplicibus aggregatis obovatis aveniis. *Plum. ic. t.* 246. *f.* 1. *nonne idem cum Amerimno Ebeno?*

hemipterus. 6. Pt. capſula hinc ſutura tumida notata, inde in alam membranaceam extenuata. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 156. *f.* 2.

anterus. 7. Pt. capſula ſubcochleata nuda. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 156. *f.* 2. *an hujus generis?*

AMERIMNON. *Cal.* 2labiatus. *Legumen* compreſſo-foliaceum, 2valve, dehiſcens. *Sem.* aliquot ſolitaria.

Brownei. 1. A. inerme, foliis petiolatis alternis ſubcordato-ovatis, racemis compoſitis axillaribus lateralibuſque. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 180. *f.* 58.

Ebenus. 2. A. ſpinoſum, foliis ſubſeſſilibus aggregatis obovato-oblongis, pedunculis bifloris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 476. Aſpalathus Ebenus. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 175. *f.* 1.

855. ERYTHRINA. *Cal.* integer. *Cor.* vexillum longiſſimum, lanceolatum.

herbacea. 1. E. foliis ternatis, caulibus ſimpliciſſimis fruticoſo-annuis. *Mant. p.* 438. *Trew. Ehret. t.* 58.

carnea. 2. E. foliis ternatis glabris, caule arboreo aculeato, calicibus campanulatis truncatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 8.

Corallodendrum. 3. E. foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato, calicibus truncatis quinquedentatis. *Commel. hort. Amſt.* 1. *t.* 108. *β)* Erythrina orientalis. *Murray comm. Goett.* 1777. *t.* 1.

picta. 4. E. foliis ternatis aculeatis, caule arboreo aculeato. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 77. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub.* 5. *app. p.* 65. *ic?*

Criſtagalli. 5. E. foliis ternatis: petiolis ſubaculeatis glanduloſis, caule arboreo inermi. *Mant. p.* 99. *Jacq. obſ. bot.* 3. *t.* 51.

planiſiliqua. 6. E. foliis ſimplicibus oblongis. *Plum. ic.* 102. *f.* 1.

856. PISCIDIA. *Stigma* acutum. *Legumen* 4fariam alatum.

Erythrina. 1. P. foliolis ovatis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 45.

carthagenenſis. 2. P. foliolis obovatis. *Pluckn. alm. t.* 214. *f.* 4. *an varietas Erythrinæ ?*

857. BORBONIA. *Cal.* acuminato-ſpinoſus. *Stigma* emarginatum. *Legumen* mucronatum.

ericifolia. 1. B. foliis ſublinearibus acutis villoſis, capitulis terminalibus.

lævigata. 2. B. foliis lanceolatis enerviis glabris, involucris calicibuſque hirtis. *Mant. p.* 100.

trinervia. 3. B. foliis lanceolatis trinerviis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 297. *f.* 4.

lanceolata. 4. B. foliis lanceolatis multinerviis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 297. *f.* 3.

cordata. 5. B. foliis cordatis multinerviis integerrimis. *Mant. p.* 488. *Seb. muſ.* 1. *t.* 24. *f.* 3.

crenata. 6. B. foliis cordatis multinerviis denticulatis. *Breyn. cent. t.* 28.

858. SPARTIUM. *Cal.* deorſum productus, 2labiatus. *Filamenta* germini adhærentia. *Stigma* longitudinale, ſupra villoſum.

* *foliis nullis.*

aphyllon. 1. Sp. ramis virgatis alternis: ſenioribus angulatis elevatopunctatis, floribus terminalibus alternis. *Suppl. p.* 320. *Pall. it.* 3. *p.* 742. *t.* V. *f.* 3. a. b.

** *foliis ſimplicibus.*

contaminatum. 2. Sp. ramis teretibus, foliis alternis filiformibus baſi contaminatis. *Mant. p.* 268.

ſepiarium. 3. Sp. ramis ſcabris, foliis ſuperioribus confertis filiformibus. *Pet. gaz. t.* 83. *f.* 3.

junceum. 4. Sp. ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Regn. bot. t.* 220. *Legumen nodosum.*

monospermum. 5. Sp. ramis striatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis.

Sphaerocarpon. 6. Sp. ramis teretibus, foliis lanceolatis sessilibus subtus pubescentibus. *Mant. p.* 571. *Renealm. sp. t.* 33.

purgans. 7. Sp. ramis teretibus striatis, foliis lanceolatis subsessilibus, pubescentibus. *Sp. pl. p.* 999. Genista purgans. *Bulliard herb. Franc. t.* 115.

Scorpius. 8. Sp. ramis spinosis patentibus, foliis ovatis.

ferox. 9. Sp. ramis spinosis striatis, foliis sparsis sessilibus, racemis foliosis lateralibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 206.

*** *foliis ternatis.*

angulatum. 10. Sp. foliis simplicibus ternatisque, ramis sexangularibus apice floriferis.

scoparium. 11. Sp. foliis ternatis simplicibusque, ramis inermibus angulatis. *Flor. dan. t.* 313. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 153. *f.* 4.

supranubium. 12. Sp. floribus axillaribus pluribus pedunculatis, ramis virgatis sulcatis incanis, leguminibus glabris. *Suppl. p.* 319.

complicatum. 13. Sp. foliolis conduplicatis, caulibus inermibus prostratis glabris, leguminibus scabris. *Pluckn. alm. t.* 86. *f.* 1.

radiatum. 14. Sp. foliis linearibus subverticillatis: petiolis persistentibus, ramis oppositis tetragonis apice umbelliferis. *Mill. h. angl. t.* 259. *f.* 1.

cytisoides. 15. Sp. foliis linearibus integerrimis petiolatis, ramis teretibus, racemis terminalibus. *Suppl. p.* 320. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 107.

sericeum. 16. Sp. inerme sericeum, foliis linearibus, racemis terminalibus, ramis angulatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 12.

spinosum. 17. Sp. ramis angulatis spinosis.

villosum. 18. Sp. ramis spinosis, calicibus leguminibusque villosis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 207.

horridum. 19. Sp. foliis complicatis sericeis, ramulis teretibus spinosis oppositis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 51.

859. GENISTA. *Cal.* 2labiatus $\frac{2}{3}$. *Vexillum* oblongum, a pistillo staminibusque deorsum reflexum. *Legumen* æquale.

* *Inermes.*

† *foliis ternatis.*

canariensis. 1. G. foliis utrinque pubescentibus, ramis angulatis. β) *Seb. mus. 2. t. 4. f. 6. 7.*

candicans. 2. G. foliis subtus villosis, pedunculis lateralibus subquinquefloris foliatis, leguminibus hirsutis alatis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 9. t. 151. f. 6.*

linifolia. 3. G. foliis sessilibus linearibus subtus sericeis.

pendulina. 4. G. foliis ternatis simplicibusque obovatis, ramis virgatis striatis patentibus, floribus lateralibus geminis subpendulis. *la Mark dict. bot. n. 24.*

† † *foliis simplicibus.*

sagittalis. 5. G. ramis ancipitibus membranaceis articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *Jacq. flor. austr. 3. t. 209. an cum tota inermium tribu spartiis adscribenda?*

tridentata. 6. G. ramis triquetris membranaceis subarticulatis, foliis tricuspidatis.

tinctoria. 7. G. ramis striatis teretibus erectis, foliis lanceolatis glabris. *Flor. dan. t. 526. Legumen cylindricum.*

sericea. 8. G. ramis striatis teretibus erectis, foliis lanceolatis subtus sericeo-villosis. *Wulf. ap. Jacq. coll. 2. p. 167.*

sibirica. 9. G. ramis æqualibus teretibus erectis, foliis lanceolatis glabris. *Mant. p. 571. Jacq. h. Vind. 2. t. 190. Legumen cylindricum.*

florida. 10. G. ramis striatis teretibus, foliis lanceolatis sericeis, racemis secundis.

pilosa. 11. G. caule tuberculato decumbente, foliis lanceolatis obtusis. *Jacq. flor. austr. 3. t. 208.*

humifusa. 12. G. ramis prostratis striatis villosis, foliis lanceolatis ciliatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 69.*

** *Spinosæ.*

** *Spinoſæ.*

anglica. 13. G. ſpinoſiſſima glabra, foliis lanceolatis, ſpinis ſimplicibus compoſitiſque. *Flor. dan. t.* 619.

germanica. 14. G. ſpinoſiſſima hirſuta, foliis ovato-lanceolatis, ſpinis compoſitis & decompoſitis. *Tabern. Kraeuterb. p.* 1102.

hiſpanica. 15. G. ſpinis decompoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis linearibus piloſis.

hirſuta. 18. G. ſpinis ternatis decuſſatis, foliis ſimplicibus lanceolatis, ſpicis terminalibus hirſutis. *Valh ſymb. bot.* 1. *p.* 51.

luſitanica. 16. G. caule aphyllo, ſpinis decuſſatis.

aſpalathoides. 17. G. foliis lineari-lanceolatis ſubſericeis, ramis ſtriatis tuberculatis apice ſpinoſis, floribus axillaribus. *la Mark dict. bot. n.* 15.

860. ASPALATHUS. *Cal.* 5fidus: lacinia ſuperiore majore. *Legumen* ovatum, muticum, ſubdiſpermum.

* *foliis faſciculatis.*

ſpinoſa. 1. A. foliis linearibus nudis ſpinam gemmaceam circumſtantibus. *Pluckn. phyt.* 297. *f.* 6. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 144. *f.* 4.

capitata. 2. A. foliis linearibus acutis, floribus capitatis, bracteis nudis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 6.

glomerata. 3. A. foliis linearibus acutis villoſis incurvatis, floribus capitatis, calicis laciniis ovatis, corollis glabris. *Suppl. p.* 321.

ericifolia. 4. A. foliis linearibus inermibus hirſutis, floribus alternis, calicibus linearibus. *Pluckn. mant. t.* 413. *f.* 6.

uniflora. 5. A. foliis linearibus inermibus glabris: ſtipulis acutis perſiſtentibus, floribus ſolitariis: calicum laciniis cymbiformibus. *Pluckn. mant. t.* 414. *f.* 7.

nigra. 6. A. foliis linearibus obtuſiuſculis, floribus capitato-ſpicatis pubeſcentibus. *Mant. p.* 262.

galioides. 7. A. foliis linearibus lævibus, pedunculis bifloris elongatis apice folioſis. *Mant. p.* 260.

verrucosa. 8. A. foliis filiformibus, gemmis verrucosis tomentosis nudis.

Hystrix. 9. A foliis filiformibus rigidis spinosis sericeis, floribus lateralibus sessilibus solitariis : corollis villosis. *Suppl. p.* 322.

genistoides. 10. A. foliis filiformibus lævibus, calicibus subracemosis pendulis, corolisque glabris. *Mant. p.* 261.

ciliaris. 11. A foliis filiformibus scabris, floribus terminalibus sessilibus : vexillis pubescentibus. *Mant. p.* 262.

carnosa. 12. A foliis teretiusculis obtusis, calicibus subpubescentibus acutis, corollis glabris. *Mant. p.* 261.

araneosa. 13. A foliis setaceis inermibus hispidis, floribuscapitatis. *Seb. mus.* 1. *t.* 23. *f.* 6.

asparagoides. 14. A foliis setaceis pilosiusculis, calicibus foliiformibus longitudine corollæ solitariis. *Suppl. p.* 321.

canescens. 15. A. foliis subulatis tomentoso-sericeis, floribus lateralibus: vexillis pubescentibus. *Mant. p.* 262.

pedunculata. 16. A. foliis subulatis glabris, pedunculis filiformibus duplo brevioribus. *Herit. sert. angl. p.* 21. *t.* 26.

retroflexa. 17. A. foliis subulatis glabris minimis, ramis filiformibus patentissimis, floribus solitariis terminalibus.

thymifolia. 18. A foliis subulatis inermibus glabris brevissimis; floribus alternis. *Pluckn. mant. t.* 413. *f.* 1.

albens. 19. A. foliis subulatis sericeis apice patulis, fasciculis floreis sparsis. *Mant. p.* 261.

chenopoda. 20. A. foliis subulatis mucronatis hirtis, floribus capitatis hirsutissimis. *Seb. mus.* 1. *t.* 23. *f.* 4.

astroites. 21. A. foliis subulatis mucronatis glabris, caule villoso, floribus sparsis. *Seb. mus.* 1. *t.* 24. *f.* 6,

sericea. 22. A. foliis lanceolatis sericeis, pedunculis terminalibus bifloris, vexillo nudiusculo. *Suppl. p.* 321.

heterophylla. 23. A. foliis ramorum fasciculatis; ramulorum ternatis linearibus hirtis, spicis terminalibus : calice corollaque villosis. *Suppl. p.* 321.

*** foliis quinis quinatisve.*

quinquefolia. 24. A. foliis quinis sessilibus, pedunculis spicatis. *Pluckn. mant. t.* 273. *f.* 4.

pinnata. 25. A. foliis pinnato-quinatis obcordatis, pedunculis capitatis.

indica. 26. A. foliis quinatis sessilibus, pedunculis unifloris. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 37.

*** *foliis trinis, ternis, ternatisve.*

candicans. 27. A. foliis trinis fasciculatisque filiformibus sericeis, floribus sublateralibus: vexillis nullis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 17.

cretica. 28. A. foliis trinis cuneiformibus glabris: lateralibus brevioribus, stipulis obsoletis, floribus congestis. *Zanon hist. t.* 39.

tridentata. 29. A. foliis trinis lanceolatis glabris: stipulis tridentatis mucronatis, floribus capitatis.

anthyphylloides. 30. A. foliis trinis lanceolatis æqualibus subpubescentibus: stipulis nullis, capitulis terminalibus.

callosa. 31. A. foliis trinis subulatis æqualibus: stipulis subrotundis callosis, floribus spicatis glabris. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 4.

argentea. 32. A. foliis trinis linearibus sericeis: stipulis simplicibus mucronatis, floribus sparsis tomentosis.

laxata. 33. A. foliis ternis linearibus villosis, floribus fasciculatis quinis, calicibus lanatis, caulibus prostratis teretibus. *Mant. p.* 263.

pilosa. 34. A. foliis ternis linearibus villosis, capitulis terminalibus pilosissimis, corollis pubescentibus. *Mant. p.* 263.

mucronata. 35. A. foliis ternis lævibus, ramis acuminatis, floribus racemosis. *Suppl. p.* 320.

orientalis. 36. A. foliis ternatis lanceolatis pubescentibus, floribus fasciculatis quinis, calicibus pubescentibus, caulibus erectis angulatis. *Mant. p.* 263.

881. ULEX. *Cal.* 2phyllus. *Legumen* vix calice longius.

europæus. 1. U. foliis villosis acutis, spinis sparsis. *Flor. dan. t.* 608. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 7.

capensis. 2. U. foliis solitariis obtusis, spinis simplicibus terminalibus. *Petiv. gaz. t.* 83. *f.* 9.

861. AMORPHA. *Corollæ* vexillum ovatum, concavum. *Alæ* 0. *Carina* 0.

fruticosa. 1. AMORPHA. *du Hamel. arbr.* 1. *t.* 46. *Gaertn de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 144. *f.* 5. *Mill. h. angl. t.* 27.

TETRAMNUS. *Corollæ* carina minima, calice recondita. *Stamina* alterna, 5 sterilia. *Stigma* sessile, capitatum.

volubilis. 1. T. foliis ovato-lanceolatis pubescentibus. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 482. Dolichos uncinatus. *Plum. ic.* 221.

uncinatus. 2. T. foliis oblongis obtusis subtus sericeis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 105.

862. CROTALARIA. *Filamenta* connata cum fissura dorsali. *Legumen* turgidum, inflatum, pedicellatum, simplex.

* *foliis simplicibus.*

perforata. 1. Cr. foliis perfoliatis cordatis denticulatis. *Mant. p.* 439.

perfoliata. 2. Cr. foliis perfoliatis cordato-ovatis. *Dill. h. Elth. t.* 102. *f.* 122.

amplexicaulis. 3. Cr. foliis caulinis amplexicaulibus cordatis alternis: floralibus oppositis reniformibus coloratis, floribus solitariis. *Seb. mus.* 1. *t.* 24. *f.* 5.

sagittalis. 4. Cr. foliis lanceolatis alternis stipulis decurrentibus, bifidis *Pluckn. alm. t.* 169. *f.* 6. *β*) *Pluckn. alm. t.* 277. *f.* 2.

juncea. 5. Cr. foliis lanceolatis petiolato-sessilibus, caule striato. *Mant. p.* 439. *Trew. Ehret. t.* 47.

sessiliflora. 6. Cr. foliis lanceolatis subsessilibus, floribus sessilibus lateralibus, caule æquali.

sericea. 7. Cr. foliis lanceolatis acutis subtus sericeis, florum racemis elongatis. *Koenig. apud Retz. obs. bot.* 5. *p.* 26.

opposita. 8. Cr. glabra exstipulata, foliis oblongis sessilibus, pedunculis axillaribus diphyllis. *Suppl. p.* 322. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 474. Spartium capense.

retusa. 9. Cr. foliis oblongis cuneiformibus retusis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 25. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 2.

biflora. 10. Cr. foliis obtusis, caulibus prostratis herbaceis, pedunculis bifloris. *Mant. p.* 516. 570. & *p.* 273. Astragalus biflorus. *Burm. ind. t.* 48. *f.* 2.

bifaria. 11. Cr. pubefcens diffufa ftipulata, foliis bifariis: inferioribus orbiculatis, fuperioribus oblongis, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 322.

cærulea. 12. Cr. foliis ovatis bafi attenuatis feffilibus fubretufis: ftipulis fulcatis amplexicaulibus, caule tetragono. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 98.

verrucofa. 13. Cr. foliis ovatis: ftipulis lanatis declinatis, ramis tetragonis. *Burm. zeyl. t.* 34.

triflora. 14. Cr. foliis ovatis feffilibus glabris, ramis angulatis, pedunculis ternis lateralibus unifloris. *Mant. p.* 440.

imbricata. 15. Cr. foliis ovatis acutis villofis feffilibus, floribus fubfeffilibus. *Pluckn. mant. t.* 388. *f.* 3.

finenfis. 16. Cr. foliis ovatis fubpetiolatis: ftipulis minutiffimis.

rotundifolia. 27. Cr. foliis rotundatis integris pilofis fparfis, caule fub decumbente. *Walt. flor. carol. p.* 181. *an cum fagittali diftincti generis?*

floribunda. 28. Cr. foliis cuneiformibus, ramis pubefcentibus, leguminibus pedicellatis glabris rugofis compreffis carinatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 19.

axillaris. 29. Cr. foliis ovato-ellipticis fubtus pilofis, ftipulis fubulatis minutis, pedunculis axillaribus geminis unifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 20.

pallida. 30. Cr. foliis lanceolatis glabris, racemis terminalibus fpiciformibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 20.

linifolia. 17. Cr. hirfuta exftipulata, foliis linearibus obtufis petiolatis, caule angulato, racemo terminali. *Suppl. p.* 322. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 96. *f.* 1.

** *foliis compofitis.*

† *ternatis.*

heterophylla. 18. Cr. foliis ternatis ellipticis emarginatis: inferioribus fimplicibus. *Suppl. p.* 323.

capenfis. 19. Cr. foliis obtufis: ftipulis foliaceis, ramis incanis: *Suppl. p.* 323. *Jacq. h. Vind.* 4. *t.* 64.

latifolia. 20. Cr. foliis oblongis glabris, floribus lateralibus fubracemofis, leguminibus feffilibus. *Sloan. hift. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 1. 2.

microphylla. 31. Cr. foliis oblongis pedunculis lateralibus bifloris, caule filiformi decumbente. *Vahl fymb. bot.* 1. *p.* 52.

lunaris. 21. Cr. foliis ovatis acutis : ſtipulis ſemicordatis lunatis.

laburnifolia. 22. Cr. exſtipulata, foliis ovatis acuminatis, leguminibus pedicellatis. *Burm. zeyl. t.* 35.

incana. 23. Cr. foliis ellipticis, ſtipulis ſubulatis, leguminibus viloſo-pubeſcentibus. *Mant. p.* 440. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 82.

cordifolia. 24. Cr. foliis obcordatis mucronatis, floribus corymboſis; caule fruticoſo. *Mant. p.* 266.

gujanenſis. 25. Cr. foliis oblongis, legumine quadrangulari. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 761. *t.* 305.

⊢⊢ *foliis quinatis.*

quinquefolia. 26. Cr. *Rheede h. malab.* 9. *t.* 28.

ZORNIA. *Cal.* campanulatus 2labiatus $\frac{1}{3}$. *Cor.* infera. *Vexillum* cordatum, revolutum. *Antheræ* alternæ oblongæ, alternæ globoſæ. *Legumen* articulatum, hiſpidum.

bracteata. 1. ZORNIA. *Walt. flor. carol. p.* 181.

863. ONONIS. *Cal.* 5partitus : laciniis linearibus. *Vexillum* ſtriatum. *Filamenta* connata abſque fiſſura. *Legumen* turgidum, ſeſſile, ſimplex, 1loculare.

* *floribus ſubſeſſilibus.*

antiquorum. 1. O. floribus ſolitariis foliolo majoribus, foliis inferioribus ternatis, ramis læviuſculis ſpinoſis.

ſpinoſa. 2. O. floribus racemoſis ſolitariis, foliis ternatis ſimplicibuſque, ramis ſpinoſis. *Flor. dan. t.* 783. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 6.

arvenſis. 3. O. floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis : ſuperioribus ſimplicibus, ramis inermibus ſubvilloſis. *Zorn. pl. offic. ic. t.* 132.

repens. 4. O. caulibus diffufis, ramis erectis, foliis fuperioribus fimplicibus : ftipulis ovatis. *Dill. h. Elth. t.* 25. *f.* 28.

minutiffima. 5. O. floribus lateralibus, foliis ternatis glabris : ftipulis enfiformibus, calicibus fcariofis corolla longioribus. *Jacq. flor. auftr.* 3. *t.* 240.

mitiffima. 6. O floribus feffilibus fpicatis : bracteis ftipularibus ovatis ventricofis fcariofis imbricatis. *Dill. h. Elth. t.* 24. *f.* 27.

alopecuroides. 7. O. fpicis foliofis, foliis fimplicibus obtius : ftipulis dilatatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 75.

flava. 8. O. foliis ternatis fubrotundis, ftigmate lævi. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 130. *an diftincta hujus tribus fpecies ?*

variegata. 9. O ftipulis bracteifque dentatis, foliis fimplicibus ftriatis, floribus fubpedunculatis. *Bocc. fic. t.* 38. *f.* 3.

alba. 10. O. floribus racemofis, foliis fimplicibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 210.

** *floribus pedunculatis.*
† *pedunculo mutico.*
† *caule herbaceo.*

capenfis. 11. O. racemis pedunculatis longis, foliis ternatis fuborbiculatis.

proftratu. 12. O. pedunculis unifloris longiffimis, foliis ternatis acutis : ftipulis fubulatis, caulibus proftratis. *Mant. p.* 266. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 504. Lotus proftratus.

reclinata. 13. O. pedunculis unifloris, foliis ternatis fubrotundis crenatis, leguminibus cernuis.

cenifia. 14. O. pedunculis unifloris, foliis ternis cuneatis : ftipulis ferratis, caulibus proftratis. *Mant. p.* 267. *Allion. flor. pedem. t.* 10. *f.* 3.

geminata. 36. O. pedunculis bifloris lateralibus, foliis ternatis obovatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 23.

†† *caule frutefcente.*

ferrata. 15. O. floribus fubfeffilibus folitariis, foliis inferioribus ternatis ferrato-dentatis cuneiformibus apice fubtridentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 130. *an diftincta fpecies hujus tribus et cohortis ?*

hircina. 16. O. floribus geminis breviffime pedicellatis, foliis fuperioribus fimplicibus : ftipulis ferratis, caulibus villofis vifcidis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 93.

umbellata. 17. O. pedunculis umbellatis, foliis ternatis emarginatis, caulibus prostratis. *Mant. p.* 266.

argentea. 18. O. volubilis, pedunculis umbellatis, foliis ternatis: foliolis sessilibus argenteo-tomentosis. *Suppl. p.* 324.

involucrata. 19. O. hirsuta prostrata, pedunculis involucratis: involucro tetraphyllo, foliis ternatis cuneiformibus. *Suppl. p.* 324.

filiformis. 20. O. pedunculis subtrifloris, foliis ternatis subsessilibus: foliolis ovatis mucronatis. *Mant. p.* 266.

cernua. 21. O. racemis strictis, foliis cuneiformibus, leguminibus cernuis linearibus recurvatis. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 82. *β)* Cytisus æthiopicus. *Sp. pl.* 2. *p.* 1042.

pubescens. 22. O. pedunculis brevissimis, foliis superioribus simplicibus: stipulis ovato-lanceolatis integerrimis. *Mant. p.* 267.

rotundifolia. 23. O. foliis ternatis ovatis dentatis, calicibus triphyllo-bracteatis, pedunculis subtrifloris. *Jacq. flor. austr.* 5. *app. t.* 49.

fruticosa. 24. O. foliis sessilibus ternatis lanceolatis serratis: stipulis vaginalibus, pedunculis subtrifloris. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 58. *Mill. h. angl. t.* 36.

tridentata. 25. O. foliis ternatis carnosis sublinearibus tridentatis, pedunculis bifloris. *Magn. h. monsp. t.* 16.

crispa. 26. O. foliis ternatis undulatis subrotundis dentatis viscoso-pubescentibus, pedunculis unifloris. *Magn. h. monsp. t.* 17.

microphylla. 27. O. spinosa, foliis minutis ternatis integerrimis, leguminibus recurvis. *Suppl. p.* 324.

mauritanica. 28. O. foliis quinatis obovatis subtus sericeis: stipulis filiformibus, pedunculis racemosis *Mant. p.* 267. 453. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 504. Lotus mauritanicus.

† † *pedunculo aristato.*

† *caule fruticoso.*

hispanica. 29. O. foliis ternatis canaliculatis recurvatis serratis, pedunculis subunifloris. *Suppl. p.* 324.

Nutrix. 30. O. foliis ternatis viscosis: stipulis integerrimis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 40. *Mill. h. angl. t.* 37.

pinguis. 31. O. foliis ternatis lanceolatis: stipulis integerrimis, pedunculis unifloris. *An mera nutricis varietas? β) Pluckn. alm. t.* 135. *f.* 5.

†† *caule herbaceo.*

Cherleri. 32. O. pedunculis unifloris, foliis ternatis stipulis serratis.

ornithopodioides. 33. O. pedunculis bifloris, leguminibus linearibus cernuis.

viscosa. 34. O. pedunculis unifloris, foliis simplicibus: infimis ternatis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1239.

vaginalis. 35. O. pedunculis unifloris aristatis, foliis sessilibus ternatis stipulisque vaginantibus dentatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 53.

864. ANTHYLLIS. *Cal.* ventricosus. *Legumen* subrotundum, tectum.

* *Herbaceæ.*

tetraphylla. 1. A. foliis quaterno-pinnatis, floribus lateralibus. *Mill. h. angl. t.* 41. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 3.

Gerardi. 2. A. foliis pinnatis inæqualibus, pedunculis lateralibus folio longioribus, capitulis aphyllis. *Mant. p.* 100. *Gerard. flor. prov. t.* 18.

Cornicina. 3. A. foliis pinnatis inæqualibus, captitulis solitariis.

Vulneraria. 4. A. foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Riv. tetrap. t.* 18. *β*) *Dill. h. Elth. t.* 320. *f.* 413.

montana. 5. A. foliis pinnatis æqualibus, capitulo terminali secundo, floribus obliquatis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 334.

quinqueflora. 6. A. foliis ternatis linearibus, capitulo quinquefloro. *Suppl. p.* 325.

lotoides. 7. A. foliis tripartitis, calicibus prismaticis fasciculatis leguminum longitudine.

involucrata. 8. A. subherbacea, foliis ternatis petiolatis stipulatis ensiformibus, floribus capitatis. *Mant. p.* 265.

** *Fruticosæ.*

visciflora. 9. A. foliis digitato-pinnatis, calicibus hirsutis. *Suppl. p.* 325.

Barba jovis. 10. A. foliis pinnatis æqualibus tomentosis, floribus capitatis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 3. *Mill. h. angl. t.* 41. *f.* 2. *Pericarpium* 1*loculare.*

heterophylla. 11. A. foliis pinnatis: floralibus ternatis.

linifolia. 12. A. foliis ternatis sessilibus ensiformibus, floribus capitatis. *Mant. p.* 265.

cytisoides. 13. A. foliis ternatis inaequalibus, calicibus lanatis lateralibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1182.

Hermanniae. 14. A. foliis ternatis subpedunculatis, calicibus nudis. *Alp. exot. t.* 26.

Erinacea. 15. A. spinosa, foliis simplicibus. *Clus. hisp. t.* 214.

876. ARACHIS. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* resupinnata. *Filamenta* connexa. *Legumen* gibbum torulosum venosum, coriaceum.

hypogaea. 1. A. caule procumbente. *Ehret. pict. t.* 3. *f.* 3. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 8. *t.* 144. *f.* 2.

aprica. 2. A. caule erecto, foliis ternatis. *Walt. flor. carol. p.* 182.

895. EBENUS. *Cal.* dentes longitudine corollae. *Cor.* alis subnullis. *Sem.* 1hirtum.

cretica. 1. EBENUS. *Mant. p.* 451. *Pluckn. alm. t.* 67. *f.* 5.

865. LUPINUS. *Cal.* 2fidus. *Antherae* 5 oblongae, 5 subrotundae. *Legumen* coriaceum, inflatum, nodosum.

perennis. 1. L. calicibus alternis inappendiculatis: labio superiori emarginato; inferiori integro. *Mill. h. angl.* 170. *f.* 1.

albus. 2. L. calicibus alternis inappendiculatis: labio superiori integro; inferiori tridentato. *Blackw. herb. t.* 282. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 4.

hirsutus. 3. L. calicibus alternis appendiculatis: labio superiori bipartito; inferiori tridentato.

angustifolius. 4. L. calicibus alternis appendiculatis: labio superiori bipartito; inferiori integro. *Knorr del. hort.* 2. *t.* L. 7. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 4.

Termis. 5. L. calicibus alternis appendiculatis: labio utroque integro acuto. *Forsk flor. aeg. arab. p.* 131.

integrifolius. 6. L. calicibus alternis appendiculatis, foliis simplicibus oblongis villosis.

varius. 7. L. calicibus semiverticillatis appendiculatis: labio superioribifido; inferiori subtridentato. *Kniph. bot. orig. cent. 7. n. 47. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 9. t. 150. f. 4.*

pilosus. 8. L. calicibus verticillatis appendiculatis: labio superiori bipartito; inferiori integro.

luteus. 9. L. calicibus verticillatis appendiculatis: labio superiori bipartito; inferiori tridentato. *Kniph. bot. orig. cent. 4. n. 47. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 9. t. 150. f. 4.*

866. PHASEOLUS. *Carina* cum *staminibus stilo*que spiraliter torta. *Legumen* (plurimis) nodosum.

* *caule volubili.*

vulgaris. 1. Ph. floribus racemosis geminis, leguminibus pendulis. *Lob. ic. 59. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 9. t. 150. f. 3.*

perennis. 21. Ph. floribus racemosis geminis, bracteis minimis, leguminibus pendulis, radice perenni. *Walt. flor. carol. p. 182.*

alatus. 2. Ph. floribus laxe spicatis, alis longitudine vexilli. *Dill. h. Elth. t. 235. f. 303.*

helvolus. 3. Ph. floribus capitatis: calicibus bracteatis, alis expansis maximis, foliolis deltoidibus oblongis. *Dill. h. Elth. t. 233. f. 300.*

vexillatus. 4. Ph. pedunculis petiolo crassioribus capitatis, alis subfalcatis difformibus, leguminibus linearibus strictis. *Jacq. h. Vind. 2. t. 102.*

farinosus. 5. Ph. pedunculis subcapitatis, seminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Nissol. act. Paris. 1730. t. 42.* *Legumen* loculamentosum, latum, simplex.

bipunctatus. 6. Ph. leguminibus acinaciformibus pubescentibus, seminibus ad hilum bipunctatis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 100.*

lunatus. 7. Ph. leguminibus acinaciformibus lævibus sublunatis.

Pallas. 8. Ph. leguminibus cylindricis torulosis pendulis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 108.*

inamœnus. 9. Ph. florum vexillo revoluto calicibus concolore. *Jacq. h. Vind. 1. t. 66.*

Caracalla. 10. Ph. vexillo carinaque spiraliter convolutis. *Trew rar.* 14. *t.* 10.

aconitifolius. 11. Ph. foliis subquinquepartitis. *Suppl. p.* 325. *Jacq. obs. bot.* 3. *t.* 52. *an distinctus a glycine triloba ?*

Asellus. 12. Ph. foliis sagitatis, seminibus globosis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 108.

** *caule semivolubili.*

semierectus. 13. Ph. floribus spicatis: calicibus ebracteatis, alis expansis majoribus, foliolis ovatis. *Mant. p.* 100. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 15.

hirtus. 14. Ph. leguminibus teretibus, carina sinistrorsum cornuta. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 38.

*** *caule erecto.*

Mungo. 15. Ph. caule flexuoso tereti hirsuto, leguminibus capitatis hirtis. *Mant. p.* 101.

Max. 16. Ph. caule recto angulοso hispido, leguminibus angustis pendulis hirtis. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 140.

nanus. 17. Ph. caule lævi, leguminibus pendulis compressis rugosis.

radiatus. 18. Ph. caule tereti, floribus capitatis, leguminibus cylindricis horizontalibus. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 139. *f.* 2. *Legumen per sepimenta loculamentosum.*

sphærospermus. 19. Ph. seminibus globosis hilo tinctis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 117. *f.* 1. 3.

lathyroides. 20. Ph. foliolis oblongis acuminatis, pedunculis elongatis, leguminibus tereti subulatis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 116. *f.* 1.

867. DOLICHOS. *Vexilli* basis callis 2 parallelis, oblongis, alas subtus comprimentibus. *Legumen* (plurimis) angustum, per sepimenta loculamentosum.

† *caule volubili.*

benghalensis. 1. D. frutescens, leguminibus longe mucronatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 124.

Faba nigrita. 2. D. frutescens, leguminibus pendulis linearibus compressis mucronatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 132.

lignofus. 3. D. caule perenni, peduuculis capitatis, leguminibus ftrictis linearibus. *Hort. Cliff. t.* 20.

polyfta-chyos. 4. D. caule perenni, fpicis longiffimis: pedicellis geminis, leguminibus acuminatis compreffis.

ariftatus. 5. D. pedunculis bifloris axillaribus, leguminibus linearibus compreffis: arifta terminali recta.

acinaci-formis. 6. D. glaber, leguminibus craffis compreffis mucrone inflexo terminatis: feminibus membrana alba involutis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 114. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 44.

Lablab. 7. D. leguminibus ovato-acinaciformibus: feminibus ovatis hilo arcuato varfus alteram extremitatem. *Alp. æg. t.* 75. *Banks. ic. Kæmpf. t.* 25? *Gnertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 2. *Legumen huic et bengalenfi latum alatum.*

finenfis. 8. D. leguminibus pendulis cylindricis torulofis, pedunculis erectis multifloris. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 134.

luteolus. 9. D. leguminibus capitatis pluribus cylindricis: feminibus rotundatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 90.

tranque-baricus. 10. D. leguminibus capitatis paucis cylindricis: apice mucronato recto. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 70.

unguicu-latus. 11. D. leguminibus capitatis fubcylindricis: apice recurvo concavo. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 23.

fesquipe-dalis. 12. D. leguminibus fubcylindricis lævibus longiffimis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 67.

luteus. 13. D. floribus fufpicatis, leguminibus fubcylindricis glabris, foliolis fubrotundo-rhombeis obtufis integris glabris. *Swarts nov. pl. gen. et fp. p.* 105.

capenfis. 14. D. pedunculis fubifloris, leguminibus ellipticis compreffis, foliis glabris.

incurvus. 15. D. leguminibus folitariis incurvis tricarinatis. *Thunb. flor. jap. p.* 280.

tetrago-nolobus. 16. D. leguminibus membranaceo-quadrangulis. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 133.

gladia-tus. 17. D. leguminibus oblongis cum mucrone obtufis glabris ad futuram quadrimarginatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 276. *Banks ic. Kæmpf. t.* 39.

enfifor-mis. 18. D. leguminibus gladiatis dorfo tricarinatis: feminibus arillatis. *Reed. h. malab.* 8. *t.* 44.

Lineatus. 19. D. leguminibus racemoſis oblongis tricarinatis. *Thunb. flor. jap. p.* 280.

altiſſimus. 20. D. leguminibus racemoſis hirtis æqualibus: ſeminibus hilo cinctis, foliis utrinque glabris. *Mant. p.* 101. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 190.

pruriens. 21. D. leguminibus racemoſis: valvis ſubcarinatis hirtis, pedunculis ternis. *Mant. p.* 441. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 188.

urens. 22. D. leguminibus racemoſis: ſulcis tranſverſis lanceolatis, ſeminibus hilo cinctis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 189.

minimus. 23. D. leguminibus racemoſis compreſſis tetraſpermis, foliis rhombeis. *Jacq. obſ. bot.* 1. *t.* 22.

cultratus. 24. D. leguminibus racemoſis compreſſis dorſo ventroque tuberculatis, foliolis ovatis acutis glabris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 134.

funarius. 25. D. caule perenni, leguminibus pendulis pentaſpermis, foliis ovalibus utrinque glabris. *Molin hiſt. nat. Chil. p.* 132.

Faba indica. 26. D. foliolis ſtipulatis; ovatis repandis acuminatis ſubtus venoſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 133.

ſcarabæoides. 27. D. foliis ovatis tomentoſis, floribus ſolitariis, ſeminibus bicornibus. *Pluckn. alm. t.* 52. *f.* 3.

reticulatus. 28. D. foliis ovatis acutis rugoſis reticulatis villoſis, racemis paucifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 33.

Didire. 29. D. ſtipulis marginè reflexis obtuſis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 133.

bulboſus. 30. D. foliis glabris multangulis dentatis. *Pluckn. alm. t.* 52. *f.* 4.

trilobus. 31. D. foliolis lateralibus extrorſum gibbis: intermedio trilobo. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 1. *an diſtinctus a glycine triloba ?*

filiformis. 32. D. foliolis linearibus obtuſis mucronatis glabris ſubtus pubeſcentibus.

purpureus. 33. D. caule glabro, petiolis pubeſcentibus, corollæ alis patentibus.

regularis. 34. D. foliis ovatis obtuſis, pedunculis multifloris, petalis regularibus æqualibus.

†† *caule procumbente.*

roſeus. 35. D. caule adſcendente repente, foliis ſubrotundis nitidis, floribus racemoſis, leguminibus dorſo tricarinatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 105.

repens. 36. D. caule repente, foliis pubescentibus ovatis, floribus racemosis geminis, leguminibus linearibus teretibus.

Lubia. 37. D. caule diffuso, pedunculis axillaribus longissimis apice racemosis, leguminibus erectis polyspermis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 133.

††† *caule erecto.*

pugioniformis. 38. D. caule suberecto, leguminibus acinaciformibus tricarinatis: seminibus arillatis.

Soja. 39. D. caule flexuoso, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdispermis. *Kaempf amœn. exot. p.* 838. *ic.*

Catianus. 40. D. leguminibus geminis linearibus erectiusculis. *Rheed h. malab.* 3. *t.* 41.

biflorus. 41. D. caule perenni lævi, pedunculis bifloris, leguminibus erectis. *Pluckn. alm. t.* 213. *f.* 4.

868. GLYCINE. *Cal.* 2labiatus. *Corollæ* carina apice vexillum reflectens.

* *foliis simplicibus.*

monophylla. 1. Gl. foliis cordatis, caule pubescente triquetro. *Mant. p.* 101. *Pluckn. amalth. t.* 454. *f.* 8.

** *foliis ternatis.*

subterranea. 2. Gl. foliis radicalibus, caulibus procumbentibus flexuosis, pedunculis bifloris. *Linn. dec.* 37. *t.* 17.

monoica. 3. Gl. foliis nudiusculis, caulibus pilosis, racemis pendulis, floribus fructiferis apetalis.

debilis. 21. Gl. foliolis ovalibus subtus pilosis, leguminibus subsolitariis linearibus polyspermis: stilo persistente erecto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 34.

reticulata. 4. Gl. foliolis oblongo-lanceolatis pubescentibus subtus reticulato-venosis, racemis axillaribus subsessilibus, leguminibus oblongis compressis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 105.

villosa. 5. Gl. foliolis trilobis villosos, racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 283.

phaseoloides. 6. Gl. foliis subtus villosis, racemis terminalibus. *Swarts. nov. pl. gen. & sp. p.* 105.

tomentosa. 7. Gl. foliis tomentosis, racemis brevissimis axillaribus, leguminibus dispermis. *Dill. h. Elth. t. 26. f. 29. β?)* Dolichos pubescens. *Syst. nat.* XII. *p.* 3. 483. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 101.

comosa. 8. Gl. foliis hirsutis, racemis lateralibus.

striata. 9. Gl. volubilis, foliolis oblongis mollissime incanis, racemis axillaribus foliorum longitudine, leguminibus hirsutissimis. *Suppl. p.* 326. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 76.

labialis. 10. Gl. volubilis, foliolis obovatis subincanis, floribus axillaribus congestis, corolla subbilabiata. *Suppl. p.* 325.

suaveolens. 11. Gl. fruticosa erecta incana, foliolis ovatis acutis, floribus axillaribus solitariis, leguminibus dispermis. *Suppl. p.* 326.

lucida. 12. Gl. volubilis, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, racemis axillaribus glandulosis: pedicellis ternis, leguminibus inflatis dispermis. *Forst. flor. austr. p.* 51.

rosea. 13. Gl. volubilis, foliolis cordato-ovatis acutis integerrimis, pedunculis trifloris, leguminibus compressis carinatis monospermis. *Forst. flor. austr. p.* 50.

caribea. 14. Gl. foliolis rhombeis acutis, caulibus lignosis glabris, racemis axillaribus elongatis multifloris patentibus. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 66.

numularia. 15. Gl. foliolis obtusissimis, racemis floribus geminis, leguminibus sessilibus suborbiculatis compressis. *Mant. p.* 571.

triloba. 16. Gl. foliolis lobatis, caule prostrato, pedunculis bifloris. *Mant. p.* 516. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 1.

javanica. 17. Gl. caule villoso, petiolis hirsutis, bracteis lanceolatis minutis.

bituminosa. 18. Gl. floribus racemosis, leguminibus tumidis villosis. *Herm. par. Lugdb. p.* 493. *ic. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 5.

*** *foliis impari-pinnatis.*

Apios. 19. Gl. foliolis septenis ovato-lanceolatis. *Morif. hist. pl.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

frutescens. 20. Gl. caule perenni. *Hort. angl. t.* 15. *an distincti generis?*

CLVI.

CYLISTA. *Cor.* calice longior, persistens. *Vexillum* basi utrinque lobulo auctum. *Carina* apice basique fissa. *Alæ* utroque breviores.

villosa. 1. CYLISTA. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 36. 512.

869. CLITORIA. *Cor.* supinata, vexillo maximo patente alas obumbrante.

* *foliis pinnatis.*

ternatea. 1. Cl. foliis glabris. *Rheed. h. malab.* 8. 38. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 149. *f.* 3.

multiflora. 2. Cl. foliis oblongis subtus sericeis, racemis axillaribus multifloris. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 106.

** *foliis ternatis.*

brasiliana. 3. Cl. calicibus solitariis campanulatis. *Breyn cent. t.* 32.

virginiana. 4. Cl. calicibus subternis campanulatis. *Dill. h. Elth. t.* 76. *f.* 87.

micrantha. 5. Cl. suffruticosa volubilis, foliolis lanceolatis, pedunculis bifloris, flore altero sterili. *Scop del. ins.* 2. *p.* 1. *t.* 1.

mariana. 6. Cl. calicibus cylindricis.

Galactia. 7. Cl. fruticosa volubilis, spicis ascendentibus, floribus pendulis. *Scop. del. ins.* 2. *p.* 6. *t.* 3.

aquilupiensis. 8. Cl. fruticosa volubilis, foliolis subcordato-oblongis subperennantibus, spicis lateralibus folio longioribus patulis. *Scop. del. ins.* 2. *p.* 4. *t.* 2.

870. PISUM. *Calicis* laciniæ 2 superiores breviores. *Stilus* 3angulus, supra carinatus, pubescens. *Legumen* inflatum.

sativum. 1. P. petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Blackw. herb. t.* 83. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 2.

arvense. 2. P. petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunculis unifloris. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 1. *f.* 4.

maritimum. 3. P. petiolis supra planiusculis, caule angulato, stipulis sagittatis, pedunculis multifloris. *Flor. dan. t.* 338.

Ochrus. 4. P. petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 71. *Legumen alatum.*

871. OROBUS. *Cal.* basi obtusus: dentibus superioribus profundioribus, brevioribus. *Stilus* filiformis.

lathyroides. 1. O. foliis conjugatis subsessilibus, stipulis dentatis. *Amm. ruth. t.* 7. *f.* 2.

hirsutus. 2. O. foliis conjugatis petiolatis, stipulis integris. *Buxb. cent.* 3. *t.* 41.

angustifolius. 3. O. foliis bijugis ensiformibus subsessilibus, stipulis subulatis, caule simplici. *Gmel. flor. sib.* 4. *t.* 14. *f.* 5.

albus. 4. O foliis bijugis ensiformibus petiolatis, stipulis simplicibus, caule simplici. *Suppl. p.* 327. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 39.

canescens. 5. O. foliis bijugis linearibus, stipulis semisagittatis subulatis, caule ramoso. *Suppl. p.* 327.

pyrenaicus. 6. O. foliis bijugis lanceolatis nervosis, stipulis subspinosis, caule ramoso. *Pluckn. phyt.* 210. *f.* 2.

tenuifolius. 7. O. foliis subtrijugis linearibus, stipulis semisagittatis, caule inferne ramoso quadrangulo, superne alato. *Roth. Beytr.* 1. *p.* 78.

versicolor. 8. O. foliis quadrijugis, stipulis semisagittatis lanceolatis, pedunculis axillaribus angulatis. *Voy. suppl. pl. Ehr. sel. t.* CVII. *f.* 2.

niger. 9. O. foliis sexjugis ovato-oblongis, caule ramoso. *Riv. tetrap. t.* 60. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 3.

silvaticus. 10. O. foliis subseptemjugis, caule ramoso hirsuto decumbente. *Mant. p.* 67. *Act. paris.* 1706. *t.* 90.

luteus. 11. O. foliis pinnatis ovato-oblongis, stipulis rotundato-lunatis dentatis. *Mant. p.* 442. *Gmel. flor. sib.* 4. *t.* 4.

vernus. 12. O foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Blackw. herb. t.* 208. *f.* 1. 2.

tuberosus. 13. O. foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Flor. dan. t.* 781.

872. LATHYRUS. *Cal.* laciniæ 2 superiores breviores. *Stilus* planus supra villosus, superne latior. *Legumen* (plurimis) æquale latum.

* *pedunculis unifloris.*

Aphaca. 1. L. cirrhis aphyllis, stipulis sagittato-coronatis. *Mill. h. angl. t.* 43.

Nissolia. 2. L. foliis simplicibus, stipulis subulatis. *Buxb. cent.* 3. *t.* 45. *f.* 1.

sativus. 3. L. cirrhis diphyllis tetraphyllisque, leguminibus ovatis compressis dorso bimarginatis. *Rivin. tetrap. t.* 47. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 1. *Legumen æquale alatum.*

Cicera. 4. L. cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis dorso canaliculatis.

setifolius. 5. L. cirrhis diphyllis, foliolis setaceo-linearibus.

amphicarpos. 6. L. pedunculis calice longioribus, cirrhis diphyllis simplicissimis. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 23. *f.* 1.

inconspicuus. 7. L. pedunculis calice brevioribus, cirrhis diphyllis simplicibus, foliolis lanceolatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 86.

sphæricus. 8. L. pedunculis aristatis, cirrhis diphyllis simplicissimis, foliolis ensiformibus. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 39. *n.* 79.

angulatus. 9. L. pedunculis aristatis, cirrhis diphyllis simplicissimis, foliolis linearibus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 42. *f.* 2.

tomentosus 10. L. pedunculis ternis, paniculis axillaribus terminalibusque, cirrhis nullis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 135.

articulatus. 11. L. pedunculis subunifloris, cirrhis poliphyllis, foliolis alternis. *Mill. h. angl. t.* 96. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 1.

** *pedunculis bifloris.*

odoratus. 12. L. cirrhis diphyllis, foliolis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. *Curtis botan. magaz. t.* 60.

annuus. 13. L. cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, stipulis bipartitis, leguminibus glabris. *Riv. tetrap. t.* 158.

tingitanus. 14. L. cirrhis diphyllis, foliolis alternis lanceolatis glabris, stipulis lunatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 46. *Legumen huic & articulato nodosum.*

Clymenum. 15. L. cirrhis polyphyllis, stipulis dentatis. *Pluckn. phyt.* 114. *f.* 6.

*** *pedunculis multifloris.*

hirsutus. 16. L. pedunculis subtrifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. *Rivin. tetrap. t.* 41.

tuberosus. 17. L. cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Riv. tetrap. t.* 42.

pratensis. 18. L. cirrhis diphyllis simplicissimis, foliolis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 527.

silvestris. 19. L. cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Flor. dan. t.* 525.

latifolius. 20. L. cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Mill. ill. ic. Rivin. tetrap. t.* 40.

heterophyllus. 21. L. cirrhis diphyllis tetraphyllisque, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. β) Lathyrus. *Hacq. it. carp. sept.* 1. *p.* 32.

palustris. 22. L. cirrhis polyphyllis, stipulis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 399.

pisiformis. 23. L. cirrhis polyphyllis, stipulis ovatis foliolo latioribus. *Linn. dec.* 39. *t.* 20.

873. VICIA. *Stigma* latere inferiore transverse barbatum. *Legumen* (multis) nodosum.

* *pedunculis elongatis.*
† *multifloris.*

pisiformis. 1. V. petiolis polyphyllis, foliolis ovatis, infimis sessilibus. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 364. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

caroliniana. 30. V. petiolis polyphyllis, foliolis lanceolatis mucronatis, stipulis ovato-lanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 182.

bohemica. 2. V. foliolis ellipticis, stipulis integris, floribus racemosis. *Joh. Mayer boehm. Abh.* 3. 1787. *p.* 316. *t.* 11. a. b.

dumetorum. 3. V. foliolis reflexis ovatis mucronatis, ſtipulis ſubdentatis. *Rivin. tetrap. t.* 50.

ſilvatica. 4. V. foliolis ovalibus, ſtipulis denticulatis. *Flor. dan. t.* 277.

Cracca. 5. V. foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris, floribus imbricatis. *Flor. dan. t.* 804.

canefcens. 6. V. foliis ſuperioribus ſubcirrhoſis, foliolis ovali-oblongis lanuginoſis, ſtipulis ſemiſagittatis integris. *la Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec.* 1. *p.* 17. *t.* 7.

tenuifolia. 7. V. foliolis linearibus trinerviis acuminatis, ſtipulis linearibus integris, floribus imbricatis, caule erecto. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 309.

onobrychoides. 8. V. foliolis linearibus ſtipulis inferne denticulatis, floribus diſtantibus.

Gerardi. 9. V. foliolis oblongis ſubpubeſcentibus, ſtipulis integris, caule erecto. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 229.

niſſoliana. 10. V. foliolis oblongis, ſtipulis integris, leguminibus villoſis ovato-oblongis.

benghalenſis. 11. V. foliolis integerrimis, ſtipulis integris, leguminibus erectiuſculis. *Herm. par. lugdb. p.* 625. *ic.*

multiflora. 12. V. cirrhis polyphyllis, foliolis ovalibus pubeſcentibus, ſtipulis ſemiſagittatis integris, caule piloſo. *Leyſſ. flor. hal. p.* 725.

biennis. 13. V. petiolis ſulcatis ſubdodecaphyllis, foliolis lanceolatis glabris. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 11. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

†† *pedunculis ſubſexfloris.*

caſſubica. 14. V. foliolis denis ovatis acutis, ſtipulis integris. *Flor. dan. t.* 98.

††† *pedunculus uniflorus.*

monantha. 15. V. pedunculis ariſtatis, foliolis lanceolatis obtuſis, ſtipulis bifidis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 39.

exſtipulata. 16. V. petiolis polyphyllis, foliolis ſeſſilibus cordato-reniformibus. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 307. *t.* 33. *f.* 2.

ſepium. 17. V. leguminibus ſubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis, exterioribus decreſcentibus. *Flor. dan. t.* 699.

bithynica. 18. V. leguminibus solitariis erectis, foliolis quaternis ovali-lanceolatis, stipulis dentatis. *Jacq. h. Vind. 2. t. 147. Huic & narbonensi legumen loculamentosum latum.*

Clymenum. 19. V. leguminibus subbinatis, foliolis retusis, stipulis notatis. *S. G. Gmel. it. 3. p. 307. t. 33. f. 1. an distincta satis a sativa.*

** *floribus axillaribus subsessilibus.*

sativa. 20. V. leguminibus subbinatis erectis, foliolis omnibus oblanceolatis retusis emarginatis, stipulis dentatis, seminibus compressis. *Flor. dan. t. 522. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 9. t. 151. f. 1.*

angustifolia. 21. V. leguminibus subbinatis patentibus, foliis imis ovatis retusis emarginatis, superioribus linearibus apice integerrimis, stipulis dentatis, seminibus globosis. *Roth. flor. germ. 1. p. 310.*

narbonensis. 22. V. leguminibus subternis erectis, foliolis senis subovatis, stipulis denticulatis. *Knorr. del. hort. 2. t. L. 1.*

lathyroides. 23. V. leguminibus solitariis erectis glabris, foliolis subsenis, inferioribus obcordatis, stipulis semisagittatis integerrimis. *Flor. dan. t. 58.*

globosa. 24. V. leguminibus solitariis, foliolis ovatis, stipulis notatis quadrodentatis. *Retz. obs. bot. 3. p. 39. an distincta satis ab angustifolia?*

lutea. 25. V. leguminibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollæ vexillis glabris. *Moris. hist. pl. 2. t. 21. f. 5.*

hybrida. 26. V. leguminibus reflexis pilosis pentaspermis, corollæ vexillis villosis. *Jacq. flor. austr. 1. t. 34. Gaertn. de fr. & sem. pl. cent. 9. t. 151. f. 1.*

peregrina. 27. V. leguminibus pendulis glabris tetraspermis, foliolis linearibus emarginatis. *Pluckn. alm. t. 233. f. 6.*

Faba. 28. V. caule erecto, foliolis integerrimis, cirrhis nullis. *Blackw. herb. t. 19.*

serratifolia. 29. V. caule erecto, foliolis serratis, cirrhis nullis. *Jacq. flor. austr. 5. app. t. 8.*

874. ERVUM. *Cal.* 5partitus, longitudine corollæ:

monanthos. 1. E. pedunculis unifloris, corolla calicem superante.

erectum. 2. E. pedunculis bifloris, caule erecto subdichotomo. *Walt. flor. carol. p.* 187.

folonienfe. 3. E. pedunculis fubbifloris ariftatis, petiolis acuminatis, foliolis obtufis.

Lens. 4. E. pedunculis fubbifloris, feminibus compreffis convexis. *Flor. dan. t.* 95. *Legumen æquale latum.*

tetrafpermum. 5. E. pedunculis fubbifloris, feminibus globofis quaternis. *Curt. flor. Lond. t.* 41.

volubile. 6. E. pedunculis multifloris, floribus geminatis, caule volubili. *Walt. flor. carol. p.* 187.

hirfutum. 7. E. pedunculis multifloris, feminibus globofis binis. *Flor. dan. t.* 639.

Ervilia. 8. E. germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Blackw. herb. t.* 208. *f.* 3. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 4.

875. CICER. *Cal.* 5partitus, longitudine corollæ, laciniis 4 fuperioribus vexillo incumbentibus. *Legumen* rhombeum, turgidum, 2fpermum.

arietinum. 1. CICER. *S. G. Gmelin it.* 3. *t.* 3. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 2.

1319. LIPARIA. *Cal.* 5partitus, licinia infima elongata. *Cor.* alæ inferius 2lobæ. *Staminis* majoris dentes 3 breviores. *Legumen* ovatum.

fphærica. 1. L. floribus capitatis, foliis lanceolatis nervofis glabris. *Mant. p.* 268.

graminifolia. 2. L. floribus capitatis, calicibus villofis, foliis linearibus acutis alternis feffilibus. *Mant. p.* 268.

umbellata. 3. L. floribus umbellatis, foliis lanceolatis lævibus. *Nonne eadem cum Borbonia lævigata.*

villofa. 4. L. floribus fafciculatis, foliis ovatis villofo-tomentofis. *Mant. p.* 438. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 474. Borbonia tomentofa. *Seb. muf.* 1. *t.* 24. *f.* 1. 2.

fericea. 5. L. floribus fubfpicatis, foliis ovatis villofis tomentofis.

876. CYTISUS. *Cal.* 2labiatus $\frac{2}{3}$. *Legumen* basi attenuatum (plurimis) æquale, latum.

* *foliis compositis.*

glaber. 1. C. floribus solitariis lateralibus subsessilibus pendulis, foliis ternatis. *Suppl. p.* 328.

hirsutus. 2. C. pedunculis simplicibus lateralibus, calicibus hirsutis trifidis obtusis ventricoso-oblongis. *Jacq. obs. bot. t.* 96.

purpureus. 3. C. floribus pedunculatis solitariis, foliis glabris, caulibus decumbentibus frutescentibus, leguminibus superne falcatis. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 48.

supinus. 4. C. floribus subbinatis pedunculatis, foliis villosis, caulibus decumbentibus frutescentibus. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 20. *β*) Cytisus glabrescens. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 269.

argenteus. 5. C. floribus subbinatis subsessilibus, foliis tomentosis, stipulis minutis, caulibus decumbentibus *Lob. ic.* 2. *p.* 41.

austriacus. 6. C. floribus umbellatis terminalibus, caulibus erectis, foliolis lanceolatis. *Jacq flor. austr.* 1. *t.* 21.

capitatus. 7. C. floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, foliolis ovatis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 33.

prolifer. 8. C. umbellis axillaribus sessilibus proliferis, foliis ternatis petiolatis sericeis, foliolis lanceolatis, bracteis filiformibus. *Suppl. p.* 328.

Cajan. 9. C. racemis axillaribus erectis, foliolis sublanceolatis tomentosis, intermedio longius petiolato. *Rheed. h. malab.* 6. *t.* 13. *β*) *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 119. *Legumen loculamentosum simplex.*

sessilifolius. 10. C. racemis erectis, calicibus bractea simplici, foliis floralibus sessilibus.

Wolgericus. 11. C. canus, racemis simplicibus erectis, floribus secundis, foliis pinnatis, foliolis subrotundis, stipulis subulatis. *Suppl. p.* 327 *Pall. it.* 3. *t. G.* 9. *f.* 3. *flor. ross. t.* 47.

foliolosus. 17. C. racemis terminalibus erectis, calicibus villosis, laciniis falcatis, foliolis obovato-oblongis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 49.

nigricans. 12. C. racemis terminalibus erectis, calicibus villosis, foliolis ellipticis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 387. *Stamina monadelphia.*

Laburnum. 13. C. racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Jacq. flor. austr. 4. t. 306. Stamina monadelphia.* Cytisus alpinus. *du Roi harbk. Baumz.* 1. *p.* 198. *Legumen nodosum.*

violaceus. 14. C. floribus spicatis, foliis ternatis, capsulis linearibus: leguminibus villosis compressis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 7 *t.* 306.

** *foliis simplicibus.*

graecus. 15. C. foliis lanceolato-linearibus, ramis angulatis.

tener. 16. C. foliis lanceolatis, ramis teretibus. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 40. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 88.

1417. MULLERA. *Pericarpium* elongatum, carnosum, moniliforme, *globulis* 1spermis.

moniliformis. 1. MÜLLERA. *Suppl. p.* 329. *Merian surin. t.* 35.

878. GEOFFROYA. *Cal.* semiquinquefidus *Drupa* ovata. *Nucleus* compressus.

spinosa. 1. G. spinosa, foliolis oblongis obtusis. *Jacq. stirp. am. pict. t.* 262. *f.* 58.

inermis. 2. G. inermis, foliolis lanceolatis. *Wright act. angl.* 1777. *p.* 512. *t.* X*.

879. ROBINIA. *Cal.* 4fidus. *Legumen* elongatum, (multis) aequale, cylindricum.

Pseud-Acacia. 1. R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, stipulis spinosis. *Seb. mus.* 1. *t.* 15. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 2. *Legumen nodosum.*

violacea. 2. R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 61.

sepium. 3. R. racemis pedicellis bifloris, foliis impari pinnatis, pinnis ovatis acuminatis, caule inermi. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 106.

hispida. 4. R. racemis axillaribus, foliis impari-pinnatis, caule inermi hispido. *Mant. p.* 101. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 3. *Mill. h. angl. t.* 244.

Halodendron. 5. R. racemis axillaribus trifloris, petiolis spinescentibus, foliis conjugatis petiolatis, foliis cuneiformibus spinosis cuspidatis. *Suppl. p.* 330. *Pall. it.* 2. *t.* W. *Flor. ross. t.* 46.

mitis. 6. R. racemis pedicellis ternis, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Pluckn. t.* 310. *f.* 3.

Panacoco. 7. R. panicula spicata terminali, foliis impari-pinnatis tomentosis, stipulis subrotundis. *Aubl. pl. guj. p.* 768. *t.* 307. β) Robinia coccinea.

Nica. 8. R. spica axillari, foliis impari pinnatis, ramis scandentibus. *Aubl. pl. guj. p.* 771. *t.* 308.

vesicaria. 9. R. pedunculis axillaribus solitariis quinquefloris, foliis præter unicum simplex ovatum sine impari pinnatis, leguminibus inflatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 107.

Caragana. 10. R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, petiolis inermibus. *Pallas flor. ross. t.* 42.

spinosa. 11. R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, stipulis petiolisque spinescentibus. *Mant. p.* 269. *Pallas flor. ross. t.* 44.

frutescens. 12. R. pedunculis simplicibus, foliis quaternatis subpetiolatis terminatis spina inermi. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 8. *Pallas flor. ross. t.* 43.

pygmæa. 13. R. pedunculis simplicibus, foliis quaternatis sessilibus. *Pallas flor. ross. t.* 45.

880. COLUTEA. *Cal.* 5fidus. *Legumen* æquale latum, plurimis. *Capsula* inflata.

* *caule arboreo.*

arborescens. 1. C. foliolis obcordato-oblongis, stipulis lanceolatis, racemis hirsutis, leguminibus apice clausis. *Regn. bot. t.* 224. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 4. β) *Commel. rar. t.* 11.

orientalis. 2. C. foliolis obcordatis rotundatis subcarnosis, stipulis minimis denticulatis, racemis glabris, leguminibus apice superne hiantibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 305.

** *caule fruticoso.*

humilis. 3. C. foliolis obcordatis, carinæ apice truncato. *Scopol. Sel. inf.* 2. *p.* 23. *t.* 12.

frutescens. 4. C. foliolis ovato-oblongis, caule inermi. *Mill. h. angl. t.* 99.

*** *caule herbaceo.*

perennans. 5. C. foliolis ovalibus, racemis approximatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 3.

fistulosa. 6 C. foliolis ovatis complicatis subtus pubescentibus. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 40.

æschynomenoides. 7. C. foliolis glabris lanceolatis obtusis e nervo acuminatis. *Scopol del inf.* 3. *p.* 22. *t.* 12.

herbacea. 8. C. foliolis linearibus glabris. *Murray comm. goett.* 1774. *p.* 40. *t.* 7. *f.* 12. 13. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 4.

DIPHYSA. *Cal.* campanulatus, semiquinquefidus $\frac{2}{3}$. *Legumen* lineare, 1loculare, polyspermum, utrinque longitudinaliter vesica membranacea inflata auctum.

carthagenensis. 1. DIPHISA. *Jacq. stirp. amer. p.* 208. *t.* 180. *f.* 51.

882. GLYCYRRHIZA. *Cal.* 2labiatus $\frac{1}{3}$. *Legumen* ovatum, compressum.

echinata. 1. Gl. leguminibus echinatis, foliis stipulatis, foliolo impari sessili. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 95. *Gaertn. de fruct. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 6.

hirsuta. 2. Gl. leguminibus hirsutis, foliolo impari petiolato.

glabra. 3. Gl. leguminibus glabris nodosis, stipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Regn. bot.*

asperrima. 4. Gl. foliolis ellipticicis cuspidatis, caule hispido scabro. *Suppl. p.* 330. *Pallas it.* 1. *t.* I. *f.* 3. *t.* G. g. *f.* 1. 2.

883. CORONILLA. *Cal.* 2labiatus $\frac{2}{3}$, dentibus superioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* aliis, aliis *Pericarpium* articulatum.

* *Fruticosæ.*

Emerus. 1. C. pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calice triplo longioribus, caule angulato. *Mill. h. angl. t.* 132. *f.* 1. β) *Mill. h. angl. t.* 132. *f.* 2. *Legumen angustum loculamentosum.*

juncea. 2. C. foliis quinatis ternatisque lineari-lanceolatis subcarnosis obtusis. *Barr. pl. rar. ic.* 133.

glauca. 3. C. foliolis septenis obtusissimis, stipulis lanceolatis. *Mant. p.* 444. *Mill. ic. h. angl. t.* 106.

valentina. 4. C. foliolis subnovenis, stipulis suborbiculatis. *Rivin. tetrap.* 206. *Gaertn. de fr. & sem. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 1.

coronata. 5. C. foliolis novenis obovatis, internis cauli approximatis, stipula oppositifolia bipartita. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 95.

argentea. 6. C. foliis undenis sericeis, extimo majore.

minima. 7. C. suffruticosa procumbens, foliolis novenis ovatis, stipula oppositifolia emarginata, leguminibus angulatis nodosis. *Mant. p.* 444. *Jacq. fl. austr.* 3. *t.* 271.

** *Herbaceæ.*

securidaca. 8. C. leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 153. *f.* 3. *Mill. h. angl. t.* 232. *Capsula composita.*

varia. 9. C. leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *S. G. Gmelin. it.* 1. *t.* 21. *Mill. h. angl. t.* 101.

cretica. 10. C. leguminibus quinis erectis teretibus articulatis, foliolis undenis. *Mant. p.* 445. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 25.

scandens. 11. C. caule scandente flaccido. *Plum. ic.* 107. *f.* 3.

884. ORNITHOPUS. *Pericarpium* articulatum teres arcuatum.

perpusillus. 1. O. foliis pinnatis, leguminibus incurvatis, bractea pinnata duplo majoribus. *Flor. dan. t.* 730.

intermedius. 2. O. caulibus repentibus longissimis, foliis pinnatis, bractea pinnata leguminibus incurvatis majore. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 319.

compressus. 3. O. foliis pinnatis, leguminibus recurvatis compressis rugosis, bractea pinnata.

scorpioides. 4. O. foliis ternatis subsessilibus, impari maximo. *Rivin. tetrap. t.* 210. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 3.

tetraphyllus. 5. O. foliis quaternis, floribus solitariis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 116. *f.* 3.

repandus. 6. O. foliis ternatis quinatisque, impari majore, stipulis subreniformibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 215.

885. HIPPOCREPIS. *Pericarpium* multiloculare compressum, altera sutura pluries emarginatum, curvum.

unisiliquosa. 1. H. leguminibus sessilibus solitariis rectis. *Riv. tetrap. t.* 98. *Mill. h. angl. t.* 278. *f.* 1.

multisiliquosa. 2. H. leguminibus pedunculatis confertis circularibus, margine altero lobatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 300. *Mill. h. angl. t.* 278. *f.* 2.

comosa. 3. H. leguminibus pedunculatis confertis arcuatis margine exteriore repandis. *Mant. p.* 445. *Riv. tetrap. t.* 97.

balearica. 4. H. leguminibus pedunculatis confertis subarcuatis lanceolato-oblongis margine exteriori repandis. *Jacq. misc.* 2. *p.* 305. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 5.

PETAGNANA. *Legumen* articulis distinctis 1spermis stilo connexis.

sensitiva. 1. PETAGNANA. *Ait. hort. Kew.* 1. *p.* 496. 512. *t.* 13.

886. SCORPIURUS. *Pericarpium* articulatum, revolutum, teres.

vermiculata. 1. Sc. pedunculis unifloris, leguminibus tectis undique squamis obtusis. *Rivin. tetrap. t.* 210. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 4.

muricata. 2. Sc. pedunculis bifloris, leguminibus extrorsum obtuse aculeatis. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 11. *f.* IV.

sulcata. 3. Sc. pedunculis subbifloris, leguminibus extrorsum spinis distinctis acutis. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 4. *Mill. h. angl. t.* 230.

subvillosa. 4. Sc. pedunculis subquadrifloris, leguminibus extrorsum spinis confertis acutis. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 11. *f.* 11.

888. ÆSCHYNOMENE. *Cal.* 2labiatus. *Legumen* articulis truncatis, 1spermis.

* *caule arboreo.*

arborea. 1. Æ. caule lævi, leguminum articulis semicordatis glabris.

grandiflora. 2. Æ. floribus maximis, leguminibus filiformibus. *Rheed. h. malab.* 1. *t.* 51.

coccinea. 3. Æ. foliis pinnatis, foliolis numerosis linearibus obtusis pulverulentis, leguminibus compressis æqualibus. *Suppl. p.* 330.

** *caule fruticoso.*

sensitiva. 4. Æ. caule glabro, foliolis obtusis, stipulis acutis deciduis, leguminibus lævibus obtusis. *Plum. ic.* 149. *f.* 2.

*** *caule herbaceo.*

cannabina. 5. Æ. foliolis obtusis acuminatis, pedunculis solitariis, leguminibus compressis lævibus. *Retz. obs. bot.* 5. *p.* 26.

aspera. 6. Æ. caule scabro, leguminum articulis medio scabris. *Breyn. cent.* 51. *t.* 52.

americana. 7. Æ. caule hirsutiusculo, leguminum articulis semicordatis, foliolis falcatis, bracteis ciliatis. *Act. Petrop.* 1763. *t.* 12. *Gaertn. de fr. & sem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 6.

indica. 8. Æ. caule lævi, leguminibus lævibus hinc torosis obtusis, foliolis obtusis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 18.

Sesban. 9. Æ. caule lævi, leguminibus cylindricis æqualibus, foliolis obtusis. *Burm. zeyl. t.* 41.

pumila. 10. Æ. caule lævi, leguminibus hinc serratis medio scabris foliolis acuminatis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 20.

Burmanni. 11. Æ. leguminibus æqualibus lævibus, corollis hirsutis. *Burm. amer. p.* 115. *t.* 125. *f.* 1.

herbacea. 12. Æ. foliis subrotundis, leguminibus angustissimis compressis. *Rheed. h. mal.* 9. *t.* 20.

STILOSANTHES. *Cal.* tubulosus, longissimus, corollifer. *Germen* infra corollam. *Legamen* 2articulatum, hamatum.

procumbens. 1. St. foliis ternatis acuminatis lineatis glabris, spicis multifloris, caule procumbente. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 494. Hedysarum hamatum. *Burm. zeyl. t.* 106. *f.* 2. *Swarts nov. act. suec.* 1789. 4. *n.* 4. *t.* 11. *f.* 1.

viscosa. 2. St. foliis ternatis ovatis ciliatis hirsutis, spicis paucifloris, caule erecto. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 119. *f.* 1. *Swarts nov. act. suec.* 1789. 4. *n.* 4. *t.* 11. *f.* 2.

elatior. 3. St. foliis glabris lanceolato-acutis, spicis paucifloris, vaginis foliolisque ciliatis caule erecto. *Swarts n. act. suec.* 1789. 4 *n.* 4. *t.* 11. *f.* 3. *Syst. n.* XII. 3. *p.* 562. Trifolium biflorum.

gujanensis. 4. St. foliis lanceolato-acuminatis, petiolis longioribus, spicis multifloris villosis caule erecto hirsuto. *Aubl. guj. t.* 309.

887. HEDYSARUM. *Cor.* carina transversim obtusa. *Legumen* articulis 1spermis.

* *foliis simplicibus.*

gramineum. 1. H. foliis lineari-lanceolatis, stipulis scariosis, racemis nudis, pedicellis bifloris, calicum dentibus barbatis. *Kœnig. apud Retz. obs. bot.* 5. *p.* 26.

glumaceum. 2. H. foliis lanceolatis, stipulis calicibusque scariosis, leguminibus rugosis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 136.

bupleurifolium. 3. H. foliis lanceolatis acutis, ſtipulis ſcarioſis, caule inermi. *Pluckn. amalth. t.* 443. *f.* 4.

hirſutum. 4. H. foliis lanceolatis nervoſis hirſutis ſubtus incanis, nervis ferrugineis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 774.

Alhagi. 5. H. foliis lanceolatis obtuſis, caule fruticoſo ſpinoſo. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 29.

vaginale. 6. H. foliis cordato-lanceolatis, petiolis ſimplicibus, ſtipulis vaginalibus. *Burm. zeyl. t.* 49. *f.* 1.

imbricatum. 7. H. foliis cordatis ſeſſilibus ſtipulatis, ſuperioribus imbricatis floriferis. *Suppl. p.* 331.

ſtyracifolium. 8. H. foliis cordato-orbiculatis retuſis ſupra glabris ſubtus tomentoſis.

moniliferum. 9. H. foliis orbiculatis, leguminibus moniliformibus globoſo articulatis. *Mant. p.* 102. *Burm. ind. t.* 52. *f.* 3.

reniforme. 10. H. foliis reniformibus, caule tereti. *Burm. ind. t.* 52. *f.* 1.

ſororium. 11. H. foliis reniformibus emarginatis, caule triquetro. *Mant. p.* 270. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 2.

veſpertilionis 12. H. foliis lunatis, lobis retrofalcatis, racemo terminali, leguminibus retrofractis calici inflato incluſis. *Suppl. p.* 331.

gangeticum. 13. H. foliis ovatis acutis ſtipulatis. *Burm. zeyl. t.* 49. *f.* 2.

maculatum 14. H. foliis ovatis obtuſis. *Dill. h. Elth. t.* 141. *f.* 161.

latebroſum. 15. H. foliis ovatis ſerrulatis, leguminibus occultatis bractea fornicata ſupina ſcarioſa. *Mant. p.* 270. *Pet. gaz. t.* 30. *f.* 11.

numularifolium. 16. H. foliis cuneiformibus. *Petiv. gaz. t.* 26. *f.* 4.

triquetrum. 17. H. foliis oblongis, petiolis alatis, ramis triquetris. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 2.

ſtrobiliferum. 18. H. bracteis ſtrobilorum inflatis cordatis obtuſis. *Flor. zeyl. t.* 3.

** *foliis compoſitis.*

† *binatis.*

diphyllum. 19. H. foliis petiolatis, bracteis geminis ovatis acuminatis ſeſſilibus. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 82. β) *Burm. zeyl. t.* 50. *f.* 1.

†† *ter-*

† † *ternatis.*

spartium. 20. H. foliis ternatis simplicibusque subtomentosis, caule dichotomo, floribus geminis, leguminibus articulatis hispidis. *Burm. ind. t.* 51. *f.* 2.

canadense. 21. H. foliis ternatis simplicibusque, caule lævi, floribus racemosis. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 11. *f.* 9. *Pericarpium articulatum.*

pulchellum. 22. H. bracteis geminis conjugatis orbiculatis lineatis. *Burm. ind. t.* 52.

umbellatum. 23. H. pedunculis umbelliferis, caule fruticoso. *Rumpf. amb.* 4. *t.* 52.

heterocarpon. 24. H. floribus paniculato-spicatis, leguminibus articulatis, infimo monospermo, stipulis setaceis. *Burm. zeyl. t.* 53. *f.* 1.

retroflexum. 25. H. racemis erectis, leguminibus pendulis multiarticulatis. *Mant. p.* 103.

barbatum. 26. H. floribus terminalibus subspicatis, leguminibus inflexis calicibus hirsutis.

lagopodioides. 27. H. racemis oblongis, leguminibus inflexis, calicibus hirsutis. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 2.

nudiflorum. 28. H. scapo florifero nudo, caule folioso angulato.

biarticulatum. 29. H. caule suffruticoso, leguminibus biarticulatis. *Burm. zeyl. t.* 50. *f.* 2.

viscidum. 30. H. caule ramisque hispidis, leguminibus membranaceis lævibus integris. *Burm. zeyl. t.* 84. *f.* 1.

lineatum. 31. H. foliolis oblongis lineatis, racemis axillaribus pendulis. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 1.

Scorpiurus. 32. H. foliolis oblongis subtus hirsutis, caulibus procumbentibus trigonis, racemis axillaribus, leguminibus teretiusculis erectis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p.* 107.

racemosum. 33. H. foliolis oblongis stipulatis glabris, caule frutescente erecto, racemis axillaribus erectis longissimis, leguminibus glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 285.

caudatum. 34. H. foliolis oblongis glabris, caule herbaceo, panicula terminali, leguminibus tomentosis. *Thunb. flor. jap. p.* 286.

striatum. 35. H. foliolis oblongis stipulatis, caule herbaceo, floribus axillaribus solitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 289.

tortuo-ſum. 36. H. foliis ovali-oblongis obtuſis glabriuſculis, racemis erectis axillaribus, leguminibus tortuoſis compressis pubeſcentibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 184. *t.* 116. *f.* 2.

volubile. 37. H. foliolis ovato-oblongis, caule volubili. *Dill. h. Elth. t.* 143. *f.* 170.

violaceum. 38. H. foliolis ovatis, floribus geminatis, leguminibus nudis venoſis articulatis rhombeis.

microphyllum. 39. H. foliolis ovatis villoſis, caule fruteſcente erecto glabro, floribus terminalibus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 284.

ſpirale. 40. H. foliolis ovatis obtuſis glabris, caule ramoſiſſimo, ramis diffuſis, racemis laxis divaricatis, leguminibus ſpirali-tortuoſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 107.

ſupinum. 41. H. foliolis ovatis obtuſiuſculis ſubtus incano-villoſis, caule ramoſo procumbente, racemis ſimplicibus erectis terminalibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 185. *t.* 118. *f.* 2.

canum. 42. H. foliolis ovatis acuminatis ſubtus incanis, caule tereti ramoſo erecto, racemis terminalibus erectis, leguminibus declinatis hirtis. *Plum. ic.* 149. *f.* 1.

piloſum. 43. H. foliolis ovatis acuminatis, caule decumbente hirto, racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 290.

trigonum. 44. H. foliolis ovatis acutis hirtis, caule adſcendente triquetro, racemis longiſſimis axillaribus, leguminibus tortuoſis inflexis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 107.

triangulare. 45. H. foliolis ovatis acutis lineatis, umbellis axillaribus, ramis triquetris flexuoſis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 40. *an diſtinctum ſatis a trigono.*

fruteſcens. 46. H. foliolis ſubovatis ſubtus villoſis, caule fruteſcente. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 89.

hirtum. 47. H. foliolis ovalibus, caule fruticoſo, ſpicis oblongis, fructibus monoſpermis calicibuſque hirſutis.

marilandicum. 48. H. foliolis ſubrotundis, caule fruteſcente ramoſiſſimo, leguminibus articulatis lævibus. *Dill. h. Elth. t.* 144. *f.* 171.

aſcendens. 49. H. foliolis ſubrotundis ſubtus pubeſcentibus, caule tereti, ramis declinatis aſcendentibus piloſis, racemis ſimplicibus erectis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 106.

axillare. 50. H. foliolis rhombeo-ſubrotundis, petiolis erectis, ſcapis axillaribus folio longioribus, caule repente radicante. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 107.

virgatum. 51. H. foliolis cum acumine obtufis, caule angulato pilofo, pedunculis capillaribus trifloris. *Thunb. flor. jap. p. 290.*

viridiflorum. 52. H. foliolis acutiufculis, caule erecto, racemis longiffimis erectis. *Pluckn. alm. t. 308. f. 5.*

junceum. 53. H. foliolis lanceolatis, pedunculis fubumbellatis lateralibus, leguminibus uniarticulatis rhombeis. *Lin. dec. 1. t. 4.*

paniculatum. 54. H. foliolis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis, leguminibus rhombeis. *Pluck. mant. t. 432. f. 6.*

repens. 55. H. foliolis obcordatis, caulibus procumbentibus, racemis lateralibus. *Dill. h. Elth. t. 142. f. 169.*

triflorum. 56. H. foliolis obcordatis, caulibus procumbentibus, pedunculis unifloris terminalibus. *Swartz obf. bot. t. 6. f. 1.*

diftortum. 57. H. caule fruticofo, leguminibus tortuofis. *Sloan. hift. jam. 2. p. 184. t. 116. f. 2.*

fericeum. 58. H. foliolis emarginatis villofis, caule frutefcente erecto; floribus axillaribus folitariis. *Thunb. flor. jap. p. 287.*

tomentofum. 59. H. foliis fubtus tomentofis, caule angulato tomentofo; racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p. 286.*

canefcens. 60. H. foliis fubtus fcabris, caule hifpido, floribus racemofis conjugatis.

gyrans. 61. H. foliolis lateralibus fpontaneo motu gyratorio huc illuc agitatis. *Suppl. p. 332.*

lappaceum. 62. H. foliolis obcordatis, floribus axillaribus fubfolitariis; leguminibus biarticulatis, fetis hamofis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 136.*

racemiferum. 63. H. foliolis ovatis, floribus racemofis conjugatis. *Burm. amer. p. 140. t. 149. f. 1.*

gujanenfe. 64. H. frutefcens, foliis fubtus incanis, floribus congeftis racemofis, leguminibus hirfutis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 774.*

grandiflorum. 84. H. foliolis ovalibus venofis utrinque lævibus, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis. *Walt. flor. carol. p. 185.*

††† *foliis pinnatis.*

argentatum. 65. H. foliis fubtus fericeis lucidis, leguminibus articulatis; fcapo aphyllo. *Suppl. p. 333. Syft. nat. XII. 3. p. 300.* Aftragalus grandiflorus. *Gmel. fior. fib. 4. t. 31.*

frutico-fum. 66. H. foliolis alternis oblongis mollibus, ftipulis fubulatis, ramis axillaribus, leguminum articulis reticulatis. *Suppl. p.* 333. *Pallas it.* 3. *t.* F.

cornu-tum. 67. H. foliolis linearibus, leguminibus monofpermis lævibus, caule fruticofo, pedunculis perfiftenti-fpinofis. *Tournef. it.* 2. *p.* 108. *ic.*

incanum. 68. H. foliis exftipulatis fubtus incanis, caule erecto, floribus racemofis cernuis. *Thunb. flor. jap. p.* 289.

Crifta galli. 69. H. leguminibus monofpermis aculeatis: criftæ laciniis lanceolatis denticulatis. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 5. *Capfula duplicata.*

Caput galli. 70. H. leguminibus monofpermis, criftæ dentibus fubulatis, alis breviffimis, caule diffufo. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 44. *Capfula duplicata.*

faxatile. 71. H. leguminibus monofpermis fulcatis muticis, corollarum alis breviffimis, fcapis fubradicatis.

Onobry-chis. 72. H. leguminibus monofpermis aculeatis, corollarum alis calicem æquantibus, caule elongato. *Jacq. flor. auftr.* 1. *t.* 38. *Capf. potius duplicata: capfulis intus nidulantibus.*

pumilum. 73. H. leguminibus monofpermis, caule fuffruticofo, corollarum alis, vexilloque carina brevioribus. *Mant. p.* 448.

crinitum. 74. H. leguminibus inflexis, racemis longis, caule fruticofo. *Mant. p.* 102.

alpinum. 75. H. leguminibus articulatis glabris pendulis, caule erecto. *Gmel. flor. fib.* 4. *t.* 10. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 5.

virgini-cum. 76. H. leguminibus articulatis glabris pedunculatis erectis, caule fruticofo.

humile. 77. H. leguminibus articulatis afperis, corollæ alis obfoletis, fpicis hirfutis, caulibus depreffis. *Mant. p.* 449.

fpinofif-fimum. 78. H. leguminibus articulatis aculeatis tomentofis, caule diffufo. *Pluckn. phyt.* 50. *f.* 2.

flexuo-fum. 79. H. leguminibus articulatis aculeatis flexuofis, caule diffufo. *Riv. tetr. t.* 213.

corona-rium. 80. H. leguminibus articulatis dentatis nudis rectis, caule diffufo. *Gaertn. de fr. & fem. pl. cent.* 9. *t.* 159. *f.* 5. *Kniph. bot. orig. cent.* 3. *n.* 45. *Pericarpium huic & flexuofo articulatum.*

pictum. 81. H. leguminibus articulatim huc illuc flexuosis rugosis, caule erecto subsimplicissimo. *Jacq. coll.* 2. *p.* 262.

obscurum. 82. H. stipulis vaginalibus, caule erecto flexuoso, floribus pendulis. *Mant. p.* 447. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 168.

**** incertæ tribus.*

immaculatum. 83. H. leguminibus conjugatis rectis exterius lobatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 214.

889. INDIGOFERA. *Cal.* patens. *Cor.* carina utrinque calcari subulato patulo. *Legumen* lineare.

** foliis simplicibus.*

linifolia. 34. I. foliis linearibus canis, leguminibus globosis. *Suppl. p.* 331. Hedysarum linifolium.

sericea. 1. I. foliis lanceolatis sericeis, spicis sessilibus, caule fruticoso. *Mant. p.* 271.

ovata. 2. I. foliis ovatis, caule herbaceo. *Suppl. p.* 335.

oblongifolia. 3. I. foliis oblongis sericeis, caule fruticoso, racemis axillaribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 137.

*** foliis ternatis.*

trifoliata. 4. I. floribus sessilibus lateralibus.

mexicana. 5. I. panicula ramosa spicata, caule fruticoso. *Suppl. p.* 335.

spinosa. 6. I. foliis obovatis, pedunculis spinescentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 137.

psoraloides. 7. I. foliis lanceolatis, racemis longissimis, leguminibus cernuis. *Sp. pl. p.* 1043. Cytisus psoraloides. *Rivin. tetrap.* 71. *f.* 135.

candicans. 32. I. foliis lanceolato-linearibus subtus sericeis, spicis pedunculatis paucifloris, leguminibus cylindricis rectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 67.

amoena. 33. I. foliis ovalibus pilosiusculis, ramis teretibus, spicis pedunculatis, stipulis setaceis, calicibus laxis, caule frutescente. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 68.

sarmentosa. 8. I. foliis ovatis subsessilibus, pedunculis axillaribus subbifloris, caule prostrato filiformi. *Suppl. p.* 334.

trita. 9. I. foliis ovatis acutis, racemis brevibus, caule erecto. *Suppl. p.* 335.

denudata. 10. I. foliis ovatis glabris, racemis pedunculatis folio longioribus, caule fruticoso erecto. *Suppl. p.* 334.

procumbens. 11. I. foliis obovatis, caule herbaceo prostrato, spicis pedunculatis. *Mant. p.* 271.

*** *foliis quinatis.*

filiformis. 12. I. foliis oblongis villosis, floribus spicatis pedunculatis; pedunculis ramisque filiformibus, caule erecto. *Suppl. p.* 334.

digitata. 13. I. foliis digitatis, racemis pedunculatis, caule fruticoso. *Suppl. p.* 335.

**** *foliis pinnatis.*

cytisoides. 14. I. foliis quinato-pinnatis ternatisque, racemis axillaribus, caule fruticoso. *Sp. pl. p.* 1076. Psoralea cytisoides. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 84.

glabra. 15. I. foliis pinnatis ternatisque obovatis, racemis brevissimis, leguminibus horizontalibus teretibus. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 67.

fragrans. 16. I. foliis quinato-pinnatis pilosis, foliolis ovatis, extimo majore, leguminibus tetragonis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 4. *p.* 29.

pentaphylla. 17. I. foliolis ovalibus quinis, caulibus prostratis, pedunculis bifloris.

semitrijuga. 18. I. foliolis obcordatis quinis, leguminibus subspicatis torulosis pendulis, caule prostrato suffruticoso. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 137.

enneaphylla. 19. I. foliolis cuneatis septenis, caulibus prostratis, spicis lateralibus. *Mant. p.* 102. 272. 571. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 496 Hedysarum prostratum. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 1.

spicata. 20. I. foliolis obovatis, floribus spicatis, leguminibus teretibus torulosis pendulis, caule decumbente. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 138.

tinctoria. 21. I. foliolis obovatis, racemis brevibus, leguminibus rectis, caule suffruticoso. *Mill. h. angl. t.* 34. *Blackw. herb. t.* 596.

frutescens. 22. I. foliolis ovatis glabris, racemis axillaribus pedunculatis, caule fruticoso erecto. *Suppl. p.* 334.

dispERMA.23. I. foliolis ovalibus, racemis elongatis, leguminibus dispermis. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 232. *Trew. Ehret. t.* 55.

stricta. 24. I. foliolis oblongis glabris, racemis axillaribus vix pedunculatis, caule fruticoso erecto. *Suppl. p.* 334.

Anil. 25. I. foliolis lanceolatis, racemis brevibus, caule suffruticoso. *Mant. p.* 272. *Sloan. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 3.

angustifolia. 26. I. foliolis linearibus, racemis elongatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 272.

hirsuta. 27. I. hirsuta, caule erecto, floribus spicatis, leguminibus pendulis lanatis. *Rheed. h. malab.* 1. *t.* 30.

dendroides. 28. I. foliolis oblongis, racemis axillaribus multifloris, caule erecto herbaceo. *Jacq. coll.* 2. *p.* 357. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 70.

hendecaphylla. 29. I. foliolis obovatis obtusis integerrimis, spicis axillaribus solitariis pedunculatis, caulibus prostratis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 359. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 71.

caroliniana. 30. I. leguminibus gibbis, racemis axillaribus folio longioribus, radice perenni. *Walt. flor. carol. p.* 187.

argentea. 31. I. foliis simplicibus ternatis pinnatisque sericeis, leguminibus torulosis pendulis. *Mant. p.* 273.

890. GALEGA. *Cal.* dentibus subulatis, subæqualibus. *Legumen* striis obliquis, seminibus interjectis.

tinctoria. 1. G. leguminibus strictis pendulis, spicis lateralibus pedunculatis, foliolis emarginatis subtus villosis.

caribæa. 2. G. leguminibus strictis glabris pendulis racemosis, foliolis glabris mucronatis, caule fruticoso. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 193.

cinerea. 3. G. leguminibus strictis patentibus pedunculatis, racemis oppositifoliis, foliolis mucronatis subtus villosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 72.

pallens. 4. G. leguminibus strictis patentibus ciliatis, stipulis subulatis, foliolis oblongis acutis subtus pubescentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 70.

officinalis. 5. G. leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. *Mill. h. angl. t.* 133. *Blackw. herb. t.* 92.

maxima. 6. G. leguminibus ſtrictis aſcendentibus glabris, ſtipulis lanceolatis, foliolis oblongis glabris ſtriatis. *Burm. zeyl. t. 108. f. 2.*

purpurea. 7. G. leguminibus ſtrictis aſcendentibus glabris racemoſis terminalibus, ſtipulis ſubulatis, foliolis oblongis glabris. *Burm. zel. t. 33.*

piſcatoria. 8. G. leguminibus ſtrictis aſcendentibus ſubvilloſis, pedunculis ancipitibus, ſtipulis ſubulatis, foliolis oblongis obtuſis ſubtus ſubpiloſis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 71.*

ochroleuca. 9. G. leguminibus linearibus glaberrimis compreſſis erectis, foliolis obovatis integerrimis ſubpetiolatis, pedunculis axillaribus ſuperne racemoſis. *Jacq. Collect. 1. p. 79.*

ſtricta. 10. G. leguminibus rectis villoſis, racemis oppoſitifoliis, ſtipulis ſubulatis, foliolis villoſis oblongis, vexillis ſupra ſericeis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 70.*

pulchella. 11. G. leguminibus rectis teretibus villoſis, ſtipulis linearibus, foliolis plurimis acuminatis, acumine reflexo. *Scop. del. inſ. 1. p. 3. t. 2.*

ſenticoſa. 12. G. leguminibus binis lateralibus glabris, foliolis emarginatis ſubtus ſericeis, caule fruticoſo.

littoralis. 13. G. villoſo-tormentoſa, leguminibus racemoſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t. 192.*

villoſa. 14. G. leguminibus retrofalcatis villoſis pendulis racemoſis lateralibus, foliolis ſubtus ſericeis cuneiformibus. *Pluckn. alm. t. 59. f. 6. β) Burm. zeyl. t. 33.*

daurica. 15. G. leguminibus retrofalcatis linearibus pubeſcentibus erectis ſpicatis, foliolis lanceolatis ſubpetiolatis albo-piloſis. *Pallas it. 3. p. 742. t. W. f. 1.*

virginiana. 16. G. leguminibus retrofalcatis compreſſis villoſis ſpicatis, calicibus lanatis, foliolis ovali-oblongis acuminatis. *Pluckn. alm. t. 23. f. 2.*

ſpinoſa. 17. G. leguminibus retrofalcatis ſolitariis compreſſis, ſtipulis ſpineſcentibus, foliolis cuneiformibus canis, caule diffuſo. *Suppl. p. 335.*

cærulea. 18. G. racemis terminalibus multifloris coarctatis, foliolis ſubdecemjugis ellipticis, caule ſcabro. *Suppl. p. 335.*

capenſis. 19. G. racemis paucifloris oppoſitifoliis, leguminibus linearibus rectis villoſis, foliolis ſubquinquejugis oblongis integerrimis, caule procumbente ſuffruticoſo. *Jacq. coll. 2. p. 292.*

filiformis. 20. G. racemis axillaribus solitariis filiformibus, floribus subternis, leguminibus linearibus compressis retrofalcatis transversim rugosis, foliis ternatis integerrimis. *Jacq. coll. 2. p. 348. pl. rar. ic. cent. 2. t. 73.*

longifolia. 21. G. racemis axillaribus solitariis erectiusculis, floribus geminis, leguminibus linearibus compressis rectis villosis, foliis ternatis integerrimis. *Jacq. coll. 2. p. 349.*

spicata. 22. G. spicis longis terminalibus. *Walt. flor. carol. p. 188.*

FALCATA. *Cal.* 4dentatus. *Stilus* adscendens. *Legumen* oblongum, compressum, falcatum, utraque acuminatum.

caroliniana. 1. FALCATA. *Walt. flor. carol. p. 188.*

891. PHACA. *Legumen* semibiloculare. *Filamentum* solitarium teres.

* *caulescentes.*

sibirica. 1. Ph. foliolis quaternis lanceolatis obtusis sericeis, calice villoso, dentibus setaceis. *Suppl. p. 365. Pallas it. 3. t. Aa. f. 2.*

trifoliata. 2. Ph. foliis ternatis ovalibus obtusis, leguminibus semiorbiculatis. *Mant. p. 270.*

australis. 3. Ph. caule ramoso prostrato, foliolis lanceolatis, corollarum alis semibifidis. *Mant. p. 123. Till. h. pis. t. 14. f. 1.*

arenaria. 4. Ph. caule patulo glabro, leguminibus glabris ovato-inflatis, foliis pinnatis. *Pallas it. 3. p. 748. t. Cc. f. 1. 2.*

alpina. 5. Ph. caule erecto glabro, leguminibus oblongis inflatis subpilosis. *Flor. dan. t. 856.*

salsula. 6. Ph. caule erecto canescente, foliis pinnatis, leguminibus pedunculatis globosis cernuis. *Suppl. p. 336. Pallas it. 3. t. Bb. f. 1. 2.*

bœtica. 7. Ph. caule erecto piloso, leguminibus tereti-cymbiformibus.

** *subacaules.*

oxyphylla. 8. Ph. leguminibus ovato-inflatis extrinsecus pilosis, foliolis tomentosis subquaternis. *Pallas it. 3. p. 743. t. X. f. 2.*

silvatica. 9. Ph. leguminibus inflatis, fusco-pilosis, foliis pinnatis longe pilosis. *Pallas it. 3. p. 744. t. W. f. 2.*

*** *acaules.*

veſicaria. 10. Ph. glabra, calicibus fructiferis ovalibus inflatis, foliolis lanceolatis. *Mant. p.* 123. *Schreb. dec.* 9. *t.* 7.

incana. 14. Ph. incana, calicibus fructiferis ovatis inflatis villoſis, foliolis oblongis obtuſis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 57.

proſtrata. 11. Ph. foliolis binatis linearibus ſericeis, ſcapo procumbente, calice villoſo, dentibus lanceolatis brevibus. *Suppl. p.* 336. *Pallas it.* 3. *t.* Y. *f.* 2.

microphylla. 12. Ph. foliolis binatis ovatis obtuſis villoſis, calice muricato piloſo, dentibus undique hiſpidis. *Suppl. p.* 337. *Pallas it.* 3. *t.* X. *f.* 1.

muricata. 13. Ph. foliolis ſubquaternis lineari-ſubulatis ſubtus muricatis, calice glabro, dentibus ciliatis. *Suppl. p.* 337. *Pallas it.* 3. *t.* Aa. *f.* 1.

892. ASTRAGALUS. *Capſula* (plurimis) 2locularis, gibba. *Filamentum* ſolitarium teres.

* *cauleſcentes.*

† *caule herbaceo.*

‡ *erecto.*

alopecuroides. 1. A. ſpicis cylindricis ſubſeſſilibus, calicibus leguminibusque lanatis. *Mill. h. angl. t.* 58.

melilotoides. 2. A. ſpicis terminalibus nudis, caulibus ſtriatis, leguminibus erectis didymo-ſubtriquetris tranſverſim ſtriatis. *Pallas it.* 3. *p.* 748. *t.* Dd. *f.* 1. 2.

bohemicus. 3. A. ſpicis laxis longe pedunculatis, caule ramoſo. *Jo. Mayer. bohem. Abh.* 3. 1787. *p.* 314. *t.* 1.

piloſus. 4. A. floribus ſpicatis, leguminibus ſubulatis cauleque piloſis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 51.

aſper. 5. A. floribus ſpicatis in pedunculis elongatis, caule ſtricto lævi ſubaſpero, leguminibus oblongis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 335. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 33.

carolinianus. 6. A. pedunculis ſpicatis, caule lævi, leguminibus ovato-cylindricis ſtilo acuminatis. *Dill. h. Elth. t.* 39. *f.* 45.

vireſcens. 62. A. pedunculis multifloris folio longioribus, foliolis lanceolatis acutis, leguminibus recurvatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 73.

uliginoſus. 7. A. floribus ſpicatis, leguminibus erectiuſculis nudis tumidis tereti-depreſſis, mucrone reflexo. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 17. 18.

Onobrychis. 8. A. floribus ſpicatis, vexillis duplo longioribus, ſtipulis ſolitariis, caule pubeſcente. *Jacq flor. auſtr.* 1. *t.* 38. *β*) Aſtragalus tenuifolius. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 499.

capitatus. 9. A. capitulis globoſis, pedunculis longiſſimis, foliolis emarginatis.

peregrinus. 63. A. ſpicis pedunculatis foliorum longitudine, leguminibus arcuatis lanuginoſis ſtilatis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 57.

chriſtianus. 10. A. floribus glomeratis ſubſeſſilibus ex omnibus axillis foliaceis. *Tournef. it.* 2. *p.* 254. *ic.*

ſinenſis. 11. A. floribus racemoſis pendulis, caule ſtricto glabro, leguminibus ovatis inflatis utrinque mucronatis. *Linn. dec.* 1. *t.* 3.

galegiformis. 12. A. floribus racemoſis pendulis, caule ſtricto glabro, leguminibus triquetris utrinque mucronatis. *Legumen.*

falcatus. 64. A. glaber, leguminibus racemoſis pendulis falcatis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 58.

ſulcatus. 13. A. caule glabro ſtricto ſtriato, foliolis lineari-lanceolatis acutis, leguminibus triquetris. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 40. *Legumen æquale.*

arenarius. 14. A. caule ramoſo tomentoſo albo, foliolis complicatis, pedunculis ſubquadrifloris. *Raj. angl.* 3. *t.* 12. *f.* 3.

deflexus. 15. A. ramis ſpiciferis nudis folio longioribus, foliolis leguminibuſque retrorſum vergentibus. *Pall. act. Petrop.* 1779. 2. *p.* 260. *t.* 15.

microphyllus. 16. A. caule erecto-patulo, foliolis ovalibus, calicibus tumidiuſculis, leguminibus ſubrotundis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 19.

††*caule adſcendente.*

hians. 17. A. pendunculis erectis racemoſis, leguminibus pendulis villoſis anterius hiantibus. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 87.

†††*caule diffuſo.*

canadenſis. 18. A. leguminibus ſubcylindricis mucronatis, foliolis nudiuſculis. *Mant. p.* 449. *Dodart. mem. t.* 65.

annularis. 19. A. leguminibus ſubulatis incurvis glabris, foliolis obovatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 139.

barbatus. 65. A. hirſutiſſimus, floribus capitatis, pedunculis folia ſubæquantibus. *Vahl ſymb. botan.* 1. *p.* 58.

Stella. 20. A. capitulis pedunculatis lateralibus, leguminibus rectis ſubulatis mucronatis. *Pluckn. phyt.* 79. *f.* 4.

Glaux. 21. A. capitulis pedunculatis imbricatis ovatis, floribus erectis, leguminibus ovatis calloſis inflatis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 241. *ic.*

ſeſameus. 22. A. capitulis ſubſeſſilibus lateralibus, leguminibus erectis ſubulatis acumine reflexis. *Pluckn. alm. t.* 79. *f.* 3.

†††† *caule procumbente.*

hamoſus. 23. A. leguminibus ſubulatis recurvatis glabris, foliolis obcordatis ſubtus villoſis. *Mant. p.* 449. *Riv. tetrap. t.* 221.

contortuplicatus. 24. A. leguminibus contortuplicatis canaliculatis villoſis. *Haller act. goett.* 2. *t.* 11. *Legumen.*

bœticus. 25. A. leguminibus priſmaticis rectis triquetris apice uncinatis, ſpicis pedunculatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 9. *f.* 11.

Laxmanni. 26. A. leguminibus oblongis trigonis ſulco exaratis mucronatis villoſis, ſpicis elongatis. *Suppl. p.* 337. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 37.

alpinus. 27. A. leguminibus piloſis utrinque acutis, floribus pendulis racemoſis. *Flor. dan. t.* 51. *an ad phacam potius referendus?*

hiſpidus. 78. A. leguminibus foliolisque ovato-oblongis hiſpidis, corollis calice brevioribus. *La Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec.* 1. *p.* 18. *t.* 8.

ſyriacus. 28. A. leguminibus ovato-oblongis tomentoſis, capitulis pedunculatis, floribus reflexis.

pentaglottis. 29. A. leguminibus capitatis replicatis compreſſis conniventibus criſtatis, acumine reflexo. *Mant. p.* 274. *Riv. tetrap.* 223. *f.* 2.

epiglottis. 30. A. leguminibus capitatis ſeſſilibus cernuis cordatis mucronatis replicatis nudis. *Mant. p.* 274. *Riv. tetrap.* 223. *f.* 1.

danicus. 31. A. decumbens hirtus, capitulis longe pedunculatis, leguminibus brevibus inflatis piloſis. *Flor. dan. t.* 614.

hypoglottis. 32. A. proſtratus, leguminibus capitatis ovatis replicatis compreſſis piloſis, acumine reflexo. *Mant. p.* 474.

Cicer. 33. A. proſtratus leguminibus ſubgloboſis inflatis mucronatis piloſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 251.

glycyphyllos. 34. A. prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliolis ovalibus pedunculis longioribus. *Rivin. tetrap. t.* 103.

austriacus. 35. A. prostratus glaber striatus debilis, foliolis sublinearibus emarginatis, leguminibus teretibus. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 195.

leontinus. 36. A. prostratus leguminibus ovatis villosis, floribus spicatis erectis. *Jacq. misc.* 2. *p.* 59. *rar. pl. ic. cent.* 1. *t.* 37.

sinuatus. 66. A. spicis pedunculatis, calicibus fructiferis ovalibus inflatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 59.

sinicus. 37. A. umbellis pedunculatis, leguminibus erectis prismaticis triquetris apice subulatis. *Mant. p.* 103.

† † *caule lignoso.*

cornutus. 38. A. suffruticosus strictus, spica brevi terminali, leguminibus subtriquetro-teretibus acutis. *Pallas it.* 1. *p.* 500. *an phacæ potius species?*

Ammodytes. 39. A. suffruticosus, floribus geminis, leguminibus ovatis didymis lanatis. *Suppl. p.* 338. *Pallas it.* 2. *t.* X.

emarginatus. 79. A. scapis longissimis, capitulis globosis, leguminibus capitatis. *La Billardiere ic. pl. rar. dec.* 1. *p.* 19. *t.* 9.

compactus. 40. A. frutescens, floribus glomerato-capitatis, petiolis spinescentibus, foliolis mucronatis. *Vahl symb. bot. p.* 65.

lagopodioides. 67. A. frutescens, petiolis spinescentibus, foliolis apice spinosis, floribus spicatis. *Vahl. symb. bot.* 1. *p.* 64.

Tragacantha. 68. A. frutescens, spicis pedunculatis longitudine foliorum, petiolis spinescentibus. *Dalech. hist. pl.* 1478. *f.* 1.

Parterium. 69. A. frutescens, floribus axillaribus sessilibus, petiolis spinescentibus, leguminibus magnitudine calicis. *Moris. h. pl. univ.* 2. *p.* 113. *f.* 1. *t.* 13. *f.* 2.

Rauwolfii. 41. A. arborescens, petiolis spinescentibus, floribus subsolitariis pedunculatis, calicibus fructiferis inflatis villosis. *Russel h. nat. Alepp. tab.* 5.

** *subcaulescentes.*

tragacanthoides. 42. A. floribus radicalibus numerosis subsessilibus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 38. *f.* 2.

trimestris. 43. A. scapis subbifloris, leguminibus hamatis subulatis bicarinatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 174.

montanus. 44. A. scapis folio longioribus, floribus laxe spicatis erectis; leguminibus ovatis, acumine inflexo. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 167. *an phaca?*

uncatus. 45. A. exscapus, leguminibus subulatis hamatis foliolo longioribus, foliolis obcordatis.

exscapus. 46. A. exscapus, leguminibus lanatis, foliis villosis. *Mant. p.* 275. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 17.

nummularius. 70. A. floribus radicalibus subsessilibus, foliolis subrotundis emarginatis hirsutis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 60.

*** *acaules.*

verticillaris. 47. A. foliolis aggregato-semiverticillatis. *Mant. p.* 275. *Amm. ruth. t.* 19. *f.* 1. 2.

caprinus. 48. A. hirsutus, scapis erectis brevissimis, foliolis oblongis, leguminibus ovatis tumidis villosis. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 24. *f.* 3.

vesicarius. 49. A. scapis folio longioribus, floribus laxe spicatis, calicibus leguminibusque inflatis hirsutis.

uralensis. 50. A. scapo erecto foliis longiore, leguminibus subulatis inflatis villosis erectis. *Hall. it. t.* 2. *f.* 2.

densifolius. 71. A. scapo erecto foliis longiore, foliolis oblongis emarginatis, floribus capitato-spicatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 60.

bicolor. 72. A. scapis erectis folio longioribus, floribus capitatis, bracteis lanceolatis calices hirsutissimos æquantibus. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 62.

alyssoides. 73. A. scapis erectis folio longioribus, floribus spicatis, leguminibus oblongis hirsutis longitudine calicis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 61.

hirsutus. 74. A. scapis erectis folio longioribus, floribus capitatis, leguminibus globosis hirsutissimis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 61.

psoraloides. 75. A. scapis erectis foliis longioribus, floribus capitatis demum spicatis, leguminibus oblongis hirsutissimis. *Vahl symb. bot.* 2. *p.* 62.

globosus. 76. A. scapis erectis foliis longioribus, capitulis globosis, bracteis linearibus calicem æquantibus. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 60.

ampullatus. 51. A. scapo erecto fructifero subascendente, floribus terminalibus subquaternis, leguminibus inflatis ovato-mucronatis villosis. *Pallas it.* 3. *p.* 750. *t.* Cc. *f.* 4. 5.

laguroides. 52. A. ſcapis ſubſolitariis hiſpidis folia ſubæquantibus, floribus confertim ſpicatis, leguminibus falcatis piloſis. *Pallas it.* 3. *p.* 750. *t.* Cc. *f.* 3.

daſyanthus. 53. A. lanuginoſus, ſcapis folia æquantibus, floribus capitatis, leguminibus ſubtriquetris villoſis. *Pallas it.* 3. *p.* 749. *t.* G. g*. *f.* 1. A. b.

phyſodes. 54. A. ſcapis folia æquantibus, leguminibus inflatis ſubgloboſis nudis.

depreſſus. 55. A. ſcapis folio brevioribus, leguminibus cernuis, foliolis ſubemarginatis nudis.

lupulinus. 56. A. ſcapis ſulcato-angulatis folio brevioribus, floribus ſpicatis, calicibus hirſutiſſimis, leguminibus ovato-compreſſis. *Pallas it.* 3. *p.* 750.

lanatus. 80. A. ſcapo nudo longitudine foliorum villoſorum, leguminibus lanatis denſe ſpicatis ſemicordatis triquetris ſubulatis. *La Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec.* 1. *p.* 21. *t.* 10.

monſpeſſulanus. 57. A. ſcapis declinatis longitudine foliorum, leguminibus ſubulatis teretibus ſubarcuatis glabris. *Mant. p.* 450.

latifolius. 77. A. ſcapis declinatis foliis longioribus, leguminibus teretibus rectis, foliis ſimplicibus compoſitiſque. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 61.

incanus. 58. A. ſcapis declinatis, foliolis tomentoſis, leguminibus ſubulatis ſubarcuatis incanis apice incurvis. *Mant. p.* 450.

campeſtris. 59. A. ſcapo decumbente, calicibus leguminibuſque villoſis, foliolis lanceolatis acutis. *Haller hiſt. ſtirp. Helv. t.* 13.

leptophyllus. 60. A. ſcapis proſtratis, leguminibus pubeſcentibus inflatis ovato-mucronatis uniiocularibus. *Pallas it.* 3. *p.* 749. *t.* X. *f.* 3. B. *Nonne potius phacæ ſpecies?*

ſpicatus. 61. A. ſcapis tomentoſis, floribus ſpicatis. *Pallas it.* 2. *p.* 742. *t.* W. *an diſtincta ſpecies?*

893. BISERRULA. *Capſula* 2locularis plana, diſſepimento contrario.

Pelecinus. 1. BISERRULA. *Giſeck. ic. faſc.* 1. *t.* 17.

894. PSORALEA. *Calix* punctis callosis aspersus, longitudine *leguminis* 1spermis.

* *foliis nullis.*

aphylla. 1. Ps. stipulis mucronatis brevissimis versus flores subimbricatis. *Mant. p.* 450. *Breyn. cent. t.* 25.

** *foliis simplicibus.*

corylifolia. 2. Ps. foliis ovatis subdentatis, spicis ovatis. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 2. *Semina nuda.*

rotundifolia. 3. Ps. foliis ovatis integerrimis, capitulis bracteisque villosis. *Suppl. p.* 338.

*** *foliis simplicibus ternatisque.*

capitata. 4. Ps. foliolis linearibus, capitulo terminali. *Suppl. p* 339.

tenuifolia. 5. Ps. foliis inferioribus ternatis, superioribus simplicibus lanceolato-subulatis. *Mant. p.* 450.

**** *foliis ternatis.*

lutea. 6. Ps. foliis fasciculatis, foliolis ovatis rugosis, spicis pedunculatis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 139.

stachydis. 7. Ps. foliis petiolatis, foliolis oblongis mucronatis, spicis terminalibus interruptis, calicibus villosis. *Suppl. p.* 338.

spicata. 8. Ps. foliolis oblongis obtusis, spicis cylindricis. *Mant. p.* 264.

aculeata. 9. Ps. foliolis cuneiformibus recurvo-mucronatis, capitulis terminalibus. *Mant. p.* 450.

decumbens. 25. Ps. foliolis cuneiformi-lanceolatis, mucrone recurvato, floribus axillaribus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 80.

bracteata. 10. Ps. foliolis obovatis recurvato-mucronatis, spicis ovatis. *Mant. p.* 264. *Sp. pl. p.* 1085. Trifolium fruticans. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 106.

hirta. 11. Ps. foliolis obovatis recurvato-mucronatis, floribus ternis subsessilibus.

repens. 12. Ps. foliolis obovatis emarginatis, caule repente, floribus subumbellatis. *Mant. p.* 265.

palaestina. 13. Ps. foliolis ovatis, petiolis pubescentibus, floribus capitatis. *Suppl. p.* 339. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 184.

14. Ps.

americana. 14. Ps. foliolis ovatis dentato-angulatis, spicis lateralibus. *Lod. ic. 2. p. 31. Pericarpium huic et 16. et 20. 1loculare.*

tetragonoloba. 15. Ps. foliolis dentatis, caule flexuoso, spicis lateralibus, leguminibus striatis quadrangularibus. *Mant. p. 104. an hujus generis ?*

glandulosa. 16. Ps. foliolis lanceolatis, petiolis scabris, floribus spicatis. *Regn. bot. t. 360. an. satis distincta ab americana ?*

bituminosa. 17. Ps. foliolis lanceolatis, petiolis laevibus, floribus capitatis. *β) Besl. h. eyst. aest. t. 11. f. 2.*

axillaris. 18. Ps. foliolis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p. 338.*

***** *foliis quinatis.*

pentaphylla. 19. Ps. foliis digitatis, foliolis inaequalibus. *B. Juss. act. paris. 1744. t. 17.*

****** *foliis pinnatis.*

pinnata. 20. Ps. foliolis linearibus, floribus axillaribus. *Herm. par. lugdb. p. 273. ic.*

leporina. 26. Ps. foliolis oblongo-linearibus numerosissimis, spicis ebracteatis villosis lanceolatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 81.*

foliolosa. 27. Ps. foliolis oblongis numerosis, spicis terminalibus bracteatis globoso-ovatis, calicibus compressis. *Ait. hort. Kew 3. p. 82.*

enneaphylla. 21. Ps. spicis axillaribus. *Mant. p. 450. Pluckn. alm. t. 166. f. 2.*

Dalea. 22. Ps. spicis cylindricis terminalibus. *Hort. Cliff. t. 22.*

laevigata. 23. Ps. stipulis solidis subacutis minutissimis. *Suppl. p. 339.*

******* *foliis supradecompositis.*

prostrata. 24. Ps. foliis digitatis linearibus.

896. TRIFOLIUM. *Flores* ſubcapitati. *Capſula* vel *Legumen* vix calice longius, non dehiſcens, deciduum.

* *capſulis ſubpolyſpermis nudis*, 1*locularibus*, Meliloti.

M. ornithopodioides. 1. Tr. capſulis octoſpermis ſubternis, calicibus duplo longioribus, caulibus declinatis. *Flor. dan. t.* 368.

M. indica. 2. Tr. capſulis recamoſis monoſpermis, caule erecto. *Pluckn. alm. t.* 45. *f.* 4. 5.

meſſanenſe. 3. Tr. capſulis racemoſis monoſpermis arcuato-ſtriatis ſemiovatis acutis, caule erecto. *Mant. p.* 275. *Suppl. p.* 339. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 9.

M. polonica. 4. Tr. capſulis racemoſis diſpermis lanceolatis, caule erecto.

M. officinalis. 5. Tr. capſulis racemoſis ſubdiſpermis acutis rugoſis, caule erecto. *Blackw. herb. t.* 80.

M. italica. 6. Tr. capſulis racemoſis nudis diſpermis rugoſis obtuſis, caule erecto, foliolis integris. *Camer. hort. t.* 29.

M. cretica. 7. Tr. pericarpiis racemoſis diſpermis compoſitis membranaceis caule, erectiuſculo. *C. Bauh. prodr. th. bot. p.* 142. *ic.* P.

M. cærulea. 8. Tr. racemis ovatis, leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto, ſpicis oblongis. *Blackw. herb. t.* 284.

* * *leguminibus polyſpermis*, *tectis*, Lotoidea.

Lupinaſter. 9. Tr. capitulis dimidiatis, foliis quinatis ſeſſilibus, leguminibus polyſpermis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 6. *f.* 1.

reflexum. 10. Tr. capitulis fructiferis reflexis, leguminibus ſubtriſpermis.

ſtrictum. 11. Tr. capitulis globoſis, leguminibus diſpermis, calicibus longitudine corollæ, foliolis ſerrulatis, ſtipulis rhombeis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 25. *f.* 7.

comoſum. 12. Tr. capitulis umbellato-globoſis imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, leguminibus tetraſpermis

---

Trifolii *character, utut generis habitu facillimum, difficillime eruitur. Inflorescentia ejus varia: racemoſa, umbellata, faſciculata, capitata, ſpicata.*

cespitosum. 13. Tr. capitulis umbellato-globosis, leguminibus subtetraspermis, surculis repentibus, foliis exstipulatis. *Regnier Mag. Naturk. Helv. 2. p. 78. ic. an satis distinctum a repente?*

repens. 14. Tr. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Curt. flor. Lond. t.* 193.

hybridum. 15. Tr. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente. *Rivin. tetrap. t.* 127. *f.* 3.

alpinum. 16. Tr. capitulis umbellaribus, scapo nudo, leguminibus dispermis pendulis, foliolis lineari lanceolatis. *Pon. bald. p.* 340. *ic.*

hedysarioides. 17. Tr. pedunculis subumbellatis serioribus subunifloris, foliis subtus pubescentibus spinula terminatis, calicibus fructiferis pungentibus. *Pall. it.* 3. *p.* 751. *t.* Dd. *f.* 3. A.

*** *calicibus villosis*, Lagopoda.

subterraneum. 18. Tr. capitulis villosis quinquefloris, coma centrali reflexa rigida fructum obvolvente. *Curt. flor. Lond. t.* 128.

globosum 19. Tr. capitulis villosis globosis, calicibus superioribus flosculo destitutis.

Cherleri. 20. Tr. calicibus villosis globosis terminalibus solitariis: calicibus omnibus fertilibus, caulibus procumbentibus, foliolis obcordatis. *Mant. p.* 451. *Barr. pl. rar. ic.* 859.

glaciale. 21. Tr. capitulis villosis globosis terminalibus bracteatis, foliolis cordato ovatis villosis, stipulis cordatis, caule decumbente. *Regnier Mag. Naturk. Hel.* 2. *p.* 81. *an distinctum satis a Tr. Cherleri?*

glomeratum. 22. Tr. capitulis sessilibus hemisphæricis rigidis, calicibus striatis patulis æqualibus. *Curt. flor. Lond. t.* 227.

scabrum. 23. Tr. capitulis sessilibus lateralibus ovatis, calicis laciniis inæqualibus rigidis recurvis. *Vaill. flor. paris. t.* 33. *f.* 1.

striatum. 24. Tr. capitulis sessilibus sublateralibus ovatis, calicibus strictis rotundatis. *Vaill. flor. paris. t.* 33. *f.* 2.

alexandrinum. 25. Tr. capitulis oblongis pedunculatis, caule erecto, foliis oppositis.

squarrosum. 26. Tr. spicis oblongis subpilosis, calicum infimo dente longissimo reflexo, caule herbaceo erecto. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 13. *f.* 1.

incarnatum. 27. Tr. ſpicis oblongis obtuſis villoſis aphyllis, foliolis ſubrotundis crenatis. *Rivin. tetrap. t.* 77. *Mill. h. angl. t.* 267. *f.* 2.

angustifolium. 28. Tr. ſpicis conico-oblongis villoſis, dentibus calicinis ſetaceis ſubæqualibus, foliolis linearibus. *Barr. pl. rar. ic. t.* 698.

pannonicum. 29. Tr. ſpicis longis villoſis, corollis monopetalis, foliolis integerrimis cauleque erecto villoſiſſimis. *Mant. p.* 276. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 42.

rubens. 30. Tr. ſpicis longis villoſis, corollis monopetalis, caule erecto, foliolis ſerrulatis. *Jacq, flor. auſtr.* 4. *t.* 385.

arvenſe. 31. Tr. ſpicis ovalibus villoſis, calicis dentibus ſetaceis villoſis æqualibus. *Flor. dant. t.* 724.

albidum. 32. Tr. ſpicis ovalibus piloſis pedunculatis ebracteatis, calicibus patulis, caule diffuſo, foliolis ovatis. *Retz. obſ. bot.* 4. *p.* 30.

clypeatum. 33. Tr. ſpicis ovatis, calicibus patulis, lacinia infima maxima lanceolata, foliolis ovatis. *Alpin. exot. t.* 306.

ſtellatum. 34. Tr. ſpicis ovatis piloſis, calicibus patulis, caule diffuſo, foliolis obcordatis. *Barr. pl. rar. ic.* 755. & 860.

lappaceum. 35. Tr. ſpicis ſubovatis, calicis dentibus ſetaceis hiſpidis, caule patulo, foliolis ovatis.

flexuoſum. 36. Tr. ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus, caule adſcendente flexuoſo ramoſiſſimo, foliolis ovato-lanceolatis ſerrulatis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 314.

alpeſtre. 37. Tr. ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus, caule erecto, foliolis lanceolatis ſerrulatis. *Flor. dan. t.* 662. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 433.

pratenſe. 38. Tr. ſpicis globoſis ſubvilloſis cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis. *Blackw. herb. t.* 20. *β*?) Trifolium odoratum. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 286.

ochroleucum. 39. Tr. ſpicis villoſis, caule erecto pubeſcente, foliolis infimis obcordatis. *Jacq. flor. auſt.* 1. *t.* 40.

uniflorum. 40. Tr. acaule, pedunculis trifidis ſubtrifloriſque ſtipula brevioribus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 31. *f.* 12.

**** *calicibus inflatis ventricoſis*, Veſicaria.

bicorne. 41. Tr. capitulis globoſis pedunculatis axillaribus, caule repente, floribus reſupinatis, calicibus fructiferis inflatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 139.

tomentosum. 42. Tr. spicis sessilibus globosis tomentosis, calicibus inflatis obtusis. *Magn. monsp. p. 264. ic.*

resupinatum. 43. Tr. spicis subovatis, corollis resupinatis, calicibus inflatis dorso gibbis, caulidus prostratis. *Barr. pl. rar. ic. t. 872.*

spumosum. 44. Tr. spicis ovatis, calicibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris universalibus pentaphyllis.

lævigatum. 45. Tr. spicis glabris pedunculatis ovalibus, dentibus calicis setaceis, caule foliisque glaberrimis. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 219.*

psoralioides. 56. Tr. spicis ovatis bracteatis imbricatis, bracteis cordatis, leguminibus rotundatis. *Walt. flor. carol. p. 184.*

fragiferum. 46. Tr. capitulis subrotundis, calicibus fructiferis reflexis, labio superiore inflato bidentato, caule repente. *Curt. flor. Lond. t. 95.*

***** *vexillis corollæ inflexis*, Lupulina.

montanum. 47. Tr. spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarcescentibus, calicibus nudis, caule erecto. *Rivin. tetrap. t. 12.*

agranum. 48. Tr. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calicibus subpubescentibus, stipulis cordatis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuso. *Curt. flor. Lond. t. 161.*

aureum. 49. Tr. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calicibus nudis, stipulis lanceolatis nudis, foliolo impari sessili, caule erecto. *Pollich. flor. pal. n. 708. an distinctum ab agrario?*

spadiceum. 50. Tr. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calicibus pilosis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic. 1024.*

procumbens. 51. Tr. spicis ovalibus imbricatis multifloris, vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus simis hirsutissimis. *Raj. angl. 3. t. 14. f. 3.*

filiforme. 52. Tr. spicis ovalibus subimbricatis paucifloris, vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus filiformibus pubescentibus. *Raj. angl. 3. t. 14. f. 4.*

suffocatum. 53. Tr. acaule exscapum, floribus subsessilibus radicalibus. *Mant. p. 276. Jacq. h. Vind. 1. t. 60.*

erectum. 54. Tr. spicis axillaribus, caule erecto foliisque tomentosis, leguminibus dispermis. *Walt. flor. carol. p. 184. an hujus generis?*

simplici-folium. 55. Tr. capitulis rotundatis, leguminibus dispermis, foliis simplicibus villosis, caule decumbente. *Walt. flor. carol. p. 184. an hujus generis?*

897. LOTUS. *Cal.* tubulosus. *Alæ.* sursum longitudinaliter conniventes. *Legumen* strictum, (plurimis) loculamentosum.

* *leguminibus tetragonis alatis latis.*

maritima. 1. L. leguminibus solitariis, foliis glabris, bracteis lanceolatis. *Flor. dan. t. 800.*

siliquosa. 2. L. leguminibus solitariis, foliis subtus pubescentibus, caulibus procumbentibus. *Jacq. flor. austr. 4. t. 361. Semina subglobosa.*

tetragonoloba. 3. L. leguminibus solitariis, bracteis ovatis. *Commel. h. amst. 1. t. 26.*

conjugata. 4. L. leguminibus conjugatis, bracteis oblongo-ovatis.

** *leguminibus cylindricis.*
† *paucioribus.*

tetraphylla. 5. L. leguminibus solitariis, foliis ternatis obcordato-cuneatis: stipula solitaria simili, bracteis monophyllis. *Suppl. p. 340.*

edulis. 6. L. leguminibus subsolitariis gibbis incurvis. *Alp. exot. t. 268.*

peregrina. 7. L. leguminibus subbinatis linearibus compressis nutantibus.

angustissima. 8. L. leguminibus subbinatis linearibus strictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis.

oligocarpos. 9. L. leguminibus binatis rectis striatis villosis albo-punctulatis. *Scop. del. insf. 1. p. 14. t. 6.*

ornithopodioides. 10. L. leguminibus subternatis arcuatis compressis, caulibus diffusis. *Cam. hort. t. 25. Legumen nodosum.*

Jacobæa. 11. L. leguminibus subternatis, caule herbaceo erecto, foliolis linearibus. *Mill. h. angl. t. 168.*

cretica. 12. L. leguminibus subternatis, caule frutescente, foliis sericeis nitidis. *Pluckn. alm. t. 43. f. 1.*

arabica. 13. L. leguminibus aristatis, caulibus prostratis, pedunculis trifloris, bracteis monophyllis. *Mant. p. 104. Jacq. h. Vind. 2. t. 155.*

glauca. 22. L. leguminibus subbinatis glabris, foliolis subcuneiformibus carnosis incanis, stipulis foliiformibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 92.

†† *leguminibus pluribus.*

† *umbellatis.*

medicaginoides. 14. L. leguminibus arcuatis, foliolis obcordatis denticulatis. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 23.

arborea. 15. L. leguminibus quinatis, foliolis obcordatis, caule arboreo. *Forst. flor. austr. p.* 52.

†† *capitatis.*

hirsuta. 16. L. capitulis subrotundis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. *Moris. hist. pl. t.* 18. *f.* 14.

græca. 17. L. capitulis subrotundis, caule erecto, foliis quinatis, leguminibus ovatis. *Mant. p.* 104.

recta. 18. L. capitulis subglobosis, caule erecto lævi, leguminibus erectis glabris. *Riv. tetrap. t.* 192.

corniculata 19. L. capitulis depressis, caulibus decumbentibus herbaceis, leguminibus patentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 107.

cytisoides. 20. L. capitulis dimidiatis, caule diffuso ramosissimo, foliis tomentosis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1031.

Dorycnium. 22. L. capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis. *Lob. ic.* 51.

898. TRIGONELLA. *Vexillum* et *Alæ* subæquales, patentes, forma corollæ 3petalæ.

ruthenica. 1. Tr. leguminibus pedunculatis congestis pendulis linearibus rectis, foliolis sublanceolatis. *Gmel. flor. sib.* 4. *t.* 8.

platycarpos. 2. Tr. leguminibus pedunculatis congestis pendulis ovalibus æqualibus compressis, caule diffuso, foliolis subrotundis. *Gmel. flor. sib.* 4. *t.* 9.

striata. 3. Tr. leguminibus pedunculatis congestis erectiusculis distantibus, pedunculis folio longioribus. *Suppl. p.* 340.

polycerata. 4. Tr. leguminibus subsessilibus congestis erectis subrectis longis linearibus, pedunculis muticis.

hamosa. 5. Tr. leguminibus pedunculatis racemosis declinatis hamosis teretibus, pedunculis spinosis foliolo longioribus. *Alp. æg. t.* 124.

spinosa. 6. Tr. leguminibus subpedunculatis congestis declinatis falcatis compressis, pedunculis spinosis brevissimis. *Breyn. cent. t.* 33. *f.* 1.

corniculata. 7. Tr. leguminibus æqualibus pedunculatis congestis declinatis subfalcatis: pedunculo longo subspinoso, caule erecto. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 11.

stellata. 8. Tr. leguminibus axillaribus confertis sessilibus rigidis arcuatis in stellam expansis. *Forsk flor. æg. arab. p.* 140.

monspeliaca. 9. Tr. leguminibus congestis sessilibus arcuatis divaricatis inclinatis brevibus, pedunculo mucronato inermi. *Breyn. cent. t.* 33. *f.* 2.

laciniata. 10. Tr. leguminibus pedunculatis subumbellatis ellipticis, foliolis cuneiformibus dentatis, stipulis laciniatis.

Fœnum græcum. 11. Tr. leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. *Zorn pl. off. ic. t.* 116. β) Silvestris, caule basi ramoso-stolonifero. *Capsula potius simplex 1locularis.*

indica. 12. Tr. leguminibus sessilibus subsolitariis subfalcatis, foliolis integerrimis, caule diffuso. *Pluckn. alm. t.* 200. *f.* 7.

899. MEDICAGO. *Pestillum* incurvatum e carina elastice exsiliens, eamque deflectens. *Legumen* vel *Pericarpium* compressum, arcuatum vel spirale.

virginica. 1. M. caule erecto ramosissimo, floribus fascicularis terminalibus.

arborea. 2. M. pericarpiis unilocularibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo. *Lob. ic.* 2. *p.* 46. β) Medicago glabra. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 778.

falcata. 3. M. pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Flor. dan. t.* 233.

sativa. 4. M. pedunculis racemosis, leguminibus angustis æqualibus contortis, caule erecto glabro. *Regn. bot. t.* 346.

obscura. 5. M. pedunculis racemosis, leguminibus reniformibus integerrimis, caule diffuso hirto. *Retz. obs. bot.* 1. *p.* 24. *t.* 1.

circinata. 6. M. pericarpiis bilocularibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis. *Rinvin. tetrap. t.* 201.

radiata. 7. M. pericarpiis quadrilocularibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. *Morif. hift. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 3.

lupulina. 8. M. fpicis ovalibus, pericarpiis reniformibus unilocularibus monofpermis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 120.

Karftienfis. 9. M. pedunculis axillaribus fubumbellatis, caule herbaceo erecto, leguminibus cochleatis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 86.

polymorpha. 10. M. pericarpiis duplicatis cochleatis, ftipulis dentatis, caule diffufo. *Curt. flor. Lond. t.* 176.

orbicularis. α. M. pedunculis unifloris ariftatis, leguminibus compreffis rugofis nudis. *Morif. hift. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

intertexta. β. M. pedunculis unifloris, leguminibus fphæricis, fpinis longioribus divaricatis recurvis. *Knorr del. hort. t.* M. 1. a.

coronata. γ. M. pedunculis fubbifloris, leguminibus compreffis fubfpinofis, ftipulis fubulatis integerrimis. *Morif. hift. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 21.

marginata. δ. M. pedunculis fubbifloris muticis, leguminibus depreffis marginatis. *Retz. obf. bot.* 2. *p.* 23.

tuberculata. ε. M. pedunculis bifloris ariftatis, leguminibus ovato-cylindricis, anfractibus quatuor bituberculatis. *Retz. obf. bot.* 2. *t.* 23.

muricata. ζ. M. pedunculis multifloris, leguminibus fubrotundis fpinofis incanis, foliis villofis. *Morif. hift. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

nigra. η. M. pedunculis paucifloris, leguminum hamulis longitudine leguminum. *Morif. hift. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 19.

arabica. θ. M. pedunculis fubtrifloris, leguminibus echinatis, foliolis obcordatis. *Morif. hift. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 27.

rigidula. ι. M. pedunculis multifloris, leguminibus intenfe aculeatis.

hirfuta. κ. M. pedunculis multifloris, leguminum fpinulis hamatis, ftipulis integris.

fcutellata. λ. M. pedunculis multifloris, leguminibus globofis inermibus nudis. *Morif. hift. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 4.

ciliaris. μ. M. leguminibus congeftis globofis hifpidis, ftipulis ciliatis.

minima. ν. M. leguminibus fubternatis, fpinulis uncinatis, ftipulis integris. *Flor. dan. t.* 211.

tornata. ξ. M. leguminibus nudis cylindricis apice basique planiusculis. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

turbinata. ο. M. leguminibus inermibus subcylindricis, extremitatibus complanatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 20.

laciniata. π. M. legumine echinato, foliis linearibus dentatis. *Mant. p.* 454. *Magnol. monsp. p.* 270. *ic.*

prostrata. 11. M. leguminibus cochleatis inermibus, foliis ternatis cuneiformibus apice dentatis, stipulis setaceis integerrimis, caule diffuso. *Suppl. p.* 340. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 89.

marina. 12. M. pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. *Rivin. tetrap.* 205.

CLASSIS XVII.

POLYADELPHIA.

DECANDRIA.

900. THEOBROMA. *Cal.* 3-5phyllus. *Cor.* 5petala : nectariis 5. *Stam.* 5 : antheris 3. *Pistill.* 3.

1418. ABROMA. *Pist.* 5. *Caps.* 5locularis, 1valvis apice dehiscens. *Semina* reniformia : *receptaculo* hirsuto.

OMPHALOBIUM. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Caps.* leguminosa, pedicellata, 1sperma.

DODECANDRIA.

1268. MONSONIA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 5: antheris 3. *Pistillum* 5fidum.

ICOSANDRIA.

901. CITRUS. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 20, in cylindrum passim connata. *Pistill.* 1. *Bacca* multilocularis : pulpa vesiculari.

POLYANDRIA.

OCOTEA. *Cal.* 6partitus. *Cor.* 0. *Caps.* supera 4-6locularis polysperma.

1269. MELALEUCA. *Cal.* 5dentatus, superus. *Cor.* 5petala. *Caps.* semivestita calice.

1270. HOPEA. *Cal.* 5fidus, superus. *Cor.* 5petala. *Drupa* nucleo 2loculari.

MORONOBEA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Bacca* 1locularis.

APAMA. *Cal.* 3fidus *Siliqua?*

DURIO. *Cal.* 5fidus, urceolatus, inferus. *Cor.* 5petala, parva. *Stil.* 1. *Stamin.* phalanges 5 ex 7. *Pomum* 5loculare.

1320. GLABRARIA. *Cal.* 5fidus, inferus. *Cor.* 5petala. *Stil.* 1. *Staminum* phalanges 5 ex 6. *Drupa.*

1321. MUNCHHAUSIA. *Cal.* inferus, 6fidus. *Cor.* 6petala. *Capf.* 2locularis.

677. SYMPLOCOS. *Cal.* 5fidus, fuperus. *Cor.* 5-8petala. *Stamina* 4plici ferie corollæ adnata.

902. HYPERICUM. *Cal.* 5partitus, inferus. *Cor.* 5petala. *Stil.* 1, 3, 5. *Capf.* 3-5locularis.

903. ASCYRUM. *Cal.* 2phyllus, inferus. *Cor.* 4petala. *Stil.* 2. *Capf.* 2valvis.

DECANDRIA.

900. THEOBROMA. *Cal.* 3-5phyllus. *Petala* 5 fornicata, 2cornia. *Nectarium* 5fidum, regulare. *Stamina* nectario innata, ſing. antheris 2-3. *Bacca* corticata, roſtrata.

Cacao. 1. Th. foliis integerrimis. *Catesb. Car.* 3. *t.* 6. *Regn. bot. t.* 397.

gujanenſe. 2. Th. foliis ſubdentatis ſubtus tomentoſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 683. *t.* 275.

Guazuma. 3. Th. foliis ſerratis. *Mant. p.* 455. *Trew Ehret.* 40. *t.* 76. *an monadelphiis accenſendum totum genus?*

1418. ABROMA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5: unguibus ſuperne anguſtatis, canaliculatis, inferne dilatatis, fornicatis, conniventibus. *Nectarium* campanulatum, 5fidum: laciniis obcordatis erectis, apice recurvis. *Antheræ* 15 ſeſſiles, ternæ. *Stil.* 5. *Capſ.* 5alata, 5roſttrata, 5locularis, polyſperma.

auguſtum. 1. A. foliis cordatis ſeptangulis. *Suppl. p.* 341. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 1. *Gærtn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 64. *f.* 1.

Wheleri. 2. A. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubdentatis. *Koenig ap. Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 27.

OMPHALOBIUM *Cal.* 5phyllus, persistens, longitudine staminum. *Petala* 5: *unguibus linearibus. Caps.* leguminosa, pedicellata 1-sperma.

indicum. 1. OMPHALOBIUM. *Gærtn. de fr. & sem. cent.* 3. *t.* 46. *f.* 3.

DODECANDRIA.

1268. MONSONIA. *Cal.* 5partitus, persistens. *Cor.* 5petala. *Stamina* 15 subtus coalita in urceolum brevissimum, in 5 lacinias oblongas partitum, singulas terminatas filamentis 3 antheriferis. *Stil.* 5fidus. *Caps.* 5gona, 5locularis.

lobata. 1. M. foliis ovato-cordatis sublobatis, calicibus muticis. *Montin act. gotheb.* 2. *t.* 1.

filia. 2. M. foliis simplicibus cordatis lobatis. *Suppl. p.* 341. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 74. *f.* 2.

speciosa. 3. M. foliis quinatis foliolis bipinnatis. *Mant. p.* 105. *Suppl. p.* 342. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 74. *f.* 1. *an hoc genus potius inter monadelphas militat?*

ICOSANDRIA.

901. CITRUS. *Cal.* 5fidus. *Petala* 5 oblonga. *Antheræ* 20, filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9locularis.

chilensis. 1. C. foliis sessilibus acuminatis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 147.

spinosa. 2. C. foliis subsessilibus utrinque incisis, fructu oblongo rugoso tuberculato. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 108. *t.* 21-23.

Medica. 3. C. foliis petiolatis: petiolis linearibus. *Blackw. herb. t.* 361. *Regn. bot. t.* 232. *β) Knorr del. hort.* 1. *t.* C. 1.

Auranti-um. 4. C. petiolis alatis, foliis acuminatis. *Knorr. del. hort.* 1, *t.* P. 4.

decuma-na. 5. C. petiolis alatis, foliis obtusis emarginatis. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 24. *f.* 2.

japonica. 6. C. petiolis alatis, foliis acutis, caule fruticoso. *Thumb. flor. jap. p.* 292.

OCOTEA. *Cal.* 6partitus inæqualis. *Cor.* o. *Filamanta* 9 : singula antheris 4. *Caps.* calice tecta 4-6locularis polysperma.

gujanensis. 1. OCOTEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 780. *t.* 310.

POLYANDRIA.

1320. GLABRARIA. *Cal.* 5fidus. *Petala* 5. *Nectarium* receptaculi setis longitudine calicis. *Stamina* 30 : 6semper connexis. *Drupa.*

tersa. 1. GLABRARIA. *Mant. p.* 276. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 44.

APAMA. *Cal.* 3fidus. *Cor.* o. *Filam.* in 3 phalang. divisa. *Siliqua?*

dubia. 1. APAMA. *la Mark encycl.* 1. *p.* 91.

1321. MUNCHHAUSIA. *Cal.* semi-sex-fidus, torulosus. *Petala* unguiculata. *Stamina* 6ies 4-5. *Pistillum* superum : stilo filiformi curvato.

speciosa. 1. MÜNCHHAUSIA. *Man. p.* 243. *Münchh. Hausv.* 5. *p.* 356. *ic.*

DURIO. *Cal.* 5 lobus, deciduus. *Petala* 5 minora. *Filamenta* connata in corpora 5, partita ſingula in 7 ſubulata. *Stil.* ſetaceus. *Pomum* ſubrotundum, muricatum, 5loculare, 5fariam dehiſcens.

zibethinus. 1. DURIO. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 99. *t.* 29.

1269. **MELALEUCA.** *Cal.* 5dentatus, ſuperus. *Cor.* 5petala. *Filamenta* multa, connata in 5 corpora: *Stil.* 1. *Capſ.* ſemiveſtita calice, 3valvis, 3locularis.

* *foliis alternis.*

Leucadendron. 1. M. foliis lanceolatis falcatis acutis multinerviis, ſpica elongata. *Mant. p.* 105. *Suppl. p.* 342. *Houttuyn natural. Hiſt.* II. 3. *t.* 15.

latifolia. 2. M. foliis lanceolatis falcatis acutis trinerviis, ſpica elongata. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 17.

anguſtifolia. 3. M. foliis oblongis ſubfalcatis obtuſis glaucis multinerviis. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 16.

trinervia. 4. M. foliis oblongis ſubfalcatis obtuſis glaucis trinerviis. *Gærtn. de fr. et ſem. cent.* 3. *t.* 35. *f.* 1.

ſcoparia. 5. M. foliis ovatis acutis trinerviis punctatis, floribus terminalibus ſolitariis. *Suppl. p.* 343. *Cook. it.* 2. *p.* 200. *ic.*

* * *foliis oppoſitis.*

diffuſa. 6. M. foliis ovatis acuminatis, pedunculis rameis cymoſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 37. *n.* 213.

lucida. 7. M. glabra, foliis ovatis venoſis, paniculis terminalibus, pedicellis oppoſitis bifloris. *Suppl. p.* 342.

villoſa. 8. M. tomentoſa, foliis ovatis venoſis, paniculis terminalibus, pedicellis ſubtrifloris. *Suppl. p.* 342.

æſtuoſa. 9. M. foliis ovatis obovatiſque ſubtrinerviis, pedunculis cymoſis terminalibus tomentoſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 38. *n.* 215. *an eadem cum lucida?*

10. M.

florida. 10. M. foliis oblongo-obovatis venosis, pedunculis terminalibus cymosis, calicibus turbinatis. *Forst. flor. austr. p. 37. n. 214.*

perforata. 11. M. foliis ovali-subrotundis pellucido-punctatis, pedunculis axillaribus trifidis. *Forst. flor. austr. p. 37. n. 212.*

lucens. 12. M. foliis lanceolatis utrinque acuminatis aveniis enerviis, floribus terminalibus congestis subsessilibus. *Forst. flor. austr. p. 38. n. 216.*

virgata. 13. M. foliis linearibus enerviis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Suppl. p. 343. Forst flor. austr. p. 37. n. 211.*

*** *foliis sparsis.*

ciliata. 14. M. foliis sparsis, superioribus suboppositis oblongis obtusis ciliatis aveniis enerviis, cymis corymbosis terminalibus. *Forst. flor. austr. p. 38. n. 217. an eadem cum villosa?*

**** *incerto foliorum situ.*

suaveolens. 15. M. calice fructus subhemisphærico, margine repando. *Gærtn. de fruct. & sem. cent. 3. t. 35. f. 1.*

viridiflora. 16. M. calice fructus hemisphæricó crasso edentulo. *Gærtn. de fr. & sem. cent 3. t. 35. f. 1.*

1270. HOPEA. *Cal.* 5fidus, superus. *Cor.* 5petala. *Stamina* multa, connata in 5 corpora. *Stil.* 1. *Drupa* nuce 3loculari.

tinctoria. 1. HOPEA. *Mant. p. 105. Catesb. Car. 1. t. 54.*

677. SYMPLOCOS. *Cal.* 5fidus, superus. *Cor.* 5–8-petala. *Stamina* 4plici serie tubo corollæ adnata. *Drupa* 5locularis polysperma.

martinicensis. 1. S. corolis pentapetalis. *Jacq. stirp. amer. pict. t. 261. f. 41.*

octopetala. 2. S. corollis octopetalis. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p. 109.*

HYPERICON. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5. *Filamenta* multa basi in 3-5 phalanges connata. *Capf.* 3. aut 5locularis, polyfperma.

* *floribus pentagynis.*

† *caule arboreo.*

arboreum. 1. H. foliis ovatis. *Suppl. p.* 345.

gujanenfe. 2. H. foliis ovato-oblongis acuminatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 784. *t.* 311.

latifolium. 3. H. foliis cordatis fubtus rufefcentibus tomentofis petiolatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 787. *t.* 312. *f.* 1.

feffilifolium. 4. H. foliis cordatis fubtus rufefcentibus tomentofis feffilibus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 787. *t.* 312. *f.* 2.

† † *caule fruticofo.*

balearicum. 5. H. foliis ramifque cicatrifatis. *Mill. h. angl. t.* 54.

Kalmianum. 6. H. foliis lineari-lanceolatis.

Brathys. 6 1/2. H. foliis fubulatis imbricatis glabris, floribus monadelphis. *Smith pl. ic. ined. fafc.* 2. *t.* 41. *Suppl. p.* 268. Brathys juniperina; *an revera hujus generis?*

calicinum. 7. H. foliis oblongo-ovatis coriaceis, caule tetragono, floribus folitariis terminalibus. *Mant. p.* 106. *Gifeck. ic. fafc.* 1. *t.* 18. *Theca baccans.*

cayanenfe. 8. H. foliis ovatis, calicibus ftriatis, corollis barbatis. *Mant. p.* 277. *Suppl. p.* 343.

bacciferum. 9. H. foliis ovatis, calicibus lævibus, corollis barbatis. *Mant. p.* 277. *Suppl. p.* 344.

guineenfe. 10. H. foliis ovatis acutis, ramis teretibus, floribus fubumbellatis. *Suppl. p.* 344. *Linn. diff. de hyperic. p.* 4. *f.* 1.

patulum. 11. H. caule fructefcente laxo, foliis ovatis margine revolutis, floribus folitariis terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 295.

† † † *caule herbaceo.*

Afcyron. 12. H. caule tetragono erecto fimplici, foliis lævibus integerrimis. *Gmel. flor. fib.* 4. *t.* 69. *Martyn. plat. to ill. Linn. fyft. t.* 24.

pyramidatum. 57. H. caule subtetragono ramoso, floribus subpaniculatis, calicibus ovatis acutis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 103.

** *floribus trigynis.*

† *caule fruticoso.*

Androsæmum. 13. H. fructibus baccatis, caule ancipiti. *Curt. flor. Lond.* t. 206. *Gærtn. de fr. & sem. cent.* 4. *t.* 59. *f.* 2. *Theca baccans.*

olympicum. 14. H. calicibus acutis, staminibus corolla brevioribus. *Dill. h. Elth. t.* 151. *f.* 183. *Mill. h. angl. t.* 151. *f.* 1.

canariense. 15. H. calicibus obtusis, staminibus corolla brevioribus.

floribundum. 58. H. calicibus ovatis acutis subciliatis, staminibus corolla brevioribus, foliis lanceolato-ellipticis. *Commel. hort. amst.* 2. *t.* 68.

foliosum. 59. H. calicibus lanceolatis acutis, staminibus longitudine corollæ, foliis ovali-oblongis sessilibus glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 104.

elatum. 60. H. calicibus lanceolato-ovatis acutis, staminibus corolla longioribus, foliis ovato-oblongis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 104.

hircinum. 16. H. calicibus lanceolatis acutis, staminibus corolla longioribus, foliis oblongis, caule ancipiti. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 51.

petiolatum. 17. H. caule tetragono compresso, foliis ovatis petiolatis integerrimis subtus tomentosis.

prolificum. 18. H. caule ancipiti, floribus primordialibus sessilibus, foliis lanceolato-linearibus. *Mant. p.* 106. *Murray comm. Gœtt.* 1780. *t.* 7.

glandulosum. 61. H. foliis oblongo-lanceolatis pellucido-punctatis margine glandulosis, calicibus acutis serrato-glandulosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 107.

repens. 19. H. caule tereti repente, foliis lanceolato-linearibus obtusis.

orientale. 20. H. foliis oblongis denticulato-crenatis, stipulis reflexis. *Tournef. it.* 2. *p.* 97. *ic.*

reflexum. 21. H. foliis lanceolatis sessilibus approximatis reflexis, ramis tomentosis, panicula terminali. *Suppl. p.* 346.

sinense. 22. H. foliis ovato-caniculatis integerrimis, pedunculis axillaribus bifloris. *Retz. obs. bot.* 5. *p.* 27.

mexicanum. 23. H. foliis ovatis imbricatis, ramis simplicibus. *Suppl. p. 345. Linn. diss. de hyper. p. 5. f. 2.*

† † *caule suffruticoso.*

virginicum. 24. H. floribus enneandris, caule tereti, foliis ovatis amplexicaulibus. *Mant. p. 255.*

scabrum. 25. H. caule tereti muricato, foliis oblongis.

linarifolium. 63. H. caule tereti erecto, foliis linearibus obtusis glabris, calicibus serrato-glandulosis. *Vahl symb. bot. 1. p. 65.*

ægyptium. 26. H. caulibus compressis, nectariis petalorum lanceolatis. *Linn. diss. de hyperic. f. 3.*

† † † *caule herbaceo.*

ericoides. 27. H. foliis linearibus imbricatis. *Pluckn. alm. t. 93. f. 5.*

canadense. 28. H. foliis lineari-lanceolatis, caule quadrangulo, pericarpiis coloratis.

lævigatum. 64. H. foliis ovatis subamplexicaulibus, calicis foliolis ovatis acutis, panicula trichotoma, flore intermedio sessili. *Ait. hort. Kew. 3. p. 106.*

quadrangulare. 29. H. foliis ovatis pellucido-punctatis, caule quadrangulo. *Flor. dan. t. 640.*

japonicum. 30. H. foliis ovatis sessilibus integris, caule tetragono basi decumbente. *Thunb. flor. jap. p. 295.*

gramineum. 31. H. foliis oblongo-parabolicis, caule tetragono dichotomo. *Forster. flor. austr. p. 53. n. 281.*

perforatum. 32. H. caule ancipiti, foliis obtusis, petalis oblique truncatis crenulatis puncto atro inter crenas notatis. *Mill. ill. ic. Blackw. herb. t. 15.*

perfoliatum. 33. H. caule subancipiti, foliis amplexicaulibus ovatis, cyma floribus sessilibus.

humifusum. 34. H. caulibus ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris, floribus axillaribus solitariis. *Flor. dan. t. 141. Curt. flor. Lond. t. 162.*

crispum. 35. H. caule tereti, foliis sessilibus lanceolatis basi undulatis dentatis. *Mant. p. 106. Bocc. mus. 2. t. 12.*

montanum. 36. H. caule tereti erecto, foliis ovatis glabris, calicibus serrato-glandulosis. *Flor. dan. t. 173.*

hirsutum. 37. H. caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus, calicibus serrato-glandulosis. *Mant. p.* 456. *Flor. dan. t.* 802.

erectum. 38. H. caule tereti, foliis amplexicaulibus lanceolatis acutis. *Thunb. flor. jap. p.* 296.

pulchrum. 39. H. caule tereti, foliis amplexicaulicibus cordatis glabris, calicibus serrato-glandulosis. *Flor. dan. t.* 75. *Curt. flor. Lond. t.* 6.

elodes. 40. H. caule tereti repente foliisque villosis subrotundis.

tomentosum. 41. H. caulibus prostratis, foliis semiamplexicaulibus flexuosis tomentosis, calicibus serrato-glandulosis.

barbatum. 42. H. calicibus & petalis ciliatis iisdemque & foliis punctatis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 259.

nummularium. 43. H. foliis cordato-orbiculatis glabris, calicibus serrato-glandulosis. *Pluckn. alm. t.* 93. *f.* 4.

Coris. 44. H. foliis subverticillatis, calicibus serrato-glandulosis. *Magaz. für. Botan.* 7. *t.* 4.

maculatum. 45. H. ramis trichotomis, foliis semiamplexicaulibus pellucido-punctatis glanduloso-ciliatis, calicibus obtusioribus. *Walt. flor. carol. p.* 189.

pilosum. 46. H. foliis subovatis appressis cauleque erecto pilosis, floribus terminalibus, calicibus integris. *Walt. flor. carol. p.* 190.

denticulatum. 47. H. caule erecto quadrangulo, foliis subamplexicaulibus ovatis, petalis dente laterali. *Walt. flor. carol. p.* 190.

quinquenervium. 48. H. caule quadrangulo, foliis semiamplexicaulibus quinquenerviis. *Walt. flor. carol. p.* 190.

nudicaule. 49. H. caulibus erectis ramosissimis, foliis infimis subovatis, superioribus brevissimis. *Walt. flor. carol. p.* 190.

campanulatum. 50. H. foliis oblongis obtusis sessilibus, pedunculis trifidis axillaribus oppositis, corollis campanulatis patulis. *Walt. flor. carol. p.* 191.

tubulosum. 51. H. foliis sessilibus, corollis tubulosis staminum corporibus ultra medium connatis. *Walt. flor. carol. p.* 191.

Walteri. 52. H. foliis petiolatis, staminum corporibus ad medium connatis. *Walt. flor. carol. p.* 191. *an. distincta species?*

*** *floribus digynis.*

muticum. 53. H. foliis ovatis feffilibus.

fetofum. 54. H. foliis linearibus.

**** *foliis monogynis.*

monogynum. 55. H. ftaminibus corolla longioribus, calicibus coloratis, caule fruticofo. *Mill. h. angl. t.* 151. *f.* 2.

revolutum. 56. H. ftaminibus corolla brevioribus, foliis lineari-lanceolatis bafi revolutis. *Vahl fymb. bot.* 1. *p.* 66.

903. ASCYRUM. *Cal.* 4phyllus. *Petala* 4. *Filamenta* multa, in 4 phalanges digefta.

Crux Andræe. 1. A. foliis ovatis caule tereti, panicula dichotoma.

hypericoides. 2. A. foliis lanceolato-obtufis ancipitibus. *Plum. gen. t.* 152. *f.* 1.

villofum. 3. A. foliis hirfutis, caule ftricto. *Pluckn. alm. t.* 245. *f.* 6.

MORONOBEA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5, ab uno latere convoluta & imbricata. *Filamenta* in 5 phalanges difpofita. *Stigma* 5radiatum. *Bacca* ovata non dehifcens, 1locularis, 2-5fperma.

coccinea. 1. MORONOBEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 789. *t.* 313.

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

* * *Flores semiflosculosi* Tournef. *corollis omnibus ligulatis.*

922. SCOLYMUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, squamosus.

921. CICHORIUM. *Recept.* subpaleaceum. *Pappus* subquinque-dentatus. *Cal.* caliculatus.

920. CATANANCHE. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 5aristatus, sessilis. *Cal.* imbricatus, scariosus.

917. SERIOLA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* subpilosus. *Cal.* simplex.

918. HYPOCHŒRIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* subplumosus. *Cal.* imbricatus.

904. GEROPOGON. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumosus disci, 5aristatus radii. *Cal.* simplex.

915. ANDRYALA. *Recept.* villosum. *Pappus* pilosus, sessilis. *Cal.* subæqualis, rotundatus.

905. TRAGOPOGON. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus, stipitatus. *Cal.* simplex.

907. PICRIS. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus, stipitatus. *Cal.* caliculatus.

906. SCORZONERA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus, stipitatus. *Cal.* imbricatus, margine scarioso.

912. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Pappus* stipitatus. *Cal.* imbricatus, squamis laxis.

914. CREPIS. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* caliculatus; squamis difformibus.

910. CHONDRILLA. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus, stipitatus. *Cal.* caliculatus, multiflorus.

911. PRENANTHES. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* caliculatus, subquinqueflorus.

909. LACTUCA. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus, stipitatus. *Cal.* imbricatus, margine scarioso.

913. HIERACIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus, sessilis. *Cal.* imbricatus, ovatus.

908. SONCHUS. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus, sessilis. *Cal.* imbricatus, gibbus.

919. LAMPSANA.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* caliculatus.
916. HYOSERIS.	*Recept.* nudum. *Pappus* caliculo coronatus. *Cal.* ſubæqualis.
VIREA.	*Recept.* planum, alveolatum. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. *Cal.* imbricatus, ſquamis laxis.

** *Flores capitati.*

930. ATRACTYLIS.	*Corolla* radiata, corollulis radii 5dentatis.
1419. BARNADESIA.	*Corolla* radiata. *Cal.* nudus, imbricatus, pungens. *Pappus radii* plumoſus, *diſci* ſetoſus retrofractus.
929. CARLINA.	*Calix* radiatus, radiis coloratis.
926. CNICUS.	*Calix* bracteis obvallatus.
923. ARCTIUM.	*Calix* ſquamis apice incurvato-hamoſis.
931. CARTHAMUS.	*Calix* ſquarroſus, ſquamis foliaceis. *Flores* diſcoidei.
STOKESIA.	*Cal.* ſquamoſus, ſquamis foliaceis. *Cor.* radiata.
928. CYNARA.	*Cal.* ſquarroſus, ſquamis canaliculatis ſpinoſis.
925. CARDUUS.	*Cal.* ventricoſus, ſquamis ſpinoſis. *Recept.* piloſum.
927. ONOPORDON.	*Cal.* ventricoſus, ſquamis ſpinoſis. *Recept.* favoſum.
924. SERRATULA.	*Cal.* ſubcylindricus imbricatus, ſquamis acutiuſculis muticis.

*** *Flores diſcoidei.*

934. ETULIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* æqualis.
936. AGERATUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* 5ariſtatus. *Cal.* ſubæqualis. *Corollulæ* 4fidæ.
933. CACALIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* caliculatus.
939. CHRYSOCOMA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* imbricatus. *Piſt.* breviſſima.
935. EUPATORIUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus. *Piſt.* longiſſima.
MARSHALLIA.	*Recept.* paleaceum. *Sem.* coronata caliculo 5phyllo. *Cal.* polyphyllus perſiſtens. *Stigm.* 2.
942. SANTOLINA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, hemiſphæricus.

941. CALEA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus.* pilosus. *Cal.* imbricatus.
943. ATHANASIA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus.* paleaceus. *Cal.* imbricatus.
1287. SPILANTUS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus.* 2dentatus. *Cal.* subæqualis.
932. BIDENS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus.* aristatus. *Cal.* imbricatus.
938. STÆHELINA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* plumosus ramosus. *Antheræ* caudatæ.
PACURINA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* simplex pilosus. *Cal.* imbricatus.
937. PTERONIA.	*Recept.* setis partitis. *Pappus* subplumosus. *Cal.* imbricatus.
940. TARCHONANTUS.	*Recept.* pilosum. *Pappus* pilosus vestiens. *Cal.* turbinatus 1phyllus.
CHUQUIRAGA.	*Recept.* villosum. *Pappus* plumosus. *Cal.* turbinatus imbricatus squamis numerosissimis.

* *Tanacetum.*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Flores discoidei.*

945. ARTEMISIA.	*Recept.* subnudum. *Pappus* o. *Cor.* radii o.
948. CARPESIUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cor.* radii 5fidæ.
944. TANACETUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* submarginatus. *Cor.* radii 3fidæ.
968. COTULA.	*Recept.* subnudum. *Pappus* marginatus. *Cor.* disci 4fidæ.
949. BACCHARIS.	*Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cor.* femineæ hermaphroditis mistæ.
950. CONYZA.	*Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cor.* radii 3fidæ.
946. GNAPHALIUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* scariosus squamis concavis.
947. XERANTHEMUM.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* subsetaceus. *Cal.* scariosus radio explanato.
969. ANACYCLUS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Semina* marginata emarginata.

** *Flores semiflosculosi, subbilabiati.*

960. PERDICIUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cor.* 3fidæ, exteriore majore 3loba.

**** Flores radiati.*

962. BELLIS.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* ſimplex, ſquamis æqualibus.
967. MATRICARIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus ſquamis acutis.
966. CHRYSANTHEMUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* ſquamis intimis ſcarioſis.
1420. UNXIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 5phyllus. *Flores radii diſcique* 5.
MADIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 8phyllus. *Sem.* plano-convexa.
959. DORONICUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, *radii* o.
958. ARNICA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Stamina* radii caſtrata.
956. INULA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Antheræ* baſi 2ſetæ.
951. ERIGERON.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii capillares.
955. SOLIDAGO.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii ſubſenæ remotæ.
957. CINERARIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* aequalis ſimplex.
953. SENECIO.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſquamis apice ſphacelatis.
952. TUCILAGO.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſquamis ſubmembranaceis.
955. ASTER.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſubſquarroſus.
1421. MUTISIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* cyliadricus imbricatus. *Cor. radii* ovali-oblongæ, *diſci* 3fidæ.
1322. BELLIUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus 8phyllusque. *Cal.* ſimplex.
964. TAGETES.	*Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 1. phyllus. *Radius* 5florns.
965. PECTIS.	*Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 5. phyllus. *Radius* 5florus.
961. HELENIUM.	*Recept.* ſeminudum. *Pappus* 5ariſtatus. *Cal.* multipartitus. *Cor.* rad. 3fidæ.
BOLTONIA.	*Recept.* favoſum. *Pappus* obſolete dentatus, 2cornis. *Cor.* radiata.
963. LEYSERA.	*Recept.* ſemipaleaceum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* ſquarroſus.

973. SIGESBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Radius* dimidiatus.
1321. ECLIPTA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cor.* disci 4fidæ.
970. ANTHEMIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* hemisphæricus.
971. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* oblongus. *Radius* subquinqueflorus.
977. BUPHTHALMUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* marginatus. *Stigma* hermaphrodit. simplex.
978. AMELLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus.* pilosus. *Cal.* imbricatus.
972. TRIDAX. *Recept.* paleaceum. *Pappus* pilosus. *Cor.* radii 3partitæ.
975. VERBESINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Flosculi* radii circiter 5.
974. ZINNIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* imbricatus. *Rad.* persistens 5florus.

* *Tetragonotheca v. Polymniaca.*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

SCLEROCARPUS. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* sulcatus.
982. GORTERIA. *Recept.* nudiusculum. *Pappus* pilosus. *Radius* corollæ ligulatus.
DIDELTA. *Recept.* partim nudum partim setosum, separabile. *Pappus* simplex. *Cal.* 2plex.
984. CENTAUREA. *Recept.* setosum. *Pappus* pilosus. *Radius* corollæ tubulosus.
1271. ZOEGEA. *Recept.* setosum. *Pappus* setaceus. *Radius* corollæ ligulatus.
GALARDIA. *Recept.* paleaceum, planum. *Sem.* apice 8paleacea. *Radius* corollæ ligulatus.
TITHONIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* apice 5paleacea. *Radius* corollæ ligulatus.
BASTERA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus.
980. RUDBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* marginatus. *Cal.* serie 2plici.
981. COREOPSIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* caliculatus.
979. HELIANTHUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* squarrosus.

983. OSMITES. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obsoletus. *Cal.* imbricatus.

ENOELIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* paleæ membranaceæ conduplicatæ inclusa. *Cal.* polyphyllus æqualis.

POLYGAMIA NECESSARIA.

995. FILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Flosculi feminei* inter squamas calicis.

996. MICROPUS. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Flosculi feminei* squamis calicis vaginati.

985. MILLERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Flosculus* femineus subsolitarius.

FLAVERIA. *Recept.* nudum. *Sem.* squamis calicis involuta. *Cal.* 3-4phyllus connivens æqualis.

1323. BALTIMORA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* cylindricus. *Radius* 5florus.

1224. HIPPIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* glabra compresso-marginata. *Radius* obsoletus.

992. OSTEOSPERMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* globosa ossea.

990. CALENDULA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* membranacea.

993. OTHONNA. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* 1phyllus.

991. ARCTOTIS. *Recept.* subpilosum. *Pappus* 5phyllus. *Sem.* tomentosa.

TRIXIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice villosa. *Cor.* radii 3fidæ.

994. ERIOCEPHALUS. *Recept.* villosum. *Pappus* o. *Flosculi* radii quini.

987. POLYMNIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* 5phyllus.

989. MELAMPODIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* vulviformis. *Cal.* 5phyllus.

986. SILPHIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 2aristatus. *Cal.* squarrosus.

988. CHRYSOGONUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 3aristatus. *Sem.* caliculis propriis.

BAILLIERIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice 2cornia.

POLYGAMIA SEGREGATA.

1001. STOEBE.	*Perianth.* 1florum. *Pappus* plumoſus. *Polyg.* æqualis.
1325. ŒDERA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus. *Perianth.* proprium floſculis tubuloſis ligulatiſque.
999. ECHINOPS.	*Perianth.* 1florum. *Pappus* pubeſcens. *Polyg.* æqualis.
998. ELEPHANTOPUS.	*Perianth.* 4florum. *Pappus* ſetoſus. *Polyg.* æqualis.
TETRANTHUS.	*Cal.* comm. 4florus. *Perianth.* proprium 1phyllum. *Semina* coronata. *Polyg.* æqualis.
ROLANDRA.	*Floſculi* faſciculati in capitulum ſquamis, interjectis. *Perianth.* proprium 2valve 1florum. *Coroll.* hermaphroditæ. *Pappus* o.
1000. GUNDELIA.	*Recept.* 5florum. *Pappus* o. *Polyg.* fruſtranea.
1422. JUNGIA.	*Recept.* paleaceum. *Perianth.* comm. 3florum. *Floſculi* tubuloſi 2labiati, *labio exteriori* ligulato, *interiori* 2partito.
CRASPEDIA.	*Recept.* paleaceum. *Cal.* communis imbricatus. *Floſc.* tubuloſi, falſciculis aliquot depreſſis. *Perianth.* proprium o. *Pappus* plumoſus.
NASSAVIA.	*Receptac.* nudum. *Perianth.* comm. 4-5-florum. *Floſcul.* ſubbilabiati, hinc 3-dentati inde 2fidi. *Pappus* ſetis 3-4 caducis.
998. SPHÆRANTHUS.	*Recept.* multiflorum, *Pappus* o. *Polyg.* neceſſaria.

MONOGAMIA.

* *Strumpfia*, *ſeriphium Corymbium*, *Jaſione*, *Simbuleta*, *Lobelia*, *Viola*, *Impatiens*, *Solanum*, *Shawia.*

POLYGAMIA ÆQUALIS.

904. GEROPOGON. *Receptaculum* ſetoſo-paleaceum. *Cal.* ſimplex. *Sem.* diſci pappo plumoſo, radii 5ariſtato.

glaber. 1. G. foliis glabris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 33.

hirſutus. 2. G. foliis hirſutis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 231. *ic.*

caliculatus. 3. G. calicibus caliculatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 106.

905. TRAGOPOGON. *Recept.* nudum. *Cal.* ſimplex. *Pappus* plumoſus.

pratenſis. 1. Tr. calicibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Knorr. del. hort.* 2. *t.* T. 3.

mutabilis. 2. Tr. calicibus octophyllis corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis lanceolato-acuminatis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 316. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 20.

capenſis. 3. Tr. calicibus octophyllis ventricoſo-conicis corolla brevioribus, foliis runcinatis ſeſſilibus ſpinoſo-dentatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 320. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 74.

undulatus. 4. Tr. calicibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſublinearibus, caulinis maxime undulatis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 317. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 19.

villoſus. 5. Tr. calicibus corollæ radio ſeſquilongioribus, caule foliiſque villoſis.

major. 6. Tr. calicibus corollæ radio longioribus, foliis integris ſtrictis, pedunculis ſuperne incraſſatis, corollulis ad apicem rotundatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 29. β?) Tragopogon dubium. *Scop. fl. carn.* 2. *n* 947.

porrifolius. 7. Tr. calicibus corollæ radio longioribus, foliis integris ſtrictis, pedunculis ſuperne incraſſatis, corollulis anguſtiſſimis truncatis. *Flor. dan. t.* 797.

crocifolius. 8. Tr. calicibus corollæ radio longioribus, foliis integris, radicalibus pedunculiſque baſi villoſis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 230. *ic.*

orientalis. 9. Tr. calicibus corollæ radio brevioribus, foliis integris ſubundulatis. *Camer. epit. p.* 312. *ic.*

Dale-champii. 10. Tr. calicibus monophyllis corolla brevioribus inermibus, foliis runcinatis. *Barr. p. rar. ic. t.* 209.

picroides. 11. Tr. calicibus monophyllis corolla brevioribus aculeatis, foliis runcinatis denticulatis.

asper. 12. Tr. calicibus corolla brevioribus hispidis, foliis integris, caulinis oblongis.

ruber. 13. Tr. glaberrimus, foliis amplexicaulibus integris, floribus solitariis terminalibus. *S. G. Gmelin. it.* 2. *p.* 198.

Dande-lion. 14. Tr. foliis ensiformibus integris lævibus, scapis radicalibus.

lanatus. 15. Tr. foliis ensiformibus undulatis villosis, scapis radicalibus.

virgini-cus. 16. Tr. foliis radicalibus lyratis rotundatis, caulinis indivisis.

906. SCORZONERA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* imbricatus', squamis margine scariosis.

tomentosa. 1. Sc. foliis ovatis nervosis tomentosis integerrimis sessilibus.

humilis. 2. Sc. foliis lato-lanceolatis nervosis planis, caule subnudo unifloro. *Flor. dan. t.* 816. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 36.

lanata. 3. Sc. foliis lanceolatis nervosis planis, caule simplici basi lanato. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 306.

caricifo-lia. 4. Sc. foliis lanceolato-linearibus nervosis carinatis, caule unifloro subfolioso. *Pallas it.* 3. *p.* 757. *t.* Ii. *f.* 1.

hirsuta. 5. Sc. foliis linearibus cauleque unifloro hirsutis. *Mant. p.* 278. *Coll. ecphr.* 1. *p.* 233. *ic.*

laciniata. 6. Sc. foliis linearibus dentatis acutis, caule erecto, calicis squamis petalo-mucronatis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 356.

pusilla. 7. Sc. foliis linearibus apice circinatis, caulibus foliosis subquadrifloris. *Pall. it.* 2. *p.* 744. *t.* L.

hispida. 8. Sc. foliis linearibus dentatis ciliatis, scapis unifloris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 215.

ciliata. 9. Sc. foliis retrorsum alternatim sinuato-dentatis glabris, margine acute ciliatis, caule procumbente ramoso scabro, pedunculis squamosis. *Forsk. flor æg. arab. p.* 143.

parviflo-ra. 10. Sc. foliis lineari-ensiformibus integris, caulibus ramosis, radio corollæ brevissimo. *Jacq. fl. austr.* 4. *t.* 305.

gramini- 11. Sc. foliis lineari-enſiformibus integris carinatis. *Jacq. obſ.*
folia. *bot.* 4. *t.* 100.

hiſpanica. 12. Sc. foliis amplexicaulibus integris ſerrulatis, caule ramoſo. *Blackw. herb. t.* 406.

tuberoſa. 13. Sc. foliis lineari-acuminatis carinatis ſubtus pubeſcentibus, radice ſubgloboſa, floribus terminalibus ante floreſcentiam nutantibus. *Pall. it.* 3. *p.* 757. *t.* Y. *f.* 3.

purpurea. 14. Sc. foliis lineari-ſubulatis integris caniculato-triquetris, pedunculis cylindricis. *Jacq. flor auſtr.* 1. *t.* 35.

anguſti- 15. Sc. foliis ſubulatis integris, pedunculis incraſſatis, caulis
folia. baſi villoſa. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 1.

reſedi- 16. Sc. foliis obtuſe dentatis, caule divaricato, calicibus
folia. apicibus tomentoſis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 800.

picroides. 17. Sc. foliis ſuperioribus amplexicaulibus integerrimis, inferioribus runcinatis, pedunculis ſquamoſis. *Plunckn. phyt.* 61. *f.* 5.

tingita- 18. Sc. foliis omnibus runcinatis amplexicaulibus. *Herm.*
na. *par. lugdb. p.* 659. *ic.*

taraxati- 19. Sc. foliis runcinatis petiolatis, ſcapo ramoſo aphyllo.
folia. *Jacq. coll.* 1. *p.* 52. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 91.

907. PICRIS. *Recept.* nudum. *Cal.* duplicatus. *Pappus* plumoſus. *Sem.* tranſverſim ſulcata.

echioides. 1. P. perianthiis exterioribus pentaphyllis interiori ariſtato majoribus. *Curt. flor. Lond. t.* 150. β) *Herm. par. lugdb. p.* 185. *ic.*

hieracioi- 2. P. perianthiis laxis, foliis integris, pedunculis ſquamatis
des. in calicem.

ſcabra. 3. P. caule ſubunifloro, foliis undulatis hiſpidis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 143.

japonica. 4. P. perianthiis hiſpidis, foliis dentatis, pedunculis ſubaphyllis hiſpidis. *Thunb. flor. jap. p.* 299.

aſplenioi- 5. P. foliis pinnatifidis, lobis alternis rotundatis.
des.

908. SONCHUS. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, ventricoſus. *Pappus* capillaris.

fruticoſus. 1. S. fruticoſus glaberrimus, foliis baſi attenuatis lyratis, lobis rotundatis obtuſis, calicibus florentibus ſquamoſis, pedunculis ſubſquamoſis. *Suppl. p.* 346.

pinnatus. 15. S. fruticoſus, foliis pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis ſubdentatis, calicibus lævibus, pedunculis nudis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 116.

radicatus. 16. S. caule fruticoſo ſubnudo, foliis radicalibus utrinque lævibus lyratis, lobis triangulari-ovatis, pedunculis nudis calicibuſque glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 116.

maritimus. 2. S. pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicaulibus indiviſis retrorſum argute dentatis. *Pluckn. alm. t.* 62. *f.* 5.

plumieri. 3. S. pedunculis nudis, floribus paniculatis, foliis runcinatis.

tataricus. 4. S. pedunculis nudis, foliis lanceolatis dentatis runcinatis. *Mant. p.* 572. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 3.

tuberoſus. 5. S. foliis inferioribus runcinatis, ſuperioribus ſagittatis. *Suppl. p.* 246.

alpinus. 6. S. pedunculis ſquamoſis, floribus racemoſis, foliis runcinatis. *Flor. dan. t.* 182. *Smith. pl. ic. ined.* 1. *t.* 11.

floridanus. 7. S. pedunculis ſquamoſis, foliis lyrato-haſtatis.

ſibiricus. 8. S. pedunculis ſquamatis, foliis lanceolatis indiviſis ſeſſilibus. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 82.

canadenſis. 9. S. pedunculis hiſpidis, foliis runcinatis, floribus racemoſis.

arvenſis. 10. S. pedunculis calicibuſque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. *Flor. dan. t.* 606.

paluſtris. 11. S. pedunculis calicibuſque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi ariſtatis.

oleraceus. 12. S. pedunculis tomentoſis, calicibus glabris. *Curt. flor. Lond. t.* 123. β) *Flor. dan. t.* 682. γ) *Flor. dan. t.* 843.

tenerrimus. 13. S. pedunculis tomentoſis, calicibus piloſis.

agreſtis. 14. S. pedunculis tomentoſis multifloris, calicibus glabris, caule ſtriato, foliis inciſo-ſerratis ſeſſilibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 110.

909. LACTUCA. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *Pappus* capillaris ſtipitatus. *Sem.* lævia.

quercina. 1. L. foliis runcinatis denticulatis acutis ſubtus lævibus, caule glabro.

intybacea. 2. L. foliis runcinatis dentato-ciliatis obtuſis amplexicaulibus, caule paniculato. *Jacq. coll.* 1. *p.* 53. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 96.

flava. 3. L. foliis radicalibus lyrato-ſinuatis margine ſpinuloſis, caulinis ſinuatis amplexicaulibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 143.

ſinuata. 4. L. foliis ſinuatis ciliato-aculeatis, racemis florum terminalibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 215. *an diſtincta ſatis a ſaligna?*

caroliniana. 15. L. foliis laciniatis denticulatis præmorſis ſubglaucis, coſta ſubtus carinata aculeata. *Walt. flor. carol. p.* 193.

tuberoſa. 5. L. foliis ſpinuloſo-denticulatis, caule ſubſimplici, radice tuberoſa multiplici. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 57.

Scariola. 6. L. foliis verticalibus carina aculeatis. *Regn. bot. t.* 345. *β*) *Herm. par. lugdb. p.* 191. *ic.*

viroſa. 7. L. foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 2. *f.* 16.

ſativa. 8. L. foliis rotundatis, caulinis cordatis, caule corymboſo. *Blackw. herb. t.* 88. *β*) *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 2. *f.* 2.

ſaligna. 9. L. foliis haſtato-linearibus ſeſſilibus carina aculeatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 250.

perennis. 10. L. foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis ſurſum dentatis. *Tabernæm. Kræuterb. p.* 176. *ic. Mill. h. angl. t.* 157.

inermis. 11. L. foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus retrorſum dentatis inermibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 144.

decorticata. 12. L. foliis lanceolatis dentato-ſinuatis glabris, appendice utrinque lineari. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 216.

canadenſis. 13. L. foliis lanceolato-enſiformibus amplexicaulibus dentatis inermibus.

indica. 14. L. foliis lanceolato-enſiformibus ſeſſilibus inæqualiter dentatis. *Mant. p.* 278.

910. CHONDRILLA. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus. *Flosculi* multiplici ſerie. *Pappus* capillaris, ſtipitatus. *Sem.* muricata.

juncea. 1. Ch. foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *Jacq. flor. auſtr. 5. t. 427.*

crepoides. 2. Ch. foliis ſagittatis amplexicaulibus, caule ſimplici, floribus ſubſeſſilibus lateralibus. *An crepidis potius ſpecies?*

nudicaulis. 3. Ch. ſcapo nudo, floribus paniculatis. *Mant. p.* 278. *Murr. comm. goett.* 1772. *t.* 4.

911. PRENANTHES. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus. *Pappus* capillaris, ſubſeſſilis. *Flosculi* ſimplici ſerie.

viminea. 1. Pr. foliorum ramentis cauli adnatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 9.

tenuifolia. 2. Pr. foliis linearibus integerrimis.

ſpinoſa. 3. Pr. foliis linearibus ſeſſilibus glabris, caule fruticoſo dichotomo ſpinoſo, pedunculis lateralibus ſolitariis unifloris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 144.

hiſpida. 4. Pr. foliis linearibus ſeſſilibus, ſpinis ſtipularibus, floſculis octonis, calice octophyllo ſpinuloſo. *Pall. it.* 1. *p.* 501. *n.* 126.

ſinenſis. 5. Pr. foliis lineari-enſiformibus integris dentatiſque. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

integra. 6. Pr. foliis oblongis integris glabris; panicula coarctata. *Thunb. berg. flor. jap. p.* 300.

dentata. 7. Pr. foliis oblongis dentatis glabris, caule paniculato. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

debilis. 8. Pr. foliis ovatis integris, caule ſubnudo erecto. *Thunb. flor. jap. p.* 300.

chondrilloides. 9 Pr. foliis lanceolatis, radicalibus indiviſis ſubdentatis, floſculis denis, caliçibus octofidis. *Mant. p.* 107. *Arduin. ſpec.* 2. *t.* 17.

purpurea. 10. Pr. foliis lanceolatis denticulatis, flosculis quinis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 307.

hastata. 11. Pr. foliis hastatis amplexicaulibus dentatis, caule ramoso. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

alba. 12. Pr. foliis hastato-angulatis, floribus nutantibus subumbellatis, flosculis plurimis.

repens. 13. Pr. foliis trilobis, caule repente. *Amoen. acad.* 2. *p.* 360. *f.* 23. *an hieracii potius species ?*

altissima. 14. Pr. foliis trilobis, caule erecto, flosculis quinis. *Pluckn. alm. t.* 317. *f.* 2.

muralis. 15. Pr. foliis runcinatis, flosculis quinis. *Flor. dan. t.* 509.

multiflora. 16. Pr. foliis petiolatis runcinatis, lobis acutis dentatis, panicula fastigiata diffusa. *Thunb. flor. jap. p.* 303.

squarrosa. 17. Pr. foliis sessilibus runcinatis, laciniis recurvis dentatis. *Thunb. flor. jap. p.* 303.

lyrata. 18. Pr. foliis runcinato-lyratis dentatis, panicula coarctata. *Thunb. fl. jap. p.* 303.

humilis. 19. Pr. foliis lyratis, lobis obtusis, caule subnudo, floribus terminalibus subternis. *Thunb. flor. jap. p.* 302.

japonica. 20. Pr. foliis radicalibus lyratis, caule subnudo, flosculis quindenis. *Mant. p.* 107.

pinnata. 21. Pr. fruticosa, foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis linearibus integerrimis, panicula composita. *Suppl. p.* 347. *an Sonchi potius species ?*

VIREA. *Recept.* subnudum. *Pappus* plumosus, substipitatus radii sessilis. *Cal.* imbricatus, squamis incumbentibus.

scabra. 1. VIREA. *Scop. del. insf.* 2. *p.* 25. *t.* 13.

912. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, squamis interioribus parallelis æqualibus. *Pappus* capillaris, stipitatus.

* *pappo stipitato*, Taraxacon.

officinalis. 1. L. squamis calicinis exterioribus reflexis integris, foliis runcinatis acute dentatis glabris. *Flor. dan. t.* 574.

mucronatus. 2. L. squamis calicinis exterioribus apice recurvis integris, pedunculis squamosis, foliis pinnatifidis undatis dentato-mucronatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 144.

Taraxacon. 3. L. squamis calicinis exterioribus erectis appressis integris, foliis lanceolatis integerrimis denticulatisve. *Wiggers prim. fl. holsp. p.* 56.

carolinianus. 17. L. squamis calicis apice bifidis, exterioribus reflexis. *Walt. flor. carol. p.* 192.

asper. 4. L. foliis dentato-pinnatifidis calicibusque hispidis, caulibus squamosis. *Flor. æg. arab. p.* 145.

tomentosus. 5. L. calice oblongo, foliis lanceolatis indivisis subtus tomentosis. *Suppl. p.* 347. *nonne potius tussilaginis species?*

** *pappo sessili.*

autumnalis. 6. L. caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris, pappo subsessili. *Flor. dant t.* 501.

Hastile. 7. L. scapo lævi, calicibus pilosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 164. *an potius hieracii species?*

hispidus. 8. L. calice toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis, setis furcatis. *Flor. dan. t.* 862.

bulbosus. 9. L. foliis oblongo-ovatis subdentatis glabris, calice lævi, scapo superne hirto. *Col. phyt. t.* 4.

alpinus. 10. L. calice toto erecto scapoque infra florem hispidis, foliis dentatis subpilosis, setis simplicissimis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 93.

hirtus. 11. L. calice toto erecto, foliis dentatis hirtis, setis simplicissimis.

croceus. 12. L. calice erecto ovato hirsuto, scapo lævi, foliis lineari-lanceolatis acutis retrorsum dentatis supra subhirsutis. *Haënk. apud Jacq. coll.* 2. *p.* 26.

aureus. 13. L. foliis runcinatis, caule subunifolio, calice hispido. *Hall. hist. stirp. Helv. t.* 24.

tuberosus. 14. L. foliis runcinatis scabris, calice acuto hirsuto. *Lob. ic.* 232.

megalorhizos. 15. L. scapo piloso, squamis calicinis ad apicem gibbis, foliis ciliato-pinnatifidis glabris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 216. *an hujus generis et tribus?*

danubialis. 16. L. scapo unifloro, foliis pinnatifidis calicibusque glabris. *Schranck. flor. bav. 2. p. 336.*

913. HIERACIUM. *Recept.* (ut plurimum) nudum. *Cal.* imbricatus, ovatus, interdum caliculatus. *Pappus* ut plurimum sessilis, capillaris, (rarius plumosus.)

* *scapo nudo.*

† *unifloro.*

‡ *receptaculo villoso, pappo plumoso,* Apargia Scopoli.

incanum. 1. H. foliis integerrimis subdenticulatis lanceolatis scabris. *Jacq. flor. austr. 3. t. 287.*

‡ ‡ *receptaculo lævi, pappo simplici.*

venosum. 2. H. foliis cuneiformibus hirtis, scapo crassissimo erecto.

Pilosella. 3. H. foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus. *Blackw. herb. t. 365.*

alpinum. 4. H. foliis oblongis integris dentatis, scapo subnudo, calice piloso. *Flor. dan. t. 27.*

taraxaconis. 5. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo subnudo, calice hirsuto. *Allion. flor. pedem. 1. t. 31. f. 1.*

alpestre. 6. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo subunifolio subunifloro, calice hirsuto cylindrico. *Jacq. flor. austr. 2. t. 191.*

pumilum. 7. H. foliis ovatis, petiolis dilatatis, scapis subunifloris. *Mant. p. 279. Gouan. ill. t. 22. f. 3. idem cum crepide pygmæa.*

† † *scapo multifloro.*

dubium. 8. H. foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus.

Auricula. 9. H. foliis integerrimis lanceolatis, stolonibus repentibus.

præmorsum. 10. H. foliis ovatis subdentatis, scapo ramoso, floribus superioribus primoribus. *Gmel. flor. sib. 2. t. 13. f. 2.*

capense. 11. H. foliis oblongis dentatis scabris, pedunculis inferioribus altioribus.

ſanctum. 12. H. foliis lyratis obtuſis dentatis. *Tabernæm. Kræuterb. p.* 183.

cymoſum. 13. H. foliis lanceolatis integris piloſis, ſcapo ſubnudo baſi piloſo, floribus ſubumbellatis. *Flor. dant. t.* 810.

Gmelini. 14. H. caule paniculato, foliis radicalibus ovatis ſerratis glabris. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 8. *f.* 2.

aurantiacum. 15. H. foliis integris, caule ſubnudo ſimpliciſſimo piloſo corymbifero. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 410.

Gronovii. 16. H. foliis radicalibus obovatis integerrimis piloſis, caule paniculato ſubnudo.

lactucaceum. 44. H. foliis oblongis integris ſubdentatis, ſcapo ſimplici, floribus racemoſis caliculatis, ſquamis calicinis glabris. *J. G. Gmelin flor. ſib.* 2. *p.* 32. *t.* 13. *f.* 2.

ſtaticefolium. 17. H. foliis lanceolato-linearibus obſolete denticulatis obtuſis, ſcapo ramoſo, pedunculis longiſſimis unifloris ſuperne ſquamoſis. *Allion. flor. pedem. p.* 214. *t.* 81. *f.* 2.

incarnatum. 18. H. foliis hirſutis obovato-oblongis repando-denticulatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 127.

** *caule folioſo.*

† *pappo ſtipitato.*

ſtipitatum. 19. H. caule ſubunifolio ramoſo, foliis dentatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 293.

†† *pappo ſeſſili.*

pontanum. 20. H. caule ſubunifloro. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 526. Hypochæris montana. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 190.

humile. 21. H. caule paucifloro, foliis inferioribus hirſutis et inciſis vix altiore. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 189.

ſabaudum. 22. H. caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus. *Flor. dan. t.* 872.

hiſpidum. 23. H. foliis oblongo-lanceolatis ſubdentatis ſubtus cauleque erecto hiſpidis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 216.

echioides. 47. H. caule erecto, foliis ſparſis lanceolatis piloſis rigidis ſubdentatis, floribus ſubumbellatis. *Lomnizer flor. poſon. p.* 348. *n.* 782.

Kalmii. 24. H. caule erecto multifloro, foliis lanceolatis dentatis, pedunculis tomentoſis.

panicula- 25. H. caule erecto, foliis alternis lanceolatis nudis dentatis,
tum. panicula capillari.

paludo- 26. H. caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis gla-
sum. bris, calicibus hispidis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 47.

lyratum. 27. H. caule multifloro, foliis lyratis glabris, calice pedun-
culisque hispidis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 9.

porrifo- 28. H. caule ramoso, foliis lanceolato-linearibus subinte-
lium. gerrimis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 286.

chondril- 29. H. caule ramoso, foliis caulinis elongato-dentatis gla-
loides. bris, radicalibus lanceolatis integris. *Jacq. flor. austr.* 5.
t. 429.

murorum. 30. H. caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis,
caulino minori. β) *Blakw. herb. t.* 538.

Sprenge- 31. H. caule ramoso, foliis semiamplexicaulibus oblongis
rianum. repandis hispidis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 17.

aurimon- 45. H. caule paucifloro sulcato, foliis amplexicaulibus laxe
tanum. dentatis patulis basi hastatis, calicibus villosis, squamis
linearibus. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 332.

undula- 46. H. caule ramoso, foliis ellipticis dentatis undulatis
tum. pilosis, pilis plumosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 124.

villosum. 32. H. caule ramoso, foliis hirsutis, radicalibus lanceolato-
ovatis dentatis, caulinis amplexicaulibus cordatis. *Jacq.
fl. austr.* 1. *t.* 27.

amplexi- 33. H. caule ramoso, foliis amplexicaulibus cordatis sub-
caule. dentatis, pedunculis unifloris hirsutis. *Kniph. bot. orig.
cent.* 12. *n.* 56.

cerinthoi- 34. H. foliis radicalibus obovatis denticulatis, caulinis
des. oblongis semiamplexicaulibus. *Gouan. illustr. t.* 22.
f. 4.

pyrenai- 35. H. foliis amplexicaulibus obovato-lanceolatis retrorsum
cum. dentatis, caule simplici, calicibus laxis.

blattari- β) H. foliis lanceolatis dentatis, floribus solitariis. *Sp. pl.*
oides. *p.* 1130.

pilosum. γ) H. caule piloso, foliis dentato-sinuatis. *Sp. pl. p.* 1115.
Picris pyrenaica. *Herm. parad. lugdb. p.* 184. *ic.*

austria- δ) H. foliis oblongis denticulatis, calicibus hispidis. *Jacq.*
cum. *fl. austr.* 5. *t.* 441.

helveti- ε) H. foliis minute serratis acutis.
cum.

molle. 36. H. foliis lanceolatis ſubintegerrimis mollibus, inferioribus petiolatis, floribus pedunculatis ſubcorymboſis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 119.

umbellatum. 37. H. foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. *Flor. dant. t.* 680. β) Hieracium glabrum. *Krock. flor. ſileſ.* 2. 2. *p.* 316.

glutinoſum. 38. H. foliis lanceolatis runcinatis ſcabriuſculis, floribus umbellatis.

viroſum. 39. H. foliis ſeſſilibus cordato-lanceolatis ſubintegerrimis, caule ſimplici, thyrſo terminali. *Pallas it.* 1. *p.* 501. *n.* 125.

ſquamoſum. 40. H. foliis radicalibus pinnatis, caulibus ſulcatis, ramis ſquamatis. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 9.

flexuoſum. 41. H. foliis radicalibus oblongis acuminatis viſcido-tomentoſis, caule ſimplici lanato. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 9.

dichotomum. 42. H. foliis radicalibus oblongis acuminatis ſinuatis lanatis, caule teretiuſculo dichotomo. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 9.

rhomboidale. 43. H. foliis radicalibus rhomboideis petiolatis lævibus, caulinis amplexicaulibus, pedunculis calicibuſque villoſis. *Lapeirouſe act. toloſ.* 1. *p.* 215. *t.* 18.

914. CREPIS. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus, exterior deciduus. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus.

alpina. 1. Cr. involucris ſcarioſis longitudine calicis, floribus ſolitariis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 5.

veſicaria. 2. Cr. involucris ſcarioſis longitudine calicis, floribus corymboſis, bracteis ovatis. β) *Col. ecphr.* 1. *p.* 237. *ic.*

barbata. 3. Cr. involucris calice longioribus, ſquamis ſetaceis ſparſis. *Curtis bot. magaz. t.* 30.

pygmæa. 4. Cr. foliis ovatis integris villoſis petiolatis, caule procumbente. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 14.

ſibirica. 5. Cr. foliis amplexicaulibus oblongis rugoſis inferne dentatis, caule hirto, calicibus carina ciliatis. *Gmel. fl. ſib.* 2. *t.* 10.

rhagadioloides. 6. Cr. foliis integris amplexicaulibus oblongis, calicibus interioribus toroſo-articulatis hiſpidis, foliolis cymbiformibus. *Mant. p.* 108.

pulchra. 7. Cr. foliis sagittatis denticulatis, caule paniculato, floribus pyramidatis glabris. β) *Col. ecphr.* 1. *p.* 249. *ic.*

filiformis. 22. Cr. foliis lineari-filiformibus integerrimis glabris, pappo sessili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 128.

rigens. 28. Cr. foliis oblongis duplicato-serratis setosis, caule nudo ramoso, floribus paniculatis, calicibus cylindricis glabris, pappo sessili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 127.

aspera. 8. Cr. foliis dentatis, inferioribus ovatis auriculatis, superioribus sagittatis, caule setis rigidis sparsis.

radicata. 9. Cr. foliis sinuatis dentatis ciliatis radicalibus, caulibus prostratis multifloris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 145.

tectorum. 10. Cr. foliis lanceolato-runcinatis sessilibus lævibus, inferioribus dentatis. *Flor. dan. t.* 501.

rubra. 11. Cr. foliis amplexicaulibus lyrato-runcinatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 36.

Dioscoridis. 12. Cr. foliis radicalibus runcinatis, caulinis hastatis, calicibus subtomentosis.

neglecta. 13. Cr. foliis amplexicaulibus runcinatis dentatis subpilosis, caule paniculato, calicibus inermi-subspinosis. *Mant. p.* 107.

virens. 14. Cr. foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calicibus subtomentosis.

biennis. 15. Cr. foliis runcinato-pinnatifidis scabris, basi superne dentatis, calicibus muricatis. *Bauh. hist. pl.* 2. *p.* 1025. *ic.*

bursifolia. 16. Cr. foliis pinnatifidis crenatis, scapo nudo paucifloro. *Bocc. muf.* 2. *t.* 106. & 112.

hieracioides. 17. Cr. caule simplici, foliis oblongis dentatis, superioribus amplexicaulibus, inferioribus petiolatis, petiolis dentatis, pappo sessili. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 24. *t.* 9.

succulenta. 23. Cr. foliis pinnatifidis dentatisve subcarnosis lævibus, calicibus subtomentosis, pappo sessili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 128.

fœtida. 18. Cr. foliis runcinato pinnatis hirtis, petiolis dentatis, receptaculo piloso, seminum radii pappo sessili. *Magn. flor. monsp. p.* 128. *ic. an hujus generis?*

albida. 19. Cr. foliis runcinato-dentatis subincanis, pedunculis nudis unifloris, squamis calicis margine albidis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 81. *Allion. flor. pedem.* 1. *t.* 32. *f.* 3. *an hujus generis?*

arenosa. 20. Cr. hirta, foliis elliptico-lanceolatis dentatis decurrentibus, caulinis sessilibus, pappo simplici sessili. *Scop. ann. hist. nat. 2. p. 59. an hujus generis?*

patula. 21. Cr. foliis inferioribus lyratis obtusis, caule subnudo laxe ramoso. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 227.*

915. ANDRYALA. *Recept.* villosum. *Cal.* multipartitus, subæqualis, rotundatus. *Pappus* capillaris, calicis longitudine.

integrifolia. 1. A. foliis inferioribus runcinatis, superioribus ovato-oblongis tomentosis. β) Andryala sinuata. *Sp. pl. p. 1137.*

cheiranthifolia. 2. A. foliis runcinatis, summis lanceolatis integris, villo glandulifero. *Herit. stirp. nov. 2. p. 35. t. 18.*

pinnatifida. 3. A. foliis tomentosis pinnatifidis, calicibus tomentosis pilosis, pilis rigidiusculis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 129.*

crithmifolia. 4. A. foliis pinnatis linearibus tomentosis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 129.*

ragusina. 5. A. foliis lanceolatis indivisis denticulatis acutis tomentosis, floribus solitariis. *Mill. h. angl. t. 146. f. 2.*

lanata. 6. A. foliis oblongo-ovatis subdentatis lanatis, pedunculis ramosis. *Mill. h. angl. t. 146. f. 1.*

nigricans. 7. A. foliis inferioribus lyrato-pinnatis, pedunculis ramosis, tomento superne nigricante. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 228.*

uniflora. 8. A. foliis glabris integris dentatis oblongo-acutis, scapo unifloro. *Schranck flor. bav. 2. p. 342.*

916. HYOSERIS. *Recept.* nudum. *Cal.* subæqualis. *Pappus* sessilis paleaceo-aristatus, capillari cinctus, aut ejus loco caliculus, capillarem pappum includens.

* *scapo nudo unifloro.*

fœtida. 1. H. foliis pinnatifidis, seminibus nudis. *Michel. nov. pl. gen. t. 28.*

radiata. 2. H. foliis glabris runcinatis, angulis dentatis, apice laciniatis. *Pluckn. alm. t. 37. f. 2.*

lucida. 3. H. foliis subcarnosis runcinatis angulatis dentatis. *Mant. p. 108. Jacq. h. Vind. 2. t. 150.*

virginica. 4. H. foliis lanceolatis lyratis glabris.

scabra. 5. H. foliis scabris, seminibus papposis. *Bocc. mus. 2. t. 106.*

caliculata. 6. H. foliis runcinatis, scapis subhirsutis, calice caliculato. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 229.*

caroliniana. 7. H. foliis lyratis apice truncatis hirsutis. *Walt. flor. carol. p. 194.*

major. 8. H. foliis integris ensiformibus lævibus. *Walt. flor. carol. p. 194.*

minor. 9. H. foliis ovatis dentatis, scapo bifloro. *Walt. flor. carol. p. 194.*

pygmæa. 10. H. foliis spatulatis dentatis ciliatis, pappo stipitato plumoso. *Ait. hort. Kew. 3. p. 130.*

** *caule diviso nudo.*

minima. 11. H. pedunculis incrassatis. *Flor. dan. t. 201.*

*** *caule folioso ramoso.*

Hedypnois. 12. H. fructibus ovatis glabris. *Lob. ic. p. 239.*

rhagadioloides. 13. H. fructibus ovatis pilosis. *Kniph. bot. orig. cent. 5. n. 44.*

cretica. 14. H. fructibus ovatis scabris. *Scop. del. ins. 1. t. 16.*

917. SERIOLA. *Recep.* paleaceum. *Cal.* simplex. *Pappus* capillaris stipitatus.

lævigata. 1. S. læviuscula, foliis obovatis dentatis.

æthnensis. 2. S. hispida, foliis obovatis subdentatis *Jacq. obs. bot. 4. t. 79. Calix subcaliculatus. Pappus subplumosus.*

urens. 3. S. urens, foliis dentatis, caule ramoso.

cretensis. 4. S. hirta, foliis runcinatis.

918. HYPOCHŒRIS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* ſubimbricatus. *Pappus* plumoſus ſtipitatus.

helvetica. 1. H. caule ſimplici folioſo unifloro, foliis lanceolatis dentatis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 25. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 4.

maculata. 2. H. caule ſubnudo, ramo ſolitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Flor. dant. t.* 149.

glabra. 3. H. glabra, caule ramoſo nudo, foliis dentato-ſinuatis, calicibus oblongis imbricatis. *Flor. dan. t.* 424.

radicata. 4. H. caule ramoſo nudo lævi, foliis runcinatis obtuſis ſcabris, pedunculis ſquamoſis. *Flor. dan. t.* 150.

minima. 5. H. caule ſuperius ſquamoſo, foliis ſinuato-lyratis. *Cyrill. pl. rar. Neap. faſc.* 1. *t.* 10.

919. LAPSANA. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus, ſquamis ſingulis interioribus canaliculatis.

communis. 1. L. calicibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. *Flor. dan. t.* 500.

zacintha. 2. L. calicibus fructus toruloſis depreſſis obtuſis ſeſſilibus.

ſtellata. 3. L. calicibus fructus undique patentibus, radiis ſubulatis rectis, foliis caulinis lanceolatis indiviſis.

Kœlpinia. 4. L. calicibus fructus undique patentibus, radiis ſubulatis incurvis echinatis, foliis caulinis lanceolatis indiviſis. *Suppl. p.* 348. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* L l. *f.* 2.

Rhagadiolus. 5. L. calicibus fructus undique patentibus, radiis ſubulatis, foliis lyratis. *Kniph. bot. orig. cent.* 4. *n.* 36. *an mera varietas?*

920. CATANANCHE. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus. *Pappus* ariſtatus, caliculo 5 ſeto.

cærulea. 1. C. ſquamis calicis inferioribus ovatis.

lutea. 2. C. ſquamis calicis inferioribus lanceolatis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 7.

graeca. 3. C. foliis incisis. *Tournef. it. 1. p. 223. ic. an luteæ varietas?*

921. CICHORIUM. *Recept.* subpaleaceum. *Cal.* caliculatus. *Pappus* subquinquedentatus, obsolete pilosus.

Intybus. 1. C. floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Knorr del. hort. 1. t. W. 9.*

Endivia. 2. C. floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Regn. bot. t. 238.* β) Cichorium pumilum. *Jacq. obs. bot. 4. t. 80.*

spinosum. 3. C. caule dichotomo spinoso, floribus axillaribus sessilibus. *Bauh. prodr. theatr. bot. p. 62. ic.*

922. SCOLYMUS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus spinosus. *Pappus* o.

maculatus. 1. Sc. floribus solitariis. *Kniph. bot. orig. cent. 9. n. 85.*

hispanicus. 2. Sc. floribus congestis. *Mill. h. angl. t. 229.*

angiospermus. 3. Sc. paleis receptaculi in membranacea seminum conceptacula abeuntibus.

923. ARCTIUM. *Cal.* globosus, squamis apice hamis inflexis.

Lappa. 1. A foliis cordatis inermibus petiolatis. *Flor. dan. t. 642.*

Personata. 2. A. foliis decurrentibus ciliato-spinosis, radicalibus pinnatis, caulinis oblongo-ovatis. *Jacq. flor. austr. 4. t. 348. an cardui potius species?*

Carduelis. 3. A foliis pinnatifidis aculeatis. *Mant. p. 108. Scop. flor. carn. ed. 2. t. 53.*

924. SERRATULA. *Cal.* subcylindricus, imbricatus, muticus.

tinctoria. 1. S. foliis lyrato-pinnatifidis, pinna terminali maxima, flosculis conformibus. *Flor. dan. t. 281.*

coronata. 2. S. foliis lyrato-pinnatifidis, pinna terminali maxima, flosculis radii femineis longioribus. *Gmel. flor. jap. sib.* 2. *t.* 20.

japonica. 3. S. foliis lyrato-pinnatifidis scabris, squamis calicis apice dilatatis membranaceis. *Thunb. flor. jap. p.* 305.

centauroides. 4. S. foliis pinnatifidis obliquis acutis glabris inermibus, squamis calicis mucronatis, interioribus scariosis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 17.

spinosa. 5. S. foliis glabris,, caule dichotomo fruticoso spinoso. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 217.

alpina. 6. S. foliis indivisis, calicibus subhirsutis ovatis. *Fl. dan. t.* 37.

caspia. 7. S. foliis oblongis subacutis sessilibus integerrimis carnosis. *Pallas it.* 2. *p.* 743 *t. Z.*

glauca. 8. S. foliis ovato-oblongis acuminatis serratis, floribus corymbosis, calicibus subrotundis. *Dill. h. Elth. t.* 262. *f.* 341.

noveboracensis. 9. S. foliis lanceolato-oblongis serratis pendulis. *Dill. h. Elth. t.* 263. *f.* 342. *an cum glauca distincti generis?*

præalta. 10. S. foliis lanceolato-oblongis serratis patentibus subtus hirsutis. *Mill. h. angl. t.* 234.

amara. 11. S. foliis lanceolatis, squamis calicis apice scariosis obtusis patulis coloratis, floribus terminalibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 29.

scariosa. 12. S. foliis lanceolatis integerrimis, calicibus squarrosis pedunculatis obtusis lateralibus. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 4.

multiflora. 13. S. foliis lanceolatis subtus villosis subdecurrentibus integerrimis, caule corymboso, calicibus cylindricis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 28.

ciliata. 19. S. foliis lanceolatis integris sessilibus spinuloso-ciliatis subtus tomentosis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 67.

salicifolia. 14. S. foliis lineari-lanceolatis alternis subtus incanis sessilibus integerrimis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 27.

pilosa. 15. S. foliis linearibus pilosis, floribus axillaribus longe pedunculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 138.

squarrosa. 16. S. foliis linearibus, calicibus squarrosis subsessilibus acuminatis lateralibus. *Dill. h. Elth. t.* 71. *f.* 82.

spicata. 17. S. foliis linearibus basi ciliatis, floribus sessilibus lateralibus spicatis, caule simplici. *Dill. h. Elth. t.* 72. *f.* 83. *an cum squarrosa distincti generis?*

arvensis. 18. S. foliis dentatis spinosis. *Flor. dan. t.* 644. *Regnault bot. t.* 240.

925. CARDUUS. *Cal.* ventricosus, imbricatus, squamis spinosis. *Recep.* pilosum.

* *foliis decurrentibus.*

leucographus. 1. C. foliis dentatis spinosis, pedunculis nudis longissimis unifloris, calicibus spinosis inclinatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 23.

palustris. 2. C. foliis dentatis margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 32. *f.* 13.

peregrinus. 3. C. foliis sinuatis spinosis subtus tomentosis, pedunculis nudis multifloris tomentosis, calicibus spinosis deciduis. *Retz. obs. bot.* 1. *p.* 27.

crispus. 4. C. foliis sinuatis margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus, squamis calicis inermibus subaristatis patulis. *Mant. p.* 461. *Flor. dan. t.* 621.

acanthoides. 5. C. foliis sinuatis margine spinosis, calicibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 249.

polyanthemus. 6. C. foliis sinuatis ciliatis subtus nudis, floribus pedunculatis congestis. *Mant. p.* 109. *Triumf. obs. p.* 103. *ic.*

pycnocephalus. 7. C. foliis pinnatifido-sinuatis pubescentibus spinosis, pedunculis nudis tomentosis, calicibus deciduis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 44.

lanceolatus. 8. C. foliis pinnatifidis hispidis, laciniis divaricatis, calicibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Tabern. Kræuterb. p.* 699. *ic.*

arabicus. 9. C. foliis pinnatifidis lanuginose villosis, laciniis divaricatis, calicibus oblongis spinulosis sessilibus aggregatis. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 56. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 95.

cyanoides. 10. C. foliis pinnatifidis linearibus integerrimis inermibus petiolatis subtus tomentosis. α) *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 15. β) *Kmel. flor. sib.* 2. *t.* 16. γ) *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 24.

spinosissimus. 42. C. foliis pinnatifidis amplexicaulibus angulato-spinosis subtus tomentosis, floribus pedunculatis aggregatis. *Walt. flor. carol. p.* 194.

carolinianus. 43. C. foliis hastato-pinnatifidis amplexicaulibus spinoso-ciliatis subtus tomentosis, calicibus aphyllis. *Walt. flor. carol. p.* 195.

11. C.

australis. 11. C. foliis runcinatis spinosis, calicibus subsessilibus terminalibus. *Suppl. p.* 348.

argentatus. 12. C. foliis runcinatis spinosis, pedunculis subtomentosis unifloris, calicibus ovatis mucronatis inermibus. *Mant. p.* 280. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 192.

pectinatus. 13. C. foliis lanceolatis pinnatifido-pectinatis, pedunculis longissimis, floribus defloratis cernuis. *Mant. p.* 279.

canus. 14. C. foliis lanceolatis eroso-dentatis ciliato-aculeatis utrinque arachnoideo-subvillosis. *Mant. p.* 108. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 42. 43.

defloratus. 15. C. foliis lanceolatis serratis subspinoso-ciliatis nudis, pedunculis longissimis lanuginosis unifloris. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 89.

monspessulanus. 16. C. foliis lanceolatis subrepandis glabris inæqualiter ciliatis, pedunculis alternis, calicibus inermibus.

carlinæfolius. 46. C. foliis decurrentibus spinosis glabris, pedunculis erectis unifloris inermibus. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 67.

carlinoides. 47. C. foliis decurrentibus pinnatifidis tomentosis, laciniis palmatis spinosis, floribus glomeratis. *Gouan. illustr. p.* 62. *t.* 23.

paniculatus. 48. C. foliis semidecurrentibus dentato-sinuatis spinosis glabris, floribus paniculatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 68.

dissectus. 17. C. foliis lanceolatis, denticulis inermibus, calicibus spinosis. *Lob. ic. p.* 583.

pannonicus. 18. C. foliis semidecurrentibus nudis indivisis ciliatis, flore subsolitario. *Suppl. p.* 348. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 127.

nutans. 19. C. foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis, squamis calicis superne patentibus. *Flor. dan. t.* 675.

chius. 20. C. foliis amplexicaulibus semipinnatifidis ciliato-spinulosis, inferioribus semidecurrentibus, caule inermi, pedunculis unifloris. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 5.

tuberosus. 21. C. foliis subdecurrentibus petiolatis subpinnatifidis spinosis, caule inermi, floribus solitariis. *Mant p.* 461. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 29. *f.* 27. 28.

parviflorus. 22. C. foliis basi adnatis lanceolatis nudis erosis ciliato-spinulosis inermibus. *Mant. p.* 279.

** *foliis sessilibus.*

paniculatus. 44. C. foliis semidecurrentibus oblongo-lanceolatis inæqualiter ciliatis glabris, inferioribus lyratis undulatis, floribus paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 143.

rigens. 45. C. foliis oblongo-lanceolatis glabris margine spinosis pinnatifidis, laciniis obliquis lobatis, calicibus oblongis bracteatis. *la Chenal. act. helv.* 4. *p.* 294. *t.* 16.

linearis. 23. C. foliis linearibus ciliato spinosis glabris, floribus terminalibus solitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 305.

Casebonæ. 24. C. foliis lanceolatis integerrimis, margine spinis ternatis. *Lob. ic. p.* 486. *f.* 1.

flavescens. 25. C. foliis lanceolatis integris inermibus dentatis glabris, floribus aphyllis inermi-spinosis.

stellatus. 26. C. foliis lanceolatis integris inermibus subtus tomentosis, spinis ramosis axillaribus, floribus sessilibus lateralibus. *Triumf. obs. p.* 96. *ic.*

virginianus. 27. C. foliis lanceolatis spinulosis subtus tomentosis, caule inermi folioso unifloro. *Jacq. obs. bot.* 4. *t.* 99.

rivularis. 28. C. foliis inferne pinnatifidis, laciniis oblongis, superne integris serratisque inermi-spinulosis, caule inermi, floribus capitatis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 91.

mollis. 29. C. foliis pinnatifidis linearibus subtus tomentosis, caule inermi unifloro. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 18.

altissimus. 30. C. foliis pinnatifidis sinuatis serratis inermibus, caule ramosissimo, calicibus villosis subserratis. *Dill. h. Elth. t.* 69. *f.* 80.

eriophorus. 31. C. foliis bifariam pinnatifidis, laciniis alternis erectis, calicibus globosis villosis. *Mill. h. angl. t.* 293. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 171.

Boujarti. 32. C. foliis bifariam pinnatifidis subtus tomentosis spina terminatis, calicibus ovatis erectis terminalibus. *Dill. & Miterpach. it.* 1. *p.* 143. *t.* 13.

serratuloides. 33. C. foliis subamplexicaulibus lanceolatis integris, serraturis spinoso-setaceis, pedunculis unifloris. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 36. *f.* 2.

ciliatus. 34. C. foliis semiamplexicaulibus pinnatifidis laciniatis spinosis subtus tomentosis, calicis squamis ciliatis basi reflexis. *Murray comm. Goett.* 1784. *p.* 35. *t.* 5.

marianus. 35. C. foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calicibus aphylis, spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Knorr. del. hort.* 1. *t.* M. 3.

syriacus. 36. C. foliis amplexicaulibus angulato-spinosis, floribus solitariis subsessilibus obvallatis, foliolis subquinis. *Camer. hort. t.* 10.

hetero-phyllus. 37. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque, caule subunifloro, calice inermi. *Flor. dan. t.* 109. *an cum helenioide in unam speciem conjungendus?*

gnapha-loides. 46. C. foliis subverticillatis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. *Cyrill. pl. rar. Neap. fasc.* 1. *t.* 9.

helenioi-des. 38. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, spinulis inæqualibus ciliatis, caule inermi. *Hall. hist. stirp. helv. t.* 7. *Mill. h. angl. t.* 94.

tataricus. 39. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis, serraturis spinoso-setaceis, floribus triphyllis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 90.

scaber. 40. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentato-spinosis supra scabris subtus tomentoso-albis, calice inermi. *Poir. voy. en Barbar.* 2. *p.* 231.

acaulis. 41. C. acaulis, calice glabro. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 18.

926. CNICUS. *Cal.* ovatus, imbricatus squamis ramoso-spinosis, (sæpe) obvallatus bracteis. *Corollulæ* æquales.

spinosissi-mus. 1. Cn. foliis amplexicaulibus sinuato-pinnatis spinosis, caule simplici, floribus sessilibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 25.

oleraceus. 2. Cn. foliis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, bracteis concavis integris subcoloratis. *Flor. dan. t.* 860.

Erisitha-les. 3. Cn. foliis amplexicaulibus pinnatifidis aristato-serratis, pedunculis cernuis, calicibus glutinosis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 310.

dubius. 4. Cn. foliis pinnatifidis petiolatis, laciniis trilobis margine spinosis, calice cylindrico glabro, caule villosissimo folioso. *Willden. prodr. fl. berol. n.* 801.

uniflorus. 5. Cn. foliis pinnatifidis, calice scarroso villoso. *Mant. p.* 572. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 38.

centau-roides. 6. Cn. foliis pinnatifidis, calicibus scarrosis, squamis acuminatis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 25. *f.* 2.

ferox. 7. Cn. foliis decurrentibus ligulatis dentato-ſpinoſis, caule ramoſo erecto. *Mant. p.* 109.

Acarna. 8. Cn. foliis decurrentibus lanceolatis indiviſis, calicibus pinnato-ſpinoſis.

pygmæus. 9. Cn. foliis ſeſſilibus ſublinearibus confertiſſimis, calice inermi. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 440.

cernuus. 10. Cn. foliis cordatis, petiolis criſpis ſpinoſis amplexicaulibus, floribus cernuis, calicibus ſcarioſis. *Gmel. flor. ſibri.* 2. *t.* 19. *Mill. h. angl. t.* 248.

927. ONOPORDON. *Recept.* favoſum. *Cal.* ventricoſus, ſquamæ mucronatæ.

Acanthium. 1. O. calicibus ſquarroſis, ſquamis patentibus, foliis ovato-oblongis ſinuatis. *Læſ. flor. pruſſ. t.* 82.

illyricum. 2. O. calicibus ſquarroſis, ſquamis inferioribus uncinatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 148.

græcum. 3. O. calicibus ſquarroſis arachnoideo-tomentoſis, foliis ſpinoſis ſubulato-lanceolatis ſinuatis tomentoſis. *Suppl. p.* 349.

deltoides. 4. O. calicibus ſquarroſis arachnoideo-tomentoſis, foliis petiolatis ovatis angulatis ſubtus tomentoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 146.

arabicum. 5. O. calicibus imbricatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 149.

acaulon. 6. O. acaule.

928. CYNARA. *Cal.* ventricoſus, imbricatus ſquamis carnoſis emarginatis cum acumine.

humilis. 1. C. foliis ſpinoſis pinnatifidis ſubtus tomentoſis, calicis ſquamis ſubulatis. *Pluckn. alm. t.* 81. *f.* 2.

horrida. 2. C. foliis pinnatifidis ſubtus tomentoſis ſpinoſis, ſpinis baſeos foliorum pinnarumque baſi connatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 148.

Cardunculus. 3. C. foliis ſpinoſis pinnatifidis, calicis ſquamis ovatis.

Scolymus. 4. C. foliis ſubſpinoſis pinnatis indiviſiſque, calicis ſquamis ovatis. *Blackw. herb. t.* 458.

integrifolia. 5. C. foliis lanceolatis denticulatis, squamis calicinis lanceolato-acuminatis. *Vahl simb. bot.* 1. *p.* 68.

acaulis. 6. C. acaulis foliis pinnatis inermibus supra glabris. *Till. h. pis. t.* 20.

929. CARLINA. *Cal.* radiatus, squamis marginalibus longis, coloratis.

acaulis. 1. C. caule unifloro flore breviore. *Knorr. del. hort.* 2. *t.* C. 1.

involucrata. 2. C. caule unifloro flore longiore, calice aureo foliis spinosis obvallato. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 234.

lanata. 3. C. caule bifido, calicibus sanguineis terminalibus, primo axillari sessili. *Col. ecphr.* 1. *t.* 27. *f.* 2.

pyrenaica. 4. C. caule multifloro, foliis decurrentibus runcinatis.

vulgaris. 5. C. caule multifloro corymboso, floribus terminalibus, calicum radio albo.

corymbosa. 6. C. caule multifloro subdiviso, floribus sessilibus, calicum radio flavo. *Col. ecphr.* 1. *t.* 27. *f.* 1.

racemosa. 7. C. floribus sessilibus lateralibus paucissimis.

atractyloides. 8. C. caule ramoso, calicibus spinis ciliatis.

Xeranthemoides. 9. C. fructicosa ramosa tomentosa, foliis lineari-subulatis, serraturis spinascentibus, panicula terminali, radio flavo. *Suppl. p.* 349.

930. ATRACTYLIS. *Cor.* radiatæ, corollulis radii 5dentatis.

gummifera. 1. A. flore acauli. *Col. ecphr.* 1. *t.* 12.

humilis. 2. A. foliis dentato-sinuatis, involucro patente, caule herbaceo. β) *Barr. pl. rar. ic. t.* 592.

cancellata. 3. A. involucris cancellatis ventricosis linearibus dentatis, calicibus ovatis, floribus flosculosis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 39. *f.* 16.

Lancea. 4. A. involucris pinnatis, foliis lanceolatis ciliatis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 306.

ovata. 5. A. involucris pinnatis, foliis ovatis ciliatis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 306.

oppositifolia. 6. A. foliis oppositis. *Mant. p.* 477. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 571. Gorteria fruticosa. *Pluckn. alm. t.* 273. *f.* 5.

purpurea. 7. A. foliis hastatis runcinatis. *Suppl. p.* 349.

mexicana. 8. A foliis oblongis integerrimis. *Suppl. p.* 349.

1419. BARNADESIA. *Cor.* radiata. *Cal.* nudus, imbricatus, pungens. *Pappus* radii plumosus, disci setosus, retrofractus.

spinosa. 1. BARNADESIA. *Suppl. p.* 348.

STOKESIA. *Cor.* radiata. *Cal.* foliaceus, subimbricatus. *Recept.* nudum. *Pappus* deciduus, filamentosus.

cyanea. 1. STOKESIA. *Herit. sert. angl. p.* 28. *t.* 38.

931. CARTHAMUS. *Cal.* ovatus, imbricatus, squamis apice subovato-foliaceis.

tinctorius. 1. C. foliis ovatis integris serrato-aculeatis. *Zorn. pl. off. ic. t.* 140.

dentatus. 11. C. foliis lanceolato-ovatis spinoso-dentatis, squamis calicinis apice dilatatis serrato-ciliatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 69. *t.* 17.

carolinianus. 12. C. foliis semiamplexicaulibus integris serrato-aculeatis, floribus solitariis. *Walt. flor. carol. p.* 194.

cæruleus. 2. C. foliis lanceolatis spinoso-dentatis, caule subunifloro.

salicifolius. 3. C. fruticosus, foliis lanceolatis integris subtus tomentosis apice pungentibus, petiolis spinosis, ramis unifloris. *Suppl. p.* 350.

arborescens. 4. C. foliis ensiformibus sinuato-dentatis. *Mant. p.* 462.

mitissimus. 5. C. foliis inermibus, radicalibus dentatis, caulinis pinnatis.

Carduncellus. 6. C. foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine plantæ. *Lob. ic.* 2. *p.* 20.

tingitanus. 7. C. foliis radicalibus pinnatis, caulinis pinnatifidis, caule unifloro. *Morif. hift. pl.* 3. *t.* 34. *f.* 19.

lanatus. 8. C. caule pilofo fuperne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, fummis amplexicaulibus dentatis. *Blackw. herb. t.* 468.

creticus. 9. C. caule læviufculo, calicibus fublanatis, flofculis fubnovenis, foliis inferioribus lyratis.

corymbofus. 10. C. floribus corymbofis numerofis. *Morif. hift. pl.* 3. *t.* 33. *f.* 17.

1287. SPILANTHES. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* ariftis 2, altera minore. *Cal.* fubhemifphæricus, fquamis duplici ferie. *Cor.* uniformis, tubulofa.

urens. 1. Sp. foliis lanceolatis integerrimis, caule proftrato. *Jacq. ftirp. amer. pict. t.* 194.

Pfeudo-acmella. 2. Sp. foliis lanceolatis ferratis, caule erecto. *Mant. p.* 475. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 568. Verbefina Pfeudoacmella. *Seb. muf.* 1. *t.* 10. 11.

uliginofa. 3. Sp. foliis ovato-lanceolatis crenatis, caule erecto dichotomo, pedunculis ternis, floribus radiatis. *Swarts nov. pl. gen. & fp. p.* 110.

Acmella. 4. Sp. foliis ovatis ferratis, caule erecto, floribus radiatis. *Mant. p.* 475. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 568. Verbefina Acmella. *Seb. muf.* 1. *t.* 9. 10.

falivaria. 5. Sp. foliis ovatis obfolete ferratis, caule obliquo flexuofo paniculato. *Murray comm. Goett.* 1783. *t.* 1. *Herit. ftirp. nov.* 1. *t.* 4. *β*) Spilanthus indicans. *Jacq. coll.* 3. *p.* 229.

infipida. 6. Sp. foliis obovatis fubdentatis feffilibus. *Jacq. ftirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 63.

atriplicifolia. 7. Sp. foliis alternis deltoidibus dentatis petiolatis ftipulatis, caule paniculato. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 735. Bidens atriplicifolia.

oleracea. 8. Sp. foliis fubcordatis ferrulatis petiolatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 135.

932. BIDENS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtis erectis, ſcabris. *Cal.* imbricatus. *Cor.* rarius floſculo uno alterove radiante inſtructa.

* *foliis ſimplicibus.*

ſcandens. 1. B. foliis ovatis acuminatis ſerratis oppoſitis, caule ſcandente fruticoſo, floribus oppoſitis paniculatis ovatis.

nodiflora. 2. B. foliis oblongis integerrimis unidentatis, caule dichotomo, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Dill. h. Elth. t.* 44. *f.* 52.

verticillata. 3. B. foliis oblongis integris, inferne alternis ſuperne oppoſitis, floribus verticillatis.

hirſuta. 4. B. foliis ovato-lanceolatis integris tomentoſo-hirſutis oppoſitis, caule ſcandente fruticoſo, pedunculis oppoſitis divergentibus multifloris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 110.

minima. 5. B. foliis lanceolatis integerrimis, flore recto ſolitario baſi involucrato bracteis duabus, radice repente. *Flor. dant. t.* 312.

cernua. 6. B. foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, ſeminibus erectis. *Flor. dan. t.* 841.

tenella. 7. B. foliis linearibus, pedunculis capillaribus, calicibus ſubtetraphyllis, ſeminibus erectis quinis.

nivea. 8. B. foliis ſimplicibus cordato-ovatis acuminatis ſerratis petiolatis, floribus hemiſphæricis pedunculis elongatis, ramis trichotomis. *Dill. h. Elth. t.* 47. *f.* 55. *n.* 3. *β*) *Dill. h. Elth. t.* 47. *f.* 55. *γ*) *Dill. h. Elth. t.* 46. *f* 54.

tripartita. 9. B. foliis trifidis, calicibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis. *Knorr. del. hort.* 2. *t.* B. 1. *f.* 2. *β*) Bidens pumila, caule ſimpliciſſimo unifloro, bracteis pluribus, foliis ſerratis, caule ſimplici. *Roth. fl. germ.* 1. *p.* 350.

** *foliis compoſitis.*

bullata. 10. B. foliis ovatis ſerratis, inferioribus oppoſitis, ſuperioribus ternatis, intermedio majore. *Arduin. ſpec.* 2. *t.* 18.

frondoſa. 11. B. foliis pinnatis ſerratis lineatis glabris, ſeminibus erectis, calicibus frondoſis, caule lævi. *Morriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 21.

piloſa. 12. B. foliis pinnatis ſubpiloſis, caule geniculis barbatis, calicibus involucro ſimplici, ſeminibus divergentibus. *Dill. h.*

Elth. t. 43. *f.* 51. *β*) Agrimonia molucca. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 15. *f.* 2.

bipinnata. 13. B. foliis bipinnatis incisis, calicibus involucratis, corollis semiradiatis, seminibus divergentibus. *Herm. parad. lugdb. p.* 123. *ic.*

933. CACALIA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris longissimus. *Cal.* cylindricus, oblongus, basi tantum subcaliculatus.

* *frutescentes.*

papillaris. 1. C. caule fruticoso obvallato spinis petiolaribus truncatis. *Dill. h. Elth. t.* 55. *f.* 63.

Klenia. 2. C. caule fruticoso composito, foliis lanceolatis planis, petiolorum cicatricibus obsoletis. *Dill. h. Elth. t.* 54. *f.* 2.

odora. 3. C. caule fruticoso a cicatricibus foliorum albo striato ad apicem folioso, foliis lanceolatis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 146.

pendula. 4. C. caulibus fruticosis descendentibus aphyllis squamatis, pedunculis terminalibus erectis. *Forsk fl. æg. arab. p.* 145.

semperviva. 5. C. caule fruticoso subdichotomo, foliis carnosis sessilibus lanceolatis confertis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 146.

laciniata. 6. C. caule fruticoso, foliis carnosis pinnatifide laciniatis, caule decumbente articulato. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 77.

repens. 7. C. caule fruticoso, foliis carnosis depressis. *Mant. p.* 110.

carnosa. 32. C. foliis teretiusculis carnosis incurvis, pendunculis terminalibus unifloris nudis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 156.

Ficoides. 8. C. caule fruticoso, foliis carnosis compressis. *Commel. rar. t.* 40.

cuneifolia. 9. C. caule fruticoso, foliis carnosis cuneiformibus. *Mant. p.* 110.

Anteuphorbium. 10. C. caule fruticoso, foliis ovato-oblongis planis, petiolis basi linea triplici deductis. *Dill. h. Elth. t.* 55. *f.* 2. 3.

laurifolia. 11. C. fruticosa glabra, foliis petiolatis ovatis triplinerviis, obtusis integerrimis glaberrimis, thyrso terminali, calice tetraphyllo glabro. *Suppl. p.* 351.

appendiculata. 12. C. fruticosa, tomentosa, foliis cordatis ovatis acutis angulatis subtus tomentosis, petiolis appendiculate foliosis. *Suppl. p.* 352. *an potius Cinerariæ species?*

tomentosa. 13. C. fruticosa tomentosa, foliis lanceolatis dentatis sessilibus subtus tomentosis. *Suppl. p.* 353.

asclepiadea. 14. C. fruticosa tomentosà, foliis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis supra glaberrimis subtus tomentosis margine revolutis, paniculis terminalibus. *Suppl. p.* 352.

cordifolia. 15. C. frutescens hirsuta, foliis petiolatis cordato-ovatis nervosis acutis scabris, calice tetraphyllo quadrifloro pubescente. *Suppl. p.* 351.

suffruticosa. 16. C. caule suffruticoso ramoso, foliis linearibus planis sparsis. *Mant. p.* 109. *Ard. spec.* 2. *t.* 19.

** *herbaceæ.*

Porophyllum. 17. C. caule indiviso, foliis ellipticis subcrenatis. *Pluckn. alm. t.* 161. *f.* 1. *cum ruderali habitu & calice subturbinatis a congeneribus distincta.*

radicans. 18. C. caule repente radicante, foliis tereti-ovatis carnosis. *Suppl. p.* 354.

villosa. 19. C. caule erecto, foliis lyratis, infimis longe petiolatis, subsequis dentatis amplexicaulibus, summis sublanceolatis inciso-serratis, floribus erectis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 347. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 75.

sonchifolia. 20. C. foliis lyratis amplexicaulibus dentatis. *Mant. p.* 463. *Murray comm. Goett.* 1772. *t.* 7.

hastata. 21. C. foliis trilobis acuminatis serratis, floribus nutantibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 66.

scandens. 33. C. caule scandente, foliis sagittatis dentatis, petiolis simplicibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 157.

suaveolens. 22. C. erecta, foliis hastato-sagittatis denticulatis, petiolis superne dilatatis.

incana. 23. C. foliis lanceolatis dentatis.

saracenica. 24. C. foliis lanceolatis serratis decurrentibus.

triplicifolia. 25. C. foliis subcordatis dentato-sinuatis, calicibus quinquefloris. *Pluckn. alm. t.* 101. *f.* 2.

echinata. 26. C. foliis reniformi-cordatis angulato-dentatis subtus tomentosis, calicis foliolis tuberculatis. *Suppl. p.* 353. *an potius cinerariæ species?*

alpina. 27. C. foliis reniformi-cordatis acutis denticulatis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 234.

albifrons. 28. C. foliis cordatis biserratis acutis subtus tomentosis, stipulis oblongis rotundatis. *Suppl. p.* 353. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 235.

ovata. 29. C. foliis ovatis nervosis utrinque viridibus, calicibus subquadrifloris. *Walt. flor. carol. p.* 196.

bipinnata. 30. C. foliis bipinnatis linearibus. *Suppl. p.* 353.

acaulis. 31. C. acaulis, foliis semiteretibus, scapis unifloris. *Supp. p.* 353.

934. ETHULIA. *Recept.* nudum. *Pappus.* o.

conyzoides. 1. E. floribus paniculatis. *Linn. fil. dec.* 1. *t.* 1.

Sparganophora. 2. E. floribus sessilibus lateralibus.

struchium. 3. E. floribus sessilibus axillaribus, omnibus trifidis. *Brown, jam. p.* 312. *t.* 34. *f.* 2.

bidentis. 4. E. racemulis secundis, calicibus subquinquefloris, foliis lanceolotis oppositis. *Mant. p.* 110.

divaricata. 5. E. foliis linearibus dentatis decurrentibus, pedunculis oppositatifoliis unifloris, caule divaricato. *Mant. p.* 110. & 572. *Burm. ind. t.* 58. *f.* 1. *an distincti generis?*

tomentosa. 6. E. suffruticosa, foliis linearibus integerrimis tomentosis. *Mant. p.* 110.

uniflora. 7. E. caule unifloro, foliis linearibus verticillatis. *Walt. flor. carol. p.* 195.

935. EUPATORIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus *Cal.* imbricatus, oblongus. *Stilus* semibifidus, longus.

* *calicibus trifloris.*

parviflorum. 1. Eu. fruticosum, foliis ovato-lanceolatis serratis glabris, corymbis patentibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 111.

triflorum. 2. Eu. fruticosum, foliis subcordatis subtus incanis, capitulis sessilibus racemosis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 795. *t.* 314.

** *calicibus quadrifloris.*

Dalea. 3. Eu. fruticosum, foliis lanceolatis venosis obsolete serratis glabris. *Brown. jam. t.* 34. *f.* 1.

scandens. 4. Eu. caule volubili, foliis cordatis dentatis acutis. *Pluckn. alm. t.* 163. *f.* 3.

micranthon. 5. Eu. caule volubili, foliis cordatis integerrimis, calicibus tetrapyllis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 797. *t.* 315.

Houstonis. 6. Eu. caule volubili, foliis ovatis integerrimis.

hyssopifolium. 7. Eu. foliis lanceolato-linearibus trinerviis subintegerrimis. *Dill. h. Elth. t.* 114. *f.* 150.

*** *calicibus quinquefloris.*

linearifolium. 46. Eu. foliis linearibus integris subverticillatis, calicibus subquinquefloris. *Walt. flor. carol. p.* 199.

rotundifolium. 8. Eu. foliis sessilibus distinctis subrotundo-cordatis. *Pluckn. alm. t.* 88. *f.* 4.

hastatum. 9. Eu. foliis cordato - hastatis subdentatis nudis, caule volubili, floribus spicatis. *Brown. jam. t.* 34. *f.* 3.

zeilanicum. 10. Eu. foliis ovato-hastatis petiolatis dentatis. *Burm. zeyl. t.* 21.

Murrubium. 40. Eu. foliis ovato-deltoidibus obtuse serratis pubescentibus sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 199.

fusco-rubrum. 41. Eu. foliis ovatis utrinque acuminatis petiolatis senis, caule maculato. *Walt. flor. carol. p.* 199.

sinense. 11. Eu. foliis ovatis petiolatis serratis.

pilosum. 42. Eu. foliis lanceolato - ovatis basi obtusis serratis sessilibus, calicibus pilosis. *Walt. flor. carol. p.* 199.

sessilifolium. 12. Eu. foliis sessilibus amplexicaulibus distinctis lanceolatis.

chilense. 13. Eu. foliis oppositis amplexicaulibus lanceolatis denticulatis. *Molin. hist. nat. chil. p.* 188.

album. 14. Eu. foliis lanceolatis serratis, calicis foliolis lanceolatis apice scariosis coloratis. *Mant. p.* 111. *Banks ic. Kæmpf. t.* 26.

altissimum. 15. Eu. foliis lanceolatis nervosis, inferioribus apice subserratis, caule suffruticoso. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 164.

compositifolium. 43. Eu. foliis compositis sublanceolatis. *Walt. flor. carol.* p. 199.

fœniculoides. 44. Eu. foliis compositis linearibus. *Walt. flor. carol. p.* 199.

trifoliatum. 16. Eu. foliis ternis.

japonicum. 17. Eu. foliis indivisis trilobisque serratis, caule scabro. *Thunb. flor. jap. p.* 308.

syriacum. 18. Eu. foliis oppositis subsessilibus ternatis. *Jacq. misc.* 2. *p.* 349. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 35.

cannabinum. 19. Eu. foliis digitatis. *Flor. dan. t.* 745.

**** *calicibus septemfloris.*

cinereum. 20. Eu. foliis oppositis lanceolatis tomentosis. *Suppl. p.* 354.

***** *calicibus octofloris.*

maculatum. 21. Eu. foliis quinis subtomentosis lanceolatis æqualiter serratis venosis petiolatis. *Herm. par. bot. p.* 158. *ic.*

purpureum. 22. Eu. foliis quaternis scabris lanceolato-ovatis inæqualiter serratis petiolatis rugosis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 13. *f.* 4.

scabrum. 23. Eu. villosum, foliis oppositis petiolatis ovatis integriusculis rugosis supra scabris. *Suppl. p.* 354.

rigidum. 24. Eu. foliis petiolatis ovatis acutis serrato-dentatis rigidis subtus scabris, caule subherbaceo. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 111.

nervosum. 25. Eu. foliis elliptico-lanceolatis attenuatis dentatis triplinerviis utrinque glabris. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 111.

****** *calicibus quindecim pluribusve flosculis.*

villosum. 26. Eu. foliis oppositis decussatis ovatis acutis subserratis subtus villoso-tomentosis, caule fruticoso. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 257. *t.* 161. *f.* 2. *Flosculi* 8.-15.

perfoliatum. 27. Eu. foliis connato-perfoliatis tomentosis. *Plucke. alm. t.* 87. *f.* 6.

microphyllum. 28. Eu. foliis triangulari-ovatis novemcrenatis subtus tomentosis fusco-venosis, panicula conglomerata terminali, pedunculo elongato. *Suppl. p.* 355.

aromaticum. 29. Eu. foliis ovatis obtuse serratis petiolatis trinerviis, calicibus simplicibus. *Pluckn. alm. t.* 88. *f.* 3.

Ageratoides. 30. Eu. foliis ovatis serratis petiolatis, caule glabro. *Suppl. p.* 355. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 537. Ageratum altissimum. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 11.

cælestinum. 31. Eu. foliis cordato-ovatis obtuse serratis petiolatis. *Dill. h. Elth. t.* 114. *f.* 139.

incarnatum. 45. Eu. foliis cordato-hastatis trinerviis obtuse serratis lævibus venosis petiolatis. *Walt. flor. carol. p.* 200.

mollé. 32. Eu. foliis cordatis acutis subserratis petiolatis pubescentibus, caule herbaceo tomentoso. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 111.

montanum. 33. Eu. foliis cordatis acutis denticulatis petiolatis scabris subtus hirsutis, corymbis patentibus, caule fruticoso. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 111.

urticæfolium. 34. Eu. hispidum, foliis cordatis petiolatis inciso-serratis, panicula terminali, calicibus subulatis subpungentibus. *Suppl. p.* 354.

cordifolium. 35. Eu. foliis cordatis serratis subtus tomentoso-hirsutis, petiolis brevissimis, corymbis subsessilibus, calicibus squarrosis, caule fruticoso. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 111.

odoratum. 36. Eu. foliis deltoidibus serratis pubescentibus. *Pluckn. phyt.* 177. *f.* 3.

ivæfolium. 37. Eu. foliis lineari-lanceolatis trinerviis serratis, calicibus squarrosis.

stœchadifolium. 38. Eu. tomentosum, foliis petiolatis linearibus crenatis tomentosis subtus canis, panicula terminali. *Suppl. p.* 355.

myosotifolium. 39. Eu. subvillosum, foliis lanceolatis subintegerrimis, pedunculis terminalibus axillaribusque ramosis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 341. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 45.

936. AGERATUM. *Recept.* nudum. *Pappus* 5aristatus. *Cal.* oblongus, subæqualis. *Corollulæ* 4fidæ.

conyzoides. 1. A. foliis ovatis, caule piloso. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 2.

ciliare. 2. A. foliis ovatis crenatis obtusis, caule glabro. *Pluckn. alm. t.* 81. *f.* 4.

gujanense. 3. A. foliis cordatis serratis petiolatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 800.

PACURINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* simplex, pilosus. *Cal.* ovatus, imbricatus. *Corollul.* 5fidæ.

edulis. 1. PACURINA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 800. *t.* 316.

937. PTERONIA. *Recept.* paleis multipartitis. *Pappus* subplumosus. *Cal.* imbricatus.

camphorata. 1. Pt. foliis sparsis ciliatis, calicis foliolis serrulatis. *Mant. p.* 464. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 56. *n.* 2.

stricta. 2. Pt. foliis sparsis basi subciliatis, calicis foliolis integerrimis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 162.

oppositifolia. 3. Pt. foliis oppositis, ramis dichotomis divaricatis. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 17. *f.* 3.

flexicaulis. 4. Pt. foliis filiformibus glabris, calicibus obtetragonis, ramis brevibus rigidis. *Suppl. p.* 355.

pallens. 5. Pt. foliis filiformibus glabris, calicibus teretibus ovatis, caule ramisque incurvis teretibus. *Suppl. p.* 357.

minuta. 6. Pt. foliis linearibus vagis, floribus axillaribus. *Suppl. p.* 357.

Cephalotes. 7. Pt. foliis subulatis conduplicatis carinatis serrulatis, calicibus oblongis terminalibus minutissime laceris. *Suppl. p.* 358.

spinosa. 8. Pt. foliis subulatis spinascentibus pungentibus. *Suppl. p.* 357.

cinerea. 9. Pt. foliis oblongis tomentosis, calicis squamis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

villosa. 10. Pt. foliis lanceolatis obtusis pilosis, squamis calicis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

hirsuta. 11. Pt. foliis lanceolatis patentibus pilosis, caule procumbente, squamis calicis integris. *Suppl. p.* 346.

glabrata. 12. Pt. foliis lanceolatis glabris, squamis calicis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

glomerata. 13. Pt. foliis ovato-triquetris glabris, caule tetragono. *Suppl. p.* 355.

retorta. 14. Pt. foliis ovatis reflexis glabris margine ciliatis scabris, caule erecto, squamis calicis integris. *Suppl. p.* 356.

inflexa. 15. Pt. foliis ovatis pilosis, squamis calicis subarticulatis membranaceis, pedunculo inflexo. *Suppl. p.* 356.

membranacea. 16. Pt. foliis ovatis pulverulento-tomentosis, squamis calicis subulatis margine scariosis. *Suppl. p.* 357.

scariosa. 17. Pt. foliis ovalibus, calicibus scariosis, ramis spinosis. *Suppl. p.* 356.

fasciculata. 18. Pt. floribus fasciculatis unifloscolosis. *Suppl. p.* 357.

caroliniana. 19. Pt. foliis radicalibus agregatis gramineis pilosis, paleis receptaculi setis simplicibus. *Walt. flor. carol. p.* 202.

938. STÆHELINA. *Recept.* brevissime paleaceum. *Pappus* ramosus. *Antheræ* caudatæ.

gnaphalioides. 1. St. foliis filiformibus tomentosis, squamis calicis apice membranaceis reflexis. *Pluckn. alm. t.* 302. *f.* 3.

dubia. 2. St. foliis linearibus denticulatis, squamis calicis lanceolatis, pappo calicibus duplo longiore. *Gerard. flor. prov. t.* 6.

Chamæpeuce. 3. St. foliis linearibus confertis longissimis revolutis. *Sup. pl. p.* 1147. Serratula Chamæpeuce. *Pluckn. alm. t.* 94. *f.* 3.

elegans. 11. St. foliis lineari-lanceolatis caule erecto tomentoso, floribus spicatis, calicibus quinquefloris. *Swarts flor. carol. p.* 202.

imbricata. 4. St. foliis subulatis erectis tomentosis. *Mant. p.* 281.

corymbosa. 5. St. foliis cuneatis præmorsis, floribus corymbosis. *Sup. p.* 359.

fruticosa. 6. St. foliis lanceolatis obtusis. *Sp. pl. p.* 1286. centaurea fruticosa. *Lob. ic.* 548.

ilicifolia. 7. St. foliis oppositis brevissime petiolatis cordatis dentatis supra lucidis subtus tomentosis. *Suppl. p.* 358.

arborescens. 8. St. foliis ovalibus. *Mant. p.* 111. *Schreb. dec.* 1. *t.* 1.

hastata. 9. St. fruticosa, foliis hastatis incanis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 70.

spinosa. 10. St. foliis subulatis spinascentibus, basi utrinque spinula. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 69.

939. CHRYSOCOMA. *Recept.* nudum. *Pappus* papillaris sessilis. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus. *Stilus* vix flosculis longior.

* *fruticosæ.*

dichotoma. 1. Chr. prolifera dichotoma glabra, foliis linearibus planis serratis scabriusculis, pedunculis corymbosis squamosis hirtis. *Suppl. p.* 359. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 78.

sericea. 2. Chr. albo-sericea, foliis linearibus canaliculatis, ramulis apice paniculatis. *Suppl. p.* 360.

cernua. 3. Chr. foliis linearibus recurvis subscabris, floribus nubilibus cernuis. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 45.

Coma aurea. 4. Chr. foliis linearibus rectis glabris dorso decurrentibus. *Pluckn. alm. t.* 327. *f.* 2.

fruticosa. 22. Chr. foliis cuneiformibus superne subserratis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 280. *t.* 22. *f.* 2.

montana. 23. Chr. foliis oblongis integerrimis, floribus solitariis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 70.

oppositifolia. 5. Chr. foliis oppositis obovatis, floribus fasciculatis pedunculatis. *Breyn. ic. t.* 17. *f.* 2.

** *suffruticosæ.*

scabra. 6. Chr. foliis lanceolato-ovatis recurvis denticulato-serratis, pedunculis pubescentibus. *Dill. h. Elth. t.* 88. *f.* 105.

ciliata. 7. Chr. foliis linearibus rectis ciliatis, ramis pubescentibus. *Commel h. amst.* 2. *t.* 48.

patula. 8. Chr. foliis linearibus glabris, ramis divaricatis. *Mant. p.* 280.

tomentosa. 9. Chr. foliis ramisque tomentosis.

*** *herbaceæ.*

Linosyris. 10. Chr. foliis linearibus glabris, calicibus laxis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 82. *ic.*

pilosa. 11. Chr. foliis lineari-acerosis cauleque simplici pilosis, floribus sessilibus subimbricatis spicatis. *Walt. flor. carol. p.* 197.

graminifolia. 12. Chr. foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus corymbofis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 556. *n.* 13. Solidago lanceolata.

biflora. 13. Chr. paniculata, foliis lanceolatis trinerviis punctatis nudis. *Gmel. flor. fib.* 2. *t.* 82. *f.* 1.

villofa. 14. Chr. foliis lanceolatis villofis, calicibus arctis. *Gmel. flor. fib.* 2. *t.* 82. *f.* 2.

ramofa. 15. Chr. foliis lanceolatis, caule fubramofo pubefcente, floribus fubfeffilibus fpicatis. *Walt. flor. carol. p.* 198.

paniculata. 16. Chr. foliis lanceolatis afcendentibus cauleque vifcofo fimplici pilofis, panicula terminali. *Walt. flor. carol. p.* 198.

uniflora. 17. Chr. foliis lanceolatis, pedunculis terminalibus unifloris, caule ramofo. *Walt. flor. carol. p.* 198.

purpurea. 18. Chr. foliis elliptico-lanceolatis fubferratis pubefcentibus, panicula terminali corymbofa. *Forft. flor. auft. p.* 54.

gigantea. 19. Chr. foliis confertis feffilibus ovato-lanceolatis ferratis rugofis utrinque lævibus. *Walt. flor. carol. p.* 196.

odoratiffima. 20. Chr. foliis radicalibus obovato-oblongis, caulinis oblongo-lanceolatis lævibus, floribus corymbofis. *Walt. flor. carol. p.* 198.

acaulis. 21. Chr. fubacaulis, foliis dentatis, radicalibus planis fubovatis, floralibus alternis, remotis lanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 196.

940. TARCHONANTHUS. *Recept.* pilofum. *Pappus* pilofus. *Cal.* 1phyllus, femifeptemfidus, turbinatus.

camphoratus. 1. T. foliis oblongis planis, calice quinquefido. *Suppl. p.* 361. *Pluckn. alm. t.* 174. *f.* 1.

glaber. 2. T. foliis glabris integris dentatifque. *Supp. p.* 361.

ericoides. 3. T. foliis acerofis, calicibus tetraphyllis. *Suppl. p.* 360. *an hujus generis ?*

CHUQUIRAGA. *Recept.* villosum. *Pappus* plumosus. *Cal.* turbinatus, imbricatus polyphyllus.

Jussieui. 1. CHUQUIRAGA. *Jussieu gen. plant. p.* 178.

941. CALEA. *Recep.* paleaceum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus.

jamaicensis. 1. C. floribus subternis pedunculatis, foliis ovato-oblongis subserratis petiolatis. *Sloan. jam.* 1. *t.* 151. *f.* 3.

leptophylla. 2. C. floribus terminalibus ternis quinisve congestis, foliis oblongis imbricatis integerrimis sessilibus, caule fruticoso. *Forst. flor. austr. p.* 55.

pinifolia. 3. C. pedunculis terminalibus congestis, foliis linearibus acerosis, caule fruticoso. *Forst. flor. austr. p.* 55.

oppositifolia. 4. C. corymbis congestis, pedunculis longissimis, foliis lanceolatis caule herbaceo.

Amellus. 5. C. floribus subpaniculatis, calicibus brevibus, seminibus nudis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis.

caroliniana. 6. C. floribus paniculatis, foliis alternis lanceolatis subserratis sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 200.

scoparia. 7. C. caule fruticoso, ramis suboppositis tetraquetris.

aspera. 8. C. aspera, pedunculis terminalibus cauleque tetragonis; foliis petiolatis oppositis serratis deltoideis lanceolatisque. *Jacq. coll.* 2. *p.* 290. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 46.

942. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 0. *Cal.* imbricatus, hemisphæricus.

Chamæcyparissus. 1. S. pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Blackw. herb. t.* 346.

rosmarinifolia. 2. S. pedunculis unifloris, foliis linearibus margine tuberculatis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 22.

tinctoria. 3. S. pedunculis unifloris, foliis linearibus integerrimis, caulibus striatis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 119.

alpina. 4. S. pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caulibus simplicibus. *Mich. nov. pl. gen. t.* 27.

anthemoides. 5. S. pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caule ramosissimo villoso.

flagrantissima. 6. S. corymbis fastigiatis, caule fruticoso diffuso tomentoso, foliis ovatis crenulatis sessilibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 147.

943. ATHANASIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus, brevissimus. *Cal.* imbricatus.

* *corolla æquali.*

crenata. 1. A. floribus solitariis terminalibus, foliis linearibus.

capitata. 2. A. floribus terminalibus subsessilibus, foliis lanceolatis hirsutis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 48.

trinervia. 29. A. floribus terminalibus, foliis caulinis alternis ovato-lanceolatis trinerviis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

graminifolia. 30. A. pedunculis unifloris, scapo paucifloro, foliis radicalibus gramineis. *Walt. flor. carol. p.* 200.

maritima. 3. A. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis crenatis obtusis tomentosis. *Mill. h. angl. t.* 135. *nonne potius ob semina nuda santolinæ species?*

obovata. 31. A. pedunculis prælongis, foliis radicalibus obovato-oblongis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

hastata. 32. A. caule erecto, foliis hastatis scabris rugosis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

paniculata. 33. A. caule erecto, panicula terminali, foliis lanceolatis decurrentibus. *Walt. flor. carol. p.* 201.

pubescens. 4. A. corymbis simplicibus, foliis lanceolatis indivisis villosis. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 47.

annua. 5. A. corymbis simplicibus coarctatis, foliis pinnatifidis dentatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 227. *ic.* β) Achillea inodora. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 566.

trifurcata. 6. A. corymbis simplicibus, foliis trilobis cuneiformibus. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 49.

crithmifolia. 7. A. corymbis simplicibus, foliis semitrifidis linearibus. *Mill. h. angl. t.* 227. *f.* 2.

linifolia. 8. A. corymbo simplici, foliis linearibus. *Suppl. p.* 361.

dentata. 9. A. corymbis compositis, foliis recurvis, inferioribus linearibus dentatis, superioribus ovatis serratis. *Commel. rar. t.* 41. *β*) Athanasia lævigata. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 541.

parviflora. 10. A. corymbis compositis, foliis pinnatis linearibus. *Mant. p.* 464. *Syst. nat.* XII. 3. 541. Tanacetum crithmifolium. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 4.

pinnata. 11. A. corymbis compositis densis, foliis pinnatis linearibus tomentosis. *Suppl. p.* 361.

pectinata. 12. A. corymbo composito, foliis pinnatis glabris. *Suppl. p.* 361.

serrata. 13. A. corymbo composito, foliolis lanceolatis dentato-serratis. *Suppl. p.* 361.

filiformis. 14. A. corymbo composito, foliis linearibus glabris, patulis. *Suppl. p.* 361.

cinerea. 15. A. corymbo composito, foliis linearibus tomentosis integris. *Suppl. p.* 361.

** *corolla radiata*, Relhaniæ.

† *floribus aggregatis.*

squarrosa. 16. A. foliis oblongis acuminatis enervibus apice recurvis. *Herit. sert. angl. p.* 22. *t.* 29.

genistifolia. 17. A. foliis lanceolatis acuminatis uninerviis subimbricatis. *Mant. p.* 464.

microphylla. 18. A. foliis linearibus enervibus confertissimis, floribus pedicellatis. *Herit. sert. angl. p.* 22.

passerinoides. 19. A. foliis linearibus enervibus, floribus subsessilibus. *Herit. sert. angl. p.* 23.

viscosa. 20. A. foliis linearibus triquetris subcarnosis viscidis. *Herit. sert. angl. p.* 23.

†† *floribus solitariis.*

laxa. 21. A. foliis linearibus villosis remotis, floribus longius pedunculatis, caule erecto. *Herit. sert. angl. p.* 23.

pumila. 22. A. foliis linearibus villosis, floribus pedunculatis, caulibus diffusis. *Suppl. p.* 362. *an eadem cum Zoega capensi?*

sessiliflora. 23. A. foliis linearibus villosis, pedunculis lateralibus folio brevioribus. *Suppl. p.* 362.

virgata. 24. A. foliis linearibus glabris, acumine recurvo folio breviore, floribus sessilibus. *Herit. sert. angl. p.* 23.

pungens. 25. A. foliis linearibus subpungentibus subtus striatis, floribus sessilibus. *Herit. sert. angl. p.* 24.

santolinoides. 26. A. foliis linearibus triquetris subtus turionibusque incanis calicibus globosis subpetiolatis. *Herit. sert. angl. p.* 24.

decussata. 27. A. foliis linearibus triquetris decussatis acutis, floribus sessilibus. *Herit. sert. angl. p.* 24.

uniflora. 28. A. foliis obovatis glabris, floribus sessilibus. *Suppl. p.* 362.

MARSHALLIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* coronata calic. 5phyllo. *Cal.* polyphyllus persistens. *Stigm.* 2.

Schreberi. 1. MARSHALLIA. *Schreb. nov. Linn. gen. plant. ad* 2. *p.* 810.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

944. TANACETUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, hemisphæricus. *Cor.* radii 3fidæ, lineari-ligulatæ, interdum o.

annuum. 1. T. foliis bipinnatifidis linearibus acutis, corymbis tomentosis. *Mill. h. angl. t.* 227. *f.* 1.

vulgare. 2. T. foliis bipinnatis incisis serratis. *Flor. dan. t.* 871.

incanum. 3. T. foliis bipinnatis tomentosis, corymbo ovato composito.

myriophyllum. 4. T. foliis bipinnatis tomentosis, pinnulis caulinorum dentatis, radicalium integerrimis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 566. Achillea bipinnata.

monanthos. 5. T. caulibus simplicissimis unifloris longitudine foliorum. *Mant. p.* 111.

argenteum. 6. T. foliis pinnatis tomentosis, pinnis lanceolatis, floribus cymosis. *Willden. de achill. t.* 2.

sibiricum. 7. T. foliis pinnatis, pinnis lineari-filiformibus, corymbis glabris, caule herbaceo. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 65. *f.* 2.

angulatum. 8. T. foliis pinnatifidis, laciniis inciso-dentatis, calice angulato. *Willden. de achilleis t.* 2.

suffruticosum. 9. T. foliis pinnato-multifidis, laciniis linearibus subdivisis acutis, caule suffruticoso. *Mant. p.* 465.

cotuloides. 10. T. foliis dentato-pinnatis acuminatis, caule ramosissimo, floribus subpaniculatis. *Mant. p.* 282.

flabelliforme. 11. T. foliis deltoidibus apice serratis, corymbis simplicibus. *Herit. sert. angl. p.* 21. *t.* 27.

Balsamita. 12. T. foliis ovatis integris serratis. *Blackw. herb. t.* 98.

945. ARTEMISIA. *Recept.* subvillosum vel nudiusculum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus: squamis rotundatis conniventibus. *Cor.* radii o.

* *fruticosae erectae.*

vermiculata. 1. A. foliis acerosis confertis minimis, panicula racemosa, floribus sessilibus. *Mant. p.* 281. *Breyn. cent. p.* 24. *t.* 12.

capillaris. 2. A. foliis simplicibus capillaceis. *Thunb. flor. jap. p.* 309.

Abrotanum. 3. A. foliis setaceis ramosissimis. *Blackw. herb. t.* 555.

laricifolia. 4. A. foliis fasciculatis indivisis fissisque, ramis deflexis, floribus oblongis cernuis. *S. G. Gmel. it.* 2. *p.* 3.

Lerchii. 5. A. incana, foliis superioribus linearibus indivisis, inferioribus pinnatis brevibus tenuiter divisis, pinnis palmatis, corymbis sessilibus copiosissimis spicatis oblongis. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 114. *n.* 99. *t.* 50. *f.* 2. 3. *β) Gmel. flor. sib. p.* 112. *n.* 97. *t.* 49. *f.* 2.

nitrosa. 6. A. subincana, foliis superioribus integris obtusis, inferioribus tenuiter multifidis, corymbis erectis incurvis oblongis spicatis sessilibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 113. *n.* 98.

arborescens. 7. A. foliis compositis multifidis linearibus, floribus subglobosis. *Lob. ic.* 753.

Gmelini. 8. A. foliis duplicato-pinnatis obtusis linearibus subtus incanis, corymbis subrotundis nutantibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 121. *n.* 106.

argentea. 9. A. sericea, foliis subpalmatis pinnatisve, laciniis lato-linearibus remotis. *Herit. sert. angl. p.* 22. *t.* 28.

æthiopica. 10. A. foliis palmatis linearibus minutissimis, floribus racemosis pedunculatis. *Mant. p.* 283.

Contra. 11. A. foliis palmatis linearibus minutis, panicula racemosa, floribus sessilibus. *Mant. p.* 282.

judaica. 12. A. foliis obovatis obtusis lobatis parvis, floribus paniculatis pedicellatis. *Mant. p.* 111. 281. *Pluckn. alm. t.* 73. *f.* 2.

pauciflora. 13. A. ramis virgatis filiformibus, corymbis fecundis spicatis subsessilibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 116. *n.* 101.

** *suffruticosæ.*

Messerschmidii. 14. A. tomentosa, caule erecto, foliis linearibus multifidis, racemis erectis tenuibus laxis. *Weber apud Stechmann de artemis. p.* XIX. *n.* IX.

humilis. 15. A. foliis setaceis pinnatifidis, caule decumbente. *Lob. ic.* 769. *Mill. h. angl. t.* 2. *f.* 1.

hispanica. 16. A. foliis laxe pinnatis, pinnis longis linearibus, spicis densissimis calicibus oblongis. *Weber apud Stecmann de artemis. p.* XXX. *n.* XXIV.

italica. 17. A. foliis tomentosis laxe pinnatis, pinnis longis linearibus, radicalibus punctatis, spicis densis, floribus erectis. *Haller. flor. Goett. p.* 373.

tatarica. 18. A. tomentosa, foliis inferioribus bipinnatis, pinnis æqualibus, superioribus pinnatis linearibus, racemis erectis laxis multifloris. *Weber ap. Stechmann artemis. p.* XIX. *n.* X.

*** *herbaceæ.*

† *procumbentes ante florescentiam.*

campestris. 19. A. foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. β) Artemisia Mutellina. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 159. γ) Artemisia incana. *Mill. h. angl. t.* 2. *f.* 2.

canethifolia. 20. A. foliis multifidis tenuissime divisis, corymbis subrotundis nutantibus secundis laxe spicatis, caule ascendente. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 119. *n.* 103.

crithmifolia. 21. A. foliis compositis divaricatis linearibus carnosis glabris, caule ascendente paniculato.

glacialis. 22. A. foliis palmatis multifidis sericeis, caulibus ascendentibus, floribus glomeratis fastigiatis. *Jacq. flor. austr. 5. app. t. 35. coll. 2. t. 7. f. 1. 3.*

maritima. 23. A. foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis femineis ternis.

santonica. 24. A. foliis caulinis linearibus pinnato-multifidis, rameis indivisis, spicis secundis reflexis, floribus quinquefloris. *Gmel. flor. sib. 2. t. 51.*

palustris. 25. A. foliis linearibus pinnatis integerrimis, floribus glomeratis subsessilibus. *Gmel. flor. sib. 2. t. 55.*

rupestris. 26. A. foliis pinnatis, caulibus ascendentibus, floribus globosis cernuis, receptaculo papposo. *Flor. dan. t. 801.*

spicata. 27. A. foliis radicalibus biternatis, caule ascendente spicato, floribus erectis. *Jacq. flor. aust. 5. app. t. 34.*

† † *erectæ.*

† *foliis compositis aut divisis.*

glaginoidea. 28. A. tomentosa, foliis multifidis, floribus subspicatis subsessilibus. *Haller hist. stirp. Helv. 1. p. 55. n. 128.*

sericea. 29. A. foliis multifidis lineari-lanceolatis, floribus ellipticis pendulis. *Gmel. flor. sib. 2. p. 131. n. 113.*

tenella. 30. A. caule lanato, foliis tenuissime multifidis brevibus, paniculis tenuibus laxis foliosis. *Weber ap. Stechm. de artmis. p.* XXVI. *n.* XX.

Semsek. 31. A. foliis multifidis filiformibus subvillosis, petiolis triquetris. *Forsk. flor. æg. arab. p. 218.*

Absinthicum. 32. A. foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villoso. *Knorr del. hort. 2. t.* A. 17.

inodora. 33. A. foliis compositis multifidis tomentosis, floribus subglobosis, receptaculo villoso, *an satis distincta ab Absinthio?*

pontica. 34. A. foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus, receptaculo nudo. *Jacq. flor. austr. 1. t. 99.*

austriaca. 35. A. foliis multipartitis tomentosis incanis, floribus oblongis nutantibus, receptaculo nudo. *Jacq. flor. austr. 1. t. 100.*

vulgaris. 36. A. foliis pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. *Blackw. herb. t. 431.*

borealis. 37. A. foliis pinnato-subseptemfidis villosis linearibus, floribus conglomeratis. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* Hh. *f.* 1.

Jacquini. 38. A. foliis pinnatis, pinnis lanceolatis inæqualiter incisis, inferioribus integerrimis, floribus globosis axillaribus subgeminis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 98.

pectinata. 39. A. foliis pinnatis pectinatis glabris sessilibus, floribus axillaribus solitariis sessilibus quadrifloris. *Suppl. p.* 362. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* Hh. *f.* 2.

tanacetifolia. 40. A. foliis bipinnatis subtus tomentosis nitidis, pinnis transversis, racemis simplicibus. *Allion. pedem. t.* 2. *f.* 1.

annua. 41. A. foliis triplicato-pinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis nutantibus, receptaculo glabro conico. *Amm. ruth. t.* 193. *f.* 23.

✝✝ *foliis simplicibus & indivisis.*

cærulescens. 42. A. foliis caulinis lanceolatis integris, radicalibus multifidis, flosculis femineis ternis. *Du Hamel arbr.* 1. *t.* 24. *f.* 5.

japonica. 43. A. foliis glabris, rameis lanceolatis integris, caulinis oblongis trifidis, floribus racemosis cernuis. *Thumb. flor. jap. p.* 310.

Dracunculus. 44. A. foliis lanceolatis glabris integerrimis. *Black. herb. t.* 116.

integrifolia. 45. A. foliis lanceolatis subtus tomentosis integerrimis dentatisque, flosculis femineis quinis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 48. *f.* 1.

sinensis. 46. A. foliis tomentosis obtusis lanceolatis, inferioribus cuneiformibus trilobis. *Pluckn. amalth.* 3. *t.* 153. *f.* 5.

minima. 47. A. foliis cuneiformibus repandis, caule procumbente, floribus axillaribus sessilibus. *Burm. ind. t.* 58. *f.* 3. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 88.

littoralis. 48. A. procumbens strigosa, foliis spatulatis serrato-dentatis, calicibus nudis pedicellatis. *Retz obs. bot.* 5. *p.* 28.

maderaspatana. 49. A. foliis lyrato-sinuatis, caulibus procumbentibus, floribus pedunculatis solitariis globosis oppositifoliis. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 49.

946. GNAPHALIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus vel capillaris. *Cal.* imbricatus ſquamis marginalibus rotundatis, ſcarioſis, coloratis.

* *Fruticoſa.*

† *Argyrocoma.*

eximium. 1. Gn. foliis ſeſſilibus ovatis confertis erectis tomentoſis, corymbo ſeſſili. *Mant. p.* 573. *Edw. av. t.* 183. *Mill. an var. ſubj. t.* 3. *f.* 1.

trinerve. 2. Gn. foliis ſeſſilibus lanceolatis trinerviis ſubtus argenteis, panicula corymboſa terminali laxa. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

appendiculatum. 3. Gn. foliis ſeſſilibus imbricatis lanceolatis lanatis apice membrana ſcarioſa appendiculatis. *Suppl. p.* 363.

coronatum. 4. Gn. foliis ſeſſilibus lanceolatis, corymbis compoſitis ſeſſilibus, pedunculis aphyllis, calicibus coronatis. *Burm. afr. t.* 69. *f.* 3.

diſcolorum. 5. Gn. foliis ſeſſilibus lanceolatis, calicibus albis, ſquamis inferioribus incarnatis. *Burm. afr. t.* 79. *f.* 4.

arboreum. 6. Gn. foliis ſeſſilibus linearibus ſupra glabris margine revolutis, floribus ſubcapitatis, pedunculis elongatis.

ericoides. 7. Gn. foliis ſeſſilibus linearibus, calicibus exterioribus rudibus, interioribus incarnatis.

grandiflorum. 8. Gn. foliis amplexicaulibus ovatis trinerviis utrinque lanuginoſis. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 1.

fruticans. 9. Gn. foliis amplexicaulibus ovatis, caule rigente, cyma ſeſſili. *Mant. p.* 282.

undatum. 10. Gn. foliis ſubtus tomentoſis ſupra ſcabris, radicalibus petiolatis oblongis, caulinis amplexicaulibus undulatis. *Suppl. p.* 363.

teretifolium. 11. Gn. foliis confertis teretiuſculis, corymbis ramoſis, calicibus exterius ferrugineis. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 3.

muricatum. 12. Gn. foliis ſubulatis mucronatis, umbella compoſita, calicibus ſubtrifloris cylindricis. *Burm. afr. t.* 79. *f.* 1. 2. 3.

††*Chryſocoma.*

mucro-natum. 13. Gn. foliis ſubulatis mucronatis, calicum ſquamis ſubrotundis. *Mant. p.* 283. *Burm. afr. t.* 66. *f.* 3.

umbellatum. 14. Gn. foliis ſubulatis tortis faſciculatis, umbellis ſimplicibus terminalibus ſeſſilibus. *Suppl. p.* 363.

repens. 15. Gn. foliis linearibus, caule repente recto, ramis erectis ſimpliciſſimis. *Mant. p.* 283.

ſtœchas. 16. Gn. foliis linearibus, corymbo compoſito, ramis virgatis. *Blackw. herb. t.* 438.

hiſpidum. 17. Gn. foliis linearibus ſemiteretibus ſulcatis hiſpidis, capitulis terminalibus ſimplicibus. *Suppl. p.* 363.

Forskåhlii. 18. Gn. foliis linearibus amplexicaulibus, corymbis terminalibus. *Forsk. Flor. æg. arab. p.* 218.

igneſcens. 19. Gn. foliis ſublanceolatis tomentoſis ſeſſilibus, corymbis alternis conglobatis, floribus globoſis.

maritimum. 20. Gn. ramoſiſſimum, foliis lanceolatis ſeſſilibus acutiuſculis, calicis ſquamis intimis aureis. *Mant. p.* 283. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 2.

ſerratum. 21. Gn. foliis lanceolatis ſerratis amplexicaulibus ſupra nudis. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 3.

craſſifolium. 22. Gn. foliis lato-lanceolatis ſubpetiolatis coriaceis tomentoſis, corymbo compoſito, caule prolifero. *Mant. p.* 112.

dentatum. 23. Gn. foliis cuneiformibus dentatis ſeſſilibus, corymbo ſimplici. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 3.

patulum. 24. Gn. foliis ſpatulatis amplexicaulibus, corymbis aggregatis, ramis patentibus.

petiolatum. 25. Gn. foliis ovatis integerrimis petiolatis, floribus confertis terminalibus. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 1.

** *Herbacea.*

† *Chryſocoma.*

orientale. 26. Gn. ſubherbaceum, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus, corymbo compoſito, pedunculis elongatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 55.

milleflorum. 27. Gn. floribus corymboſis faſtigiatis rufeſcenti-albidis, calicibus ſubcylindricis. *Suppl. p.* 362.

cylindricum. 28. Gn. foliis sessilibus oblongis tomentosis, corymbis inaequalibus, calicibus glabris cylindricis sessilibus. *Pluckn. phyt.* 298. *f.* 4.

arenarium. 29. Gn. foliis lanceolatis, inferioribus obtusis, corymbo composito, caulibus simplicissimis. *Flor. dan. t.* 641.

rutilans. 30. Gn. foliis lanceolatis, corymbo decomposito, caule inferne ramoso. *Dill. h. Elth. t.* 107. *f.* 127.

imbricatum. 31. Gn. foliis lanceolatis tomentosis, squamis calicis reflexis, caule ramoso. *Burm. afr. t.* 80. *f.* 2.

cymosum. 32. Gn. foliis lanceolatis trinerviis supra glabris, racemo terminali, caule inferne ramoso. *Pluckn. alm. t.* 279. *f.* 1.

nudifolium. 33. Gn. foliis lanceolatis trinerviis nudis reticulato-venosis. *Petiv. gaz. t.* 82. *f.* 1.

uniflorum. 34. Gn. foliis lanceolatis alternis lanatis, caulibus unifloris prostratis lanatis. *Hablizl ap. S. G. Gmel. it.* 4. *p.* 176.

albescens. 35. Gn. niveo-tomentosum, foliis lineari-lanceolatis, caule erecto inferne simplici, ramis terminalibus fastigiatis, floribus confertis conicis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 112.

luteo-album. 36. Gn. foliis semiamplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus, floribus conglomeratis. *Pluckn. alm. t.* 31. *f.* 16.

pedunculare. 37. Gn. foliis spatulatis subamplexicaulibus subtus tomentosis calicis squamis acutissimis. *Mant. p.* 284.

Vira vira. 38. Gn. foliis decurrentibus spatulatis utrinque tomentosis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 125.

odoratissimum. 39. Gn. foliis decurrentibus mucronatis utrinque tomentosis planis. *Mill. h. angl. t.* 131. *f.* 2.

†† *Argyrocoma.*

sanguineum. 40. Gn. foliis decurrentibus lanceolatis tomentosis planis, apiculo nudo terminali. *Rauw. it. p.* 285. *ic.*

undulatum. 41. Gn. foliis decurrentibus lanceolatis undulatis acutis subtus tomentosis, caule ramoso. *Dill. h. Elth. t.* 108. *f.* 130.

foetidum. 42. Gn. foliis amplexicaulibus integerrimis acutis subtus tomentosis, caule ramoso. *Volkam. norimb. p.* 194. *ic.* *Pappus simplex.*

crispum. 43. Gn. foliis amplexicaulibus spatulatis tomentosis, calicibus obtusissimis plicato-undulatis basi tomentosis. *Pluck. alm. t.* 298. *f.* 3.

helianthemifolium. 44. Gn. foliis subamplexicaulibus lanceolatis, corymbis compositis, calicis squamis subplicatis. *Volkam. norimb. p.* 194. *ic.*

squarrosum. 45. Gn. foliis sessilibus lingulatis tomentosis; calicis squamis interioribus subulatis recurvatis. *Pluckn. alm. t.* 323. *f.* 1.

stellatum. 46. Gn. foliis sessilibus lanceolatis villosis, calicibus acutis extrinsecus incarnatis. *Burm. afr. t.* 80. *f.* 1.

obtusifolium. 47. Gn. foliis lanceolatis, caule tomentoso paniculato; floribus glomeratis conicis terminalibus. *Dill. h. Elth. t.* 108. *f.* 131.

arabicum. 48. Gn. foliis lanceolatis remotis petiolatis supra pilosis integris, corymbo terminali, caule ramoso. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 218.

indicum. 49. Gn. foliis lanceolatis, caule ramosissimo diffuso, corymbis inæqualibus, calicibus intus coloratis. *Pluck. alm. t.* 187. *f.* 5.

purpureum. 50. Gn. foliis lanceolatis nudis, caule erecto simplicissimo, floribus spicatis lateralibus sessilibus. *Dill. h. Elth. t.* 109. *f.* 132.

margaritaceum. 51. Gn. foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule superne ramoso, corymbis fastigiatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 12. *n.* 50.

cinereum. 52. Gn. foliis linearibus integris, calicibus cinereis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 218.

cuneifolium. 53. Gn. foliis cuneatis obtusis subsinuatis, calicibus cinereis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 218.

denudatum. 54. Gn. foliis spatulatis subtus niveis tomentosis; supra lævibus. *Suppl. p.* 364.

americanum. 55. Gn. foliis ovato-lanceolatis serratis subtomentosis, caule inferne simplici superne corymboso, floribus ovatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 112.

plantagineum. 56. Gn. foliis radicalibus ovatis maximis, caule simplicissimo, sarmentis procumbentibus. *Pluckn. alm. t.* 348. *f.* 9.

dioicum. 57. Gn. sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioicis. *Dod. pempt.* 68.

alpinum. 58. Gn. sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, capitulo aphyllo, floribus oblongis. *Flor. dan. t.* 332.

††† *Filaginoidea.*

silvaticum. 59. Gn. caule simplicissimo erecto, floribus sparsis. *Flor. dan. t.* 254. β) Gnaphalium germanicum. *Schrank. flor. bav.* 2. *p.* 368.

norwegicum. 60. Gn. caule herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis utrinque acutis trinerviis subtus lanuginosis, spica florum terminali dense foliosa. *Flor. dan. t.* 254.

verticillatum. 61. Gn. caule simplicissimo, floribus verticillatis, foliis linearibus. *Suppl. p.* 364.

spicatum. 73. Gn. caule simplicissimo herbaceo, floribus verticillatis, foliis fasciculatis linearibus revolutis. *Petiv. gazoph. t.* 8. *f.* 12.

supinum. 62. Gn. caule simplici procumbente, floribus sparsis. *Bocc. mus. t.* 85.

Oculus Cati. 63. Gn. caule prostrato, foliis ovatis, floribus glomeratis terminalibus villosissimis. *Suppl. p.* 364.

glomeratum. 64. Gn. caule diffuso, calicibus squamis interioribus subulatis nudis, foliis subamplexicaulibus.

uliginosum. 65. Gn. caule ramoso diffuso, floribus confertis terminalibus. *Flor. dan. t.* 859.

nudum. 74. Gn. caule ramoso herbaceo diffuso, floribus confertis terminalibus nudis. *Hoffm. bot. Taschenb.* 1791. *p.* 292.

tomentosum. 75. Gn. caule ramoso herbaceo diffuso, floribus confertis terminalibus tomentosis. *Hoffm. bot. Taschenb.* 1791. *p.* 292.

pilosellum. 66. Gn. foliis lanceolatis quinquenerviis subtus tomentosis, caule nudo, floribus capitatis. *Suppl. p.* 364.

radiatum. 67. Gn. foliis lanceolatis, calicum radio multiplici subrotundo. *Suppl. p.* 365.

declinatum. 68. Gn. foliis lineari-lanceolatis, calicibus radio albo lanceolato. *Suppl. p.* 365.

†††† *incertae cohortis.*

lanatum. 69. Gn. lanatum, foliis lineari-oblongis apice callosomucronatis, corymbo coarctato, caule simplicissimo. *Forst. flor. aust. p.* 55.

involucratum. 70. Gn. foliis linearibus elongatis mucronatis subtus tomentosis, capitulo terminali folioso. *Forst. flor. austr. p.* 55.

japonicum. 71. Gn. erectum, foliis lineari-ensiformibus subtus niveis, capitulis terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 311.

hyemale. 72. Gn. sarmentis procumbentibus, foliis radicalibus obtusis tomentosis, floribus glomeratis conicis rubris. *Walt. flor. carol. p.* 203.

947. XERANTHEMUM. *Recept.* paleaceum aut nudum. *Pappus* setaceus, plumosus aut pilosus. *Cal.* imbricatus, radiatus, radio colorato.

* *receptaculo paleaceo, pappo quinqueseto.*

annuum. 1. X. herbaceum, foliis lanceolatis patentibus. *Jacq. flor. aust.* 4. *t.* 388. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 20.

** *receptaculo nudo.*

⊢ *pappo piloso.*

bellidioides. 2. X. ramis unifloris, foliis ovato-oblongis cuspidatis amplexicaulibus, pedunculis tomentosis subaphyllis. *Forst. flor. austr. p.* 55.

canescens. 3. X. fruticosum, foliis imbricatis ovato-subulatis glabris. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 1.

vestitum. 4. X. fruticosum erectum, foliis adnatis lanceolato-linearibus apice calloso-mucronatis, ramis unifloris foliosis. *Seb. mus.* 2. *t.* 43. *f.* 5.

imbricatum. 5. X. caulibus fruticosis erectum, foliis ovatis subtomentosis, pedunculis squamosis. *Petiv. gaz. t.* 5. *f.* 10.

proliferum. 6. X. caule fruticoso prolifero, floribus sessilibus, foliis granulato-subrotundis imbricatis obsoletis. *Mant. p.* 467. *Seb. mus.* 2. *t.* 89. *f.* 8.

⊢ ⊢ *pappo plumoso.*

speciosissimum. 7. X. fruticosum erectum, foliis amplexicaulibus lanceolatis trinerviis, floribus pedunculatis. *Seb. mus.* 2. *t.* 43. *f.* 6.

retortum. 8. X. caulibus frutescentibus provolutis, foliis tomentosis recurvatis. *Dill. h. Elth. t.* 322. *f.* 415.

9. X.

ſtolonife- rum. 9. X. procumbens repens ſericeum, foliis oblongis recurvato-patulis, ramulis unifloris. *Suppl. p.* 366.

virgatum. 10. X. ramis unifloris virgatis, foliis lanceolatis tomentoſis, pedunculis ſubnudis. *Mant. p.* 284. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 16. *f.* 3.

ſeſamoi- des 11. X. ramis unifloris imbricatis, foliis linearibus. *Burm. afr. t.* 67. *f.* 2. *β) Seb. muſ.* 2. *t.* 43. *f.* 5.

ſquamo- ſum. 12. X. ramis unifloris inferne imbricatim folioſis, ſuperne dente ſquamoſis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 279. *t.* 20. *f.* 2.

panicula- tum. 13. X. floribus paniculatis, foliis lineari-lanceolatis. *Suppl. p.* 366. *Brum. afr. t* 67. *f.* 1.

Stæheli- na. 14. X. pedunculis terminalibus exſertis nudis unifloris, foliis lanceolatis tomentoſis.

variega- tum. 15. X floribus ſolitariis nutantibus, ſquamis calicis obtuſis maculatis.

ſpinoſum. 16. X. ſquamis calicis mucronato-ſpinoſis. *Burm. afr. t.* 67. *f.* 3.

*** *incertæ tribus.*

fulgidum. 17. X. foliis lato-lanceolatis, convoluto-incumbentibus, floribus ſuſpenſis. *Suppl. p.* 365.

recurva- tum. 18. X. foliis recurvatis lanceolatis complicato-canaliculatis cuſpidatis ciliatis, ramulis unifloris. *Suppl. p.* 366.

948. CARPESIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, ſquamis exterioribus reflexis.

cernuum. 1. C. floribus terminalibus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 204.

abrota- noides. 2. C. floribus lateralibus. *Osb. it. t.* 10.

949. BACCHARIS. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Floſculi* feminei hermaphroditis immiſti.

ivæfolia. 1. B. foliis lanceolatis longitudinaliter dentato-ſerratis. *Barth. act. Hafn.* 2. *t.* 57.

fœtida. 2. B. foliis lanceolatis ſerrato-dentatis, corymbis folioſis

neriifolia. 3. B. foliis lanceolatis superne uno alterove denticulo serratis.

Dioscoridis. 4. B. foliis lato-lanceolatis dentatis sessilibus stipulatis. *Suppl. p.* 366. *Rauw. it. p.* 54. *ic.*

arborea. 5. B. foliis elliptico-lanceolatis integerrimis nudis petiolatis. *Mant. p.* 284.

halimifolia. 6. B. foliis obovatis superne emarginato-crenatis. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 35.

brasiliana. 7. B. foliis obovatis integris scabris sessilibus subtus venosis.

indica. 8. B. foliis obovatis denticulatis petiolatis. *Breyn. cent. t.* 70.

viscosa. 9. B. foliis subcuneiformibus semiamplexicaulibus dentatis obtusis piloso-viscosis alternis, floribus corymbosis. *Walt. flor. carol. p.* 202.

950. CONYZA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus, subrotundus. *Cor.* radii 3fidæ.

canescens. 1. C. foliis linearibus, panicula fastigiata. *Suppl. p.* 397.

saxatilis. 2. C. foliis linearibus subdentatis, pedunculis longissimis unifloris, caule suffruticoso. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 10. *f.* 16.

sordida. 3. C. foliis linearibus integerrimis, pedunculis longis trifloris, caule suffruticoso. *Mant. p.* 466. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 543. Gnaphalium sordidum.

linifolia. 4. C. foliis lineari-lanceolatis integerrimis, corollis radiatis. *Pluckn. alm. t.* 79. *f.* 2.

squarrosa. 5. C. foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboso, calicibus squarrosis. *Flor. dan. t.* 622.

virgata. 6. C. foliis lanceolatis serrulatis decurrentibus, caulibus virgatis, floribus spicatis sparsis congestis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 5.

decurrens. 7. C. foliis lanceolatis serrulatis decurrentibus, floribus axillaribus sessilibus glomeratis.

balsamifera. 8. C. foliis lanceolatis subtus tomentosis, petiolis etiam dentatis. *Suppl. p.* 1208. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 24. *f.* 1.

asteroides. 9. C. foliis lato-lanceolatis subserratis, corollis radiatis, calicibus squarrosis.

crispata. 10. C. foliis lanceolatis decurrentibus serrato dentatis nudis, pedunculis unifloris, caule fruticoso. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 71.

purpurascens. 11. C. foliis ovato-lanceolatis serratis subtomentosis, caule subherbaceo inferne simplici superne corymboso, floribus ovatis. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 258. *t.* 252. *f.* 1.

lobata. 12. C. foliis superioribus ovato-lanceolatis obsolete serratis, inferioribus trifidis, floribus corymbosis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 4. *an Calæe potius species?*

anthalmintica. 13. C. foliis lanceolato-ovatis scabris, pedunculis unifloris, calicibus squarrosis. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 24.

sinensis. 14. C. foliis lanceolato-ovatis reflexo-serratis subtus tomentosis, floribus terminalibus congestis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 14. *f.* 2.

colorata. 15. C. foliis ovatis serratis subtomentosis acutis, caule corymboso, corollis subglobosis. β) *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 2.

candida. 16. C. foliis ovatis tomentosis, floribus confertis, pedunculis lateralibus terminalibusque. *Buxb. cent.* 2. *t.* 47.

arborescens. 17. C. foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, racemis erectis secundis, bracteis reflexis. *Plum. spec. t.* 130. *f.* 2.

fruticosa. 18. C. foliis ovatis integerrimis obtusis, floribus sessilibus alternis, ramulis flexuosis.

incisa. 30. C. foliis ovatis subcordatis piloso-viscidis dentatis basi auriculatis, receptaculi disco favoso. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 184.

tortuosa. 19. C. foliis ovato-oblongis integerrimis, caule tortuoso fruticoso, racemis reflexis.

bifrons. 20. C. foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. *Pluckn. alm. t.* 87. *f.* 4.

scabra. 21. C. foliis oblongis subdentatis sessilibus scabris, pedunculis unifloris elongatis. *Mant. p.* 113.

pubigera. 22. C. foliis oblongis subdentatis subpetiolatis, pedunculis lanatis subbifloris. *Mant. p.* 113. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 103. *f.* 2.

cinerea. 23. C. foliis oblongis floribus paniculatis, corollis cylindricis calice duplo longioribus. *moris. hist. pl.* 3. *t.* 17. *f.* 7.

caroliniensis. 24. C. foliis lanceolato-oblongis integerrimis, corymbis axillaribus, pedunculis multifloris. *Jacq. coll.* 2. *p.* 271.

rupestris. 25. C. foliis spatulatis subdentatis cauleque suffruticoso tomentosis, pedunculis elongatis unifloris. *Mant. p.* 113. *Shaw afr. t.* 176.

rugosa. 33. C. foliis ellipticis decurrentibus crenatis subtus tomentosis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 71.

bifoliata. 26. C. foliis ovalibus dentatis, pedunculis diphyllis, bracteis oppositis. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 1.

hirsuta. 27. C. foliis ovalibus integerrimis scabris subtus hirsutis.

patula. 31. C. foliis ellipticis serratis subtus villosis, calicibus subglobosis, foliolis lanceolato-subulatis, ramis patulis. *Mill. h. angl. t.* 247.

rugosa. 32. C. fruticosa, foliis cuneiformibus serratis villosis rugosis reticulatis, pedunculis villosis unifloris floribus radiatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 184.

rigida. 28. C. foliis petiolatis obovatis integris scabris subtus venosis, spicis flexuosis, floribus secundis geminatis. *Plum. ic.* 14. *f.* 1.

aurita. 29. C. foliis dentato-sinuatis, auriculis subdecurrentibus. *Suppl. p.* 367.

951. ERIGERON. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cor.* radii lineares, angustissimæ.

carolinianum. 1. E. caule paniculato, floribus subsolitariis terminalibus, foliis linearibus integerrimis. *Dill. h. Elth. t.* 306. *f.* 393.

gramineum. 2. E. caule unifloro, foliis linearibus ciliatis scabris. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 76. *f.* 2.

decurrens. 34. E. foliis linearibus tomentosis decurrentibus, floribus paniculatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 72.

incanum. 35. E. foliis linearibus tomentosis subdentatis, floribus corymbosis, caule fruticoso. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 72.

tuberosum. 3. E. foliis linearibus, ramis unifloris, caule suffruticoso. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 19. *f.* 20. β) *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 20. *f.* 15. γ) *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 22. *f.* 7.

graveolens. 4. E. foliis sublinearibus integerrimis, ramis lateralibus multifloris. *Mant. p.* 468. *Lob. ic.* 346.

fœtidum. 5. E. foliis lanceolato-linearibus retusis, floribus corymbosis. *Mill. h. angl. t.* 223.

glutinosum. 6. E. foliis lanceolato-linearibus piloso-viscidis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 112.

viscosum. 7. E. foliis lanceolatis denticulatis basi reflexis, pedunculis unifloris lateralibus, calicibus squarrosis, corollis radiatis. *Mant. p.* 468. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 165.

canadense. 8. E. foliis lanceolatis ciliatis, caule floribusque paniculatis hirtis. *Hoffmann bot. Taschend.* 1791. *t.* 12.

philadelphicum. 9. E. foliis lanceolatis subserratis, caulinis semiamplexicaulibus, flosculis radii capillaceis longitudine disci.

bahamense. 10. E. fruticosum, foliis lanceolatis petiolatis integris, floribus terminalibus corymbosis, flosculis radii trifidis. *Scop. del. inf.* 3. *p.* 14. *t.* 7.

Gouani. 11. E. foliis lanceolatis subdentatis margine scabris, floribus congestis, calicibus scariosis. *Mant. p.* 469. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 79.

sumatrense. 12. E. tomentosum, floribus racemoso-paniculatis, foliis lanceolatis subserratis. *Wennerberg ap. Retz. obs. bot.* 5. *p.* 28.

sericeum. 13. E. floribus paniculatis, foliis ovato-lanceolatis tomentoso sericeis integris serratisque basi appendiculatis. *Wennerberg apud. Retz. obs. bot.* 5. *p.* 28.

glandulosum. 29. E. foliis ovato-lanceolatis integris cauleque pilosis, pedunculis ternis, calicibus hemisphæricis glanduloso pilosis. *Walt flor. carol. p.* 205.

camphoratum. 14. E. foliis lanceolato-ovatis villosis, serraturis apice cartilagineis.

purpureum. 33. E. foliis oblongis subdentatis amplexicaulibus, caule piloso multifloro, radii corollis capillaribus disco longioribus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 186.

scandens. 15. E. foliis ovatis serratis villosis, floribus axillaribus, caule scandente. *Thunb. flor. jap. p.* 313.

obliquum. 16. E. ramosissimum, foliis ovatis obliquis. *Mant. p.* 573.

japonicum. 17. E. foliis sessilibus obovatis serratis villosis, floribus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 312.

alpinum. 18. E. foliis obtusis subtus villosis, caule subbifloro, calice subhirsuto. *Flor. dan. t.* 292.

ægyptiacum. 19. E. foliis spatulatis dentatis semiamplexicaulibus, floribus globosis. *Mant. p.* 112. 517. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 19.

jamaicense. 20. E. foliis lanceolatis, ferraturis utrinque duabus, caule paucifloro albefcente. *Swarts obf. bot. p.* 306. *t.* 8. *f.* 2.

rivulare. 21. E. foliis cuneatis acutis hirtis, apice utrinque dentatis margine ciliatis, caulinis feffilibus, caule fimpliciufculo erecto paucifloro. *Swarts nov. pl. gen. & fp. p.* 113.

tricuneatum. 22. E. fruticulofum, foliis cuneatis trilobis. *Suppl. p.* 368.

pinnatum. 23. E. foliis pinnatifidis dentatis. *Suppl. p.* 368.

bonarienfe. 24. E. foliis bafi revolutis. *Dill. h. Elth. t.* 257. *f.* 334.

ficulum. 25. E. calicis fquamis inferioribus laxis flores fuperantibus, pedunculis foliofis. *Magn. h. monfp. p.* 76. *ic.*

acre. 26. E. pedunculis alternis unifloris. *Jungh. pl. off. ic. t.* 12.

uniflorum. 27. E. caule unifloro, calice pilofo. *Flor. lapp. t.* 9. *f.* 3.

Drœbachienfe. 28. E. caule floribufque paniculatis, terminali majore. *Flor. dan. t.* 874.

pilofum. 30. E. calicibus pilofis, fquamis laxis. *Walt. flor. carol. p.* 206.

fquarrofum. 31. E. calicibus tomentofis, fquamis patentibus. *Walt. flor. carol. p.* 206.

cymofum. 32. E. foliis dentato-laciniatis, calicibus lævibus. *Walt. flor. carol. p.* 206.

962. TUSSILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* fquamæ æquales, difcum æquantes, fubmembranaceæ.

* *fcapo unifloro.*

Anandria. 1. T. fcapo fquamofo erecto, calice claufo, foliis lyrato-ovatis. *Gmel. flor. fib.* 2. *t.* 68. *f.* 1.

nana. 2. T. fcapo fquamofo erecto, calice fubapetto. *Gmel. flor. fib.* 2. *p.* 143. *t.* 67. *f.* 2.

fibirica. 3. T. fcapo imbricato, foliis ovato-oblongis finuato-dentatis. *Gmel. flor. fib.* 2. *p.* 141. *t.* 67. *f.* 1.

pumila. 4. T. fcapo ebracteato erecto, foliis lyratis incifis denticulatis tomentofis. *Swarts nov. pl. gen. & fp. p.* 113.

nutans. 5. T. scapo ebracteato, flore nutante, foliis lyratis obtusis. *Plum. ic.* 41. *f.* 1.

dentata. 6. T. scapo ebracteato, foliis lanceolatis dentatis villosis. *Plum. ic.* 40. *f.* 2.

alpina. 7. T. scapo subnudo, foliis cordato-orbiculatis crenatis utrinque virentibus. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 246.

discolor. 8. T. scapo subnudo, foliis cordato-orbiculatis crenatis supra lucidis, subtus tomentoso-incanis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 247.

Farfara. 9. T. scapo imbricato, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Flor. dan. t.* 595. *ad polygamias necessarias potius spectat.*

* * *scapo paucifloro.*

silvestris. 10. T. scapo subunifloro subnudo, foliis cordato-orbiculatis inciso-lobatis. *Jacq. flor. austr.* 5. *app. t.* 12.

japonica. 11. T. floribus alternis radiatis. *Mant. p.* 113. *Banks ic. Kæmpf. t.* 27. 28.

* * * *floribus in thyrsum aggregatis*, Petasites.

Petasites. 12. T. thyrso ovato, flosculis femineis nudis paucis. *Flor. dan. t.* 842.

paradoxa. 13. T. thyrso subovato, flosculis femineis nudis multis, hermaphroditis ternis, antheris liberis, foliis triangulari-cordatis denticulatis. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 24. *t.* 3.

hybrida. 14. T. thyrso oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. *Dill. h. Elth. t.* 230. *f.* 297. *an. distincta satis à Petasite.*

spuria. 15. T. thyrso fastigiato, flosculis femineis subpetaloideis plurimis, foliis triangulari-cordatis denticulatis, lobis sinuatis. *Retz. obs. bot.* 1. *p.* 29. *t.* 2. *an distincta a paradoxa?*

rubella. 16. T. thyrso fastigiato, flosculis petaloideis, femineis paucis, foliis subcordatis angulatis. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 145. *t.* 68. *f.* 2.

lutea. 17. T. thyrso fastigiato, pedunculis multifloris, flosculis paucissimis hermaphroditis. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 149. *t.* 69. *f.* D. E.

alba. 18. T. thyrso fastigiato, floribus femineis nudis paucis. *Flor. dan. t.* 524.

frigida. 19. T. thyrso fastigiato, floribus radiatis, foliis subtus incanis. *Flor. dan. t.* 61.

radiata. 20. T. thyrſo faſtigiato, floribus radiatis, foliis utrinque glaberrimis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 140. *t.* 69.

palmata. 21. T. thyrſo faſtigiato, foliis palmatis dentatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 188. *t.* 11.

953. SENECIO. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris longus. *Cal.* conicus, caliculatus, ſquamis apice ſphacelatis.

** floribus floſculoſis.*

hieracifolius 1. S. foliis amplexicaulibus laceris, caule herbaceo erecto. *Mant. p.* 469. *Herm. par. Lugdb. p.* 226. *ic.*

cernuus. 2. S. foliis eroſis auriculatis, floribus nubilibus cernuis. *Suppl. p.* 370. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 98.

japonicus. 3. S. foliis inciſo-pinnatifidis dentatis glabris petiolatis. *Thunb. flor. jap. p.* 315.

vulgaris. 4. S. foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. *Flor. dan. t.* 513.

arabicus. 5. S. foliis ſubbipinnatis petiolatis lævibus. *Mant. p.* 114.

peucedanifolius. 6. S. foliis pinnatis filiformibus. *Suppl. p.* 372.

virgatus. 7. S. foliis lyratis ſubtus tomentoſis, pedunculis unifloris, ſquamis ſubulatis.

purpureus. 8. S. foliis lyratis hirtis, ſuperioribus lanceolatis dentatis. *Breyn. cent. t.* 67.

erubeſcens. 64. S. foliis lyratis viſcoſis utrinque piloſis, ſuperioribus oblongo-lanceolatis, caulibus aſcendentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 190.

divaricatus. 9. S. foliis lanceolatis dentatis ſcabris, ramulis floriferis divaricatis.

perſicifolius. 10. S. foliis lanceolatis integerrimis baſi dentatis.

reclinatus. 11. S. foliis linearibus ſparſis ſcabris recurvis, caule fruteſcente. *Suppl. p.* 369. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 66. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *t.* 5.

biflorus. 70. S. foliis linearibus planis ſubdentatis lævibus, pedunculis ſubifloris, caule fruticoſo. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 72.

Pseudo-China. 12. S. scapo subnudo longissimo. *Dill. h. Elth. t.* 258. *f.* 335.

tussilaginoides. 63. S. foliis crenatis, infimis cordatis petiolatis, superioribus pinnatifidis lyratis. *Walt. flor. carol. p.* 208.

* *floribus radiatis.*

† *radio revoluto.*

triflorus. 13. S. foliis sessilibus sinuatis, calicibus conicis, squamis minimis intactis. *Kniph. bot. orig. cent.* 1. *n.* 80. β) Senecio paucifoliis. *S. G. Gmel. it.* 3. *p.* 171. *t.* 38. *f.* 1.

laniger. 14. S. foliis sessilibus dentatis oblongis. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 155. *t.* 35. *f.* 1.

ægyptius 15. S. foliis amplexicaulibus sinuatis, squamis calicis brevioribus integris sphacelatis. *Mant. p.* 517.

lividus. 16. S. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, squamis calicis brevissimis intactis. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 79.

glaucus. 17. S. foliis amplexicaulibus lanceolatis obtusis dentatis.

trilobus. 18. S. foliis amplexicaulibus, squamis calicis sphacelatis laceris.

cinerascens. 66. S. foliis pinnatifidis tomentosis margine revolutis, panicula patula, calicis squamis exterioribus patulis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 191.

viscosus. 19. S. foliis pinnatifidis viscidis, squamis calicis laxis longitudine perianthii. *Dill. h. Eth. t.* 258. *f.* 336.

silvaticus. 20. S. foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboso erecto. *Flor. dan. t.* 869.

nebrodensis. 21. S. foliis lyratis sinuatis obtusis petiolatis, caule hirto. *Barr. rar. pl. ic. t.* 401.

varicosus. 22. S. foliis ovatis petiolatis dentatis punctulato-varicosis. *Linn. fil. dec.* 9. *t.* 5.

hadiensis. 23. S. foliis ellipticis petiolatis integerrimis denticulatisque, caule fruticoso, flosculis radii quinis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 149. *ic. t.* 19.

leucanthemifolius. 62. S. foliis spatulatis inciso-crenatis, corymbo paucifloro. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 238.

†† *radio patente.*

† *foliis divisis aut compositis.*

pubigerus. 24. S. petiolis radicalibus lanatis, foliis runcinatis, caulibus

simplicissimis, floribus lateralibus sessilibus. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 32.

elegans. 25. S. foliis pinnatifidis æqualibus patentissimis, margine incrassato recurvato. *Seb. mus.* 1. *t.* 22. *f.* 1. β) *Volkam. norimb. p.* 225. *ic.*

squalidus. 26. S. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus distantibus, corollis calice longioribus integris. β) Senecio alpestris. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 387.

crucifolius. 27. S. foliis pinnatifidis dentatis subhirtis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic. t.* 153.

venustus. 67. S. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus acutis dentatis, caule calicibusque glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 192.

alpinus. 28. S. foliis cordatis lyratis grosse serratis, petiolis auritis. *Suppl. p.* 371. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 557. Cineraria alpina.

auriculatus. 71. S. foliis lanceolatis lyrato-pinnatis dentatis nudis, petiolis auritis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 72. *t.* 18.

Jacobæa. 29. S. foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *Knorr del. hort.* 1. *t.* I.

umbellatus. 30. S. foliis pinnato-denticulatis, laciniis distantibus. *Mant. p.* 470.

hastatus. 31. S. foliis pinnato-sinuatis petiolis amplexicaulibus, pedunculis folio triplo longioribus. *Dill. h. Elth. t.* 152. *f.* 184.

abrotanifolius. 32. S. foliis pinnato-multifidis linearibus nudis acutis, pedunculis subbifloris. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 79.

incanus. 33. S. foliis utrinque tomentosis subpinnatis incanis, corymbo subrotundo. *Pluckn. phyt.* 39. *f.* 6.

tenuifolius. 34. S. foliis pinnatis, pinnis linearibus, pedunculis corymbosis caule erecto. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 278.

diffusus. 35. S. foliis bipinnatis linearibus caulibus diffusis. *Suppl. p.* 371.

canadensis. 36. S. foliis bipinnatis linearibus, pedunculis corymbosis.

aureus. 37. S. foliis crenatis, infimis cordatis petiolatis, superioribus pinnatifidis lyratis.

lyratus. 38. S. foliis infimis lyratis dentatis, supremis serratis amplexicaulibus, lobis margine muricatis. *Suppl. p.* 369.

† † *foliis indivisis simplicibusque.*

linifolius. 39. S. foliis linearibus integerrimis, corymbo subsquamato, caule herbaceo. *Barr. pl. rar. ic. t.* 802.

roſmarinifolius. 40. S. foliis linearibus margine revolutis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 369. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 20.

longifolius. 41. S. foliis linearibus ſparſis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 470. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 71.

cruciatus. 42. S. foliis linearibus ſubtus tomentoſis, inferioribus cruciatis, ſuperioribus integris. *Suppl. p.* 371.

aſper. 68. S. foliis lanceolato-linearibus dentatis rigidis, calicibus ſublanuginoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 196.

juniperinus. 43. S. foliis ſubulatis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 371.

byzantinus. 44. S. foliis oblongis remote dentatis ſpinoſo-denticulatis ſupra nudis, caule herbaceo.

eroſus. 45. S. foliis radicalibus petiolatis oblongis ſinuatis ſerratis villoſis, caule unifloro ſubnudo. *Suppl. p.* 370.

ilicifolius. 46. S. foliis ſagittatis amplexicaulibus dentatis, caule herbaceo. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 4.

paludoſus. 47. S. foliis enſiformibus acute ſerratis ſubtus ſubvilloſis, caule ſtricto. *Flor. dan. t.* 385.

nemorenſis. 48. S. foliis lanceolatis biſerratis ſubtus villoſis, caule ramoſo, corollis octonis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 184.

ſarracenicus. 49. S. foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis, floribus corymboſis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 186.

Doria. 50. S. foliis lanceolatis denticulatis nudis ſubdecurrentibus, ſuperioribus ſenſim minoribus, floribus corymboſis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 185.

marginatus. 51. S. foliis lanceolatis glabris ſubarticulatis marginatis amplexicaulibus, corymbo compoſito. *Suppl. p.* 370.

glaſtifolius. 52. S. foliis lanceolatis ſubdentatis lævibus amplexicaulibus. *Suppl. p.* 372.

lanceus. 69. S. foliis lanceolatis baſi cordatis amplexicaulibus lævibus argute ſerratis, caule fruteſcente. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 194.

lanatus. 53. S. foliis ſeſſilibus utrinque lanatis dentatis, infimis ovatis, ſuperioribus lanceolatis. *Suppl. p.* 370.

maritimus. 54. S. foliis ovatis denticulatis carnoſis amplexicaulibus, caule herbaceo procumbente. *Suppl. p.* 369.

angulatus. 55. S. foliis ovatis dentato-angulatis glabris petiolatis. *Suppl. p.* 369.

Doronicum. 56. S. foliis indivisis serratis, radicalibus ovatis subtus villosis, caule indiviso subunifloro. *Jacq flor. austr. 5. app. t. 45.*

populifolius. 57. S. foliis ovatis spatulatis integris obtusis, adultioribus supra glabris, caule fruticoso.

rigidus. 58. S. foliis spatulatis repandis erosis scabris amplexicaulibus, caule fruticoso. *Seb. mus. 1. t. 22. f. 5.*

sibiricus. 59. S. foliis ellipticis laevibus, flosculis radii quinis. *Suppl. p. 370.*

halimifolius. 60. S. foliis obovatis carnosis dentatis, caule fruticoso. *Dill. h. Elth. t. 104. f. 124.*

cordifolius. 61. S. foliis cordatis dentatis, calicibus simplicissimis. *Suppl. p. 372.*

incertae tribus.

ciliatus. 65. S. floribus radiatis, caule piloso, foliis lanceolato-linearibus ciliatis. *Walt. flor. carol. p. 208.*

954. ASTER. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Coroll.* radii plures quam 10. *Cal.* imbricati, squamae inferiores patulae.

* *Fruticosi.*

reflexus. 1. A. foliis ovatis subimbricatis recurvatis serrato-ciliatis, floribus terminalibus. *Commel. h. amst. 2. t. 28.*

Cymbalariae. 46. A. foliis ovatis sinuatis calicibusque imbricatis hirtis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 197.*

crinitus. 2. A. foliis ovato-oblongis acutis subtus tomentosis, calicibus pilo terminatis.

fruticulosus. 3. A. foliis linearibus punctatis, pedunculis unifloris nudis. *Commel. h. aust. 2. t. 27.*

taxifolius. 4. A. suffruticosus, foliis decurrentibus subulatis canaliculatis ciliatis, floribus terminalibus.

carolinianus. 43. A. caule ramosissimo flexuoso subscandente, foliis integris laevibus lanceolatis sessilibus, pedunculis foliosis unifloris. *Walt. flor. carol. p. 208.*

* * *Herbacei.*

† *foliis subintegerrimis.*

† *pedunculis squamatis.*

hyssopifolius. 5. A. foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis striatis, ramulis corymbosis fastigiatis. *Mant. p.* 114. 517.

dumosus. 6. A. foliis linearibus glabris, ramulorum brevissimis paniculatis, rames calicibus cylindricis. *Pluckn. alm. t.*78. *f.*6.

ericoides. 7. A. foliis linearibus glaberrimis, rameis subulatis, caulinis elongatis, calicibus subsquarrosis, caule glabro.

multiflorus. 52. A. foliis linearibus glabriusculis, ramulis secundis, calicibus squarrosis, squamis acutis, caule pubescente. *Dill. hort. Elth.* 40. *t.* 36. *f.* 40.

foliolosus. 53. A. foliis lanceolato-linearibus glabris, ramulorum patentissimis, calicis squamis acutis, caule pubescente. *Dill. hort. Elth.* 39. *t.* 35. *f.* 39.

salicifolius. 54. A. foliis lineari-lanceolatis glabris, calicibus laxis, caule lævi. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 203.

linariifolius. 8. A. foliis linearibus mucronatis scabris striatis, superioribus laxis remotis, calicibus inermibus, ramis fastigiatis. *Pluchn. alm. t.* 14. *f.* 7.

linifolius. 9. A. foliis linearibus scabriusculis, ramis corymbosis fastigiatis, radiis disco subæqualibus.

rigidus. 10. A. foliis linearibus alternis, floribus terminalibus solitariis.

tenuifolius. 11. A. foliis sublinearibus, pedunculis foliosis. *Pluckn. alm. t.* 78. *f.* 5.

nemoralis. 47. A. foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis scabriusculis, ramis filiformibus unifloris; calicibus laxis imbricatis, foliolis acutis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 198.

acris. 12. A. foliis lanceolato-linearibus striatis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliosis. *Lob. ic.* 349.

umbellatus. 48. A. foliis lanceolatis basi attenuatis margine scabris, ramis corymbosis fastigiatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 199.

novæangliæ. 13. A. foliis lanceolatis cordatis pilosis amplexicaulibus, calicibus laxis discum superantibus, foliolis lineari-lanceolatis subæqualibus, caule hispido. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 2.

ciliatus. 44. A. foliis lanceolatis integris ciliatis, floribus subsolitariis, *Walt. flor. carol. p.* 209.

squarrosus. 45. A. foliis squarrosis triangularibus confertis scabris, floribus subpaniculatis. *Walt. flor. carol. p.* 209.

grandiflorus. 14. A. foliis linearibus subamplexicaulibus hispidis ciliatis, ramorum calicisque reflexis. *Mill. h. angl. t.* 282.

paludosus. 49. A. foliis linearibus amplexicaulibus erectis glaberrimis margine scabris, pedunculis subnudis, calicibus squarrosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 201.

patens. 50. A. foliis oblongis integris acutis cordatis subamplexicaulibus scabris, ramis patulis elongatis paucifloris, calicibus subsquarrosis, caule hirto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 201.

æstivus. 51. A. foliis lanceolatis subamplexicaulibus glabris margine scabris, calicibus laxis, foliolis æqualibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 203.

undulatus. 15. A. foliis serratis pilosis undulatis, inferioribus cordatis, petiolis alatis, caule hispido, ramulis virgatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 96. *ic.*

coriaceus. 16. A. foliis ovatis superne sulcatis subtus lanatis, pedunculis unifloris lanatis. *Forster flor. austr. p.* 56.

concolor. 17. A. foliis ovatis sessilibus, caule simplicissimo, racemo terminali.

† † *pedunculis nudis.*

Tripolium. 18. A. foliis lineari-lanceolatis carnosis glabris trinerviis, calicis squamis submembranaceis obtusis. *Flor. dan. t.* 615.

vernus. 19. A. foliis radicalibus lanceolatis obtusis, caule subnudo filiformi subramoso.

Amellus. 20. A. foliis oblongo-lanceolatis integris scabris, ramis nudiusculis corymbosis, calicibus imbricatis subsquarrosis, squamis obtusis interioribus membranaceis apice coloratis. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 435.

sibiricus. 21. A. foliis lanceolatis subamplexicaulibus piloso-scabris serratis, calicibus laxis hispidis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 80. *f.* 1.

alpinus. 22. A. foliis subspatulatis hirtis, caule simplici unifloro. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 88.

tenellus. 23. A. foliis filiformibus aculeato-ciliatis, calicibus hemisphæricis foliolis æqualibus. *Mant. p.* 471. *Curtis bot. magaz. t.* 33.

divaricatus. 24. A. foliis ovatis serratis, floralibus integerrimis obtusiusculis amplexicaulibus, ramis divaricatis. *Pluckn. alm. t.* 79. *f.* 1.

⊢ ⊢ *foliis serratis.*

† *pedunculis nudis.*

cordifolius. 25. A. foliis cordatis petiolatis subtus pilosis, petiolis subsimplicibus, caule hirto, ramis paniculatis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 22. *f.* 34.

corymbosus. 59. A. foliis cordatis glabris acuminatis petiolatis, petiolis simplicibus, caule glabro, ramis fastigiatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 207.

paniculatus. 60. A. foliis glabris acutis petiolatis, radicalibus cordatis, caulinis ovatis, summis lanceolatis integris, caule glabro paniculato, calicibus laxis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 207.

puniceus. 26. A. foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris, caule hispido, ramis paniculatis, calicibus laxis discum superantibus. *Herm. par. Lugdb. p.* 651. *ic.*

annuus. 27. A. foliis pilosiusculis, superioribus lanceolatis, inferioribus subovatis crenatis, calicibus hemisphæricis, squamis strigosis subæqualibus. *Flor. dan. t.* 486.

scaber. 28. A. foliis oblongis scabris, pedunculis paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 316.

† † *pedunculis squamosis.*

indicus. 29. A. foliis ovato-oblongis, floralibus ovali-lanceolatis, ramulis unifloris. *Pluckn. alm. t.* 149. *f.* 4.

misus. 30. A. foliis sessilibus lanceolatis subserratis glabris, calicis squamis acutis, disco radiis æquali, caule villosiusculo.

lævis. 31. A. foliis amplexicaulibus lucidis oblongis, radicalibus subserratis, caule glabro, ramis simplicibus subunifloris.

novi Belgii. 32. A. foliis subamplexicaulibus lanceolatis glabris margine scabris, inferioribus serratis, caule glabro, ramis subdivisis, calicibus laxis. *Herm. par. Lugdb. p.* 67. *ic.*

Tradescanti. 33. A. foliis lanceolatis sessilibus cauleque tereti glabris, ramis virgatis.

junceus. 55. A. foliis lanceolato-linearibus sessilibus glabris, infimis subserratis, ramulorum lanceolatis, caule glabriusculoso, ramis virgatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 204.

pendulus. 56. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris, ramulorum remotiusculis, caule pubescente, ramis divaricatissimis pendulis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 204.

diffusus. 57. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris, caule pubescente, ramis patentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 205.

divergens. 58. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris, caulinis lineari-lanceolatis, caule pubescente, ramis patentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 205.

tardiflorus. 34. A. foliis glabris lanceolatis basi attenuatis sessilibus, calicibus laxis glabris.

spectabilis. 61. A. foliis lanceolatis scabriusculis, inferioribus serratis, ramis corymbosis, calicibus laxis squarrosis foliaceis, squamis subcuneiformibus. *Ait hort. Kew.* 3. *p.* 209.

Radula. 62. A. foliis lanceolatis acuminatis rugosis scaberrimis, calicis squamis lanceolatis obtusis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 210.

holosericeus. 35. A. foliis oblongo-lanceolatis subtus argenteo-sericeis, pedunculis unifloris foliosis. *Forst. flor. austr. p.* 56.

mutabilis. 36. A. foliis subamplexicaulibus lævibus lanceolatis, calicibus laxis, caule glabro, ramulis virgatis. *Plackn. alm. t.* 326. *f.* 1.

tataricus. 37. A. foliis radicalibus lanceolato-ovatis scabris, caule paucifloro. *Suppl. p.* 373.

sinensis. 38. A. foliis ovato-oblongis integris sinuatisve ciliatis, calicibus ciliatis foliosis patentibus. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 3. 4. 5.

macrophyllus. 39. A. foliis oblongis, caulinis cordatis petiolatis, summis ovatis sessilibus. *Otterit. stirp. nov.* 2. *t.* 66.

crispus. 40. A. foliis linearibus serrato-crispis, caule tomentoso, radio disco breviore. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 150.

††† *pedunculis nullis.*

hispidus. 41. A. foliis infimis oblongis crenatis scabris, caulinis lanceolatis integris ciliatis, caule scabro, floribus ramos terminantibus. *Thunb. flor. jap. p.* 315. *Banks ic. Kæmpf. t.* 29.

*** *incertæ tribus.*

ericæfolius. 42. A. calice cylindrico, squamis membranaceis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 150.

salicinus. 63. A. foliis lanceolatis serratis margine scabris, ramis sublinearibus integerrimis, pedunculis alternis subnudis. *Scholl. flor. barb. t.* 1.

955. SOLIDAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cor.* radii circiter 5. *Cal.* ſquamæ imbricatæ, conniventes.

ſuaveolens. 1. S. foliis lineari-lanceolatis integerrimis acutis ſubquinquenerviis punctatis glabris teneirime ciliatis, racemis paniculatis ſecundis, caule erecto pubeſcente. *Schœpf. it.* 1. *p.* 166. *Pluckn. alm. t.* 116. *f.* 6.

viminea. 24. S. caule erecto ſubpubeſcente, foliis lineari-lanceolatis membranaceis baſi attenuatis glabris margine ſcabris, infimis ſubſerratis, racemis erectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

dubia. 2. S. foliis lanceolatis ſeſſilibus nervoſis ſupra ſcabris rariter denticulatis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 19. *t.* 10.

mexicana. 3. S. foliis lanceolatis ſubcarnoſis lævibus integerrimis, racemis paniculatis erectis, pedunculis ſquamoſis, caule obliquo glabro.

ſerotina. 4. S. racemis terminalibus folioſis ſecundis, foliis lanceolatis ſubſerratis deflexis. *Retz obſ. bot.* 2. *p.* 26. *an diſtincta ſatis ſpecies?*

piloſa. 18. S. panicula terminali, caule piloſo, foliis ovatis integris ciliatis. *Walt. flor. carol. p.* 207.

ſempervirens. 5. S. foliis lineari-lanceolatis ſubcarnoſis lævibus integerrimis margine ſcabro, racemis paniculatis ſecundis, caule erecto glabro. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 5.

gigantea. 25. S. caule erecto glabro, foliis lanceolatis ſerratis glabris margine ſcabris, racemis paniculatis ſecundis, pedunculis hirtis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

arguta. 26. S. caule erecto glabro, foliis glabris argute inæqualiter ſerratis, caulinis ellipticis, radicalibus ovato-oblongis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

juncea. 27. S. caule erecto glabro, foliis lanceolatis glabris margine ſcabris, inferioribus ſerratis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

elliptica. 28. S. caule erecto glabro, foliis ellipticis lævibus ſerratis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 214.

stricta. 29. S. caule erecto glabro, foliis caulinis lanceolatis glabris margine scabris integerrimis, radicalibus serratis, racemis paniculatis erectis, pedunculis glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 216.

lævigata. 30. S. caule erecto lævi, foliis carnosis lanceolatis integerrimis lævibus, racemis paniculatis erectis, pedunculis squamosis villosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

Sera. 31. S. caule erecto tereti lævi, foliis lineari-lanceolatis triplinerviis glabris margine asperis serratis, racemis paniculatis secundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

cæsia. 6. S. foliis lanceolatis serratis glabris, racemis erectis, caule recto lævi. *Dill. h. Elth. t.* 307. *f.* 395.

lateriflora. 7. S. racemis paniculatis secundis subrecurvis, foliis lanceolatis subtriplinerviis glabris margine scabris, caule erecto pilosiusculo.

altissima. 8. S. caule erecto hirto, paniculis secundis, foliis enerviis serratis rugosis scaberrimis lanceolatis. *Mart. cent. t.* 14.

canadensis. 9. S. caule villoso erecto, racemis paniculatis secundis recurvis, foliis lanceolatis triplinerviis serratis scabris. *Pluckn. alm. t.* 263. *f.* 1.

procera. 19. S. caule erecto villoso, racemis spiciformibus erectis, innuptis nutantibus, foliis lanceolatis serratis triplinerviis scabris subtus villosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

reflexa. 20. S. caule erecto villoso, racemis paniculatis subsecundis, foliis lanceolatis subserratis triplinerviis scabris reflexis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

petiolaris. 21. S. caule erecto villoso, racemis erectis, foliis ellipticis scabriusculis petiolatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

nemoralis. 22. S. caule erecto tomentoso, foliis caulinis lanceolatis hispidis integerrimis, radicalibus subcuneiformibus serratis, racemis paniculatis secundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

bicolor. 10. S. racemis erectis, caule foliisque ellipticis pilosis, inferioribus serratis, calicis squamis obtusis. *Mant. p.* 114. *Pluckn. alm. t.* 114. *f.* 8.

minuta. 11. S. caule simplicissimo piloso, foliis lanceolatis acutis serratis glabris, racemo terminali simplici erecto. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 7. 8.

aspera. 23. S. caule erecto tereti piloso, racemis paniculatis secundis, foliis ovatis subellipticis scaberrimis rugosis serratis enerviis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 212.

Virga-aurea. 12. S. caule erecto tereti pubescente superne ramoso, racemis erectis, foliis inferioribus ellipticis serratis. *Flor. dan. t.* 663.

cambrica. 33. S. caule simplicissimo pubescente, foliis cuneiformi-lanceolatis serratis subpilosis, racemis erectis. *Dill. hort. Elth.* 413. *t.* 306. *f.* 393.

multiradiata. 34. S. caule subvilloso, foliis sessilibus lanceolatis glabris ciliatis, inferioribus apice serratis, racemo terminali erecto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 218.

flexicaulis. 13. S. caule flexuoso glabro angulato, foliis ovatis acuminatis serratis glabris, racemis erectis. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 3. *an eadem cum latifolia.*

ambigua. 32. S. caule subflexuoso angulato glabro ramoso, foliis oblongo-lanceolatis serratis subtus subpilosis, racemis erectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 217.

latifolia. 14. S. caule erecto, foliis ovatis acuminatis serratis, racemis lateralibus simplicibus. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 4.

rigida. 15. S. caule foliisque ovato-oblongis pilosis scabris, caulinis integerrimis, infimis serratis floriferis paniculatis, racemis compactis erectis. *Herm. par Lugdb. p.* 243. *ic.*

noveboracensis. 16. S. foliis radicalibus ovato-oblongis petiolatis, caule nudiusculo ramoso fastigiato.

arborescens. 17. S. caule arboreo, paniculis corymbosis strictis terminalibus, foliis ovato-subrotundis acutis repandis petiolatis. *Forst. flor. austr. p.* 56.

951. CINERARIA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* simplex, polyphyllus, æqualis.

geifolia. 1. C. pedunculis ramosis, foliis reniformibus suborbiculatis sublobatis dentatis petiolatis. *Seb. mus.* 1. *t.* 22. *f.* 2.

humifusa. 2. C. pedunculis unifloris, foliis reniformibus subangulatis; petiolis apice auriculatis nudisve. *Herit. sert. angl. p.* 25.

cymbalarifolia. 3. C. foliis lyratis, impari reniformi denticulato, caulinis summis amplexicaulibus lobatis integerrimis.

tussilaginis. 4. C. floribus laxe paniculatis, foliis reniformi-cordatis multangulis subtus tomentosis, petiolis basi auritis. *Herit. sert. angl. p.* 26.

sibirica. 5. C. racemo simplici, foliis cordatis obtusis denticulatis lævibus, caule simplicissimo monophyllo. *Mant. p.* 472. *Amm. ruth. t.* 24.

cordifolia. 6. C. panicula pauciflora, foliis caulinis petiolatis cordatis acute serratis glabris, caule angulato. *Suppl. p.* 371. 375. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 176. β) *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 177.

aurita. 7. C. floribus corymbosis, foliis cordatis subangulatis subtus tomentosis, petiolis basi biauritis. *Herit. sert. angl. p.* 26. *t.* 31.

malvæfolia. 8. C. floribus cymosis, foliis cordatis angulatis subtus subtomentosis, petiolis simplicibus. *Herit. sert. angl. p.* 26. *t.* 32.

cruenta. 9. C. floribus cymosis, foliis cordatis angulatis subtus purpurascentibus, petiolis basi auritis. *Herit. sert. angl. p.* 26. *t.* 33.

elongata. 10. C. foliis subcordatis erosis, pedunculis longissimis subulato-squamosis. *Suppl. p.* 374.

lanata. 11. C. pedunculis unifloris, foliis cordato-subrotundis septangulis subtus lanuginosis. *Herit. sert. angl. p.* 25. *t.* 30. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 177. *t.* 19. *f.* 1.

glauca. 12. C. racemo simplici, foliis spatulato-cordatis integerrimis, caule simplicissimo. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 74.

crispa. 13. C. floribus paniculatis, foliis caulinis spatulato-oblongis serratis obtusis amplexicaulibus basi dilatato-dentatis. *Suppl. p.* 376. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 178.

longifolia. 14. C. foliis oblongis obsolete denticulatis. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 181.

cacalioides. 15. C. foliis oblongis teretibus carnosis, panicula terminali elongata pauciflora, pedunculis alternis. *Suppl. p.* 374.

glabra. 16. C. foliis oblongis acutis subdenticulatis enerviis utrinque glabris subcarnosis, caule fruticoso corymboso, calicibus cylindricis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 113.

linifolia. 17. C. pedunculis unifloris, foliis sparsis, caule fruticoso.

japonica. 18. C. foliis ensiformibus dentatis tomentosis, floribus terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 317.

integrifolia. 19. C. floribus umbellatis, foliis denticulatis lanceolatis, radicalibus spatulatis. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 179. γ) *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 180.

aurea. 20. C. floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis subtus tomentosis.

denticulata. 21. C. foliis lanceolatis glabris denticulatis, floribus paniculatis. *Suppl. p.* 375.

lineata. 22. C. foliis lanceolatis subtus tomentosis apice serratis basi dentatis. *Suppl. p.* 375.

discolor. 23. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subdenticulatis glabris subtus niveo-tomentosis, caule fruticoso corymboso. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 114.

americana. 24. C. fruticosa, paniculis axillaribus, foliis alternis petiolatis lato-lanceolatis serratis supra glabris subtus incanis. *Suppl. p.* 373.

palustris. 25. C. floribus corymbosis, foliis lato-lanceolatis dentato-sinuatis, caule villoso. *Flor. dan. t.* 573.

hastifolia 26. C. foliis hastatis, laciniis lateralibus bifidis divaricatis. *Suppl. p.* 376.

sonchifolia. 27. C. foliis amplexicaulibus sinuatis difformibus. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 21. *f.* 1.

senecionis. 28. C. foliis sinuato-pinnatifidis glabris, caulinis subsessilibus, floribus subcorymbosis. *Herit. sert. angl. p.* 27.

viscosa. 29. C. pedunculis unifloris, foliis pinnatifido-lobatis acutis viscidis subcarnosis. *Herit. sert. angl. p.* 25.

maritima. 30. C. floribus paniculatis, foliis pinnatifidis tomentosis laciniis sinuatis, caule frutescente. *Kniph. bot. orig. cent.* 6. *n.* 68.

canadensis. 31. C. floribus paniculatis, foliis pinnatifidis subvillosis, laciniis sinuatis, caule herbaceo.

capillacea. 32. C. foliis pinnatis, pinnis capillaceis integris. *Suppl. p.* 375.

lobata. 33. C. floribus subcorymbosis, foliis subrotundis multilobatis glabris, petiolis basi auritis, calicibus subcaliculatis. *Herit. sert. angl. p.* 26. *t.* 34.

purpurata. 34. C. caule subbifloro, foliis obovatis subtomentosis. *Mant. p.* 285.

alata. 35. C. caule herbaceo, foliis obovatis decurrentibus, floribus corymbosis. *Suppl. p.* 374.

Amelloides. 36. C. pedunculis unifloris, foliis oppositis ovatis nudis, caule suffruticoso. *Mill. h. angl. t.* 76. *f.* 2.

repanda. 37. C. paniculis compositis racemosis diffusis, foliis petiolatis ovatis repando-sinuatis subtus tomentosis, caule arboreo. *Forst. flor. austr. p.* 56. *Charact. gen. t.* 46.

scapiflora. 38. C. pedunculis longissimis unifloris, foliis ovatis glabris duplicato-dentatis. *Suppl. p.* 25.

multiflora. 39. C. floribus cymosis, foliis cordato-ovatis subtus tomentosis, petiolis dimidio auritis. *Herit. sert. angl. p.* 26.

perfoliata. 40. C. foliis ovato-cordatis amplexicaulibus, pedunculis unifloris elongatis. *Suppl. p.* 375.

rotundifolia. 41. C. paniculis paucifloris, foliis petiolatis ovato-subrotundis integerrimis subtus tomentosis, caule arboreo. *Forst. flor. austr. p.* 56. *Charact. gen. t.* 46.

caroliniensis. 42. C. floribus paniculatis, foliis petiolatis oblongis denticulatis lævibus, caule herbaceo. *Walt. flor. carol. p.* 207.

956. INULA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Antheræ* basi in setas 2 desinentes.

squarrosa. 1. I. foliis sessilibus ovalibus lævibus reticulato-venosis subcrenatis, calice squarroso. *Pluckn. alm. t.* 16. *f.* 1.

cærulea. 2. I. foliis decurrentibus obovatis subserratis, caule suffruticoso, floribus sessilibus terminalibus. *Mant. p.* 471. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 553. Aster polifolius.

provincialis. 3. I. foliis subserratis subtus tomentosis, radicalibus petiolatis ovatis, caule erecto unifloro.

odora. 4. I. foliis amplexicaulibus dentatis hirsutissimis, radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis, caule paucifloro. *Col. ecphr.* 1. *p.* 253. *ic.*

Helenium. 5. I. foliis amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calicum squamis ovatis. *Flor. dan. t.* 728.

spiræifolia. 6. I. foliis subsessilibus ovato-oblongis nudis reticulatis confertis serrulatis, floribus terminalibus subsessilibus.

Oculus Christi. 7. I. foliis amplexicaulibus oblongis integris hirsutis, caule piloso corymboso. *Jacq. flor. austr.* 3. *p.* 223.

arabica. 8. I. foliis oblongis sessilibus, pedunculis filiformibus, calicibus cylindricis. *Mant. p.* 115. *Pluckn. alm. t.* 149. *f.* 4.

dubia. 9. I. foliis sessilibus oblongis ciliatis, caule unifloro. *Thunb. flor. jap. p.* 318.

bifrons. 10. I. foliis decurrentibus oblongis denticulatis, floribus congeſtis terminalibus ſubſeſſilibus. *Bocc. muſ.* 1. *t.* 121.

dyſenterica. 11. I. foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoſo paniculato, calicis ſquamis ſetaceis. *Flor. dan. t.* 410.

indica. 12. I. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis ſerratis, pedunculis unifloris filiformibus, floribus globoſis. *Burm. zeyl. t.* 55. *f.* 2.

undulata. 13. I. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis undulatis. *Mant. p.* 115.

Pulicaria. 14. I. foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis, radio breviſſimo. *Flor. dan. t.* 613.

ſuaveolens. 15. I. foliis lanceolatis ſubſerratis, inferioribus petiolatis, ſuperioribus ſeſſilibus, caule multifloro ſubcorymboſo. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 51.

britannica. 16. I. foliis amplexicaulibus lanceolatis ſerratis diſtinctis ſubtus villoſis, caule ramoſo erecto villoſo. *Flor. dan. t.* 413.

chryſocomoides. 17. I. foliis ſemiamplexicaulibus linearibus margine revolutis minutis, pedunculis unifloris. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 239.

germanica. 18. I. foliis ſeſſilibus lanceolatis recurvis ſcabris, floribus ſubfaſciculatis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 134.

ſalicina. 19. I. foliis lanceolatis recurvis ſerrato-ſcabris, ramis angulatis, floribus inferioribus altioribus. *Flor. dan. t.* 786.

hirta. 20. I. foliis ſeſſilibus lanceolatis recurvis ſubſerrato-ſcabris, caule teretiuſculo ſubpiloſo, floribus inferioribus altioribus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 358.

mariana. 21. I. foliis ſeſſilibus lanceolatis ſubſerratis piloſis, pedunculis ſubunifloris ſubviſcoſis, foliolis linearibus. *Mill. dict. ic. t.* 56.

Buboninum. 22. I. foliis lanceolatis rigidulis denticulatis ſubvilloſis ſeſſilibus, caule ramiſque ſubbifloris, calice ſquarroſo. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 19.

japonica. 23. I. foliis ſeſſilibus lanceolatis denticulatis, pedunculis virgatis unifloris. *Thumb. flor. jap. p.* 318. *Banks ic. Kæmpf. t.* 30.

montana 24. I. foliis lanceolatis hirſutis integerrimis, caule unifloro, calice brevi imbricato. *Lob. ic.* 350.

fœtida. 25. I. foliis lanceolato-linearibus integerrimis, corymbis ramoſis, radiis florum breviſſimis. *Bocc. ſic. t.* 13.

aromatica. 26. I. foliis linearibus integerrimis tomentosis sparsis, caule fruticoso. *Pluckn. alm. t.* 326. *f.* 2.

ensifolia. 27. I. foliis sessilibus linearibus acuminatis nervosis glabris sparsis, caule subunifloro. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 162.

crithmifolia. 28. I. foliis linearibus carnosis tricuspidatis.

pinifolia. 29. I. foliis subulato-linearibus triquetris confertissimis, caule fruticoso. *Mant. p.* 472. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 31.

æstuans. 30. I. foliis spatulatis subtus tomentosis. *Plum. ic.* 41. *f.* 2.

958. ARNICA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Corollul.* radii filamentis 5 sine antheris.

montana. 1. A. foliis ovatis integris, caulinis geminis oppositis. *Flor. dan. t.* 63.

ciliata. 2. A. foliis amplexicaulibus ovatis dentatis ciliatis glabris, caule simplici unifloro. *Thunb. flor. jap. p.* 318.

crocea. 3. A. foliis ovatis repando-denticulatis subtus tomentosis. *Burm. afr. t.* 55. & *t.* 56. *f.* 2.

glacialis. 4. A. foliis alternis repando-subdentatis, radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis. *Wulfen ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 230. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 47.

scorpioides. 5. A. foliis alternis dentatis mollibus oblongo-ovatis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 349.

Doronicum. 6. A. foliis alternis subserratis oblongis asperis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 92.

hirsuta. 7. A. foliis oblongis hirsutis subtus tomentosis scapo nudo unifloro. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 151.

piloselloides. 8. A. foliis integerrimis ellipticis villosis, scapo unifloro aphyllo lanato, calice radium æquante.

maritima. 9. A. foliis lanceolatis, inferioribus serratis, caule folioso multifloro.

Oporina. 10. A. fruticosa, foliis lanceolatis calloso-crenatis subtus tomentosis, pedunculis unifloris solitariis terminalibus squamatis. *Forst. flor. austr. p.* 56.

japonica. 11. A. foliis inciso-palmatis denticulatis, floribus terminalibus subbinis. *Thunb. flor. jap. p. p.* 319.

palmata. 12. A. foliis inciso-palmatis dentatis, floribus paniculatis, *Thunb. flor. jap. p.* 319.

Gerbera. 13. A. foliis pinnatifidis, laciniis rotundatis. *Burm. afr. t.* 56. *f.* 1.

corono-pifolia 14. A. foliis pinnatis, pinnis linearibus.

959. DORONICUM. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Calic.* squamæ 2plicis ordinis æquales, disco longiores. *Sem.* radii nuda pappoque destituta.

Pardalianches. 1. D. foliis cordatis obtusis denticulatis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 350. *β)* Doronicum austriacum. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 130.

altaicum. 2. D. foliis ovalibus decurrenti-amplexicaulibus alternis. *Pallas act. Petrop.* 1779. 2. *p.* 271. *t.* 16.

plantagineum. 3. D. foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis.

Bellidiastrum. 4. D. caule nudo simplicissimo unifloro. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 400.

acaule. 5. D. scapis nudis simplicissimis multifloris tomentosis. *Walt. flor. carol. p.* 205.

lævifolium. 6. D. caule subsimplici, foliis lævibus subdentatis. *Walt. flor. carol. p.* 205.

ramosum. 7. D. caule ramoso, foliis lanceolatis subhirsutis sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 205.

960. PERDICIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris sessilis. *Corollul.* 2labiatæ.

semiflosculare. 1. P. scapo unifloro nudo, flore semiflosculoso.

radiale. 2. P. floribus subradiatis, calice exteriore tetraphyllo, caule fruticoso. *Brown. jam. t.* 33. *f.* 1.

brasiliense. 3. P. floribus subradiatis, calicibus simplicibus, caule herbaceo. *Mant. p.* 115.

lævigatum. 4. P. floribus subradiatis, caule suffruticoso, foliis lanceolatis acutis integerrimis. *Bergius act. Stockh.* 1772. *p.* 228. *t.* 7.

magellanicum. 5. P. foliis runcinatis, caule diphyllo simplici unifloro. *Suppl. p.* 376.

tomentosum. 6. P. foliis lyratis subtus tomentosis. *Thunb. flor. jap. p.* 319.

1421. MUTISIA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* cylindricus, imbricatus. *Corollul. radii* ovali-oblongæ : *disci* trifidæ.

Clematis. 1. MUTISIA. *Suppl. p.* 373.

161. HELENIUM. *Recept.* nudum : *radii* paleaceum. *Pappus* 5dentatus. *Cal.* simplex multipartitus. *Corollulæ* radii semitrifidæ.

autumnale. 1. H. foliis serratis decurrentibus glaberrimis. *Pluckn. amalth. t.* 372. *f.* 4.

æstivale. 2. H. foliis integerrimis, corollulis radii quadrifidis. *Walt. flor. carol. p.* 210.

vernale. 3. H. foliis integerrimis, corollulis radii trifidis. *Walt. flor. carol. p.* 210.

serotinum 4. H. foliis serratis sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 210.

pubescens. 5. H. foliis pubescentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 227.

BOLTONIA. *Cal.* imbricatus, squamis linearibus. *Pappus* obsolete dentatus, 2cornis. *Recept.* favosum. *Germ.* compressa, verticalia.

glastifolia 1. B. foliis inferioribus serratis. *Herit. sert. angl. p.* 27. *t.* 35.

asteroides. 2. B. foliis integerrimis. *Herit. sert. ang. p.* 27. *t.* 36. *Mant. p.* 116. Matricaria asteroides.

962. BELLIS. *Recept.* nudum, conicum. *Pappus* o. *Cal.* hemifphæricus : fquamis æqualibus. *Sem.* obovata.

perenis. 1. B. fcapo nudo. *Flor. dan. t.* 503.

annua. 2. B. caule fubfoliofo ramofo multifloro.

arabica. 3. B. foliis lanceolatis ciliatis, petiolo alato lineari. *Forsk. flor. æg. amb. p.* 151.

1322. BELLIUM. *Recept.* nudum. *Sem.* turbinata, corona paleacea 8phylla *pappo*que ariftato. *Cal.* foliolis æqualibus.

bellidioides. 1. B. fcapis nudis filiformibus. *Mant. p.* 285. *Triumf. obf. t.* 82.

minutum. 2. B. caule foliofo. *Mant. p.* 286. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 561. Pectis minuta. *Schreb. n. act. Upf.* 1. *t.* 5. *f.* 2.

964. TAGETES. *Recept.* nudum. *Pappus* paleis 5 erectis. *Cal.* 1phyllus, 5dentatus, tubulofus. *Flofculi* radii 5 perfiftentes.

patula. 1. T. caule fubdivifo patulo. *Knorr. del. hort.* 1. *t.* S. 7. 8.

erecta. 2. T. caule fimplici erecto, pedunculis nudis unifloris. *Knor del. hort.* 1. *t.* S. 6. a. β) *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 6. γ) *Col. ecphr.* 2. *t.* 46. *f.* 1. δ) *Col. ecphr.* 2. *t.* 46.

minuta. 3. T. caule fimplici recto, pedunculis fquamofis multifloris. *Dill. h. Elth. t.* 280. *f.* 362.

963. LEYSERA. *Recept.* fubpaleaceum. *Pappus* paleaceus, difci etiam plumofus. *Cal.* fcariofus.

gnaphalodes. 1. L. foliis fparfis, floribus pedunculatis. *Seb. muf.* 2. *t.* 66. *f.* 6.

Callicornia. 2. L. foliis trifariis, floribus fubfeffilibus. *Mant. p.* 286. *Pluckn. phyt.* 350. *f.* 4.

caroliniana. 3. L. foliis radicalibus rotundatis subserratis hirsutis, caulinis oppositis. *Walt. flor. carol. p.* 211.

paleacea. 4. L. foliis triquetris apice callosis recurvatis, *an potius Athanasiæ species?*

974. ZINNIA. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* mucronibus 2 erectis. *Cal.* ovato-cylindricus, imbricatus. *Floscul.* radii 5 persistentes, integri.

pauciflora. 1. Z. floribus sessilibus. *Mill. h. angl. t.* 64.

multiflora. 2. Z. floribus pedunculatis, foliis petiolatis. *Linn. dec.* 23. *t.* 12.

verticillata. 3. Z. foliis verticillatis integris.

Bidens. 4. Z. foliis pinnatifidis, caulinis sessilibus, seminum aristis longis retro aculeatis. *Kœnig. apud Retz. obs. bot.* 5. *p.* 28.

965. PECTIS. *Recept.* nudum. *Pappus* aristatus. *Cal.* 5phyllus, cylindricus. *Flosculi* radii 5.

linifolia. 1. P. foliis linearibus integerrimis utrinque lævibus. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 149. *f.* 3.

punctata. 2. P. foliis linearibus sessilibus subtus punctatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 196.

ciliaris. 3. P. foliis linearibus semiamplexicaulibus basi ciliatis. *Plum. ic.* 51. *f.* 2.

humifusa. 4. P. foliis ovatis subtus punctatis basi utrinque ciliatis, caulibus procumbentibus. *Plunb. ic.* 84. *t.* 95. *f.* 2.

966. CHRYSANTHEMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* marginatus. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus squamis marginalibus membranaceis.

* *Leucanthema.*

fruteſcens. 1. Chr. fruticoſum, foliis carnoſis linearibus pinnatis dentatis apice trifidis. *Wal. hort. t.* 24.

corymboſum. 2. Chr. foliis pinnatis inciſo-ſerratis, caule multifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 379.

inodorum. 3. Chr. foliis pinnatis multifidis, caule ramoſo diffuſo. *Flor. dant. t.* 896.

Achilleæ. 4. Chr. foliis bipinnatis, pinnis imbricatis, caule ſtricto multifloro. *Mich. nov. pl. gen. t.* 29.

monſpelienſe. 5. Chr. foliis imis palmatis, foliolis linearibus pinnatifidis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 93.

alpinum. 6. Chr. foliis cuneiformibus pinnatifidis, laciniis integris, caulibus unifloris. *Barrel. pl. rar. ic.* 458. *f.* 3.

atratum. 7. Chr. foliis omnibus cuneiformibus oblongis inciſis carnoſis.

Leucanthemum. 8. Chr. foliis amplexicaulibus oblongis ſuperne ſerratis inferne dentatis. *Blackw. herb. t.* 42. *β) Barrel. pl. rar. ic. t.* 458. *f.* 2.

ſerotinum. 9. Chr. foliis lanceolatis ſuperne ſerratis utrinque acuminatis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 90.

carolinianum. 26. Chr. foliis lanceolatis integris lævibus, caule ramoſiſſimo. *Walt. flor. carol. p.* 204.

montanum. 10. Chr. foliis imis ſpatulato-lanceolatis ſerratis, ſummis linearibus. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 91. *an mera* Chr. *leucanthemi varietas ?*

graminifolium. 11. Chr. foliis linearibus ſubintegerrimis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 92.

Balſamita. 12. Chr. foliis ovatis oblongis ſerratis auriculatis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 89.

paludo-ſum. 13. Chr. foliis omnibus ſpatulatis inciſo-ſerratis carnoſis; ramis unifloris. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 241.

** *Chryſanthema.*

indicum. 14. Chr. foliis ſimplicibus ovatis ſinuatis angulatis ſerratis acutis. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 44. *β) Pluckn. alm. t.* 160. *f.* 6.

Myconis. 15. Chr. foliis lingulatis obtuſis ſerratis, calicis ſquamis æqualibus. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 94.

floſculo-ſum. 16. Chr. floſculis omnibus uniformibus hermaphroditis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 9. *f.* 16. *β)* Cotula grandis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 564. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 81.

ſegetum. 17. Chr. foliis amplexicaulibus ſuperne laciniatis inferne dentato-ſerratis. *Bulliard herb. Franc. t.* 339.

arcticum. 18. Chr. foliis ſimplicibus cuneiformibus ſubpalmatis multifidis obtuſis. *Gmel. flor. ſibir.* 2. *t.* 84.

pinnatifi-dum. 19. Chr. fruticoſum, foliis ſimplicibus oblongis pinnatifidis; laciniis ſerratis. *Suppl. p.* 377.

corona-rium. 20. Chr. foliis pinnatis inciſis extrorſum latioribus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 2. 3.

pectina-tum. 21. Chr. foliis pinnatis linearibus parallelis acutis integerrimis, pedunculis ſolitariis unifloris.

italicum. 22. Chr. foliis bipinnatis ſerratis, florum radiis longitudine diſci, caule procumbente. *Mant. p.* 116. *Mich. nov. pl. gen. t.* 29.

millefo-liatum. 23. Chr. foliis bipinnatis dentatis, caule decumbente, corollæ radiis diſco brevioribus. *Sp. pl.* 1263. Anthemis millefolia. *Mill. dict. ic. t.* 9.

bipinna-tum. 24. Chr. foliis bipinnatis ſerratis villoſis, radiis diſco brevioribus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 85. *f.* 1.

*** *incertæ tribus.*

japani-cum. 25. Chr. foliis petiolatis apice inciſis dentatis. *Suppl. p.* 321.

967. MATRICARIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* hemifphæricus, imbricatus, fquamis marginalibus folidis, acutiufculis.

proftrata. 1. M. foliis fimplicibus ovatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris, ramis decumbentibus. *Swarts nov. pl. gen. & fp. p.* 114.

Parthenium. 2. M. foliis compofitis planis, foliolis ovatis incifis, pedunculis ramofis. *Flor. dan. t.* 674.

argentea. 3. M. foliis bipinnatis, pedunculis folitariis.

maritima. 4. M. receptaculis hemifphæricis, foliis bipinnatis fubcarnofis fupra convexis fubtus carinatis. *Raj. angl.* 3. *t.* 7. *f.* 1.

fuaveolens. 5. M. receptaculis conicis, radiis deflexis, fquamis calicis margine æqualibus, *an vere diftincta a chamomilla?*

Chamomilla. 6. M. receptaculis conicis, radiis patentibus, fquamis calicis margine æqualibus. *Zorn pl. off. ic. t.* 139.

1420. UNXIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 5phyllus, foliolis ovatis, *Flofculi radii & difci* 5.

camphorata. 1. Unxia. *Suppl. p.* 368.

MADIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 8phyllus. *Sem.* plano-convexa.

fativa. 1. M. foliis lineari-lanceolatis petiolatis. *Molin. hift. nat. Chil. p.* 114.

melita. 2. M. foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Molin. hift. nat. Chil. p.* 114.

968. COTULA. *Recept.* fubnudum. *Pappus* marginatus. *Corollul.* difci 4fidæ, radii fere nullæ.

turbinata. 1. C. receptaculis fubtus inflatis turbinatis, floribus radiatis. *Mant. p.* 473. *Breyn. cent. t.* 73.

Verbesina. 2. C. foliis oppositis trinervis cordatis crenatis, floribus radiatis pedunculatis binis. *Mant. p.* 473. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 155. *f.* 2. *an forte cum Verbesina Lavenia proprium genus constituit?*

pyrethraria. 3. C. foliis oppositis ovatis crenatis petiolatis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 116.

coronopifolia. 4. C. foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus dentatis, floribus flosculosis. *Flor. dan. t.* 341.

umbellata. 5. C. foliis lanceolatis hirsutis, floribus umbellatis, caule erecto. *Suppl. p.* 378.

minuta. 6. C. foliis alternis subamplexicaulibus oblongis dentatis, floribus solitariis sessilibus folio oppositis. *Forst. flor. austr. p.* 57.

quinqueloba. 7. C. foliis quinquelobis subtomentosis, caulibus erectis. *Suppl. p.* 377.

stricta. 8. C. foliis pinnatifidis planis nudis punctatis, caule erecto stricto, floribus radiatis. *Mant. p.* 287. *Berg. cap. t.* 5. *f.* 9.

aurea. 9. C. foliis pinnato-setaceis multifidis, floribus flosculosis cernuis.

anthemoides. 10. C. foliis pinnato-multifidis dilatatis, floribus flosculosis. *Dill. h. Elth. t.* 23. *f.* 25. β) Artemisia nisotica. *Spp. pl. p.* 1189.

viscosa. 11. C. foliis lyrato-pinnatis, floribus radiatis.

capensis. 12. C. foliis pinnatis subcarnosis teretiusculis, infimis subbipinnatis, floribus radiatis. *Mant. p.* 115. 287. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 563. Matricaria capensis.

pilulifera. 13. C. foliis bipinnatis, capitulis globosis, caule erecto *Suppl.* 378.

tanacetifolia. 14. C. foliis tripinnatis, lacinulis acutis, caule erecto, floribus flosculosis corymbosis. *Pluckn. mant. t.* 430. *f.* 7.

sericea. 15. C. foliis supra decompositis tomentosis linearibus. *Suppl. p.* 377.

969. ANACYCLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Semina* lateralia membranacea, emarginata.

orientalis. 1. A. foliis compositis setaceis acutis rectis. *Boerh. ind. h. Lugdb.* 1. *p.* 110. *ic.*

2. A.

creticus. 2. A. foliis decompositis linearibus, foliolis divisis planis.

valentinus. 3. A. foliis decompositis linearibus, foliolis divisis teretiusculis acutis, floribus flosculosis.

aureus. 4. A. foliis bipinnatis teretiusculis incanis excavato-punctatis. *Mant. p. 287. Lob. ic. 771.*

970. ANTHEMIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* hemisphæricus, subæqualis. *Flosculi* radii plures, quam 5.

* *radio albo.*

Cota. 1. A. florum paleis rigidis pungentibus. *Mant. p. 474. Till. h. pis. t. 19.*

arvensis. 2. A. receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. *Kniph. bot. orig. cent. 11. n. 5.*

Cotula. 3. A. receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus nudis. *Blackw. herb. t. 67.*

mixta. 4. A. foliis simplicibus dentato-laciniatis. *Pluckn. alm. t. 17. f. 4.*

alpina. 5. A. foliis dentato-pinnatis integerrimis linearibus, caule villoso unifloro, petalis ovatis, paleis sphacelatis. *Jacq. flor. austr. 5. t. 30.*

nobilis. 6. A. foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis. *Blackw. herb. t. 526.*

Pyrethrum. 7. A. foliis pinnato-multifidis, caulibus simplicibus unifloris decumbentibus. *Mill. h. angl. t. 38.*

chia. 8. A. foliis pinnatifidis laciniatis, pedunculis nudis subvillosis.

tomentosa. 9. A. foliis pinnatifidis obtusis planis, pedunculis hirsutis foliosis, calicibus tomentosis. *Flor. dan. t. 635.*

maritima. 10. A. foliis pinnatis denticulatis carnosis nudis punctatis, caule prostrato, calicibus subtomentosis. *Till. h. pis. t. 19. f. 3.*

altissima. 11. A. erecta, foliis pinnatis, pinnarum basibus denticulo reflexo asperis. *Mant. p. 474. Kniph. bot. orig. cent. 11. n. 4.*

corymbosa. 12. A. foliis subbipinnatis linearibus acutis, caule simplici erectiusculo villoso, corollulis radii obovatis obtusissimis tridentatis. *Haenk. ap. Jacq. coll. 2. p. 73.*

austriaca. 13. A. receptaculis conicis, paleis oblongis mucronatis, seminibus nudis, foliis bipinnatis lanuginoso-villosis. *Jacq. flor. austr. 5. t. 444.*

** *radio flavo s. concolore.*

valentina. 14. A. caule ramoso, foliis pubescentibus tripinnatis setaceis, calicibus villosis pedunculatis. *Breyn. cent. t. 75.*

americana. 15. A. foliis triternatis, pedunculis terminalibus ramo longioribus, *an eadem cum verbesina mutica?*

tinctoria. 16. A. foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso. *Flor. dan. t. 741.*

odorata. 17. A. foliis apice pinnatifidis, pedunculis elongatis, calicibus membranaceis, radio sterili. *Ait. hort. Kew. 3. p. 238.*

trinervia. 18. A. foliis ovatis serratis trinerviis oppositis petiolatis, receptaculo conico. *Suppl. p. 378.*

repanda. 19. A. foliis simplicibus ovato-lanceolatis repando-crenatis.

repens. 20. A. foliis simplicibus ovato-lanceolatis obsolete serratis, caule repente. *Walt. flor. carol. p. 211.*

arabica. 21. A caule decomposito, calicibus ramiferis. *Shaw. afr. t. 36. f. 58.*

971. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* ovatus, imbricatus. *Flosculi* radii 5-10.

* *foliis simplicibus.*

† *integris.*

Ageratum. 1. A. foliis oblongis obtusis serratis fasciculatis. *Mill. h. angl. t. 10. Jungh. pl. offic. ic. t. 17.*

herbarota. 2. A. foliis cuneiformibus, apice dentatis. *Allion. flor. pedem. n. 656. ic.*

alpina. 3. A. foliis lanceolatis semiamplexicaulibus serratis, serraturis serrulatis.

Ptarmica. 4. A. foliis lineari-lanceolatis amplexicaulibus serrulatis. *Flor. dan. t. 643.*

†† *foliis divisis.*

lobata. 5. A. foliis villosis linearibus subdentatis apice lobatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 218.*

Clavennæ. 6. A. foliis obovatis laciniatis tomentosis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 76.

serrata. 7. A. foliis pinnatifidis lineari-lanceolatis tomentosis basi laciniatis. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 25.

capitata. 8. A. foliis profunde pinnatifidis tomentosis, laciniis dentatis, floribus umbellato-capitatis. *Willden. de achill. n.* 7. *t.* 1.

cristata. 9. A. foliis pectinato-pinnatifidis argute serratis glabris. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 25.

coronopifolia. 10. A. foliis pinnatifidis dentatis glabris. *Willden. de achill. n.* 9. *t.* 1.

ligustica. 11. A. foliis pinnatifidis glabris, incisuris tri-vel multifidis. *Allion. flor. pedem.* 4. 660. *ic.*

macrophylla. 12. A. foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis inciso-serratis, infimis distinctis. *Pill. & Mitterpach. it. t.* 11.

magna. 13. A. foliis pinnatifidis, laciniis inæqualiter dentatis. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 25.

squarrosa. 32. A. foliis lanceolato-linearibus pinnatifidis, laciniis ovato-cuneiformibus inciso-acuminatis verticalibus, caule subvilloso. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 242.

** *foliis compositis.*

† *pinnatis.*

ægyptiaca. 14. A. foliis tomentosis, pinnis subrotundis dentatis. *Tournef. it.* 1. *t.* 87.

cretica. 15. A. foliis tomentosis, pinnis quadrifidis imbricatis.

nana. 16. A. foliis villosis, pinnis linearibus integerrimis, foliorum inferiorum dentatis. *Allion. pedem.* 3. *t.* 2. *f.* 3.

Halleri. 17. A. foliis hirsutis, pinnis acute dentatis latescentibus. *Hal. hist. stirp. Helv.* 1. *p.* 47. *n.* 110.

micrantha. 18. A. foliis pubescentibus, pinnis laciniatis, florum radio minimo. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 198. *n.* 164 *t.* 83. *f.* 2.

pilosa. 19. A. foliis subtus pilosis, pinnis integris bifidisque. *Willden. de achill. n.* 19.

falcata. 20. A. foliis alternis, pinnis falcatis argute serratis.

impatiens. 21. A. pinnis lanceolatis geminatis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 83. *f.* 1.

Santolina. 22. A. foliis fasciculatis glabris, pinnis obtusis tridentatis.

moſchata. 23. A. foliis glabris, pinnis lineari-lanceolatis integerrimis punctatis. *Haller. hiſt. ſtirp. Helv.* 1. *p.* 47. *n.* 112. *Scop. del. inſ.* 1. *t.* 3.

††*foliis ſubbipinnatis.*

atrata. 24. A. foliis glabris pectinatis, caule piloſo. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 22.

tanacetifolia. 25. A. foliis punctatis, pinnis pinnatifidis, laciniis integris inciſiſque. *Mill. h. angl. t.* 9. *Allion. pedem. n.* 666. *an diſtincta ſpecies?*

pubeſcens. 26. A. foliis pubeſcentibus, pinnis pinnatifidis, laciniis inæqualibus.

nobilis. 27. A. foliis pubeſcentibus, pinnis oblongis pinnatifidis, inciſuris æqualibus.

tomentoſa. 28. A. foliis tomentoſis, pinnulis denſe imbricatis integerrimis acutis. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 25. *f.* 2.

†††*foliis bipinnatis.*

Millefolium. 29. A. foliis glabris, pinnarum laciniis linearibus dentatis. *Flor. dan. t.* 737.

abrotanifolia. 30. A. foliis pubeſcentibus, pinnulis tenuiſſimis linearibus integerrimis.

odorata. 31. A. foliis piloſis, pinnulis lanceolatis integerrimis mucronatis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 992. β) *Wulfen apud Jacq. Collect.* 1. *t.* 21. *an mera nobilis varietas?*

972. TRIDAX. *Recept.* paleaceum. *Pappus* multiradiatus, ſimplex. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Corollulæ* radii 3partitæ.

procumbens. 1. TRIDAX.

978. AMELLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus. *Corollulæ* radii indiviſæ.

lychnitis. 1. A. foliis oppoſitis lanceolatis obtuſis tomentoſis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 476. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 15. *f.* 2.

umbellatus. 2. A. foliis oppositis triplinerviis subtus tomentosis, floribus umbellatis. *Brown. jam. t. 33. f. 2.*

carolinianus. 3. A. foliis oppositis sublanceolatis subserratis, pedunculis geminis unifloris axillaribus. *Walt. flor. carol. p. 213.*

1321. ECLIPTA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Corollulæ* disci 4fidæ.

erecta. 1. E. caule erecto, foliis basi deflexis, sessilibus lanceolatis. *Mant. p. 286. 475. Syst. nat. XII. 3. p. 564.* Cotula alba. *Rumpf. amb. 6. t. 18. f. 1.*

sessilis. 2. E. caule erecto, foliis subamplexicaulibus ovatis dentatis, floribus axillaribus sessilibus discoideis. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p. 114.*

latifolia. 3. E. caule erecto, foliis ovatis petiolatis. *Suppl. p. 378.*

punctata. 4. E. caule erecto punctato, foliis planis. *Mant. p. 286. Jacq. stirp. amer. pict. t. 197.*

prostrata. 5. E. caule prostrato, foliis subundulatis subpetiolatis. *Mant. p. 128. 475. Syst. nat. XII. 3. p. 564.* Cotula prostrata. *Zinn. comm. Goett. 3. t. 11.*

973. SIGESBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* exterior, 5phyllus, proprius, patens. *Radius* dimidiatus.

orientalis. 1. S. petiolis sessilibus, calicibus exterioribus majoribus patentibus. *Hort. Cliff. t. 23.*

occidentalis. 2. S. petiolis decurrentibus, calicibus nudis. *Mant. p. 475. an potius Verbesina?*

flosculosa. 3. S. flosculis tridentatis, hermaphroditis triandris. *Herit. stirp. nov. 2. p. 37. t. 19.*

975. VERBESINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* 2plici ordine. *Flosculi* radii circiter 5.

alata. 1. V. foliis alternis decurrentibus angulato-dentatis acuminatis. *Commel. h. amst. 1. t. 3.*

chinensis. 2. V. foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis serratis.

virginica. 3. V. foliis alternis petiolatis lanceolatis, floribus corymbosis.

mutica. 14. V. foliis alternis petiolatis, superioribus tripartitis, inferioribus integris ovatis, pedunculis terminalibus unifloris. *Swarts observ. bot. p.* 314. *t.* 8. *f.* 1.

pinnatifida. 4. V. foliis alternis pinnatifidis, caule herbaceo. *Plum. ic.* 41. *t.* 51.

gigantea. 5. V. foliis alternis profunde pinnatifidis, caule fruticoso. *Jacq. coll.* 1. *p.* 53. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 97.

Bosvallea. 6. V. foliis multifido-capillaribus, caulibus prostratis, flosculis senis, femineo unico. *Suppl. p.* 379.

Lavenia. 7. V. foliis oppositis ovatis trinerviis glabris petiolatis, seminibus tricornibus. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 63. *an cum Cotula Verbesina in distinctum genus conjungenda? an eadem cum Adenostemate Forsteri prodr. flor. austr. p.* 58. *n.* 284.

dichotoma. 8. V. foliis oppositis ovatis tomentosis petiolatis, caule supra dichotomo, extimo internodio compresso. *Murray comm. Goett.* 1779. *p.* 15. *t.* 4.

fruticosa. 9. V. foliis oppositis ovatis serratis petiolatis, caule fruticoso. *Plum. ic.* 52.

nodiflora. 10. V. foliis oppositis ovatis serratis, calicibus oblongis sessilibus, caulinis lateralibus. *Dill. h. Elth. t.* 45. *f.* 53.

biflora. 11. V. foliis oppositis oblongo-ovatis triplinerviis acuminatis serratis, pedunculis geminis bifloris. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 79.

calendulacea. 12. V. foliis oppositis lanceolatis obtusiusculis, pedunculis longis unifloris, calicibus simplicibus. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 42.

laciniata. 13. V. foliis sinuato-laciniatis. *Walt. flor. carol. p.* 213. *an hujus generis?*

977. BUPHTHALMUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obsoletus. *Seminum* latera, præsertim radii, marginata. *Stigma* flosculorum hermaphroditicorum indivisum.

* *Asterisci* T.

frutescens. 1. B. foliis oppositis lanceolatis, petiolis bidentatis, caule fruticoso. *Catesb. Car.* 1. *t.* 93.

arborescens. 2. B. foliis oppositis lanceolatis utrinque tomentosis edentulis integerrimis, caule fruticoso. *Plum. ic.* 106. *f.* 2.

sericeum. 3. B. foliis oppositis approximatissimis spatulo-oblongis sericeis, squamis calicis setaceis hirsutis, caule arboreo. *Suppl. p.* 379. *Herit. sert. angl. t.* 37.

spinosum. 4. B. calicibus acute foliosis, foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis. *Blackw. herb. t.* 272. *Mill. h. angl. t.* 249. *f.* 1.

melitense. 5. B. calicibus acute foliosis pedunculatis, foliis lanceolatis basi attenuato-petiolatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 218.

pratense. 15. B. calicibus acute foliosis, foliis alternis cuneiformibus incisis hirtis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 153. Ceruana pratensis.

graveolens. 6. B. calicibus acute foliosis, foliis alternis pinnatifidis. *Vahl symbol. botan.* 1. *p.* 74. *t.* 19.

ramosum. 7. B. calicibus obtuse foliosis terminalibus solitariis, foliis oppositis sessilibus lanceolatis remotis, caule hispido ramoso. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 151.

aquaticum. 8. B. calicibus obtuse foliosis sessilibus axillaribus, foliis alternis oblongis obtusis, caule herbaceo. *Mill. h. angl. t.* 249. *f.* 2.

maritimum. 9. B. calicibus obtuse foliosis pedunculatis, foliis alternis spatulatis, caule herbaceo. *Bocc. mus.* 2. *t.* 129.

durum. 10. B. foliis alternis lanceolatis integerrimis, caule suffruticoso. *Plukn. alm. t.* 21. *f.* 3.

** *Asteroidea* T.

salicifolium. 11. B. foliis alternis lanceolatis subserratis villosis, calicibus nudis, caule herbaceo. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 370.

grandiflorum. 12. B. foliis alternis lanceolatis subdenticulatis glabris, calicibus nudis, caule herbaceo. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 7. *f.* 52.

speciosissimum. 13. B. foliis alternis amplexicaulibus ovatis nudis serratis subciliatis, caule unifloro. *Mant. p.* 177. 517. *Arduin. spec.* 1. *t.* 12. *an ad silphium potius spectat?*

helianthoides. 14. B. foliis oppositis ovatis serratis triplinerviis, calicibus foliosis, caule herbaceo. *Herit. stirp. nav.* 4 *t.* 45. *an distinctum satis ab helianthо lævi & silphio solidaginoide, & Rudbeckia oppositifolia?*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

979. HELIANTHUS. *Recept.* paleaceum, planum. *Pappus* radii o, disci 2paleis constans. *Cal.* imbricatus, subsquarrosus.

annuus. 1. H. foliis omnibus cordatis trinerviis, pedunculis incrassatis, floribus cernuis. *Mill. illustr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 1.

indicus. 2. H. foliis omnibus cordatis trinerviis, pedunculis æqualibus, calicibus foliosis. *Mant. p.* 117.

multiflorus. 3. H. foliis inferioribus cordatis trinerviis, superioribus ovatis. *Pluckn. phyt.* 159. *f.* 2.

tuberosus. 4. H. foliis ovato-cordatis triplinerviis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 161.

frondosus. 5. H. calicibus squarrosis undulatis frondosis, radiis octopetalis, foliis ovatis, caule inferne scabro.

divaricatus. 6. H. foliis oppositis sessilibus ovato-oblongis trinerviis, panicula dichotoma.

atro-rubens. 7. H. foliis oppositis spatulatis crenatis triplinerviis scabris, squamis calicis erectis longitudine disci. *Dill. h. Elth.* *t.* 94. *f.* 110.

decapetalus. 8. H. caule inferne lævi, foliis lanceolato-cordatis triplinerviis, radiis decapetalis, pedunculis scabris.

altissimus. 9. H. foliis alternis latiuscule lanceolatis scabris, petiolis ciliatis, caule stricto glabro. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 160.

gigan-teus. 10. H. foliis alternis lanceolatis ſcabris baſi ciliatis, caule ſtricto ſabro. *Moriſ. hiſt. pl. 3. t. 7. f. 66.*

lævis. 11. H. foliis oppoſitis trinerviis lanceolatis ſerratis lævibus, caule pedunculiſque glabris.

thurifer. 12. H. caule fruticoſo, foliis lineari-lanceolatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p. 135.*

anguſti-folius. 13. H. foliis alternis linearibus.

ſtrumo-ſus. 14. H. radice fuſiformi. *Bocc. ſic. t. 27. f. 4. an mera gigantei varietas?*

GALARDIA. *Recept.* paleaceum, convexum. *Sem.* angulata, apice cornu 5phylla. *Cal.* duplici ſquamarum ordine ſubæqualis.

alternifo-lia. 1. GALARDIA. *Fougeroux act. Pariſ. ad ann. 1786. p. 1. ſeq. t. 1. 2.*

TITHONIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* apice 5pa-leacea. *Cal.* duplici ſquamarum ordine connivens, cylindricus, ſubæqualis.

uniflora. 1. TITHONIA. *Des Fontaines act. Pariſ. extram. vol 12.*

980. RUDBECKIA. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* margine 4dentato. *Cal.* 2plici ſquamarum ordine.

laciniata. 1. R. foliis compoſitis laciniatis. *Moriſ. hiſt. pl. 3. t. 6. f. 53. 54.*

digitata. 2. R. foliis inferioribus compoſitis, caulinis quinatis ternatiſque, ſummis ſimplicibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 251.*

triloba. 3. R. foliis ſpatulatis, inferioribus trilobis, ſuperioribus indiviſis. *Pluckn. alm. t. 22. f. 2.*

hirta. 4. R. foliis indiviſis ſpatulato-ovatis triplinerviis ſerratis hirtis, receptaculo conico, paleis lanceolatis. *Knorr del. hort. 1. t. F. 1. Jungh. pl. ic. cent. 1. n. 29.*

fulgida. 5. R. foliis oblongo-lanceolatis denticulatis hispidis basi angustatis subcordatis, receptaculo hemisphaerico, paleis lanceolatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 251.

purpurea. 6. R. foliis lanceolato-ovatis alternis indivisis, radii petalis bifidis. *Catesb. Car.* 2. *t.* 59.

oppositifolia. 7. R. foliis lanceolato-ovatis oppositis serratis, radii petalis bifidis.

angustifolia. 8. R. foliis oppositis linearibus integerrimis. *Mill. h. angl.* *t.* 224. *f.* 2.

981. COREOPSIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 2-4cornis. *Cal.* erectus, polyphyllus, basi radiis coloratis patentibus cinctus.

verticillata. 1. C. folis decomposito-linearibus. *Ehret. pict. t.* 9. *f.* 1.

coronata. 2. C. foliis pinnatis serratis lineatis glabris. *Plum. ic.* 53. *f.* 2.

leucantha. 3. C. foliis pinnatis serratis, radio florum diversicolore.

chrysantha. 4. C. foliis ternatis ovato-oblongis serratis, radio florum concolore. *Plum. ic.* 53. *f.* 1.

alba. 5. C. foliis subternatis cuneatis serratis. *Pluckn. alm. t.* 160. *f.* 3.

tripteris. 6. C. foliis subternatis integerrimis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 44.

aurea. 7. C. foliis serratis, radicalibus tripartitis, caulinis trifidis integrisve lanceolato-linearibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 252.

procera. 8. C. foliis ellipticis acuminatis serratis petiolatis venosis decurrentibus, inferioribus verticillatis, superioribus alternis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

reptans. 9. C. foliis serratis ovatis, summis ternatis, caule repente. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 154. *f.* 2. 3.

baccata. 10. C. foliis serratis ovatis, seminibus bacciformibus. *Suppl.* *p.* 380.

Bidens. 11. C. foliis lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus, pappo bicorni. *Moris. hist.* 3. *t.* 5. *f.* 25. *an mera bidentis cernuae varietas?*

quadricornis. 12. C. foliis lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus, pappo quadricorni. *Krock. flor. siles.* 2. 2. *p.* 481.

alternifolia. 13. C. foliis lanceolatis ferratis alternis petiolatis decurrentibus. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 110.

lanceolata. 14. C. foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. *Dill. h. Elth. t.* 48. *f.* 56.

linenfis. 15. C. foliis fubintegerrimis caule ovatis tomentofis. *Jacq. col.* 2. *p.* 299. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 49.

auriculata. 16. C. foliis integerrimis ovatis, inferioribus ternatis. *Pluckn. alm. t.* 83. *f.* 5. & *t.* 242. *f.* 4.

craffifolia. 17. C. foliis obovato-oblongis obtufis integerrimis pubefcentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

angustifolia. 18. C. foliis alternis lineari-lanceolatis integerrimis lævibus, radii petalis oblongis trifidis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

major. 19. C. foliis verticillatis lato-lanceolatis bafi pubefcentibus. *Walt. flor. carol. p.* 214.

perfoliata. 20. C. foliis caulinis oblongis enfiformibus oppofitis perfoliatis, caule ramofo. *Walt. flor. carol. p.* 215.

gladiata. 21. C. foliis radicalibus linearibus lævibus integris, caulinis alternis, pedunculis terminalibus. *Walt. flor. carol. p.* 215.

983. OSMITES. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obfoletus. *Cor.* radii ligulatæ. *Cal.* imbricatus, gibbus.

Bellidiaftrum. 1. O. foliis linearibus carnofis, calicibus fcariofis.

camphorata. 2. O. foliis lanceolatis fubferratis bafi dentatis. *Mant. p.* 477. *Seb. muf.* 1. *t.* 90. *f.* 2. β) *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 565. Anthemis leucantha.

Afteriscoides. 3. O. foliis lanceolatis punctatis, caulibus foliofis. *Seb. muf.* 1. *t.* 16. *f.* 4.

calicina. 4. O. foliis lanceolatis nudis, calicibus fcariofis. *Suppl. p.* 380.

ENCELIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* paleæ membranaceæ conduplicatæ, inclufa. *Cal.* polyphyllus, fimplex, æqualis.

alternifolia. 1. Encelia. *Juffieu gen. plant. p.* 180.

SCLEROCARPUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* foliol. inter. canaliculatis.

africanus. 1. SCLEROCARPUS. *Jacq. fil. act. Helv.* 9. *f.* 1.

981. GORTERIA. *Recept.* nudum. *pappus* simplex. *Cor.* radii ligulatæ. *Cal.* imbricatus, squamis spinosis.

uniflora. 1. G. foliis lanceolatis indivisis subtus tomentosis, caulibus unifloris depressis. *Suppl. p.* 382.

personata. 2. G. foliis lanceolatis integris sinuatisque, caule erecto, floribus pedunculatis. *Pluckn. phyt.* 273. *f.* 6.

rigens. 3. G. foliis lanceolatis pinnatifidis, caule depresso, scapis unifloris. *Mill. h. angl. t.* 49.

setosa. 4. G. foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-spinosis, floribus terminalibus pedunculatis. *Mant. p.* 287.

squarrosa. 5. G. foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-spinulosis, floribus sessilibus. *Mant. p.* 470. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 28.

echinata. 6. G. foliis oblongis sinuato-incisis spinulosis, caulibus ascendentibus, receptaculis paleaceis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 254. *an hujus generis?*

barbata. 7. G. foliis elliptico-lanceolatis dentato-aristatis, calicibus pedunculatis ciliato-setaceis. *Suppl. p.* 382.

Asteroides. 8. G. foliis ellipticis, serraturis setaceis. *Suppl. p.* 381. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 48.

hispida. 9. G. foliis oblongis ciliato-spinosis erectis glabris, calicibus integris spina terminatis. *Suppl. p.* 382.

spinosa. 10. G. foliis oblongis sessilibus dentato-spinosis patentibus glabris, calicibus ciliato-spinosis, erectis. *Suppl. p.* 381.

cernua. 11. G. foliis oblongis amplexicaulibus dentato-spinosis patentibus glabris, calicibus ciliato-serratis cernuis. *Suppl. p.* 382.

herbacea. 12. G. foliis caulinis amplexicaulibus ciliatis, radicalibus inermibus subtus villosis. *Suppl. p.* 381.

ciliaris. 13. G. foliis imbricatis bifariam ciliatis, ciliis exterioribus spinaque terminali reflexis. *Seb. mus.* 1. *t.* 23. *f.* 1.

DIDELTA. *Recept.* 4partitum, medium 3angulare nudum, lateralia fungosa, setosa, segmentis indurescentibus in pericarpium. *Pappus* simplex. *Cal.* 2plex. *Flosculi* disci medii steriles, laterales perfecti, radii ligulati, neutri. *Germina* immersa.

tetragoniæfolia. 1. DIDELTA. *Herit. stirp. nov.* 3. *p.* 55. *t.* 28. *an segregatis potius accensenda?*

2271. ZŒGEA. *Recept.* setosum. *Pappus* setaceus. *Cor.* radii ligulatæ. *Cal.* imbricatus.

Leptaurea. 1. Z. foliis oblongis, calice hirto campanulato. *Mant.* *p.* 117. *Suppl. p.* 383. *Herit. stirp. nov.* 3. *p.* 57. *t.* 29.

capensis. 2. Z. foliis linearibus, calice glabro basi gibbo. *Suppl. p.* 382.

aleppica. 3. Z. foliis pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis integerrimis, calicis squamis exterioribus ciliatis apice scariosis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 89.

984. CENTAUREA. *Recept.* setosum. *Pappus* plumosus vel capillaris. *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares.

* *calicibus lævibus inermibus*, Jaceæ.

Centaureum. 1. C. calicis squamis ovatis, foliis pinnatis, pinnis serratis decurrentibus. *Reg. bot. t.* 354.

alpina. 2. C. calicis squamis ovatis obtusis, foliis pinnatis glabris integerrimis, impari serrato. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 25. *f.* 5.

moschata. 3. C. calicibus subrotundis glabris, squamis ovatis, foliis lyrato-dentatis. *Knorr del hort.* 2. *t.* C. 4. *f.* 1. 2.

Moschus. 4. C. calicis squamis ovato-lanceolatis, foliis pinnatis lineari-oblongis integerrimis. *Hablizl apud S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 176.

Crupina. 5. C. calicis squamis lanceolatis, foliis pinnatis serratis subciliatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 34.

erucifolia. 6. C. calicis squamis lanceolatis, foliis lanceolatis subdentatis. *Pluckn. phyt.* 39. *f.* 3. *mala.*

Lippii. 7. C. calicis squamis mucronatis, foliis decurrentibus lyrato-dentatis. *Isnard act. Paris.* 1719. *t.* 10.

maxima. 8. C. caule fruticoso, foliis ellipticis tomentosis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 152.

mucronata. 9. C. calicis squamis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis sessilibus mucronatis serratis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 151.

** *squamis calicis serrato-ciliatis*, Cyani.

bracteata. 10. C. calicibus subciliatis basi foliosis, foliis margine scabris, radicalibus oblongis subintegerrimis, caulinis lanceolatis sessilibus integerrimis. *Scop. del. insf.* 2. *p.* 17. *t.* 9.

spinosa. 11. C. calicibus subciliatis, ramis spinosis. *Alp. exot. p.* 162. *ic.*

montana. 12. C. calicibus serratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule simplicissimo. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 371.

Cyanus. 13. C. calicibus serratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* K. 4. 5.

argentea. 14. C. calicibus serratis, foliis tomentosis, radicalibus pinnatifidis, laciniis inauritis. *Barr. pl. rar. ic.* 218.

nigra. 15. C. calicis squamulis ovatis, ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus flosculosis. *Reich. flor. francof. n.* 625. *ic.*

paniculata. 16. C. calicis squamis planis ciliatis, foliis bipinnatis, rameis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 320.

pullata. 17. C. calicibus ciliatis verticillato-foliosis, foliis lyratis dentatis obtusis. *Mill. h. angl. ic. t.* 152. *f.* 2.

cineraria. 18. C. calicibus ciliatis terminali-sessilibus, foliis tomentosis bipinnatifidis, laciniis acutis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 92. β) Centaurea. *Krock. flor. sil.* 2. 2. *p.* 489. *n.* 1462.

Stœbe. 19. C. calicibus ciliatis oblongis, foliis pinnatifidis linearibus integerrimis.

sempervirens. 20. C. calicibus ciliatis, foliis lanceolatis serratis infimo dente substipulatis, inferioribus hastatis. *Bocc. sic. t.* 39. *f.* 3.

acaulis. 21. C. calicibus ciliatis, foliis lyratis, caule subnullo. *Shaw spec. p. 342. ic.*

sibirica. 22. C. calicibus ciliatis, foliis tomentosis indivisis pinnatifidisque integerrimis, caule declinato. *Gmel. flor. sib. 2. t. 42. f. 2.*

ragusina. 23. C. calicibus ciliatis, foliis tomentosis pinnatifidis, laciniis obtusis ovatis integerrimis, exterioribus majoribus. *Mill. h. angl. t. 152. f. 1.*

caroliniana. 76. C. foliis sessilibus basi serrato-setaceis. *Walt. flor. carol p. 214.*

Scabiosa. 24. C. calicibus ciliatis, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis.

tatarica. 25. C. calicibus ciliatis, foliis pinnatis, pinnis lanceolatis indivisis. *Suppl. p. 383.*

capillata. 26. C. calicibus recurvato-plumosis, foliis imis pinnatis dentatis, summis lanceolatis. *Haller act. Goet. 1. t. 6.*

pectinata. 27. C. calicibus recurvato-plumosis, foliis lyratis denticulatis, rameis lanceolatis integerrimis.

uniflora. 28. C. calice recurvato-plumoso, foliis lanceolatis subdentatis tomentosis. *Bocc. mus. 2. t. 2.*

phrygia. 29. C. calicibus recurvato-plumosis, foliis indivisis oblongis scabris. *Flor. dan. t. 520.* β) Centaurea serratuloides? *Krocke flor. siles. 2. 2. p. 484.*

hyssopifolia. 30. C. calicibus recurvato-plumosis, foliis lineari-lanceolatis apice patulis suffruticosis. *Barrel pl. rar. ic. 306.*

linifolia. 31. C. calicibus recurvato-plumosis, foliis linearibus sparsis cauleque hirtis. *Mant. p. 117. Barr. pl. rar. ic. 139. 162.*

diluta. 79. C. calicibus ciliatis, squamis acuminatis subspinosis, foliis oblongis pinnatifidisque, radii flosculis disco longioribus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 261.*

*** *squamis calicis aridis scariosis*, Rhapontica.

orientalis. 32. C. calicibus scariosis ciliatis, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. *Kniph. bot. orig. cent. 4. n. 16.*

strobilacea. 33. C. calicibus scariosis serrato-ciliatis spinosis, foliis subtus punctatis pinnatis, pinnis lanceolatis falcatis erectis. *Scop. del. ins. 1. t. 17.*

Jacea. 34. C. calicibus laceris, foliis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Flor. dan. t. 519.*

humilis. 77. C. calicibus laceris, foliis lanceolatis repando-dentatis, caule unifloro. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 376.

angusti-folia. 78. C. calicibus coloratis serrato-laceris, foliis linearibus subtus lanatis. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 376.

alba. 35. C. calicibus integris mucronatis, foliis pinnato-dentatis, caulinis linearibus basi dentatis. *Tabernaem. Kraeuterb. p.* 153. *ic.*

splen-dens. 36. C. calicibus obtusis, foliis radicalibus bipinnatifidis, caulinis pinnatis, dentibus lanceolatis.

Behan. 37. C. foliis radicalibus lyratis, lobis oppositis, caulinis amplexicaulibus. *Rauw. it. p.* 288 *ic.*

babylo-nica. 38. C. foliis subtomentosis decurrentibus indivisis, radicalibus lyratis. *Mant. p.* 460. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 528. Serratula babylonica. *Alpin. exot. p.* 282. *ic.*

conifera. 39. C. foliis tomentosis, radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis, caule simplici. *Lob. ic.* 7. *Mill. h. angl. t.* 153.

procum-bens. 40. C. foliis tomentosis pinnatis, caulinis sessilibus alternis, superioribus ternatis, summis simplicibus ovato lanceolatis, caulibus procumbentibus, ramosis quadrangulis, floribus terminalibus sessilibus solitariis. *Hablizl ap. S. G. Gmel. it.* 4. *p.* 167.

Cardun-culus. 41. C. foliis glabris, radicalibus decumbentibus ovalibus subrepandis margine spinulosis, caulinis simplicibus. *Pall. it.* 1. *p.* 500. *n.* 123.

glastifo-lia. 42. C. foliis indivisis integerrimis decurrentibus. *Curtis bot. mag. t.* 62.

amara. 43. C. foliis lanceolatis integerrimis, caulibus decumbentibus. *Lob. ic.* 548.

repens. 44. C. foliis lanceolatis subpetiolatis dentatis, pedunculis filiformibus aphyllis.

Rhapon-tica. 45. C. foliis ovato-oblongis denticulatis integris petiolatis subtus tomentosis. *Lob. ic.* 288.

**** *squamis calicis spinosis.*

† *spinis simplicibus*, Crocodilia.

nudicau-lis. 46. C. calicibus subinermibus lævibus nitidis, foliis imis oblongis dentatis, superioribus pinnatis, summis indivisis, caule nudiusculo unifloro simplici. *Scop. del. insf.* 3. *t.* 11.

47. C.

radiata. 47. C. calicibus subinermibus subaristatis radiatis, foliis pinnatifidis. *Sp. pl.* 1201. Xeranthemum erucæfolium. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 47. *f.* 1.

salmantica. 48. C. calicibus setula subspinosa exstante glabris, foliis lyratoruncinatis serratis. *Mant. p.* 478. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 64.

tingitana. 49. C. calicibus margine spinosis, foliis lanceolatis indivisis serrato-subspinosis. *Herm. par. Lugdb. p.* 163. *ic.*

cichoracea. 50. C. calicum spinis setaceis, foliis decurrentibus indivisis serrato-spinosis. *Till. h. pis. t.* 27.

galactites. 51. C. calicum spinis setaceis, foliis decurrentibus sinuatis spinosis subtus tomentosis.

peregrina. 52. C. calicum spinis setaceis, foliis lanceolatis petiolatis inferne dentatis.

pumila. 53. C. calicum spinis simplicissimis, foliis dentato-pinnatis villosis, caule nullo.

muricata. 54. C. calicum spinis simplicibus, foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus lanceolatis, pedunculis longissimis.

Venetum. 55. C. calicum spinis simplicissimis, dentibus duobus oppositis, foliis lanceolatis integris decurrentibus. *Mant. p.* 478.

Crocodilium. 56. C. calicibus scariosis simplicissime spinosis, foliis pinnatifidis integerrimis, lacinia extima majore dentata. *Barr. pl. rar. ic. t.* 503.

† † *calicis spinis palmatis*, Stoebæ.

sessilis. 57. C. calicibus oblongis radicalibus glomerato-sessilibus, foliis pinnatis incisis. *Forsk flor. ægypt. arab. p.* 152.

sonchifolia. 58. C. foliis subdecurrentibus spinulosis repando-dentatis. *Mant. p.* 478. *Pluckn. phyt.* 39. *f.* 1.

seridis. 59. C. foliis decurrentibus tomentosis oblongis, infimis sinuato-dentatis. *Pluckn. phyt.* 38. *f.* 1.

romana. 60. C. foliis decurrentibus inermibus, radicalibus pinnatifidis, impari maximo. *Zanon. hist. t.* 42.

napifolia. 61. C. foliis decurrentibus sinuatis spinulosis, radicalibus lyratis. *Herm. par. Lugdb. p.* 189. *ic.*

Isnardi. 62. C. foliis lyrato-dentatis hispidis subamplexicaulibus, floribus sessilibus terminalibus. *Isnard act. Paris.* 1719. *t.* 9.

sphærocephala. 63. C. foliis ovato-lanceolatis petiolatis dentatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 333. *ic.*

aſpera. 64. C. calicum ſquamis palmato-triſpinoſis, foliis lanceolatis dentatis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 26.

ceſpitoſa. 81. C. foliis ſinuato-dentatis, inferioribus petiolatis, ſuperioribus ſemiamplexicaulibus. *Cyrill. pl. rar. Nat. f.* 1. *t.* 8.

† † † *calicis ſpinis compoſitis*, Calcitrapæ.

collina. 65. C. calicibus ciliatis inermibus ſpinoſis, foliis radicalibus bipinnatifidis, caule acutangulo.

rupeſtris. 66. C. calicibus ciliatis ſpinoſis, foliis bipinnatis linearibus. *Col. ecphr.* 1. *t.* 35. *f.* 2.

Centauroides. 67. C. calicibus ciliatis ſpinoſis, foliis lyrato-pinnatis integerrimis, lacinia impari majore. *Col. ecphr.* 1. *t.* 35. *f.* 1.

ſicula. 68. C. calicibus ciliato-ſpinoſis terminalibus, foliis decurrentibus lyratis inermibus incanis *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 28. *f.* 26.

aurea. 80. C. calicibus ſimpliciſſime ſpinoſis, ſpinis patulis, floſculis æqualibus, foliis hirtis, inferioribus pinnatifidis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 265.

Calcitrapoides. 69. C. calicibus ſubduplicato-ſpinoſis, foliis amplexicaulibus lanceolatis indiviſis ſerratis.

Calcitrapa. 70. C. calicibus ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloſo. *Regn. bot. t.* 329.

ægyptiaca. 71. C. calicibus duplicato-ſpinoſis ſublanatis, foliis ſeſſilibus lanceolatis integris dentatiſque, caule prolifero. *Mant. p.* 118.

eriophora. 72. C. calicibus duplicato-ſpinoſis lanatis, foliis ſemidecurrentibus integris ſinuatiſque, caule prolifero. *Mant. p.* 478. *Kniph. bot. orig. cent.* 7. *n.* 10.

Benedicta. 73. C. calicibus duplicato-ſpinoſis lanatis involucratis, foliis ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis. *Blackw. herb. t.* 476.

ſolſtitialis. 74. C. calicibus duplicato-ſpinoſis ſolitariis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, radicalibus lyrato-pinnatifidis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 31.

melitenſis. 75. C. calicibus duplicato-ſpinoſis confertis terminalibus, foliis decurrentibus lanceolatis ſinuoſis inermibus. *Bocc. ſic. t.* 35.

POLYGAMIA NECESSARIA.

985. MILLERIA. *Recept.* minimum. *Pappus* o. *Cal.* 3partitus. *Radius* corollæ dimidiatus.

quinque-flora. 1. M. foliis cordatis pedunculis dichotomis. *Mant. p.* 478. *Mart. cent. t.* 41. β) *Mart. cent. t.* 47. *f.* 2.

biflora. 2. M. foliis ovatis, pedunculis simplicissimis. *Mart. cent. t.* 47. *f.* 1.

FLAVERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* connivens, æqualis, 3-4phyllus.

chilensis. 1. Fl. glomerulis terminalibus capitatis. *Jussieu gen. plant. p.* 186. 187.

peruviana. 2. Fl. glomerulis terminalibus spiratis. *Jussieu gen. plant. p.* 187.

1323. BALTIMORA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* cylindricus, polyphyllus. *Radius* corollæ 5florus.

recta. 1. BALTIMORA. *Mant. p.* 288. *Pluckn. mant. t.* 342. *f.* 3.

986. SILPHIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* marginato-2cornis. *Cal.* squamosus.

laciniatum. 1 S. foliis alternis pinnato-sinuatis. *Linn. fil. fasc.* 1. *t.* 1.

terebinthinaceum. 2. S. foliis alternis ovatis serratis scabris, radicalibus cordatis. *Suppl. p.* 383. *Jacq. h. Vind.* 1. 43.

scabrum. 9. S. foliis alternis lato-lanceolatis serratis scabris ciliatis subsessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 216.

solidaginoides. 3. S. foliis oppositis petiolatis lanceolatis acute serratis.

perfoliatum. 4. S. foliis oppositis petiolatis deltoidibus perfoliatis, caule tetragono lævi. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 33.

connatum. 5. S. foliis oppositis sessilibus perfoliatis, caule tereti scabro. *Mant. p.* 574. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 26.

Asteriscus. 6. S. foliis oppositis sessilibus indivisis, inferioribus alternis. *Dill. h. Elth. t.* 37. *f.* 42.

trilobatum. 7. S. foliis oppositis sessilibus cuneiformibus. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 155. *f.* 1.

trifoliatum. 8. S. foliis ternis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 68.

987. POLYMNIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 0. *Cal.* exterior 4-5phyllus. interior 10phyllus, foliolis cymbiformibus.

carnosa. 1. P. foliis alternis oblongis, calicibus serratis, caule frutescente decumbente. *Suppl. p.* 384.

canadensis. 2. P. foliis alternis hastato-sinuatis. *Amœn. acad.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

Uvedalia. 3. P. foliis oppositis hastato-sinuatis. *Pluckn. alm. t.* 83. *f.* 3.

Tetragonotheca. 4. P. foliis oppositis spatulatis subdentatis. *Sp. pl. p.* 1273. Tetragonotheca helianthoides.

spinosa. 5. P. foliis oppositis ovato-cordatis sessilibus, aculeis supra axillaribus, calicibus integris, caule fruticoso erecto. *Suppl. p.* 384.

abyssinica. 6. P. foliis oppositis lanceolatis sessilibus. *Suppl. p.* 383.

Wedelia. 7. P. foliis lanceolatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 118. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 198. *Pappus 10dentatus; an ergo hujus generis?*

988. CHRYSOGONUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 1phyllus, 3dentatus. *Cal.* 5phyllus. *Sem.* caliculo 4phyllo involuta.

virginianum. 1. CHRYSOGONUM. *Pluckn. alm. t.* 83. *f.* 4. & *t.* 242. *f.* 3. *Petioli folio longiores.*

BASTERA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus.

Houttuyni. 1. BASTERA. *Houttuyn. Linn. Syſt.* 4. *p.* 437.

989. MELAMPODIUM. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* 1phyllus, vulviformis. *Cal.* 5phyllus.

humile. 1. M. caule erecto, foliis lyrato-dentatis ſeſſilibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 114.

americanum. 2. M. caule erecto, foliis ſublinearibus utrinque unidentatis.

auſtrale. 3. M. caule decumbente, foliis ovatis ſerratis.

TRIXIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice hirſuto. *Corollul.* radii 3fidæ.

terebinthinacea. 1. Tr. foliis ovatis ſerrulatis hiſpidis ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 115.

aſpera. 2. Tr. foliis ovatis baſi & apice attenuatis dentato-ſerratis aſperis, floribus paniculatis. *Aubl. pl. guj. p.* 804. *t.* 317.

eroſa. 3. Tr. foliis lato-ovatis inciſo-ſerratis rugoſis ſcabris petiolo longioribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 115.

BAILLIERIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice 2cornia. *Cal.* ovatus, 4-5phyllus. *Corollul.* rad. 7.

aſpera. 1. BAILLIERIA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 804. *t.* 317. β) Bailliera ſilveſtris *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 807.

990. CALENDULA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* polyphyllus, ſubæqualis. *Sem.* diſci ut plurimum membranacea.

ſancta. 1. C. ſeminibus urceolatis obovatis lævibus, calicibus ſubmuricatis.

arvensis. 2. C. seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis, intimis conglobatis; extimis erectis caudatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 239.

officinalis. 3. C. seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Mill. ill. ic. Knorr. del. hort.* 1. *t.* R. 21.

pumila. 4. C. seminibus oblongis incurvatis, foliis orbiculatis crenatoserratis, serraturis mucronatis, scapo nudo unifloro. *Forst. flor. austr. p.* 57.

tomentosa. 5. C. foliis obovatis integris tomentosis, scapo nudo unifloro. *Suppl. p.* 284.

fruticosa. 6. C. foliis obovatis subdentatis, caule fruticoso decumbente. *Mill. h. angl. t.* 283.

rigida. 7. C. foliis ellipticis dentatis scabriusculis, seminum alis semiorbiculatis *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 271.

hybrida. 8. C. foliis lanceolatis dentatis, caule folioso, pedunculis superne incrassatis. *Mill. h. angl. t.* 75. *f.* 1.

pluvialis. 9. C. foliis lanceolatis sinuato-denticulatis, caule folioso, pedunculis filiformibus. *Mill. h. angl. t.* 75. *f.* 2.

nudicaulis. 10. C. foliis lanceolatis sinuato-dentatis, caule subnudo. *Mant. p.* 479. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 33.

arborescens. 11. C. foliis cuneiformi-lanceolatis serrato-dentatis, caule ramoso, pedunculis unifloris teretibus. *Jacq. Colect.* 3. *p.* 167.

graminifolia. 12. C. foliis linearibus subintegerrimis, caule subnudo unifloro, seminibus obcordato orbiculatis lævibus. *Mill. h. angl. t.* 76. *f.* 1.

Tragus. 13. C. caulescens, foliis alternis linearibus subintegerrimis subpilosis, seminibus suborbiculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 271.

oppositifolia. 14. C. foliis oppositis linearibus integerrimis subcarnosis glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 272.

991. ARCTOTIS. *Recept.* villosum vel paleaceum. *Pappus* corona subcentophylla. *Cal.* imbricatus: squamis intimis apice scariosis.

* *receptaculo villoso.*

⊢ *flosculis radiantibus sterilibus.*

calendulacea. 1. A. foliis runcinatis subtomentosis.

Calendula. α A. flosculis radiantibus duodenis subintegris. *Herm. par. bat. p.* 42. *ic.*

hypochondriaca. β. A. flosculis radiantibus trifidis, media inflexa. *Breyn ic. t.* 15.

tristis. γ. A. flosculis radiantibus quadripartitis. *Mant. p.* 479. *Commel rar. t.* 36.

coruscans. δ. A. flosculis radiantibus tripartitis, exteriori trifida.

superba. ε. A. flosculis radiantibus quinquepartitis.

serrata. 2. A. foliis lanceolatis indivisis dentato-serratis. *Suppl. p.* 385.

microphylla. 3. A. foliis linearibus indivisis nudis. *Suppl. p.* 385.

⊢ ⊢ *flosculis radiantibus fertilibus.*

argentea. 4. A. foliis lanceolato-linearibus integerrimis tomentosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 273.

plantaginea. 5. A. foliis lanceolato-ovatis nervosis denticulatis amplexicaulibus.

angustifolia. 6. A. caulibus repentibus arachnoideis, foliis lyratis utrinque bidentatis. β) *Mant. p.* 479.

aspera. 7. A. foliis pinnato-sinuatis villosis, laciniis oblongis dentatis. *Mant. p.* 480. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 22.

grandiflora. 8. A. foliis pinnatifidis denticulatis arachnoideis trinerviis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 272.

** *receptaculo paleaceo.*

tenuifolia. 9. A. foliis linearibus indivisis glabris. *Mant. p.* 288. *an vere distincta ab angustifolia?*

scariosa. 10. A. foliis decompositis, flosculis radiantibus sterilibus, paleis flosculos disci æquantibus. *Ait. hort. Kew. 3. p.* 274.

acaulis, 11. A. pedunculis radicalibus, foliis lyratis. *Commel. rar. t.* 35.

dentata. 12. A. flosculis radiantibus sterilibus, foliis pinnatis, pinnis pinnatifido-dentatis. *Burm. afr. t.* 64.

paleacea. 13. A. flosculis radiantibus sterilibus, paleis flosculos disci æquantibus, foliis pinnatis linearibus. *Burm. afr. t.* 65. *f.* 1.

paradoxa. 14. A. flosculis radiantibus sterilibus, paleis coloratis disco longioribus, foliis bipinnatis linearibus. *Pluckn. phyt.* 312. *f.* 5.

anthemoides. 15. A. paleis flosculo brevioribus, foliis supradecompositis linearibus. *Burm. afr. t.* 63. *f.* 2.

caroliniana. 16. A. foliis radicalibus ovatis dentatis hirsutis, pedunculis radicatis pilosis unifloris. *Walt. flor. Carol. p.* 216.

992. OSTEOSPERMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* 0. *Cal.* polyphyllus. *Drupæ* subglobosæ, coloratæ, tandem osseæ, congregatæ, 1 loculares.

junceum. 1. O. foliis linearibus acutis carinatis distantibus, panicula terminali. *Mant. p.* 290.

triquetrum. 2. O. foliis linearibus triquetris. *Suppl. p.* 385.

ilicifolium 3. O. foliis oblongis dentato-angulatis scabris semiamplexicaulibus, ramis sulcatis. *Burm. zey. t.* 62.

spinosum. 4. O. spinis ramosis. *Mant. p.* 480. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 43. *Pisifero proximum.*

pisiferum. 5. O. foliis lanceolatis mucronatis subpetiolatis glabris serratis, ramis denticulato-angulatis. *Mill. h. angl. t.* 194. *f.* 1.

calendulaceum. 6. O. foliis lanceolatis sessilibus dentatis scabris, caule carnoso laxo. *Suppl. p.* 386.

polygaloides. 7. O. foliis lanceolatis sparsis decurrentibus glabris integerrimis, axillis lanatis. *Mant. p.* 480. *Pluckn. mant. t.* 382.

corymbosum. 8. O. foliis lanceolatis glabris, floribus paniculatis. *Mant. p.* 290.

ciliatum. 9. O. foliis elliptico-lanceolatis crenatis ciliatis. *Burm. afr. t. 61. f. 2.*

imbricatum. 10. O. foliis ovatis obtusis imbricatis. *Mant. p. 290.*

herbaceum. 11. O. foliis ovatis subsessilibus spatulatis serratis, caule herbaceo. *Suppl. p. 385.*

niveum. 12. O. foliis ovatis petiolatis dentatis lanatis. *Suppl. p. 386.*

perfoliatum. 13. O. foliis ovatis petiolatis angulato-dentatis subtus tomentosis, petiolis perfoliato-amplexicaulibus. *Suppl. p. 386.*

moniliferum. 14. O. foliis obovatis serratis petiolatis subdecurrentibus. *Dill. h. Elth. t. 78. f. 79.*

Arctotoides. 15. O. foliis lyratis petiolatis, petiolis basi auriculatis semiamplexicaulibus tomentosis. *Suppl. p. 385.*

rigidum. 16. O. foliis dentato-pinnatifidis pilosis, ramis inermibus. *Ait. hort. Kew. 3. p. 275.*

pinnatifidum. 17. O. foliis pinnatifidis. *Herit. stirp. nov. 1. p. 11. t. 6.*

cæruleum. 18. O. erectum viscosum, foliis pinnatis, pinnis oblongis inæqualiter serratis utrinque decrescentibus. *Jacq. Coll. 1. p. 78. an idem cum pinnatifido ?*

993. OTHONNA. *Recept.* nudum. *Pappus* subnullus. *Cal.* 1phyllus, multifidus, subcylindricus.

* *foliis simplicibus indivisisque.*

ericoides. 1. O. caule dichotomo imbricato, foliis acerosis, pedunculo longissimo, ex divaricaturis solitario. *Suppl. p. 388.*

tenuissima. 2. O. foliis filiformibus carnosis, caule fruticoso. *Mant. p. 118. Plunckn. phyt. 319. f. 5.*

linifolia. 3. O. herbacea, foliis linearibus marginatis gramineis. *Suppl. p. 388.*

crassifolia. 4. O. foliis lanceolatis integerrimis subcarnosis, caule erecto. *Mill. h. angl. t. 245. f. 2.*

cheirifolia. 5. O. foliis lanceolatis trinerviis integerrimis, caule suffruticoso repente. *Mill. h. angl. t. 245. f. 1.*

coronopifolia. 6. O. foliis lanceolatis, infimis integerrimis, ſuperioribus ſinuato-dentatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 70.

parviflora. 7. O. foliis lanceolatis glabris amplexicaulibus, floribus paniculatis. *Mant. p.* 289. *Syſt. nat.* XII, 3. *p.* 553. Senecio rigens. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 72.

lateriflora. 8. O. foliis lanceolatis, floribus lateralibus, pedunculis longitudine foliorum. *Suppl. p.* 387.

Lingua. 9. O. foliis ovato-lanceolatis ſemiamplexicaulibus. *Suppl. p.* 387.

heterophylla. 10. O. foliis radicalibus ovatis angulato-dentatis, caulinis lanceolatis integriuſculis. *Suppl. p.* 387.

Cacalioides. 11. O. ramoſa nuda lævis, foliis faſciculatis obovatis ſeſſilibus pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 388.

fruteſcens. 12. O. foliis ovalibus ſubdentatis, caule fruteſcente. *Mant. p.* 288. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 557. Cinneraria othonnites. *Commel. h. amſt.* 20. *t.* 76.

virginea. 13. O. foliis cuneatis inciſis. *Suppl. p.* 389.

arboreſcens. 14. O. foliis oblongis integerrimis, caule arboreſcente carnoſo, cicatricibus lanatis. *Dill. h. Elth. t.* 103. *f.* 123.

bulboſa. 15. O. foliis oblongis nudis petiolatis, caule herbaceo, pedunculis unifloris longiſſimis. *Breyn cent.* 1. *t.* 66.

denticulata. 16. O. foliis oblongis denticulatis glabris baſi attenuatis amplexicaulibus, floribus paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 276.

digitata. 17. O. foliis oblongis indiviſis, vel digitato-dentatis, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 386.

** *foliis diviſis compoſitiſve.*

capillaris. 18. O. foliis lyratis ramis capillaribus. *Suppl. p.* 388.

trifida. 19. O. foliis trifidis linearibus, floribus lateralibus pedunculatis. *Suppl. p.* 387.

trifurcata. 20. O. foliis trifido-pinnatifidis, laciniis linearibus, pedunculis lateralibus faſtigiatis. *Suppl. p.* 387.

pectinata. 21. O. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus parallelis. *Mill. h. angl. t.* 194. *f.* 2.

ciliata. 22. O. foliis pinnatifidis ſeſſilibus, laciniis ovatis ciliatis, pedunculis terminalibus elongatis unifloris. *Suppl. p.* 386.

pinnata. 23. O. foliis pinatifidis, laciniis lanceolatis integerrimis decurrentibus. *Suppl. p.* 387. *Burm. afr. t.* 59.

munita. 24. O. foliis pinnatifidis imbricatis incurvis, laciniis triquetris subulatis, caule dichotomo, pedunculis ex divaricaturis. *Suppl. p.* 388.

abrotani-folia. 25. O. foliis multifido-pinnatis linearibus, caulium geniculis villosis. *Seb. muf.* 2. *t.* 23. *f.* 6.

Tagetes. 26. O. foliis linearibus pinnatis subdentatis. *Murray comm. goett.* 1780. *p.* 17. *t.* 5.

Athanasiæ. 27. O. foliis pinnatis filiformibus, calice hemisphærico duodecimdentato. *Suppl. p.* 386.

1324. HIPPIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Semina* marginibus latissimis. *Cal.* hemisphæricus, subimbricatus. *Corollul.* radii 10, obsoletæ, subtrifidæ.

integrifolia. 1. H. hispida erecta, foliis obovatis serratis quinquenerviis, racemis terminalibus. *Suppl. p.* 389.

minuta. 2. H. herbacea repens glabra, foliis pinnatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p.* 389.

frutescens. 3. H. fruticosa villosa, foliis pinnatifidis, floribus corymbosis. *Mant. p.* 291. *Suppl. p.* 390. *Sp. pl. p.* 1183. Tanacetum frutescens. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 579. Eriocephalus pectinifolius. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 101.

994. ERIOCEPHALUS. *Recept.* subvillosum. *Pappus* o. *Cal.* 10phyllus, æqualis. *Radii* flosculi 5.

africanus. 1. E. foliis integris divisisque, floribus corymbosis. *Dill. h. Elt. t.* 110. *f.* 134.

racemosus. 2. E. foliis linearibus indivisis, floribus racemosis.

995. FILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* o. vel brevis ſimplex. *Cal.* imbricatus. *Floſculi feminei*, partim apetali inter ſquamas calicis locati.

acaulis. 1. F. floribus acaulibus ſeſſilibus, foliis floralibus majoribus. *Barr. pl. rar. ic.* 127.

arvenſis. 2. F. caule paniculato, floribus conicis lateralibus.

germanica. 3. F. panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirſutis, foliis acutis.

pyramidata. 4. F. caule dichotomo, floribus pyramidatis pentagonis axillaribus, floſculis femineis ſerratis.

gallica. 5. F. caule dichotomo erecto, floribus ſubulatis axillaribus, foliis filiformibus. *Pluckn. alm. t.* 298. *f.* 2.

montana. 6. F. caule ſubdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribuſque. *Lob. ic.* 481.

Leontopodium. 7. F. caule ſimpliciſſimo, capitulo terminali bracteis hirſutiſſimis radiato. *Mant. p.* 481. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 86.

996. MICROPUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* caliculatus. *Rad.* corollæ o. *Floſculi feminei* ſquamis calicis involuti.

ſupinus. 1. M. caule procumbente, foliis geminis. *Pluckn. alm. t.* 187. *f.* 6.

erectus. 2. M. caule erecto, calicibus edentulis, foliis ſolitariis. *Loefl. hiſp. t.* 1. *f.* 3.

POLYGAMIA SEGREGATA.

997. ELEPHANTOPUS. *Caliculus* 4florus. *Corollulæ* ligulatæ, hermaphroditæ. *Recept.* nudum. *Pappus* ſetaceus vel ariſtatus.

ſcaber. 1. E. foliis oblongis ſcabris. *Dill. h. Elth. t.* 106. *f.* 126.

tomentoſus. 2. E. foliis ovatis tomentoſis.

ſpicatus. 3. E. foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus. *Sloan. jam.* 1. *p.* 256. *t.* 150. *f.* 3. 4.

anguſtifolius. 4. E. foliis caulinis lineari-lanceolatis integris villoſis. *Sloan. jam.* 1. *p.* 256. *t.* 148. *f.* 4.

1325. ŒDERA. *Calic.* multiflori. *Corollulæ* tubuloſæ, hermaphroditæ, una alterave feminea ligulata. *Recept.* palaceum. *Pappus* paleis pluribus.

prolifera. 1. Œ. foliis lanceolatis oppoſitis ciliatis utrinque glabris. *Mant. p.* 291. *Supp. p.* 391. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 569. Buphthalmum capenſe.

aliena. 2. Œ. foliis linearibus ſubtus tomentoſis. *Suppl. p.* 390.

998. SPHÆRANTHUS. *Calic.* multiflori. *Coroll.* tubuloſæ hermaphroditæ & obſoletæ feminæ. *Recept.* ſquamoſum. *Pappus* o.

indicus. 1. Sph. foliis decurrentibus lanceolatis ſerratis, pedunculis criſpatis. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 43.

africanus. 2. Sph. foliis decurrentibus ovatis ſerratis, pedunculis teretibus. *Mant. p.* 119. *Burm. ind. t.* 60. *f.* 2.

ſinenſis. 3. Sph. foliis ſeſſilibus pinnatifidis. *Mant. p.* 119.

999. ECHINOPS. *Calic.* 1florus. *Coroll.* tubuloſæ, hermaphroditæ. *Recept.* ſetoſum. *Pappus* obſoletus.

ſphærocephalus. 1. E. capitulis globoſis, foliis ſinuatis aſperis ſubtus tomentoſis. *Mill. illuſtr. ic.*

ſpinoſus. 2. E. capitulis inſperſis ſpinis longis. *Mant. p.* 119.

Ritero. 3. E. capitulo globoſo, foliis pinnatifidis ſupra glabris. *Mill. h. angl. t.* 130. *β*) *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 46.

ſtrigoſus. 4. E. capitulis faſciculatis, calicibus lateralibus ſterilibus, foliis ſupra ſtrigoſis. *Herm. par. Lugdb. p.* 224. *ic.*

TETRANTHUS. *Calix* 4florus. *Calic.* 1phyllus. *Sem.* coronata. *Coroll.* tubuloſæ, hermaphroditæ.

littoralis. 1. TETRANTHUS. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 116.

ROLANDRA. *Flores* faſciculati in capitulum ſquamis interjectis. *Cal.* partial. 2valvis, 1florus. *Coroll.* hermaphroditæ. *Pappus.* 0.

argentea. 1. ROLANDRA. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 116. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 7. *Echinops fruticoſus.*

1000. GUNDELIA. *Calic.* fere 0. *Corollul.* 5. tubulosæ, masculæ & hermaphroditæ. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 0. *Sem.* margine obsoleto.

Tournefortii. 1. GUNDELIA. *Mill. h. engl. t.* 287.

1422. JUNGIA. *Cal. communis* 3florus. *Recept.* paleaceum. *Flosculi* tubulosi, 2labiati, labio exteriori ligulato, interiori 2partito.

ferruginea. 1. JUNGIA. *Suppl. p.* 3901.

CRASPEDIA. *Cal.* communis imbricatus. *Calic.* 0. *Flosculi* hermaphroditi, tubulosi, fasciculis aliquot depressis. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumosus.

uniflora. 1. CRASPEDIA. *Forst. flor. austr. p.* 58.

NASSAUVIA. *Cal. comm.* 4–5florus. *Recept.* nudum. *Flosc.* subbilabiati, hinc 3dentati, inde 2fidi.

magellanica. 1. NASSAUVIA. *Jussieu gen. plant. p.* 175.

1001. STŒBE. *Calic.* 1florus *Coroll.* tubulosæ, hermaphroditæ. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus.

æthiopica. 1. St. foliis recurvato-uncinatis nudis. *Mant. p.* 481.

ericoides. 2. St. foliis recurvatis incanis, corollis bifloris difformibus. *Mant. p.* 574. *Breyn. cent. t.* 9.

disticha. 3. foliis recurvis fasciculatis, spicis bifariis. *Suppl. p.* 391.

prostrata. 4. St. foliis resupinatis hinc tomentosis, caulibus prostratis *Mant. p.* 291.

gnaphaloides. 5. St. foliis imbricatis appressis filiformibus. *Mant. p.* 119. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 582. Seriphium corymbiferum. *Spec. pl. p.* 1192. Gnaphalium niveum. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 1.

gomphrenoides. 6. St. foliis imbricatis appressis lanceolatis, capitulo terminali sessili. *Suppl. p.* 391.

scabra. 7. St. foliis tortis appressis linearibus exterius tuberculato-scabris intus tomentosis, floribus racemosis. *Suppl. p.* 391.

Rhinocerotis. 8. St. foliis triquetris appressis, ramulis tomentosis cernuis, racemis proliferis. *Suppl. p.* 391.

reflexa. 9. St. procumbens, foliis linearibus, spicis ovatis, ramis ascendentibus. *Suppl. p.* 391.

CLAS.

CLASSIS XIX.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

* *fructificationibus spicatis.*

1169. EQUISETUM. *Spica* sparsa, *Fructificationes* peltatæ, basi valvatæ.

1170. ONOCLEA. *Spica* 2sticha, *Fructificationes* 5valves.

1171. OPHIOGLOSSUM. *Spica* articulata, *Fructificationes* circumscissæ.

1172. OSMUNDA. *Spica* racemosa, *Fructificationes* 2valves.

MARATTA. *Capsulæ* multiloculares, loculis superne dehiscentibus.

1185. LYCOPODIUM. *Capsulæ* dehiscentes 2valves.

** *fructificationibus frondosis, in pagina inferiori.*

1173. ACROSTICUM. *Fructificationes* subtus totam frondem tegentes.

1179. POLYPODIUM. *Fructificationes* in acervulos subrotundos subfronde distributæ.

DICKSONIA. *Fructificationes* subrotundæ, margini averso subjectæ.

1176. HEMIONITIS. *Fructificationes* lineas decussantes sub fronde efficientes.

1178. ASPLENIUM. *Fructificationes* lineas subparallelas sub fronde efficientes.

1175. BLECHNUM. *Fructificationes* lineas utrinque costis adjacentes efficientes.

1177. LONCHITIS. *Fructificationes* lineas ad sinus marginis efficientes.

1174. PTERIS. *Fructificationes* subtus in linea marginali frondis.

DAREA. *Fructificationes* lineas breves solitarias ex unico frondis latere subtus exsertas efficientes.

1180. ADIANTUM. *Fructificationes* maculas apicem margine reflexo obtectas efficientes.

1181. TRICHOMANES. *Fructificationes* solitariæ margini ipsi insertæ.

CÆNOPTERIS. *Fructific.* puncto marginali solitario, rima concava scobe parva capitulata farta.

*** *fructificationibus lateralibus.*

1182. MARSILEA. *Fructus* 4capſularis.
1183. PILULARIA. *Fructus* 4locularis.
1184. ISŒTES. *Fructus* 2locularis.

MUSCI.

* *frondoſi.*

1186. PORELLA. *Capſ.* multilocularis, poris pertuſa, ſine operculo & calyptra.

1187. SPHAGNUM. *Flos maſculus* clavatus, antheris planis. *Capſ.* operculatæ ſine calyptra, ore lævi, in eadem planta.

1191. SPLACHNUM. *Gemma* orbicularis, terminalis. *Capſ.* in alia planta cum calyptra & apophyſi maxima, periſtomate octodentato.

1192. POLYTRICHUM. *Gemma* orbicularis, terminalis. *Capſula* in alia planta calyptra munita, periſtomatis dentibus 32.

1193. MNIUM. *Gemma* orbicularis, rarius capitata. *Capſ.* utplurimum in alia planta, calyptra munitæ, periſtomatis dentibus 16, rarius 4.

1189. PHASCUM. *Capſula* calyptra munita cum rudimento operculi perſiſtente.

1194. BRYUM. *Gemmæ* ſæpe axillares, nunc in alia nunc in eadem planta cum capſulis calyptra munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti inſidentibus.

1195. HYPNUM. *Gemmæ* in alia utplurimum planta. *Capſulæ* pedunculo laterali ex perichætio prodeunti inſidentes, periſtomatis dentibus ſedecim.

1190. FONTINALIS. *Gemma* in eadem planta cum *capſula* ſeſſili perichætio imbricato obvoluta & calyptra munita.

1188. BUXBAUMIA. *Gemma* orbicularis. *Capſ.* pedunculata, periſtomate externo 16dentato, interno membranaceo plicato.

** *hepatici.*

1198. MARCHANTIA. *Capſula* peltata, pedunculata, inferne ſeminifera.

1196. JUNGERMANNIA. *Capſula* pedunculata, nuda, 4valvis.
1197. TARGIONIA. *Cal.* 2valvis, includens capſulam campanulatam.

ALGÆ.

* *terreſtres.*

1201. ANTHOCEROS. *Capſ.* ſubulata, 2valvis, valvis ſeminiferis.
1199. BLASIA. *Theca* cylindrica e fundo gemmas globuloſas excludens.
1200. RICCIA. *Fructificationes* granuloſæ frondi innatæ.
1202. LICHEN. *Propagines* & *gemmæ* receptaculis elevatis lævibus nitidis cruſtæ vel frondis innidulantes.
1208. BYSSUS. *Fibræ* ſimplices uniformes lanuginoſæ.

** *aquaticæ.*

1206. ULVA. *Gemmæ* vel *Gangyli* rotund. in membrana diaphana.
1205. FUCUS. *Gangyli* cuſpomorphi vel *ſemina* graniformia ſub punctis perforatis latentia.
1207. CONFERVA. *Fibræ* ſimplices, aut ramoſæ gemmas globuloſas protrudentes.

* *Spongia? Corallina?*

FUNGI.

1209. AGARICUS. *Fungus* ſubtus lamelloſus.
MERULIUS. *Fungus* ſubtus venoſus.
1210. BOLETUS. *Fungus* ſubtus poroſus.
THÆLÆPHORA. *Fungus* ſubtus papilloſus.
1211. HYDNUM. *Fungus* ſubtus echinatus.
1212. PHALLUS. *Fungus* ſubtus lævis, ſupra celluloſus.
1214. HELVELLA. *Fungus* turbinatus, plicatus, rugoſus.
ATRACTOBOLUS *Fungus* ejaculatorius ſeſſilis cupulatis operculatus, veſicula gemmifera fuſiformi ejicienda.
TYMPANIS. *Fungus* cyathiformis, cupula ſuperne volvata, gemmis ſevis confectis in pulverem fatiſcentibus.
MYROTHECIUM. *Fungus* cyathiformis, cupula ſuperne volvam, gemmis lento viſcidis.

SETARIA. *Fungus* hypocrateriformis ſtipitatus, pilei ſuperficie ſuperiori punctata umbilicata, margine primum ævoluto, gemmis ſimilaribus, ſtipite brevi ſetaceo.

CYATHUS. *Fungus* campanulatus, capſulas lentiformes intus gerens.

PORONIA. *Fungus* patelliformis, in ſuperficie externa gemmas ejaculans.

1215. PEZIZA. *Fungus* ſæpe concavus, ſine capſulis aut gemmis oculo nudo viſibilibus.

PATERA. *Fungus* carnoſus, ſeſſilis, planiuſculus, ſuperne glaber.

1216. CLAVARIA. *Fungus* glaber clavatus aut ramoſus.

ACROSPERMUM. *Fungus* ſimpliciſſimus ſuberectus, in apice convexo extrinſecus gemmas portans.

PUCCINIA. *Fungus* cylindricus, gemmis caudatis farctus.

STEMONITIS. *Fungus* corticatus, tomento polliniféro elaſtice proſiliente impletus.

1213. CLATHRUS. *Fungus* cancellatus.

1217. LYCOPERDON. *Fungus* gemmas Filo inſtructas continens.

TUBER. *Fungus* ſucco pulpoſo repletus.

CARPOBOLUS. *Fungus* capſulam globoſam ejaculans, ſeſſilis, vertice radiatim dehiſcente.

SPERMODERMIA. *Fungus* globoſus ſeſſilis ſimpliciſſimus ſpongioſus, corticis vicem ſupplente polline conferto.

VERMICULARIA. *Capſula* globoſa ſeſſilis, corporibus vermiformibus liberis repleta.

PYRENIUM. *Fungus* globoſus ſeſſilis integerrimus, germina nuda conglobata nuclei inſtar includens.

MEDUSULA. *Fungus* globoſus ſtipitatus confertus ſolidus, gemmis externis fuſiformibus flexilibus colliqueſcentibus.

CHORDOSTYLUM. *Fungus* tenuiſſimus ſtipitatus, capitulo globoſo ſubdeciduo intus gemmas gerente, ſtipite longiſſimo ſubramoſo.

SPHÆRIA. *Fungus* gemmis ecaudatis farctus, per poros in ſuperficie ſparſos emittens.

THELEOBOLUS. *Fungus* ejaculatorius ſeſſilis, ſubſtantia & placenta gemmifera ſolidis gelatinoſis dejiciendis.

1204. TREMELLA. *Fungus* gelatinoſus, gemmis latitantibus.

MESENTERICA. *Fungus* expanſus gelatinoſus venoſus, in margine gemmas ferens.

TUBERCULARIA. *Fungus* gelatinofus ftipitatus, pileatus ftipite craffiffimo farcto; pileo tuberculato-papillofo ftipiti arcte appreffo in fuperficie fuperiori gemmas portante.

STILBUM. *Fungus* gelatinofus aggregatus ftipitatus, capitulo diaphano nitente folido perfiftente, extrinfecus gemmas portante.

ASCOPHORA. *Fungus* erectus ftipitatus, capitulo globofo-oblongo inflato opaco elaftico, extrinfecus gemmas ferente ftipite fetaceo.

SCLEROTIUM. *Fungus* fimpliciffimus globofo-oblongus, fubftantia tenaci duriufcula centro demum fubhiante, cortice infeparabili fuperne nunquam dehifcente.

HYSTERIUM. *Fungus* labiato-globofus feffilis, capfula in labiis dehifcente, fubftantia prominente exterius gemmas portante.

XYLOSTROMA *Fungus* expanfus coriaceus deformis interpolatus lævis æqualis, gemmis globulofis minutiffimis intus fibrillis fungi infixis.

HYDROGERA. *Fungus* ftipitatus ftipite capillari fuperne ventricofo hydrophoro, placenta gemmifera dejicienda pileum conftituente.

MUCILAGO. *Fungus* cellulofus aut filamentofus aquofus, fine granulis & capitulis.

EMBOLUS. *Fungus* cellulofus pulverulentus, fine cortice.

HELOTIUM. *Fungus* fugaciffimus perpendicularis, ftipite capillari, pileo minuto convexo inferne nudas gemmas portante.

1218. MUCOR. *Fungus* mollis in pulverem capitulo inclufum dehifcens.

MONILIA. *Granula* minuta fubftantiæ filamentofæ affixa.

RETICULARIA. *Fungus* germina pulverulenta reticulo implicata gerens.

FULIGO. *Fungus* mollis, butyraceus, in atrum pulverem dilabens.

FILICES.

1169. EQUISETUM. *Clava* ovato-oblonga, multivalvis, Fructificationes peltatae intus dehiscentes.

silvaticum. 1. E. frondibus compositis, spica terminali flaccida. *Weinm. phytanth. t.* 479. *f.* f.

arvense. 2. E. scapo fructificante nudo, fronde sterili verticillato-ramoso decumbente. *Curt. flor. Lond. t.* 285.

palustre. 3. E. caule angulato, frondibus simplicibus. *Weinm. phytanth. t.* 479. *f.* d. e. β) *Raj. angl.* 3. *t.* 5. *f.* 3.

fluviatile. 4. E. caule striato, frondibus subsimplicibus. *Blackw. herb. t.* 217. *f.* 2.

limosum. 5. E. caule subnudo laevi. *Raj. angl.* 3. *t.* 5. *f.* 2. *an mera fluviatilis varietas?*

hiemale. 6. E. caule nudo scabro basi subramoso. *Regn. bot. t.* 401.

pratense. 7. E caule subaequali ramoso sulcato scaberrimo, ramis patentissimis sterilibus, dentibus vaginarum subulatis scariosis. *Ehrhart Hannöv. Mag.* 1784. 9.

giganteum. 8. E. caule striato arborescente, frondibus simplicibus strictis spiciferis. *Plum. ic.* 125. *f.* 2.

1185. LYCOPODIUM. *Capsulae?* reniformes, 2-valves, elasticae, polyspermae.

nudum. 1. L. foliis subnullis, spicis dichotomis, floribus distantibus. *Mant. p.* 506. *Dill. musc. t.* 64. *f.* 4.

selaginoides. 2. L. foliis sparsis ciliatis lanceolatis, spicis solitariis terminalibus foliosis. *Flor. dan. t.* 70.

taxifolium. 3. L. foliis sparsis lanceolato-linearibus patulis, caule erecto dichotomo, capsulis sparsis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 138.

alopecuroides. 4. L. foliis sparsis ciliatis linearibus, spicis terminalibus foliosis. *Dill. musc. t.* 62. *f.* 8.

squarrosum. 5. L. foliis sparsis linearibus glabris, spicis terminalibus foliosis. *Forst. flor. austr. p.* 86.

dichotomum. 6. L. foliis ſparſis lineari-acuminatis patulis, caule declinato aſſurgente dichotomo, ramis patulis, capſulis ſparſis. *Jacq. h. Vind.* 3. *p.* 26. *t.* 45.

clavatum. 7. L. foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Flor. dan. t.* 126.

rupeſtre. 8. L. foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis terminalibus tetragonis. *Dill. muſc. t.* 63. *f.* 11.

inundatum. 9. L. foliis ſparſis integerrimis, ſpicis terminalibus folioſis. *Flor. dan. t.* 336.

cernuum. 10. L. foliis ſparſis curvatis, caule ramoſiſſimo, ſpicis nutantibus. *Dill. muſc. t.* 63. *f.* 10.

obſcurum. 11. L. foliis ſparſis decurrentibus, ſarmentis repentibus, ſurculis erectis dichotomis. *Dill. muſc. t.* 67.

Bryopteris. 12. L. foliis ſparſis imbricatis, ramulis convolutis. *Dill. muſc. t.* 66. *f.* 11.

annotinum. 13. L. foliis ſparſis quinquefariis ſubſerratis, ſurculis annotino-articulatis, ſpicis terminalibus glabris erectis. *Flor. dan. t.* 127.

Selago. 14. L. foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, capſulis ſparſis. *Flor. dan. t.* 104.

linifolium. 15. L. foliis alternis remotis lanceolatis, capſulis axillaribus. *Dill. muſc. t.* 57. *f.* 5.

gnidioides. 16. L. foliis ternis imbricatis lanceolatis obtuſis glaberrimis caule dichotomo, ramis elongatis, capſulis axillaribus *Suppl. p.* 448.

ſerratum. 17. L. foliis quaternis lanceolatis ſerratis, capſulis ſeſſilibus axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 341.

Phlegmaria. 18. L. foliis verticillato-quaternis, ſpicis terminalibus dichotomis. *Dill. muſc. t.* 61. *f.* 5.

rigidum. 19. L. foliis ſubverticillatis undique reflexis, inferioribus ſquarroſis rigidis, caule dichotomo faſtigiato, capſulis ſparſis. *Dill. muſc. p.* 4410. *t.* 57. *f.* 4.

ſcarioſum. 20. L. foliis bifariis imbricatis erectis ovatis glabris, ſpicis terminalibus ſquamoſis, ſquamis ſcarioſis reflexis. *Forſt. fl. auſtr. p.* 87.

complanatum. 21. L. foliis bifariis connatis, ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis pedunculatis. *Flor. dan. t.* 78.

stolonife-rum. 22. L. foliis bifariis patentibus, superficialibus oblongis acutis distichis, surculis tetragonis repentibus longissimis inferne subnudis stoloniferis, spicis terminalibus sessilibus. *Plum. fil. t.* 43.

plumosum. 23. L. foliis bifariis patentibus, superficialibus semiovatis ciliatis, surculis erectiusculis, spicis terminalibus tetragonis sessilibus. *Dill. musc. t.* 66. *f.* 10.

ornithopodioides. 24. L. foliis bifariis patentibus, supeficialibus distichis, surculis repentibus, spicis sessilibus. *Dill. musc. t.* 62. *f.* 1. B.

carolinianum. 25. L. foliis bifariis patulis, superficialibus solitariis, scapis longissimis monostachis. *Dill. musc. t.* 66. *f.* 6.

helveticum. 26. L. foliis bifariis patulis superficialibus distichis, spicis geminis pedunculatis. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 196.

flabellatum. 27. L. foliis bifariis, superficialibus distichis, caule erecto tereti. *Dill. musc. t.* 65. *f.* 5.

canaliculatum. 28. L. foliis bifariis, superficialibus distichis, caule erecto canaliculato. *Dill. musc. t.* 65. *f.* 6.

ciliare. 29. L. foliis bifariis, superficialibus distichis, caule ramoso, spicis terminalibus solitariis foliosis compressis unilateralibus. *Kœnig ap. Retz. obs. bot.* 5. *p.* 32.

circinale. 30. L. foliis bifariis, superficialibus geminis, ramis convolutis. *Suppl. p.* 448. *Dill. musc. t.* 66. *f.* 11.

denticulatum. 31. L. foliis bifariis, superficialibus imbricatis, surculis repentibus, capsulis sparsis. *Dill. musc. t.* 66. *f.* 1. A. *an varietas helvetici?*

apus. 32. L. foliis bifariis, alternis minoribus, caule repente, spicis sessilibus. *Dill. musc. t.* 64. *f.* 3.

myrtifolium. 33. L. foliis quadrifariis lineari-oblongis, spicis terminalibus filiformibus foliosis. *Forst. flor. austr. p.* 87.

verticillatum. 34. L. foliis quadrifariis approximatis acerosis, ramis dichotomis, capsulis axillaribus verticillatis. *Suppl. p.* 448.

sanguinolentum. 35. L. foliis quadrifariis imbricatis, caulibus repentibus dichotomis, spicis sessilibus tetragonis. *Amœn. acad.* 3. *f.* 26.

alpinum. 36. L. foliis quadrifariam imbricatis acutis caulibus erectis bifidis, spicis sessilibus teretibus. *Flor. dan. t.* 79.

japonicum. 37. L. foliis sexfariis integris, caule radicante. *Tunb. flor. jap. p.* 341.

radicans. 38. L. foliis quadrifariis, binis patulis, binis imbricatis, ſpica filiformi bifurca, caule ramisque repentibus dichotomis compreſſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 493. *Dill. muſc. t.* 65. *f.* 2. A.

1170. ONOCLEA. *Spcia* 2ſticha, fructificationibus 3-5valvibus.

ſenſibilis. 1. O. frondibus pinnatis apice ſubracemoſis. *Mant. p.* 504. *Pluckn. man. t.* 404. *f.* 2.

polypodioides. 2. O. frondibus bipinnatis, fructificationibus trivalvibus. *Mant. p.* 306.

1171. OPHIOCLOSSUM. *Spica* 2ſticha, articulata, articulis, tranſverſim dehiſcentibus, ſubgloboſis.

vulgatum. 1. O. fronde ovata, ſcapo unifolio. *Flor. dan. t.* 147.

nudicaule. 2. O. frondibus ovatis, ſcapo aphyllo. *Suppl. p.* 443.

luſitanicum. 3. O. fronde lanceolata. *Barr. pl. rar. ic. t.* 252. *f.* 2.

reticulatum. 4. O. fronde cordata. *Plum. fil. t.* 164.

crotalophoroides. 10. O. fronde ſubcordata ſcapo breviori. *Walt. flor. carol. p.* 256.

pendulum. 5. O. frondibus linearibus longiſſimis indiviſis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 37. *f.* 3.

palmatum. 6. O. fronde palmata baſi ſpicifera. *Plum. fil. t.* 163.

flexuoſum. 7. O. ſcapo flexuoſo tereti, frondibus oppoſitis petiolatis palmatis, laciniis lanceolatis integerrimis glabris. *Suppl. p.* 443. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 33.

ſcanens. 8. O. caule flexuoſo tereti, frondibus conjugatis pinnatis, pinnis utrinque ſpiniferis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 33.

japonicum. 9. O. caule flexuoſo angulato, frondibus ſupradecompoſitis, foliolis alternis inciſis. *Thunb. flor. jap. p.* 328.

1172. OSMUNDA. *Spica* ramosa, Fructificationibus subglobosis, sessilibus transverse dehiscentibus.

* *fructificationibus in scapis distinctis.*
† *cauli ad basin frondis insidentibus.*

zeylanica. 1. O. scapo solitario, frondibus verticillatis lanceolatis indivisis. *Rumpf. amb. 6. t. 68. f. 3.*

Lunaria. 2. O. scapo solitario, racemo laterali, fronde pinnata, solitario. *Flor. dan. t. 18.*

virginica. 3. O. scapo solitario, fronde supradecomposita. *Plum fil. t. 159.*

ternata. 4. O. scapo solitario, fronde tripartita supra decomposita. *Thunb. flor. jap. p. 329. t. 32.*

phylliti-dis. 5. O. scapis geminis, fronde pinnata, caule lævi. *Plum. fil. t. 156.*

hirta. 6. O. scapis geminis, fronde pinnata, caule hirto. *Plum. fil. t. 157.*

hirsuta. 7. O. scapis geminis, fronde bipinnata hirsuta. *Plum. fil. t. 162.*

adianti-folia. 8. O. scapis geminis, frondibus supradecompositis. *Plum. fil. t. 158.*

†† *scapis nudis radicalibus.*

bipinnata. 9. O. fronde pinnata, pinnis pinnatifidis. *Plum. fil. t. 155.*

cervina. 10. O. fronde pinnata, pinnis integerrimis. *Plum. fil. t. 154.*

verticil-lata. 11. O. racemis verticillatis, fronde supradecomposita. *Plum. fil. t. 160.*

filiculi-folia. 12. O. scapo paniculato, fronde supradecomposita. *Plum. fil. t. 161.*

bifurcata. 27. O. fronde pinnata, pinnis bifidis dichotomis simplicibusque. *Jacq. coll. 3. p. 282. t. 20. f. 4.*

matrica-riæ. 28. O. fronde pinnata, pinnis ovatis crenatis. *Schranck. flor. bav. 2. p. 419.*

trifida. 29. O. fronde ternata. *Jacq. coll. 3. p. 281. t. 20. f. 3.*

** *fructificationibus frondi insidentibus.*
† *omni.*

regalis. 13. O. fronde bipinnata, racemo terminali supradecomposito. *Flor. dan. t. 217.*

Claytoniana. 14. O. frondibus pinnatis, pinnis pinnatifidis apice coarctato fructificantibus.

†† *fructificationibus in frondibus distinctis.*

Spicanthus. 15. O. frondibus sterilibus pinnatifidis, fructificantibus pinnatis angustioribus, laciniis integerrimis. *Flor. dan. t.* 99. *an acrostichi potius species?*

capensis. 17. O. frondibus pinnatis, pinnis cordato-lanceolatis crenulatis. *Mant. p.* 306.

cinnamomea. 17. O. fronde pinnata, pinnis pinnatifidis, scapis hirsutis, racemis oppositis compositis.

caroliniana. 26. O. fronde pinnata, pinnis inferioribus undulato-dentatis lanceolatis distinctis, superioribus confluentibus. *Walt. flor. carol. p.* 287.

Struthiopteris. 18. O. frondibus sterilibus binnatifidis, scapo fructificante pinnato disticho.

japonica. 19. O. fronde bipinnata, pinnulis cordato-lanceolatis serratis. *Thunb. flor. jap. p.* 330.

Lancea. 20. O. fronde bipinnata, pinnulis lanceolatis serratis. *Thunb. flor. jap. p.* 330.

crispa. 21. O. frondibus supradecompositis, foliolis alternis subrotundis incisis. *Mant. p.* 505. *Flor. dan. t.* 496.

*** *tribus incertæ.*

ramosa. 22. O. racemis lateralibus, frondibus bipinnatis, pinnulis incisis. *Roth flor. germ.* I. *p.* 444.

scandens. 23. O. caule scandente, frondibus pinnatis oppositis. *Rheed. h. mal.* 12. *p.* 67. *t.* 34.

discolor. 24. O. frondibus pinnatis, pinnis oblongis acutiusculis integris sessilibus alternis approximatis. *Forst. fl. austr. p.* 78.

procera. 25. O. frondibus pinnatis, pinnis remotis ovato-oblongis acuminatis serratis sessilibus. *Forst. flor. austr. p.* 78.

MARATTIA. *Caps.* multiloculares, loculis superne longitudinaliter dehiscentibus.

alata. 1. M. rhachibus squamosis, partialibus alatis, foliolis acute seratis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 128. *Smith, plant. ic. ined.* 2. *t.* 46.

lævis. 2. M. rhachibus lævibus, partialibus alatis, foliolis apice obtuse serratis, summis confluentibus. *Smith plant. ic. ined. fasc.* 2. *t.* 47.

fraxinea. 3. M. rhachibus lævibus simplicibus, foliolis lanceolatis serratis omnibus distinctis. *Smith plant. ic. ined. fasc.* 2. *t.* 48.

1173. ACROSTICHUM. *Fructificationes* discum totum frondis inferius tegentes.

* *fronde simplici.*

† *indivisa.*

serrulatum. 1. A. frondibus linearibus dentatis apice fructificantibus, surculo brevissimo radicante. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 128.

graminoides. 2. A. frondibus nudis linearibus apice subdichotomis fructificantibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 128.

longifolium. 3. A. frondibus lineari-lanceolatis acutis integerrimis, sterilibus erectis, fertilibus spiraliter revolutis. *Plum. fil. t.* 118. *t.* 135.

heterophyllum. 4. A. frondibus integerrimis glabris petiolatis, sterilibus subrotundis, fertilibus linearibus. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 29.

petiolatum. 5. A. frondibus glabris petiolatis, sterilibus lineari-lanceolatis, fertilibus linearibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 128.

muscosum. 6. A. frondibus petiolatis squamosis, sterilibus ovato-lanceolatis obtusis, fertilibus lineari-lanceolatis. *Plum. fil. t.* 139.

lanceolatum. 7. A. frondibus lineari-lanceolatis acutis, surculo scandente. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 33.

simplex. 8. frondibus glabris petiolatis, sterilibus lanceolatis acuminatis, fertilibus lineari-lanceolatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 128.

spicatum. 9. A. fronde petiolata lanceolata utrinque attenuata integerrima, spica terminali lineari. *Suppl. p.* 444. *Smith plant. ic. ined. fasc.* 2. *t.* 49.

villosum. 10. A. frondibus lato-lanceolatis subcrenulatis utrinque villosis. *Plum. fil. t.* 127. *f.* D.

latifolium. 11. A. frondibus lato lanceolatis glaberrimis marginatis, fructificantibus ovato-lanceolatis, surculo repente. *Plum. fil. t.* 135.

citrifolium. 12. A. frondibus lanceolato-ovatis integerrimis, furculo fcandente. *Plum. fil. t.* 116.

crinitum. 13. A. frondibus ovatis obtufis hirfutis fupra crinitis. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 14.

Lingua. 14. A. frondibus oblongis obtufis petiolatis, furculo repente. *Thunb. flor. jap. p.* 330. *t.* 33.

punctatum. 15. A. frondibus cordato-lingulatis acuminatis integerrimis fupra punctatis.

haftatum. 16. A. fronde haftata. *Thunb. flor. jap. p.* 331. *t.* 34.

⊢ ⊢ *fronde divifa.*

feptentrionale. 17. frondibus nudis linearibus laciniatis. *Flor. dan. t.* 60.

auftrale. 18. A. ftipitibus nudis glaberrimis apice dichotomo-ramofis fubflexradiatis fubulatis laterifloris. *Suppl. p.* 444. *Vahl. fymb. bot.* 1. *t.* 25.

pectinatum. 19. A. nudum fimpliciffimum, fpica lanata fecunda afcendente compreffa. *Pluckn. alm. t.* 95. *f.* 4.

dichotomum. 20. A. nudum dichotomum, fpicis fecundis afcendentibus reflexis compreffis. *Pet. gaz. t.* 70. *f.* 12.

digitatum. 21. A. ftipitibus nudis triquetris, fronde digitata lineari integerrimis æquali. *Amoen. acad.* 1. *p.* 269. *f.* 1.

ferrugineum. 22. A. frondibus pinnatifidis, laciniis linearibus acutis patentibus integerrimis connatis, ftipite lævi. *Pluckn. phyt.* 89. *f.* 9.

polypodioides. 23. A. frondibus pinnatifidis, laciniis linearibus obtufis integerrimis patentibus connatis, ftipite fquamofo. *Pluckn. alm. t.* 289. *f.* 1. *nonne potius polypodii fpecies ?*

* * *fronde compofita.*

⊢ *pinnata.*

platyneuron. 24. A. pinnis alternis ovatis crenatis feffilibus furfum arcuatis. *Pluckn. alm. t.* 289. *f.* 2.

punctuatum. 25. A. pinnis alternis lanceolatis integerrimis fupra punctatis glabris, infimis auriculatis, fummis decurrentibus. *Suppl. p.* 444.

aureum. 26. A. pinnis alternis linguiformibus integerrimis glabris. *Pluckn. fil. t.* 104.

areolatum. 27. A. pinnis alternis linearibus apice serratis.

rufum. 28. A pinnis oblongo-ovatis integerrimis pubescentibus. *Sloan. hist. jam. 1. t. 45. f. 1.*

sorbifolium. 29. A. pinnis oblongo-ovatis integris serratis acutis, stipitibus squamosis. *Pet. fil. t. 9. f. 8.*

marginatum. 30. A. pinnis oblongis integerrimis undulatis acuminatis, stipite nudo. *Sloan. hist. jam. 1. t. 40. vix propria species, certe hujus generis.*

sanctum. 31. A. frondibus lanceolatis, pinnis lineari-lanceolatis inciso-serratis, serraturis infimis majoribus. *Sloan. hist. jam. 1. t. 49. f. 2. an polypodium?*

trifoliatum. 32. A. pinnis ternatis lanceolatis. *Plum. fil. t. 144.*

⊢⊢ *fronde subbipinnata.*

siliquosum. 33. A. pinnis alternis sursum pinnulatis linearibus, inferioribus bipartitis. *Amoen. acad. 1. p. 270. f. 3.*

thalictroides. 34. A. pinnis alternis utrinque pinnatifidis, sterilibus latioribus. *Flor. zeyl. p. 377. f. 4. an idem cum siliquoso?*

sulphureum. 35. A. pinnis alternis ovatis pinnatifidis, laciniis retusis serratis. *Plum. fil. t. 44.*

Marantæ. 36. A. pinnis opposito-coadunatis subtus hirsutissimis basi subdentatis. *Pluckn. alm. t. 281. f. 4.*

ilvense. 37. A. pinnis opposito-coadunatis obtusis subtus hirsutis basi integerrimis. *Flor. dan. t. 391.*

ebeneum. 38. A. pinnis sessilibus oblongis sinuatis, summis brevissimis integerrimis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 53. f. 1. an sola ætate minore ab calomelam. distinctum?*

furcatum. 39. A. dichotomum, pinnis pinnatis, pinnulis parallelis lanceolatis approximatis integerrimis. *Plum. fil. t. 28. polypodii potius species.*

⊢⊢⊢ *fronde bipinnata.*

cruciatum. 40. A. pinnis oppositis lanceolatis, infimis cruciatim appendiculatis. *Plum. fil. t. 38.*

barbatum. 41. A. pinnis oppositis, pinnulis lanceolatis obtusis serratis sessilibus alternis. *Pluckn. alm. t. 181. f. 5.*

filare. 42. A. pinnis alternis remotis, pinnulis erectis confluentibus linearibus apice filari dentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 184.

calomelas. 43. A. pinnis alternis lanceolatis acuminatis pinnatifidis. *Plum. fil. t.* 40.

velleum. 44. A. pinnis ovatis cordatis latere incisis subtus hirsutissimis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 457.

⊢⊢⊢⊢ *fronde supradecomposita.*

aculeatum. 45. A filiolis bifidis, stipitibus aculeatis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 61. *an potius Trichomanes?*

1174. PTERIS. *Fructificationes* in lineam digestæ subtus cingentem frondis marginem.

* *frondibus simplicissimis.*

pilofelloides. 1. Pt. frondibus sterilibus obovatis, fertilibus lanceolatis longioribus, surculis repentibus. *Banks ic. Kæmpf. t.* 31.

lanceolata. 2. Pt. frondibus lanceolatis subangulatis glabris, apice fructificante. *Plum. fil. t.* 132.

angustifolia. 3. Pt. frondibus lanceolato-linearibus integris erectis margine toto fructificantibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 129.

lineata. 4. P. frondibus linearibus integerrimis longitudinaliter fructificantibus. *Plum. fil. t.* 143.

tricuspidata. 5. Pt. frondibus tinearibus apice trifidis. *Plum. fil. t.* 140.

furcata. 6. Pt. frondibus dichotomis subtus hispidis, apice fructificantibus. *Plum. fil. t.* 141.

** *frondibus compositis.*

⊢ *quaternata.*

quadrifoliata. 7. Pt. fronde subrotunda integerrima, surculis repentibus. *Pluckn. phyt.* 401. *f.* 5. *Linn. mant. p.* 202. Marsilea minuta.

⊢⊢ *frondibus pinnatis.*

grandifolia. 8. Pt. pinnis oppositis ovato-linearibus acuminatis integerrimis. *Plum. fil. t.* 106.

cretica. 9. Pt. pinnis oppositis lanceolatis serrulatis basi angustatis, infimis subtripartitis. *Mant. p.* 130. *Tournef. inst.* 1. *herb. t.* 321.

rotundifolia. 10. Pt. frondibus hispidis, pinnis suboppositis subrotundis obsolete crenatis. *flor. Forst. austr. p.* 79.

lunulata. 11. Pt. pinnis alternis petiolatis lunulatis striatis. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 28. *t.* 4.

trichomanoides. 12. Pt. pinnis subovatis obtusis repandis subtus hirsutis. *Plum. fil. t.* 75.

subciliata. 13. Pt. pinnis lanceolatis-serrulato-ciliatis, basi supra latioribus. *Forsk flor. æg. arab. p.* 185.

nervosa. 14. Pt. pinnis lanceolatis parallelo-nervosis integris, infimis binatis. *Thunb. flor. jap. p.* 332.

stipularis. 15. Pt. pinnis linearibus sessilibus, stipulis lanceolatis. *Plum. fil. t.* 70.

vittata. 16. Pt. pinnis linearibus rectis basi rotundatis. *Osb. it. t.* 4.

longifolia. 17. Pt. pinnis linearibus repandis basi cordatis. *Plum. fil. t.* 69.

⊢ ⊢ ⊢ *frondibus semibipinnatis.*

serrulata. 18. Pt. frondibus linearibus serrulatis. *Suppl. p.* 445. *Burm. zeyl. t.* 37. *f.* ext.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *frondibus subbipinnatis.*

argula. 19. Pt. pinnis lanceolatis serratis, foliolis infimis bis bipartitis. *Pluckn. almag. p.* 153. *t.* 290. *f.* 2.

pedata. 20. Pt. frondibus quinquangulis trifoliatis, foliolis pinnatifidis, lateralibus bipartitis. *Plum. fil. t.* 152. *β*) *Pallas Comm. petrop.* 12. *t.* 12.

sinuata. 21. Pt. frondibus bipinnatifidis, laciniis sinubusque rotundatis. *Thunb. flor. jap. p.* 332.

humilis. 22. Pt. pinnis oblongis incisis subpinnatis, extimis obsolete crenatis confluentibus. *Forst. flor. austr. p.* 79.

comans. 23. Pt. pinnis pinnatifidis, laciniis elongatis lanceolatis apice attenuatis serratis. *Forst. flor. austr. p.* 79.

arborea. 24. Pt. pinnis pinnatifidis, caudice arboreo aculeato.

biaurita. 25. Pt. pinnis pinnatifidis, infima bipartita. *Plum. fil. t.* 15.

denticulata. 26. Pt. pinnis inferioribus semipinnatis lanceolatis sterilibus denticulato-ciliatis, fertilibus integerrimis. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 29.

27. Pt.

semipinnata. 27. Pt. pinnis lateralibus loboque infimo semipinnatifidis. *Osb. it. t. 3. f. 1.*

mutilata. 28. Pt. pinnis pinnatis, infimis semipinnatifidis, terminalibus baseosque longissimis. *Plum. fil. t. 51.*

atropurpurea. 29. Pt. pinnis lanceolatis, infimis subpinnatis, terminalibus longioribus.

viridis. 30. Pt. pinnis superioribus lanceolatis sessilibus, inferioribus pinnatifidis pinnatisque petiolatis. *Forsk. flor. æg. ar. p. 186.*

dentata. 31. Pt. pinnis sessilibus remotis decursive pinnatis, pinnulis oppositis linearibus crenato-dentatis. *Forsk. flor. æg. ar. p. 186.*

farinosa. 32. Pt. pinnis sessilibus oppositis, supremis concatenatis, inferioribus remotis, pinnulis connatis subtus farinoso-tomentosis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 187.*

+ + + + + *frondibus quadripinnatis.*

quadripinnata. 33. Pt. pinnulis basi liberis, infimis bipinnatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 186.*

+ + + + + + *frondibus supradecompositis.*

aculeata. 34. Pt. pinnis bipinnatifidis, laciniis lato-lanceolatis, caudice arboreo aculeato. *Plum. fil. t. 5.*

regularis. 35. Pt. pinnis sessilibus, pinnulis connatis patentibus lineari-lanceolatis integris, infimis pinnatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 186.*

decursiva. 36. Pt. pinnulis erecto-recurvis decurrentibus, infimis decursive pinnatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 186.*

serrata. 37. Pt. pinnulis concatenatis lanceolatis serrulatis, infimis sejunctis pinnatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 187.*

aquilina. 38. Pt. pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. *Blackw. herb. t. 325.*

caudata. 39. Pt. pinnis linearibus, infimis basi pinnato-dentatis terminalibus longioribus. *Plum. fil. t. 29. β) Jacq. coll. 2. p. 273. pl. rar. ic. cent. 2. fasc. 1. t. 25.*

esculenta. 40. Pt. frondibus sulcatis, foliolis pinnatis, pinnis linearibus decurrentibus, summis brevioribus. *Forst. flor. aust. p. 79.*

heterophylla. 41. Pt. pinnis ovato-oblongis serratis obtusis, frondibus fertilibus integerrimis. *Sloan. jam. 1. t. 53. f. 2.*

1175. BLECHNUM. *Fructificationes* in lineis costæ frondis approximatis parallelis.

occidentale. 1. Bl. frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis oppositis basi emarginatis. *Pet. fil. t. 3. f. 9.*

australe. 2. Bl. frondibus pinnatis, pinnis subsessilibus cordato-lanceolatis integerrimis, infimis oppositis. *Mant. p.* 130.

orientale. 3. Bl. frondibus pinnatis, pinnis linearibus alternis.

virginicum. 4. Bl. frondibus pinnatis, pinnis multifidis. *Mant. p.* 307.

japonicum. 5. Bl. fronde bipinnatifida, lacinulis ovatis obtusis serratis. *Suppl. p.* 445. *Thunb. flor. jap. p.* 333. *t.* 35.

radicans. 6. Bl. frondibus bipinnatis, pinnatis lanceolatis crenulatis lineolis fructificantibus interruptis. *Mant. p.* 307. *Pluckn. alm. t.* 179. *f.* 2. *β)* Blechnum carolinianum. *Walt. flor. carol. p.* 257.

1176. HEMIONITIS. *Fructificationes* in lineis ramosis vel decussatis.

lineata. 1. H. frondibus lanceolato-linearibus, fructificationibus subparallelis longitudinalibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 129.

reticulata. 2. H. frondibus lanceolato-falcatis integerrimis, venis reticulatis. *Forst. flor. austr. p.* 79.

lanceolata. 3. H. frondibus lanceolatis integerrimis. *Plum. fil.* 127. *f.* 6.

parasitica. 4. H. frondibus ovatis acuminatis, surculis paleaceis repentibus.

palmata. 5. H. frondibus palmatis hirsutis. *Plum. fil. t.* 151.

japonica. 6. H. frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis integris. *Thunb. flor. jap. p.* 333.

1177. LONCHITIS. *Fructificationes* in lineolis sub frondis sinubus.

hirsuta. 1. L. frondibus pinnatifidis obtusis integerrimis, surculis ramosis hirsutis. *Plum. fil. t.* 20.

pedata. 2. L. frondibus pedatis, foliolis pinnatifidis serrulatis. *Brown. jam. t.* 1. *f.* 1, 2.

repens. 3. L. frondibus pinnatis, pinnis alternis ſinuatis, ſurculis ramoſis aculeatis. *Plum. fil. t.* 12.

aurita. 4. L. frondibus pinnatis, pinnis infimis bipartitis, ſurculis indiviſis aculeatis. *Plum. fil. t.* 17.

bipinnata. 5. L. fronde bipinnata, pinnis alternis. pinnulis linearibus confluentibus interioribus emarginatis. *Forsk. flor. æg. ar. p.* 184.

tenuifolia. 6. L. arboreſcens, frondibus ſupradecompoſitis, foliolis pinnatis, pinnis lineari-oblongis ſerratis, infimis pinnatifidis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

1178. ASPLENIUM. *Fructificationes* in lineas rectas ſubparallelas in pagina inferiori frondis congeſtæ.

* *fronde ſimplici.*

† *indiviſa.*

rhizophyllum. 1. A. frondibus cordato-enſiformibus, apice filiformi radicante. *Pluckn. alm. t.* 105. *f.* 3.

Scolopendrium. 2. A. frondibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Jungh. pl. off. ic. cent.* 1. *t.* 5.

anguſtifolium. 3. A. frondibus lineari-lanceolatis acutiuſculis integerrimis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 121.

Nidus. 4. A. frondibus lanceolatis integerrimis glabris. *Breyn. cent. t.* 99.

ſerratum. 5. A. frondibus lanceolatis ſerratis ſubſeſſilibus. *Plum. fil. t.* 124.

proliferum. 6. A. frondibus lato-lanceolatis ſubſeſſilibus, primoribus obovatis apice radicantibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 71. *t.* 26. *f.* 1.

plantagineum. 7. A. frondibus ovato-lanceolatis ſubcrenatis, ſtipite tetragono.

lanceum. 8. A. fronde elliptico-glabra, ſtipite tereti ſquamoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 333.

† † *fronde diviſa.*

Hemionitis. 9. A. frondibus cordato-haſtatis quinquelobis integerrimis, ſtipitibus lævibus.

Ceterach. 10. A. frondibus pinnatifidis, laciniis alternis confluentibus obtuſis. *Blackw. herb. t.* 216.

præmorſum. 11. A. frondibus tripinnatifidis, laciniis ſubcuneiformibus, lacinulis apice eroſo dentatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 130.

** *fronde compoſita.*

† *ternata.*

pumilum. 12. A. foliolis tripartito-inciſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 129.

† † *fronde pinnata.*

obtuſifolium. 13. A. frondibus ſubpinnatis, pinnis obtuſis ſinuatis decurrentibus alternis. *Pet. fil. t.* 2. *f.* 4.

bifolium. 14. A. pinnis lanceolatis ſubſinuatis connatis. *Plum. fil. t.* 133.

nodoſum. 15. A. pinnis lanceolatis integerrimis oppoſitis. *Plum. fil. t.* 108.

grandifolium. 16. A. pinnis lanceolatis ſubſerratis alternis baſi ſuperne rectangulis inferne rotundatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 130.

diſſectum. 17. A. pinnis lanceolatis inciſo-ſerratis apice caudatis. *Plum. fil.* 46.

ebeneum. 50. A. pinnis lanceolatis ſubfalcatis ſerratis baſi auriculatis, ſtipite læviſſimo ſimplici. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 462.

ſalicifolium. 18. A. pinnis falcato-lanceolatis crenatis baſi ſurſum angulatis. *Plum. fil. t.* 60.

cultrifolium. 19. A. pinnis falcato-lanceolatis inciſo-ſerratis baſi deorſum angulatis. *Plum. fil. t.* 59.

marginatum. 20. A. pinnis cordato-lanceolatis oppoſitis ſubmarginatis integerrimis. *Pet. fil. t.* 12. *f.* 2.

dentatum. 21. A. pinnis cuneiformibus obtuſis crenato-emarginatis. *Plum. fil. t.* 101.

alternifolium. 22. A. pinnis cuneiformibus alternis ſuperne inciſis. *Wulfen apud Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 51. *t.* 5. *f.* 2. *an diſtinctum a germanico?*

monanthemum. 23. A. pinnis trapeziis obtuſis ſuperne crenatis, linea fructificationis unica. *Mant. p.* 130.

viride. 24. A. frondibus lanceolatis, pinnis trapezoideis crenatis. *Hudſon flor. angl.* 453. *Boldon filic. Brit.* 1. *p.* 24. *t.* 14.

polyodon. 25. A. pinnis trapezoidibus acuminatis acutis duplicato-ſerratis. *Forſt. flor. auſt. p.* 80.

eroſum. 26. A. pinnis trapezio-oblongis ſtriatis eroſis baſi erectis. *Sloan. jam.* 1. *t.* 33. *f.* 2.

simidiatum. 27. A. pinnis trapezio-oblongis acuminatis sursum angulatis deorsum integris planis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 129.

tenerum. 28. A. pinnis rhombeo-oblongis obtusis inciso-serratis. *Forst. flor. austr. p.* 80.

obtusatum. 29. A. pinnis oblongis obtusis serratis oppositis. *Forst. flor. austr. p.* 80.

obliquum. 30. A. pinnis oblongis oppositis acuminatis serratis, margine exteriore breviore, stipite squamuloso. *Forst. fl. austr. p.* 80.

lanceolatum. 31. A. frondibus lanceolatis, pinnis oblongis acutis incisis alternis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 185.

squamosum. 32. A. pinnis acuminatis incisis, stipite squamoso. *Pet. fil. t.* 5. *f.* 2.

lucidum. 33. A. pinnis oblongo-ovatis acuminatis serratis oppositis. *Forst. flor. austr. p.* 80.

rhizophorum. 34. A. frondibus apice radicantibus, pinnis ovatis repando-subauritis, minimis remotis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 253. *f.* 4.

marinum. 35. A. pinnis obovatis serratis superne gibbis obtusis basi cuneatis. *Bolton fil. Brit.* 1. *t.* 15.

pygmeum. 36. A. pinnis subrotundis quinis ternisve. *Vix distincta species.*

trichomanoides. 37. A. pinnis subrotundis crenatis. *Flor. dan. t.* 119.

anthrisci-folium. 38. A. pinnis obtuse lobato-serratis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 103. *t.* 2. *f.* 3. 4.

sorbifolium. 39. A. pinnis longe lanceolatis acuminatis crenatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 106. *t.* 3. *f.* 2.

+ + + *fronde subbipinnata.*

japonicum. 40. A. pinnis acutis inciso-pinnatifidis serrulatis stipite squamoso. *Thunb. flor. jap. p.* 334.

striatum. 41. A. pinnis pinnatifidis obtusis crenatis, terminali acuminata. *Pet. fil. t.* 3. *f.* 3. 4.

flaccidum. 42. A. pinnis alternis remotis pinnatifidis, laciniis linearibus striatis. *Forst. flor. austr. p.* 80.

caudatum. 43. A. pinnis pinnatifidis linearibus apice setaceis, laciniis obtusis apice inciso-serratis, stipite hirto. *Forst. flor. austr. p.* 80.

bulbiferum. 44. A. pinnis pinnatifidis decurrentibus oblongis obtusis; fructificationibus proliferis. *Forst. flor. austr. p.* 80.

germanicum. 45. A. pinnis imis trifoliatis, superioribus simplicibus dentatis. *Hall. hist. stirp. helv.* 3. *p.* 8. *Breyn. cent. p.* 189. *f.* 97.

Trichomanes ramosum. 46. A. pinnis pinnatis, inferioribus minoribus, pinnulis obovatis crenatis.

fragrans. 47. A. pinnis pinnatis alternis, pinnulis lanceolatis latiusculis apice serratis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 130.

leptophyllum. 51. A. frondibus bipinnatis tripinnatifidisque, pinnis remotis, lobis cuneiformibus incisis, fructificationibus solitariis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 694. *n.* 53. Polypodium leptophyllum. *Magnol. hort. monsp. t.* 5.

†††† *frondibus alternatim decompositis.*

Ruta muraria. 48. A. foliolis cuneiformibus crenulatis. *Flor. dan. t.* 190.

††††† *fronde subtripinnata.*

Adiantum nigrum. 49. A. pinnis alternis, pinnulis lanceolatis inciso-serratis. *Flor. dan. t.* 250.

cicutarium. 50. A. fronde glaberrima, pinnulis superioribus pinnatifidis, laciniis lanceolatis integris. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 92. *t.* 52. *f.* 3.

1179. POLYPODIUM. *Fructificationes* per inferiorem frondis partem in globulos dispositæ.

* *fronde simplici.*

† *indivisa.*

minimum. 1. P. scandens, foliis subrotundis crassis acutis. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 74. *t.* 28. *f.* 3.

rigidum. 2. P. frondibus integerrimis glabris acutis. *Plum. fil. t.* 135.

gramineum. 3. P. frondibus acuminatis integerrimis glabris, fructificationibus solitariis, surculo nudo. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 130.

lanceolatum. 4. P. frondibus lanceolatis integerrimis glabris, fructificationibus solitariis, surculis nudis. *Pet. fil. t.* 6. *f.* 2.

lycopodioides. 5. P. frondibus lanceolatis integerrimis glabris, fructificationibus solitariis, surculo squamoso repente. *Plum. fil. t.* 119.

comosum. 6. P. frondibus lanceolatis glabris integerrimis apice multifidis, fructificationibus sparsis. *Plum. fil. t.* 131.

crassifolium. 7. P. frondibus lanceolatis glabris integerrimis, fructificationibus serialibus. *Pet. fil.* 1. *t.* 8.

phyllitidis. 8. P. frondibus lanceolatis glabris integerrimis, fructificationibus sparsis. *Pet. pter. t.* 6. *f.* 10.

repens. 9. P. frondibus lanceolatis acuminatis glabris, fructificationibus sparsis, surculo repente. *Plum. fil. t.* 134.

trifurcatum. 10. P. frondibus lanceolatis glabris repando-sinuatis apice trilobis. *Plum. fil. t.* 138.

plantagineum. 11. P. frondibus lanceolato-oblongis glabris integerrimis, fructificationibus serialibus. *Jacq. coll.* 2. *p.* 104. *t.* 3. *f.* 1.

heterophyllum. 12. P. frondibus crenatis glabris, sterilibus subrotundis sessilibus, fertilibus lanceolatis, fructificationibus solitariis. *Plum. fil. t.* 120.

piloselloides. 13. P. frondibus integerrimis hirtis, sterilibus ovatis, fertilibus lanceolatis, fructificationibus solitariis. *Plum. fil. t.* 118.

lineare. 14. P. frondibus lineari-lanceolatis glabris, fructificationibus solitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

angustifolium. 15. P. frondibus lineari-lanceolatis longissimis acuminatis rigidis, margine convexo, fructificationibus sparsis, surculo repente. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 130.

serpens. 16. P. frondibus lanceolato-linearibus subundulatis glabris, fructificationibus solitariis, surculo hirsuto radicante. *Plum. fil. t.* 124.

marginellum. 17. P. frondibus cuneiformi-linearibus obtusis marginatis glabris, fructificationibus solitariis confertis, surculo brevissimo nudo. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 130.

acrostichoides. 18. P. frondibus linearibus glabris, fructificationibus confertis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

stoloniferum. 19. P. frondibus linearibus obtusis pubescentibus, fructificationibus serialibus, stolonibus repentibus. *Forst. flor. aust. p.* 81.

surinamense. 143. P. fronde lineari remote serrulata glabra, fructificationibus solitariis. *Jacq. collect.* 3. *p.* 285. *t.* 21. *f.* 4.

† † *fronde divisa.*

† *lobata.*

Pica. 20. P. fronde cordata triloba, lobis lanceolatis subulatis basi auriculatis, intermedio elongato. *Suppl. p.* 446.

phymatodus. 21. P. frondibus trifidis quinquelobisve lanceolatis supra fructificationes verucosis. *Mant. p.* 306. *Burm. zeyl t.* 86.

hastatum. 22. P. fronde trifido-hastata. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

† † *frondibus pinnatifidis, laciniis sæpe coadunatis.*

scandens. 23. P. frondibus lævibus, laciniis linearibus obtusis undulatis distantibus, stolonibus radicantibus scandentibus. *Forst. flor. austr. p.* 81.

pustulatum. 24. P. frondibus lævibus, laciniis oblongis integris acuminatis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

aureum. 25. P. frondibus lævibus, laciniis oblongis distantibus infimis patulis, terminali maxima, fructificationibus serialibus. *Plum. fil. t.* 76.

ellipticum. 26. P. frondibus lævibus, laciniis ellipticis integris, surculo repente. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

loriceum. 27. P. frondibus lævibus, laciniis lanceolatis distantibus horizontalibus repandis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 10. 12.

alatum. 28. P. frondibus lævibus, laciniis oblongis distantibus dentatis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 13.

squamatum. 29. P. frondibus scabris, laciniis lanceolatis distantibus horizontalibus integerrimis. *Plum. fil. t.* 79.

asplenifolium. 30. P. frondibus pilosis, laciniis semiovatis acutis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 16. *β) Plum. fil. t.* 88.

trichomanoides. 31. P. frondibus subpilosis, laciniis semiovatis obtusis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 131.

suspensum. 32. P. frondibus glabris, laciniis semiovatis acutis. *Plum. fil. t.* 87.

crispatum. 33. P. frondibus glabris, laciniis semiorbiculatis crenatis. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 12.

myosuroides. 34. P. frondibus glabris, laciniis in apice lanceolatis coadunatis, fructificationibus inferioribus remotis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 131.

pendulum. 35. P. frondibus subsessilibus glabris pendulis, laciniis oblongis obtusiusculis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 131.

incisum. 36. P. frondibus lanceolatis, laciniis rotundatis, infimis minoribus coadunatis. *Plum. fil. t.* 91.

scolopendroides. 37. P. frondibus lanceolatis, laciniis obtusiusculis, infimis remotis. *Pet. fil.* 2. *t.* 1.

pectinatum. 38. P. frondibus lanceolatis, laciniis approximatis ensiformibus parallelis acutis horizontalibus, radice nuda. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 14.

taxifolium. 39. P. laciniis approximatis ensiformibus parallelis acutis ascendentibus, radice hirta. *Plum. fil. t.* 89.

struthionis. 40. P. laciniis approximatis ensiformibus repandis horizontalibus. *Plum. fil. t.* 82.

Otiter. 41. P. laciniis lanceolatis obtusis alternis distantibus. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 16.

virginianum. 42. P. laciniis oblongis subserratis obtusis, radice lævi. *Plum. fil. t.* 77.

vulgare. 43. P. laciniis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. *Zorn. pl. off. ic.* 1. *t.* 46.

quercifolium. 44. P. frondibus sterilibus sessilibus brevioribus obtusis sinuatis, fertilibus alterno-pinnatis lanceolatis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 11.

††† *frondibus bipinnatifidis.*

cambricum. 45. P. laciniis lanceolatis lacero-pinnatifidis serratis. *Plukn. alm. t.* 30. *f.* 1.

obliteratum. 46. P. lacinulis alternis lato-lanceolatis attenuatis crenatis, crenis apice & basi utrinque obliteratis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 132.

Serra. 47. P. laciniis linearibus longissimis attenuatis serratis, serraturis semiovatis acutis striatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 132.

tetragonum. 48. P. laciniis lanceolatis acuminatis oppositis distantibus horizontalibus, lacinulis ovatis obtusiusculis, stipite tetragono. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 132.

deltoideum. 49. P. laciniis inferioribus abbreviatis integris oblongis deltoideis reflexis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 133.

invisum. 50. P. fronde glabra, laciniis lineari-lanceolatis acuminatis longissimis, lacinulis ovato-falcatis acutis integris, infimis æqualibus. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 90. *t.* 51.

patens. 51. P. fronde subtus villosiuscula, laciniis lineari-lanceolatis elongatis, lacinulis oblongis acutis integris, infimis longioribus. *Sloan. hist. jam. 1. p. 91. t. 52. f. 1.*

††††*fronde tripinnatifida.*

hirtum. 52. P. fronde inferne tripinnatifida, superne bipinnatifida & tandem pinnatifida, laciniis ovatis obtusis subintegris, stipite ramisque hirtis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 133.*

punctatum. 53. P. lacinulis lanceolatis obtusis pinnatifidis, stipite villoso. *Thunb. flor. jap. p. 337.*

coriaceum. 54. P. fronde coriacea inferne tripinnatifida, superne bipinnata, pinnis pinnulisque acuminatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 133.*

†††††*fronde quadripinnatifida.*

dissectum. 55. P. fronde glabriuscula, lacinulis ovatis obtusis inciso-serratis, fructificationibus in sinu solitariis, ramis ramulisque pubescentibus. *Sloan. hist. jam. 1. p. 96. t. 37. f. 1. 2.*

æmulum. 149. P. fronde glabra, pinnis oblongo-linearibus incisis, pinnulis apice denticulatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 466.*

††††††*fronde quinquepinnatifida.*

effusum. 56. P. fronde subglabra membranacea, lacinulis acutis argute serratis, rachi ramulisque marginatis. *Sloan. hist. jam. 1. t. 57. f. 3.*

** *fronde composita.*

† *ternata.*

trifoliatum. 57. P. frondibus sinuato-lobatis, foliolo intermedio majore. *Plum. fil. t. 148.*

cicutarium. 58. P. foliolis bipinnatis basi laciniatis obtuse inciso-serratis acuminatis, infimis gibbosioribus.

triphyllum. 144. P. frondibus pinnatis, pinnis tribus alternis linearibus. *Jacq. coll. 3. p. 284. t. 22. f. 1.*

†† *frondibus pinnatis.*

dentatum. 59. P. fronde dentata superne pinnatifida, pinnis crenatis, infimis deflexis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 185.*

fontanum. 60. P. frondibus lanceolatis, pinnis subrotundis argute incisis, stipite lævi. *Bolton fil. Brit. 1. t. 21.*

Lonchitis. 61. P. pinnis lunulatis ciliato-serratis declinatis, stipitibus strigosis. *Flor. dan. t.* 497.

rhizophyllum. 62. P. frondibus decumbentibus apice caudatis, fertilibus radicantibus, pinnis ovato-deltoideis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 132.

reptans. 63. P. frondibus repentibus apice radicantibus, pinnis subcordatis ovatis obtusis crenatis basi subauriculatis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 30. *f.* 1.

cordifolium. 64. P. pinnis cordatis obtusis integerrimis repandis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 11.

falcatum. 65. P. pinnis cordatis falcatis acuminatis integris, fructificationibus approximatis sparsis. *Suppl. p.* 446. *Thunb. flor. jap. p.* 336. *t.* 35.

echinatum. 66. P. pinnis falcato-lanceolatis subserratis sursum auritis basi & anterius spinosis, stipite squamoso. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 82. *t.* 36. *f.* 4. 5.

auriculatum. 67. P. pinnis falcato-lanceolatis serratis basi truncatis sursum auritis. *Burm. zeyl. t.* 44. *f.* 2.

crenatum. 68. P. pinnis oblongo-lanceolatis crenatis glabris, fructificationibus biseriatis. *Plum. fil. t.* 3.

simile. 69. P. pinnis lanceolatis integerrimis distantibus, supremis minoribus, punctis serialibus. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 32.

dissimile. 70. P. pinnis lanceolatis subpubescentibus confluentibus, inferioribus distinctis, punctis sparsis. *Pluckn. almag. t.* 288. *f.* 1.

semicordatum. 71. P. pinnis lanceolatis parallelis glaberrimis basi oblique cordatis, lobo inferiore gibbosiore, fructificationibus quadri-seriatis. *Plum. fil. t.* 113.

sagittatum. 72. P. pinnis lanceolatis obtusis integris basi utrinque denticulo acutis, inferioribus mutilatis triangularibus minutis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 132.

triangulare. 73. P. pinnis triangularibus dentatis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 10.

exaltatum. 74. P. pinnis ensiformibus integris, basi inferiore introrsum, superiore sursum gibbis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 31.

unitum. 75. P. pinnis ensiformibus serratis, serraturis semiovatis ovato-nervosis. *Burm. zeyl. t.* 44. *f.* 1.

marginale. 76. P. pinnis superioribus coalitis, inferioribus ensiformibus sursum auriculatis incisis stipite villoso. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

evectum. 77. P. pinnis oppositis oblongis apice lineari acuminatis serratis, fructificationum serie submarginali continua. *Forst. flor. austr. p.* 81.

hirsutulum. 78. P. pinnis oblongis obtuse serratis basi sursum auriculatis, stipite villoso. *Forst. flor. austr. p.* 81.

reticulatum. 79. P. pinnis oblongis integerrimis, anastomosibus rectangulis, punctis rectangulis approximatis. *Forst. flor. austr. p.* 81. *Plum. fil. t.* 92.

tenellum. 80. P. pinnis alternis remotis linearibus acuminatis undulatis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

mollissimum. 147. P. pinnis pinnatifidis linearibus acuminatis utrinque villosis. *Jacq. collect.* 3. *p.* 188.

gujanense. 81. P. pinnis latis crenatis suboppositis. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 86. *t.* 43. *f.* 1. 2.

adiantoides. 82. P. pinnis auriculatis. *Plum. fil. f.* 7. *an distincta species?*

serratum. 83. P. pinnis alternis serratis. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 78. *t.* 33. *f.* 1.

Hippocrepis. 145. P. pinnis oblongis acuminatis obtuse incisis supra pilosis subtus glabris. *Jacq. coll.* 3. *p.* 186.

fraxinifolium. 146. P. pinnis lanceolatis acuminatis undulatis transversim lineatis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 187.

††† *frondibus subbipinnatis.*

Phegopteris. 84. P. pinnis oppositis, superioribus pinnula trapezoide conjunctis infimo pari deflexo, pinnulis obtusis glomerulis capsularum dimidiam marginis partem occupantibus. *Bolton fil. Brit.* 1. *t.* 20.

montanum. 85. P. pinnis alternis, pinnulis integerrimis lanceolatis obtusiusculis, glomerulis marginalibus. *Wilden. prodr. flor. berol. n.* 883.

retroflexum. 86. P. pinnis infimis reflexis, pinnulis laceris. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 9.

fragrans. 87. P. frondibus lanceolatis, pinnis confertis, laciniis obtusis serratis, stipite paleaceo.

parasiticum. 88. P. frondibus lanceolatis, pinnis ad medium pinnatifidis, laciniis rotundatis integerrimis striatis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 17.

molle. 89. P. pinnulis lanceolatis obtusiusculis apice crenulatis *Schreb. spic. flor. lips. p.* 70.

Callipteris. 90. P. pinnis ovato-oblongis profunde pinnatifidis, laciniis ovatis duplicato-serratis, serraturis mucronulatis. *Ehrh. Hannöv. Mag.* 1784. 9. *an vere distinctum a cristato?*

cristatum. 91. P. pinnulis oblongis obtusis serratis, serraturis ciliatis, glomerulis capsularum duplici serie dispositis. *Ad Afzelius n. act. Stockh.* 1787. *t.* 9. *f.* 1. 2. *Bolton fil. Brid.* 1. *t.* 23.

Thelypteris. 92. P. pinnis pinnatifidis integerrimis subtus undique glomerulis capsularum tectis. *Mant. p.* 505. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 687. Acrostichum Thelypteris. *Flor. dan. t.* 760.

nymphale. 93. P. frondibus pubescentibus, pinnis linearibus acuminatissimis serratis basi pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis vix antrorsum falcatis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

laciniatum. 94. P. pinnis pinnatifidis, laciniis oblongis obtuse serratis, inferioribus longioribus vix coalitis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

exosum. 95. P. frondibus glabris, pinnis linearibus acuminatissimis serrato-pinnatis, pinnulis lanceolatis falcato-acutis basi connatis. *Forst. flor. aust. p.* 81.

pennigerum. 96. P. frondibus glabris, pinnis linearibus acuminatissimis subpinnatis, pinnulis ovato-oblongis obtusis connatis. *Forst. flor. austr. p.* 82.

vestitum. 97. P. pinnis rhombeo-ovatis acutis inciso-serratis, infimis lobatis subpinnatis, stipite squamis scariosis vestito. *Forst. flor. austr. p.* 82.

setosum. 98. P. pinnis subpinnatis, pinnulis linearibus inciso-serratis, serraturis setaceis, stipite villoso. *Forst. flor. austr. p.* 82.

adiantiforme. 99. P. pinnis ovatis profunde incisis, laciniis ovatis obtusis crenato-serratis, infimis discretis, stipite squamuloso aspero. *Forst. flor. austr. p.* 82.

latifolium. 100. P. pinnis ovatis acuminatis pinnatifidis lobatisque, lobis repandis crenatis, stipite glaberrimo nitido. *Forst. flor. austr. p.* 83.

varium. 101. P. frondibus lateralibus bipinnatis, pinna infima pinnatifida.

† † † † *frondibus bipinnatis.*

aristatum. 102. P. pinnis inferioribus pinnatis, pinnulis rhombeo-oblongis incisis, laciniis mucronato-serratis, stipite villosiusculo. *Forst. flor. austr. p.* 82.

fragile. 103. P. pinnis remotis, pinnulis ſubrotundis incifis. *Flor. dan. t.* 401.

villo-ſum. 104. P. frondibus hirſutis, pinnulis obtuſis oblongis, terminalibus acuminatis. *Plum. fil. t.* 27.

decuſſa-tum. 105. P. pinnulis obtuſis horizontalibus integerrimis, terminalibus lanceolatis. *Pet. fil. t.* 2. *f.* 5. 6.

Filix mas. 106. P. pinnulis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Blackw. herb. t.* 323.

Filix femina. 107. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Blackw. herb. t.* 325.

Baro-metis. 108. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis ſerratis, radicibus lanatis.

rhæti-cum. 109. P. pinnis pinnulifque lanceolatis remotis, ſerraturis acuminatis.

ſetige-rum. 100. P. pinnulis lanceolatis incifis integris, ſtipite ſetoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

orien-tale. 111. P. pinnulis lanceolatis connexis integris patentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 185.

pubeſ-cens. 112. P. frondibus piloſis, pinnulis lanceolato-ovatis ſubincifis acutis, extimis confluentibus.

murica-tum. 113. P. pinnulis ovatis denticulato-ſpinoſis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 6.

ſetife-rum. 114. P. pinnulis reniformibus, dentibus ſetiferis, ſtipite lanato. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 185.

nudum. 115. P. pinnulis rhombeis inciſo-crenatis, ſtipite ſcabro nudo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

aculea-tum. 116. P. pinnulis lunulatis ciliato-dentatis, ſtipite ſtrigoſo. *Mill. illuſtr. ic. Bolton. fil. Brit.* 1. *t.* 26.

novebo-racenſe. 117. P. pinnulis oblongis integerrimis parallelis; ſtipite lævi.

bulbife-rum. 118. P. pinnis remotis, pinnulis oblongis obtuſis ſerratis ſubtus bulbiferis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 10.

medul-læ. 119. P. pinnis acuminatiſſimis, pinnulis oblongis ſubfalcatis acutis crenatis, ſtipite aſpero, caudice arboreo hiſpido. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

exten-ſum. 120. P. pinnis acuminatis apice ſerratis, pinnulis oblongis ſerratis, ſtipite punctis aſpero, caudice arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

arboreum. 121. P. frondibus serratis, caudice arboreo inermi. *Plum. fil. t.* 1.

spinosum. 122. P. frondibus serratis, caudice arboreo aculeato. *Plum. fil. t.* 3. *nonne potius pteridis species?*

dealbatum. 123. P. pinnis acuminatis subtus albis, pinnulis oblongis subfalcatis serratis, stipite aspero, caudice arboreo. *Forst. flor. austr. p.* 83.

lacerum. 124. P. pinnulis sessilibus, extimis confluentibus falcatis serratis, stipite squamoso. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

lunulatum. 125. P. pinnis apice serratis setaceis, pinnulis lineari-oblongis falcatis apice serrulatis, stipite aspero. *Forst. flor. austr. p.* 83.

elongatum. 150. P. pinnis glabris obtusis argute seratis, superioribus ovatis, mediis oblongis, inferioribus lanceolatis pinnatifidis acutiusculis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 465.

affine. 126. P. pinnis acuminatis, pinnulis lineari-oblongis crenatis, stipite glabro. *Forst. flor. austr. p.* 83.

dichotomum. 127. P. frondibus dichotomis, pinnulis linearibus integris parallelis. *Thunb. flor. jap. p.* 338. *t.* 37.

glaucum. 128. P. fronde bipartita subtus glauca, pinnulis incisis integris. *Thunb. flor. jap. p.* 338.

regium. 129. P. pinnis suboppositis, pinnulis alternis laciniatis. *Vaill. flor. paris. t.* 9. *f.* 1.

marginatum. 130. P. pinnulis basi sinuato-repandis, fructificationibus marginalibus.

†††††*fronde supradecomposita.*

speluncæ. 131. P. frondibus pilosis, foliolis lanceolatis pinnatis, pinnis oppositis pinnatifidis. *Pluckn. alm. t.* 244. *f.* 2.

crenulatum. 132. P. foliolis alternis bipinnatis, pinnulis pinnatifidis crenatis ciliatis. *Forsk flor. æg. arab. p.* 185.

Dryopteris. 133. P. foliolis ternis bipinnatis. *Flor. dan. t.* 759.

capense. 134. P. foliolis bipinnatis, pinnulis basi unifloris. *Suppl. p.* 445.

pyramidale. 135. P. pinnulis terminalibus lanceolatis longissimis serratis, stipite inferne aculeato. *Pet. fil. t.* 4. *f.* 2.

alpinum. 136. P. frondibus alterne tripinnatis, pinnulis oblongis vage incisis, lacinulis obtusis subbifidis. *Wulf. ust. Jacq. coll.* 2. *p.* 171. *Seg. pl. ver. suppl. t.* 1. *f.* 3.

multifidum. 148. P. fronde tripinnata glabra triangulari, pinnulis oblongis pinnatifide incisis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 187.

axillare. 151. P. fronde tripinnata glabra, pinnis oblongis apice serratis adnatis paucifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 466.

umbrosum. 152. P. fronde tripinnata glabra, pinnis lanceolato-linearibus serratis adnatis multifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 466.

horridum. 137. P. pinnulis semisagittatis basi connexis apice serratis, caudice aculeato. *Pet. fil. t.* 5. *f.* 1.

asperum. 138. P. pinnulis obtusis apice serratis, terminalibus acuminatis, caudice arboreo aculeato. *Pet. fil. t.* 4. *f.* 7.

montium. 139. P. fronde triangulari, pinnulis pinnatifidis, segmentis ultimis oblongis obtusis bifidis trifidisque. *Pluckn. alm. t.* 89. *f.* 4.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *frondibus quadripinnatis.*

denticulatum. 140. P. fronde glabra inferne quadripinnata superne tripinnata, pinnulis cuneato-ovatis incisis denticulatis, fructificationibus solitariis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 134.

quadripinatum. 141. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis, laciniis ovatis acutis subtus glaucis, ramis ramulisque asperis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 134.

armatum. 142. P. pinnulis lanceolatis crenulatis supra glabris subtus hirsutis, fructificationibus confertis, ramis ramulisque asperis, caudice arboreo aculeato. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 134.

DICKSONIA. *Fructificationes* subrotundæ, margine averso frondis subjectæ.

arborescens. 1. D. frondibus supradecompositis villosis, foliolis subintegris. *Herit. sert. angl. p.* 31. *t.* 43.

Culcita. 2. D. frondibus supradecompositis glabris, foliolis serratis. *Herit. sert. angl. p.* 31. *an eadem cum Polypodio Barometis?*

1180. ADIANTUM. *Fructificationes* in maculis ovalibus terminalibus sub replicato frondis margine.

* *fronde simplici.*

reniforme. 1. A. frondibus reniformibus stipitatis multifloris. *Pluckn. alm. t.* 287. *f.* 5.

2. A.

ſagittatum. 2. A. frondibus ſagittatis ſtipitatis. *Aubl. pl. jug.* 2. *p.* 964. *t.* 366.

philippenſe. 3. A. frondibus reniformibus alternis petiolatis lobatis multifloris. *Pet. gaz. t.* 4. *f.* 4.

repens. 4. A. frondibus trapeziformibus cordatis pinnatifidis, laciniis lanceolatis apice ſerratis floriferis, infimis inciſis. *Suppl. p.* 446.

decurrens. 5. A. fronde bipinnatifida. *Jacq. coll.* 2. *p.* 103. *t.* 2. *f.* 1. 2.

** *fronde compoſita.*

trilobum. 6. A. pinnis tripartitis obtuſis inciſis multifloris. *Pet. fil. t.* 11. *f.* 9.

radiatum. 7. A. fronde digitata, foliolis pinnatis pinnis unifloris. *Plum. fil. t.* 100.

pedatum. 8. A. frondibus pedatis, foliolis pinnatis, pinnis anterius gibbis inciſis fructificantibus. *Pluckn. alm. t.* 124. *f.* 2.

fuſcum. 9. A. frondibus pedatis, foliolis pinnatis, pinnis rhombeo-rotundatis ſubquadrifloris. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 28. *t.* 5.

caudatum. 10. A. frondibus pinnatis falcatis apice caudatis. *Mant. p.* 308. *Burm. zeyl. t.* 5. *f.* 1.

ſerrulatum. 11. A. frondibus bipinnatis, pinnulis deltoideo-oblongis ſerratis, fructificationibus ſolitariis ſuperioribus. *Pluckn. phyt. t.* 253. *f.* 1.

haſtatum. 12. A. frondibus pinnatis, pinnis haſtato-trilobis rectis. *Suppl. p.* 447.

Lancea. 13. A. frondibus pinnatis, pinnis oppoſitis oblongis, terminalibus triangulari-haſtatis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 64. *f.* 7. 8.

macrophyllum. 14. A. frondibus pinnatis, pinnis oppoſitis rhomboideis acutis, ima majora, infima ſubhaſtata reflexa, fructificationibus anterius & inferius reflexis. *Brown. jam. p.* 87. *t.* 38. *f.* 1.

deltoideum. 15. A. frondibus pinnatis, pinnis alternis deltoideis obtuſis, ſumma triangulari, fructificationibus ſuperne & anterius continuatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 134.

pumilum. 16. A. fronde pinnata, pinnis alternis ſubrotundis ſerrulatis, ſumma majuſcula trapezoide, fructificationibus interruptis, ſtipite capillari. *Pluckn. alm. t.* 251. *f.* 4.

cuneatum. 17. A. frondibus pinnatis, pinnis oppoſitis ſubpinnatis, pinnulis cuneiformibus retuſis alternis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

*** *fronde decompoſita.*

denticulatum. 18. A. foliolis alternis trapezoideis acuminatis crenatis, ferenis denticulatis, fructificationibus superioribus interruptis. *Pet. fil. t.* 52.

flabellulatum. 19. A. foliolis alternis rhombeis rotundatis multifloris, ſtipitibus ſupra pubeſcentibus. *Pluckn. alm. t.* 4. *f.* 3.

trifoliatum. 20. A. foliolis alternis ternatis linearibus unifloris. *Pet. fil. t.* 11. *f.* 4.

Capillus Veneris. 21. A. foliolis alternis, ſecundariis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 7.

chuſanum. 22. A. foliolis alternis pinnatifidis, laciniis inæqualibus.

truncatum. 23. A. foliolis pinnatis, pinnis alternis cuneatis ſubfalcatis truncatis integerrimis. *Burm. ind. t.* 66. *f.* 4.

gujanenſe. 24. A. fronde bipinnata, pinnis oppoſitis, pinnulis reniformibus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 963. *t.* 365.

criſtatum. 25. A. frondibus bipinnatis, pinnis infimis bipartitis, pinnulis lunatis ſuperne multifloris.

furcatum. 26. A. fronde bipinnata, pinnulis ſæpius bipartitis linearibus, pinea fructificationis unica. *Suppl. p.* 447. *Pluckn. mant. t.* 350. *f.* 4.

ſtrictum. 27. A. fronde bipinnata, pinnis tetragonis faſtigiatis erectis, pinnulis alternis lunatis integris, fructificationibus ſuperius continuatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 135. *Plum. fil. t.* 97.

ſerratum. 28. A. fronde bipinnata, pinnulis deltoideo-oblongis ſerratis, fructificationibus ſolitariis ſuperioribus. *Pluck. alm. t.* 253. *f.* 1.

villoſum. 29. A. frondibus bipinnatis, pinnulis rhombeis anterius exteriuſque fructificantibus, ſtipite villoſo. *Mant. p.* 505. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 55. *f.* 1.

pulverulentum. 30. A. frondibus bipinnatis, pinnullis ovalibus anterius truncatis unifloris, ſtipite hirto. *Plum. fil. t.* 55.

caffrorum. 31. A. frondibus bipinnatis, pinnulis ovatis inciſo-denticulatis ſubtus paleaceis. *Suppl. p.* 447. *Mant. p.* 307. Polypodium caffrorum.

fragrans. 32. A. frondibus bipinnatis, pinnulis ovatis ſublobatis obtuſis ſubtus nudis. *Suppl. p.* 447. *Mant. p.* 307. Polypodium fragrans.

ſtriatum. 33. A frondibus bipinnatis, pinnulis rigidis falcato-ovatis ſtriatis, fructificationibus ſuperne interruptis, ſtipite tereti aſpero. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 135.

micro-phyllum. 34. A. fronde bipinnata, pinnulis alternis oblongis obtuſis curvatis inferius pinnatifidis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 98. *t.* 13. *f.* 2.

borbonicum. 43. A. fronde bipinnata glabra, pinnulis oblongis, infima ſuperne bipartita, reliquis integerrimis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 286. *t.* 21. *f.* 1.

tenellum. 44. A. frondibus bipinnatis, pinnulis lobatis, lobis oblongis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 287. *t.* 21. *f.* 3.

**** *fronde ſupradecompoſita.*

fragile. 35. A. fronde ſupradecompoſita ſuperne bipinnata, pinnulis obovatis cuneatis integris, fructificationibus interruptis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 135.

tenerum. 36. A. foliolis ſecundariis alternis rhombeo-cuneiformibus obtuſis incifis, fructificationibus interruptis. *Pluckn. phyt. t.* 254. *f.* 1.

clavatum. 37. A. foliolis alternis, ſecundariis cuneiformibus integerrimis, alternis unifloris. *Plum. fil. t.* 101. *f.* B.

trapeziforme. 38. A. foliolis alternis, ſecundariis rhombeis inciſis utrinque fructificantibus.

aculeatum. 39. A. foliolis ſecundariis palmatis multifloris, ſtipite aculeato. *Plum. fil. t.* 94.

hexagonum. 40. A. foliolis ſecundariis ſexangularibus emarginatis integerrimis utrinque unifloris. *Pet. fil. t.* 10. *f.* 2. *anne idem cum pteride heterophylla?*

pteroides. 41. A. foliolis ſecundariis ovatis integris crenulatis, ſtipite lævi. *Mant. p.* 130.

æthiopicum. 42. A. foliolis ſecundariis rotundatis integris crenulatis, petiolatis capillaribus. *Pluckn. alm. t.* 253. *f.* 2.

1181. TRICHOMANES. *Fructificationes* ſolitariæ, turbinatæ, ſtilo ſetaceo terminatæ, margini frondis ipſi inſertæ.

* *fronde ſimplici.*

ſ *indiviſa.*

reniforme. 1. Tr. frondibus reniformibus ſtipitatis multifloris, capſulis exſertis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

puſillum. 2. Tr. frondibus linearibus inciſis, ſurculo repente. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

membranaceum. 3. Tr. frondibus oblongis laceris. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 5.

ſ ſ *frondibus pinnatifidis.*

reptans. 4. Tr. frondibus cuneato-ovatis inciſo-pinnatifidis, ſurculo repente. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

criſpum. 5. Tr. frondibus lanceolatis. laciniis parallelis ſubſerratis. *Plum. fil. t.* 86.

polypodioides. 6. Tr. frondibus lanceolatis repandis, fructificationibus ſolitariis terminalibus.

aſperioides. 7. Tr. frondibus pendulis lanceolatis glaberrimis, laciniis bilobis, lobis obtuſis fructificationibus bivalvibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

humile. 8. Tr. frondibus dichotomis, laciniis alternis decurrentibus linearibus obtuſis integris, fructificationibus turbinato-infundibuliformibus, ſtilis ſetaceis exſertis, ſtipite vix ullo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

ſ ſ ſ *frondibus bipinnatifidis.*

ſericeum. 9. Tr. frondibus pendulis lanceolatis tomentoſis, laciniis alternis, lacinulis linearibus obtuſis integris, inferioribus bifidis, fructificationibus terminalibus hirſutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

ciliatum. 10. Tr. frondibus erectis deltoidibus, laciniis ovatis, lacinulis linearibus obtuſis ciliatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus hirtis, ſtipite marginato. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

lucens. 11. Tr. frondibus pendulis lanceolatis hirſutis lucidis, laciniis parallelis, lacinulis ſubrotundis ſubſerrulatis, ſtipite hirſutiſſimo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

fucoides. 12. Tr. frondibus ovatis glabris, laciniis ovatis, lacinulis bipartitis, ſegmentis ſerratis obtuſis, fructificationibus bivalvibus ſupra baſin pinnarum inſertis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

ꝛꝛꝛꝛ frondibus tripinnatifidis.

undulatum. 13. Tr. frondibus tripinnatifidis bipinnatiſve pendulis lanceolatis, laciniis lacinuliſque alternis decurrentibus, ſecundariis linearibus retuſis crenulatis undulatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 137.

ꝛꝛꝛꝛꝛ frondibus quadripinnatifidis.

rigidum. 14. Tr. frondibus erectis deltoideis, laciniis patentibus, lacinulis lanceolatis, ſecundariis linearibus apice inciſis, ſcyphis fructificantibus pedicellatis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 137.

polyanthon. 15. Tr. frondibus deltoideis erectis, laciniis lacinuliſque decurrentibus, ſecundariis linearibus obtuſis, fructificationibus bivalvibus numeroſis, ſtipite marginato. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 137.

clavatum. 16. Tr. frondibus oblongo-lanceolatis laxis, laciniis lacinuliſve decurrentibus, ſecundariis linearibus emarginatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus ſubrotundis, ſtipite teretiuſculo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 137.

*** fronde compoſita.*

ꝛ pinnata.

contiguum. 17. Tr. pinnis linearibus alternis approximatis integris, fructificantibus apice inciſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

adiantoides. 18. Tr. pinnis enſiformibus acuminatis inciſo-ſerratis, ſerraturis bifidis. *Burm. zeyl. t.* 43.

umbrigenſe. 19. Tr. pinnis oblongis dichotomis decurrentibus dentatis. *Bolton fil. brit. t.* 31.

ꝛꝛ frondibus ſubbipinnatis.

dilatatum. 20. Tr. pinnis alternis decurrentibus dichotomis cuneiformibus inciſis, fructificationibus bivalvibus orbicularibus inflatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

bivalve. 21. Tr. pinnis alternis decurrentibus dichotomis, laciniis linearibus ferratis, fructificationibus subrotundis bivalvibus. *Forst. flor. austr. p.* 84.

pyxidiferum. 22. Tr. pinnis alternis confertis lobatis linearibus. *Bolton fil. brit. t.* 30.

hirsutum. 23. Tr. pinnis alternis pinnatifidis pilosis. *Pet. fil. t.* 15. *f.* 5.

sanguinolentum. 24. Tr. pinnis alternis pinnatifidis, laciniis dichotomis lineari-obtusis integris decurrentibus, fructificationibus ovato-subrotundis dehiscentibus. *Forst. flor. austr. p.* 84.

crinitum. 25. Tr. frondibus pilosis, pinnis ovatis pinnatifidis, laciniis bifidis, lacinulis obtusis, stipite erecto hirto. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 136.

lineare. 26. Tr. frondibus pendulis lanceolatis glabris, pinnis remotis, pinnulis linearibus bipartitis, fructificationibus terminalibus bivalvibus, stipite capillari. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 137.

squarrosum. 27. Tr. pinnis oblongis acuminatis subpinnatis serratis, serraturis mucronatis, fructificationibus sinuum globosis dehiscentibus subbivalvibus, stipite hispido barbato, caudice arboreo. *Forst. flor. austr. p.* 86.

††† *frondibus bipinnatis.*

strigosum. 28. Tr. pinnulis rhombeis pilosis serratis, fructificationibus solitariis infra serraturas. *Thunb. flor. jap. p.* 339.

epiphyllum. 29. Tr. pinnis acuminatis, pinnulis linearibus inciso-serratis, fructificationibus in pagina superiore infra apicem serraturarum squamaceis. *Forst. flor. austr. p.* 85.

cuneiforme. 30. Tr. pinnis dichotomis pinnulisque alternis, his cuneiformibus incisis, fructificationibus truncato-laceris. *Forst. flor. austr. p.* 85.

gibberosum. 31. Tr. pinnulis oblongis pinnatifido-incisis, laciniis linearibus integris margine interiori infra apicem fructificantibus. *Forst. flor. austr. p.* 85.

demissum. 32. Tr. pinnis alternis strictis, pinnulis pinnatifido-dichotomis, laciniis linearibus obtusis integris, fructificantibus globosis terminalibus. *Forst. flor. austr. p.* 85.

tamarisciforme. 42. Tr. pinnulis pinnatifide lobatis, costa pilosa. *Jacq. coll.* 3. *p.* 285. *t.* 21. *f.* 3.

ſſſſ *frondibus decompoſitis.*

multifi-dum. 33. Tr. foliolis alternis pinnatis, pinnis dichotomis linearibus decurrentibus argute ſerratis, fructificationibus ovato-ſubrotundis dehiſcentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

elatum. 34. Tr. foliolis pinnatis, pinnis oblongis ſtrictis pinnatifido-inciſis, laciniis oblongis apice ſerratis, fructificationibus terminalibus ovatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

flacci-dum. 35. Tr. foliolis rhombeis ſubpinnatis, pinnis cuneiformibus apice inciſis margine interiore infra apicem fructificantibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

ſolidum. 36. Tr. foliolis acuminatis, ſecundariis ovato-oblongis inciſis crenatis, fructificationibus filiformibus tubuloſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 86.

ſſſſſ *fronde ſupradecompoſita.*

ſinenſe. 37. Tr. foliis pinniſque alternis lanceolatis, pinnis laciniis cuneiformibus. *Osb. it. t.* 6.

ſcandens. 38. Tr. foliolis pinniſque alternis, his oblongis ſerratis. *Plum. fil. t.* 93.

capillaceum. 39. Tr. pinnis filiformibus linearibus unifloris. *Plum. fil. t.* 99.

japonicum. 40. Tr. pinnulis inciſo-trifidis acutis. *Thunb. flor. jap. p.* 340.

canarienſe. 41. Tr. frondibus tripartitis, foliolis pinniſque alternis, his pinnatifidis. *Pluckn. alm. t.* 291. *f.* 2. *β)* Polypodium luſitanicum. *Sp. pl.* 2. *p.* 1556. *Magn. h. monſp. p.* 79. *ic.*

CÆNOPTERIS. *Fructificationes* in lineolis ſubmarginalibus lateralibus membrana exterius dehiſcente tectis.

rutæfolia. 1. C. frondibus pinnatifidis, laciniis linearibus planis obtuſis. *Berg. act. Petrop. pr.* 1782. 2. *p.* 249. *t.* 7. *f.* 2.

furcata. 2. C. fronde bipinnata, pinnulis imis furcatis, rhachi compreſſa marginata. *Berg. act. Petrop. pr.* 1782. 2. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1.

rhizophylla. 3. C. fronde bipinnata apice radicante, pinnulis obovatis ſubfalcatis petiolatis, primordialibus lobatis. *Smith. plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 80.

vivipara. 4. C. frondibus subtripinnatis, laciniis subulatis erectis. *Berg. act. Petropol. pr.* 1782. 2. *p.* 250. *t.* 7. *f.* 3. *Suppl. p.* 444. Acrostichum viviparum.

1182. MARSILEA. *Cal.* communis ovalis coriaceus multilocularis. *Cor.* o. *Filam.* o. *Anther.* plures. *Pist.* plura. *Stil.* o.

patens. 1. M. foliis oppositis simplicibus. *Mant. p.* 506. *act. palat.* 3. *phys. t.* 21.

quadrifolia. 2. M. foliis quaternis integerrimis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 5.

1183. PILULARIA. *Cal.* communis villosus, 4fariam dehiscens, globosa, 4locularis. *Anth.* plures sessiles. *Pist.* plura. *Stil.* o.

globulifera. 1. PILULARIA. *Flor. dan. t.* 223.

1184. ISŒTES. *Flores masculi: Anthera* intra basin frondis sessilis. *Fructificatio feminea: Capsula* 2locularis intra basin frondis.

lacustris. 1. I. foliis subulatis semiteretibus recurvis. *Suppl. p.* 448. *Flor. dan. t.* 191. *an vere distincta sui generis planta perfecta?*

coromandeliana. 2. I. foliis filiformibus erectis glabris. *Suppl. p.* 447.

MUSCI.

1186. PORELLA. *Anthera* oblonga, dehiscens poris plurimis lateralibus, non operculata. *Calyptra* o.

pinnata. 1. PORELLA. *Dill. musc. t.* 68. *f.* 1.

1187. SPHAGNUM. *Flos masculus* clavatus, antheris planis. *Caps.* in eadem planta operculatæ, sessiles, sine calyptra integra, ore lævi.

palustre. 1. Sph. ramis deflexis. *Flor. dan. t.* 474. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. *t.* 3. *f.* 9. & 4. *f.* 14. & 9. *f.* 53. 54. β) *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 13-15.

alpinum. 2. Sph. subramosum erectum. *Dill. musc. t.* 32. *f.* 3. *an bryi potius species ?*

1189. PHASCUM. *Capsula* ovata, calyptra munita, cum rudimento operculi persistente.

pedunculatum. 1. Ph. acaule, capsula pedunculata. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* II.

cernuum. 2. Ph. acaule, foliis floralibus erectis, pedunculo curvato. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 31. *t.* 11. *Schreb. de phasco. p.* 8. *t.* 1. *f.* 6. 7.

serratum. 3. Ph. acaule, foliis ovato-lanceolatis serratis planis erectis. *Schreb. de phasco. p.* 8. *t.* 2.

muticum. 4. Ph. acaule, foliis ovatis muticis concavis conniventibus. *Schreb. de phasco. p.* 8. *t.* 1. *f.* 11. 12.

cuspidatum. 5. Ph. caulescens, foliis ovatis cuspidatis patulis, summis erectis conniventibus. *Flor. dan. t.* 249. *f.* 3. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 699. Phascum acaulon.

subulatum. 6. Ph. caulescens, foliis lanceolato-linearibus patulis. *Flor. dan. t.* 249. *f.* 1. *Hedw. crypt.* 4. *t.* 35.

piliferum. 7. Ph. caulescens, foliis oblongis apice piliferis. *Schreb. phasco. t.* 1. *f.* 6-10.

crispum. 8. Ph. canescens, foliis minutis laxis capsulam cingentibus basi latis concavis, apice cuspidato undulatis. *Hedw. cryptog.* 1. *p.* 25. *t.* 9.

patens. 9. Ph. caulescens, foliis lanceolatis dentatis patulis, capsulæ apice diaphano. *Hedw. cryptog.* 1. *p.* 28. *t.* 10.

nitidum. 10. Ph. caulescens humile, foliis subulato-carinatis subfasciatis, capsulis pedunculatis suberosis. *Hedw. cryptog.* 4. *p.* 91. *t.* 34.

caulescens. 11. Ph. caulescens erectum, foliis lanceolatis alternis. *Dill. musc. t.* 85. *f.* 15.

repens. 12. Ph. caulescens repens, capsulis lateralibus sessilibus. *Dill. musc. t.* 85. *f.* 16.

alternifolium. 13. Ph. caulibus capsuliferis nanis, sterilibus altioribus erectis, foliis alternis subulatis. *Dicks. crypt. brit. fasc.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2.

1190. FONTINALIS. *Gemma* in eadem planta cum *capsula* subsessili, perichætio imbricato obvoluta & calyptra munita.

minor. 1. F. foliis ovatis concavis trifariis acutis passim geminis, capsulis terminalibus. *Dill. musc. t.* 33. *f.* 2.

antipyretica. 2. F. foliis complicato-carinatis trifariis acutis, capsulis lateralibus. *Dill. musc. t.* 33. *f.* 1. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 5. *f.* 27. & 2. *t.* 1. *f.* 5. *t.* 4. *f.* 14. 15. & *t.* 9. *f.* 53-55.

crispa. 3. F. surculis ramosis pennatis, foliis duplicato-bifariis rotundatis patentibus imbricatis undulatis, capsulis lateralibus posterioribus. *Dill. musc. t.* 32. *f.* 7. 8.

disticha. 4. F. surculis simplicibus, foliis bifariis patentibus retusis imbricatis planis, capsulis lateralibus posterioribus. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 138.

squamosa. 5. F. foliis imbricatis subulato-lanceolatis, capsulis lateralibus. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 32. *t.* 12.

albicans. 6. F. foliis imbricatis ovato-lanceolatis pilo terminatis, capsulis lateralibus. *Dill. musc. t.* 32. *f.* 5.

capillacea. 7. F. foliis secundis lineari-setaceis, perichætialibus longissimis convolutis subulatis. *Dill. musc. p.* 260. *t.* 33. *f.* 5.

alpina. 8. F. foliis subsecundis ellipticis obtusiusculis, perichætialibus lanceolatis acutis. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 2. *p.* 2. *t.* 4. *f.* 1.

1188. BUXBAUMIA. *Gemma* orbicularis, *Capsula* pedunculata, peristomate externo 16dentato, interno membranaceo plicato.

aphylla. 1. B. aphylla, pedunculo elongato. *Flor. dan. t.* 44. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 3. *f.* 10. & *t.* 9. *f.* 51.

foliosa. 2. B. acaulis, capsula subsessili foliis cincta. *Linn. fil. de musc. p.* 33. *t.* 1. *f.* 4. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2 *t.* 9. *f.* 52.

1191. SPLACHNUM. *Gemma* orbicularis, terminalis. *Capsula* in alia planta cylindrica cum calyptra & apophysi maxima, peristomate octodentato.

luteum. 1. Spl. umbraculo orbiculari plano. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 17.

ampullaceum. 2. Spl. umbraculo ampullaceo obconico. *Flor. dan. t.* 822. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 33. 34. & *crypt.* II. 2. *t.* 14.

vasculosum. 3. Spl. umbraculo ampullaceo subgloboso. *Flor. dan. t.* 192. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 15.

rubrum. 4. Spl. umbraculo orbiculari hemisphærico. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 18.

sphæricum. 5. Spl. receptaculo globoso. *Linn. fil. musc. t.* 1. *f.* 1. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 16.

angustatum. 6. Spl. caulescens, foliis piliferis, pedunculo brevissimo. *Linn. fil. musc. p.* 33. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 12.

urceolatum. 7. Spl. trunco erecto bifloro, foliis cochleariformibus imbricatis apiculatis, apophysi tumidiuscula obconica. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 13.

Breweri. 8. Spl. foliis lanceolatis integerrimis. *Hedw. crypt.* 114. *p.* 120. *t.* 38.

longisetum. 9. Spl. foliis ovatis cuspidatis, umbraculo subgloboso. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 441.

tenue. 10. Spl. caulescens, foliis ovato-oblongis acutis, receptaculo obconico attenuato. *Dicks. crypt. Brit. f.* 2. *p.* 2. *t.* 4. *f.* 2.

ovatum. 11. Spl. acaule, foliis lanceolato-ovatis acutis, receptaculo obovato. *Dill. musc. p.* 344. *t.* 44. *f.* 4.

1192. POLYTRICHUM. *Gemma* orbicularis, terminalis, *Capsula* in alia planta calyptra munita, periſtomatis externis dentibus 32.

* *capſula apophyſi munita.*

commune. 1. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis ſerrulatis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. *Blackw. herb. t.* 375. *Hedw. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 9. *f.* 62 64. & 2. *t.* 7. *f.* 37.

magellanicum. 2. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis ſubulatis canaliculatis cartilagineo-ſerratis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. *Suppl. p.* 449.

juniperinum. 3. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis integerrimis mucronatis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. *Flor. dan. t.* 295.

piliferum. 4. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis, apice piliferis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. *Dill. muſc. t.* 54. *f.* 3.

pulverulentum. 5. P. ſurculo ſubſimplici folioſo, foliis lanceolatis acuminatis horizontalibus roridis. *Reynar act. Lauſann.* II. 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 2.

ſerratum. 13. P. ſurculo ſimplici, capſulis tetraëdris, foliis lanceolato-linearibus ſerratis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 446.

** *capſula ſine apophyſi.*

nanum. 6. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis apice ſubſerratis, capſulis ſubrotundis, calyptris villoſis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Maium polytrichoides. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 37. *t.* 13.

aloides. 7. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis apice ſerrulatis, capſulis cylindricis, calyptris villoſis. *Hedw. cryptog.* 2. *p.* 40. *t.* 14.

undulatum. 8. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis ſerratis undulatis, capſulis cylindricis, operculi acumine longe producto, calyptris dimidiatis glabris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701.

Bryum undulatum. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 46. *t.* 16. *β*) *Hedw. crypt.* 2. *t.* 17.

hercynicum. 9. P. surculo subsimplici, foliis lanceolatis carnosis, capsulis erectis urceolatis calyptris interrupte villosis. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 43. *t.* 15.

alpinum. 10. P. surculo ramosissimo, foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis terminalibus, capsulis ovatis. *Flor. dan. t.* 296.

urnigerum. 11. P. surculo ramosissimo, foliis lanceolatis dentato-serratis, pedunculis axillaribus, capsulis cylindricis. *Dill. musc. t.* 55. *f.* 5.

convolutum. 12. P. caule folioso, foliis involutis subulatis glabris, pedunculo filiformi brevi, calyptra villosa. *Suppl. p.* 449. *Linn. fil. musc. t.* 1. *f.* 3.

1193. MNIUM. *Gemma* orbicularis rarius capitata, *Capsulæ* utplurimum in alia planta calyptra munitæ, perisstomatis dentibus 16 rarius 4.

* *gemmis capsulisque in eadem planta.*

⁊ *peristomate interno ciliis 16 membranaceis planis,* Funaria s. Koelreutera.

hygrometricum 1. Mn. surculo subsimplici, foliis oblongis acuminatis, capsulis ovatis nutantibus, operculis planis. *Flor. dan. t.* 648. *f.* 2. *Hedw. hist. musc. frond.* 1. *t.* 5. *f.* 21-26. & 2. *t.* 3. *f.* 11. *t.* 5. *f.* 25. 26. *t.* 6. *f.* 27. *t.* 10. *f.* 58-61.

⁊⁊ *peristomate interno obsolete sulcato laciniato:* Timmia.

megapolitanum. 2. Mn. erectum, foliis lineari-lanceolatis serratis patulis, capsula cernua, operculo convexo medioque depresso. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 83. *t.* 31.

** *gemmis capsulisque in diversa planta.*

⁊ *illis capitatis, harum peristomate simplici.*

† *peristomatis dentibus.* 4. Tetraphis, sive Georgia

pellucidum. 3. Mn. surculo simplici, foliis ovatis, capsulis cylindricis. *Flor. dan. t.* 300. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 32.

†† *peristomatis dentibus* 16. Dicranum.

purpureum. 4. Mn. surculo ramoso, foliis oblongis acutis carinatis, capsulis subcylindricis, setis axillaribus. *Dill. musc. t.* 49. *f.* 51. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 17.

strictum. 5. Mn. surculo caulescente, foliis capillaceis, pedunculis elongatis terminalibus, capsulis obliquis. *Swarts nov. gen. pl. & sp. p.* 139. *an hujus cohortis?*

latifolium. 6. Mn. erectum, foliis oblongo-dilatatis concavis pilo brevi terminatis, capsula cylindrica recta. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 89. *t.* 33.

scoparium. 7. Mn. surculo ramoso, foliis lineari-lanceolatis recurvis secundis, capsulis erectis oblongo-cylindricis, operculis conicis acuminatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum scoparium. *Curt. flor. Lond. t.* 38. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 41. 42.

heteromallum. 8. Mn. surculo subsimplici, foliis setaceis recurvis, capsulis ovatis, operculis acuminatis recurvis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum heteromallum. *Hedw. cryp.* 3. *p.* 72. *t.* 26. & *fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 9. *f.* 55. 61.

tortile. 33. Mn. surculo subdiviso, foliis subulato-carinatis reflexis heteromallis siccitate tortilibus, thecis oblongis, operculo rostrato. *Schrader.*

glaucum. 9. Mn. surculo ramoso, foliis ovatis acutis imbricatis, capsulis oblongis, operculis acuminatis recurvis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum glaucum. *Dill. musc. t.* 46. *f.* 20.

pellucens. 10. Mn. surculo hirsuto, foliis recurvis acutis, capsulis erectiusculis. *Dill. musc. t.* 46. *f.* 23. 24. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum pellucidum.

aciculare. 11. Mn. foliis erectis subsecundis, capsulis erectis, operculo aciformi. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum aciculare. *Dill. musc. t.* 46. *f.* 25.

simplex. 12. Mn. surculo simplicissimo, medio pedunculifero, foliis subulatis, capsula nutante oblonga. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum simplex. *Dill. musc. t.* 50. *f.* 9. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 103. *t.* 34.

pusillum. 34. Mn. foliis capillaribus rigidulis erectis, summis æqualibus. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 96. *t.* 29. *f.* B.

spuricum. 35. Mn. surculo erecto, foliis nitidis cuspidatis concavis, summis confertis patulis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 96. *t.* 30.

ﬞﬞ *gemmis orbicularibus, periſtomate duplici.*

✝ *interno reticulato*, Mæſia.

triquetrum. 13. Mn. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis acutis carinatis patulis, capſulis obliquis oblongo-cylindricis, operculis conicis. *Hedw. crypt.* 3. *t.* 21. 22.

uliginoſum. 14. Mn. ſurculo ſubſimplici, foliis oblongo-lanceolatis obtuſis, capſulis obliquis pyriformibus, operculis conicis umbilicatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum trichodes. *Hedw. crypt.* I. *t.* I. 2. & *fund. hiſt. muſc. frond.* I. *f.* 16. 20. 2. *t.* 6. *f.* 28. & *t.* 9. *f.* 56. 57.

✝✝ *periſtomate interno e membrana ciliis difformibus.*

tomentoſum. 15. Mn. ſurculo dichotomo erecto tomentoſo, foliis ſubulatis, capſulis ſphæricis. *Swarts nov. pl. gen.* & *ſp. p* 139.

ſphærocapron. 16. Mn. ſurculis erectis tomentoſis filiformibus, ramis ſimplicibus faſciculatiſque terminalibus, foliis capillaribus, capſulis ſphæricis. *Swarts nov. pl. gen.* & *ſp. p.* 139.

ramoſum. 17. Mn. ſurculo ramoſo erecto, pedunculis axillaribus *Dill. muſc. t.* 31. *f.* 4. *an cum* 2 *præcedentibus hujus cohortis?*

fontanum. 18. Mn. ſurculo ſubramoſo erecto, foliis lanceolatis apice ſetaceis incurvis, capſulis ſubrotundis obliquis, operculo conico umbilicato obtuſo. *Flor. dan. t.* 299.

marchicum. 19. Mn. ſurculo ramoſo erecto, foliis ovatis acuminatis, capſulis ſubrotundis obliquis, operculis mucrone craſſo adunco. *Roth. flor. germ.* I. *p.* 474. *Hedw. crypt.* II. 4. *t.* 39.

paluſtre. 20. Mn. ſurculo ramoſo dichotomo, foliis ſubulatis acutis carinatis, capſulis oblongis, operculis conicis. *Dill. muſc. t.* 31. *f.* 3.

annotinum. 21. Mn. foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis ſubradicalibus, capſulis nutantibus. *Dill. muſc. t.* 50. *f.* 68.

hornum. 22. Mn. capſulis pendulis, pedunculo curvato, ſurculo ſimplici, foliis margine ſcabris. *Curt. flor. Lond. t.* 48. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* I. *t.* I. *f.* 2. 3. 10. & 12. *t.* I. *f.* 4. & *t.* 4. *f.* 22. 23.

capillare. 23. Mn. capſulis pendulis, foliis ovatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis. *Dill. muſc. t.* 50. *f.* 67.

crudum. 24. Mn. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis acutis, capſulis nutantibus ovatis, operculis conicis, calyptris recurvatis. *Hedw. crypt.* 4. *t.* 37.

punctatum. 25. Mn. capſulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis integerrimis obtuſis punctatis. *Dill. muſc. t.* 53. *f.* 81. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 10. *f.* 66-69.

cuſpidatum. 26. Mn. capſulis nutantibus, pedunculis aggregatis foliis ovatis acutis ſerratis. *Dill. muſc. t.* 53 *f.* 79.

ſerratum. 27. Mn. ſurculo ſimplici, foliis ovatis acuminatis, ſummis anguſtioribus ſerratis, thecis ovatis nutantibus, operculi roſtello recurvo. *Schrader.*

roſtratum. 28. Mn. ſurculo ſimplici, foliis ovato-ligulatis ſubſerratis, thecis ovatis nutantibus, operculi roſtello recurvo. *An ſatis diſtinctum a ſerrato? Schrader.*

proliferum. 29. Mn. capſulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis roſaceo congeſtis lanceolatis acutis. *Dill. muſc. t.* 52. *f.* 77.

undulatum. 30. Mn. capſulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis ſerrulatis. *Dill. muſc. t.* 52. *f.* 76.

nutans. 31. Mn. ſurculo ſubramoſo, foliis ovatis acutis, capſulis pyriformibus nutantibus. *Dill. muſc. t.* 51. *f.* 74.

ceſpititium. 32. Mn. capſulis pendulis, foliis lanceolatis, acuminato-ſetaceis pedunculis longiſſimis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum cæſpiticium. *Curt. flor. Lond.* 166. a. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 3. *f.* 12. & *t.* 10. *f.* 67.

1194. BRYUM. *Gemmæ* ſæpe axillares, nunc in alia, nunc in eadem planta cum *capſulis* calyptra munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti inſidentibus.

* *gemmis conſpicuis nullis*, Webera.

pomiforme. 1. Br. ſurculo ramoſo, foliis lineari-lanceolatis ſeta terminatis imbricato-patulis, capſulis ſphæricis, operculo plano. *Dill. muſc. t.* 44. *f.* 1.

mnioides. 2. Br. ſurculo ſubſimplici, foliis linearibus, capſulis pyriformibus nutantibus, operculis conicis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium pyriforme. *Hedw. cryptog.* 1. *t.* 3. & *fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 12.

3. Br.

nutans. 3. Br. surculo simplici, foliis ovato-lanceolatis conniventibus, capsulis cylindricis, operculis conicis mucronatis. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 9. *t.* 4.

rubrum. 56. Br. capsula oblonga nutante, foliis subulatis, caule simplicissimo medio pedunculifero. *Mant. p.* 309. *an huc spectat?*

* * *gemmis instructa.*

ꓶ *gemmis capsulas includentibus*, Swarzia.

capillaceum. 61. Br. foliis distichis basi semivaginantibus, capsulis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 88. *t.* 26.

inclinatum. 62. Br. foliis basi semivaginantibus subsetaceis, capsulis inclinatis, peristomatis dentibus perforatis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 90. *t.* 27.

trifarium. 63. Br. foliis trifariis, superioribus lanceolatis, inferioribus subulatis, capsulis ovatis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 92. *t.* 28.

ꓶꓶ *in eadem planta cum capsulis.*

† *peristomate nudo*, Hedwigia.

ciliatum. 4. Br. capsulis sessilibus terminalibus, calyptra minima. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 107. *t.* 40.

aquaticum. 95. Br. capsulis oblongis, trunco tenui declinato, apice foliisque linearibus acuminatis reclinatis. *Hedw. crypt.* III. 2. *p.* 29. *t.* 11. *Jacq. flor. austr. t.* 290.

†† *peristomate octodentato.*

Octoblepharis. 4. Br.
Hedw. crypt. 3. *p.* 15. *t.* 6.

††† *peristomate 16dentato.*

⊥ *simplici.*

⊥ *gemmis axillaribus*: Leersia.

pulvinatum. 5. Br. surculo ramoso, foliis oblongis piliferis, capsulis subrotundis nutantibus, calyptris minutis. *Dill. musc. t.* 50. *f.* 65. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 10. *f.* 65.

cirrhatum. 6. Br. surculo ramoso, foliis lanceolatis acutis, capsulis oblongis, operculo acuminato, calyptris dimidiatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium cinctum. *Flor. dan. t.* 538. *f.* 4. *nonne potius ad dicrana Hedwigii ablegandum?*

exſtincto-rium. 7. Br. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis, capſulis cylindricis, calyptris campanulatis margine integris capſulas ſuperantibus. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 49. *t.* 18. *fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 19. & 24. a.

cuſpidatum. 68. Br. ſurculo ſimplici, foliis lanceolato-linearibus acuminatis, capſulis ovatis, operculis conico-roſtratis ſubincurvis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 442.

ciliare. 8. Br. ſurculo ſubramoſo, calyptra ampla conica ciliata. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 53. *t.* 19.

† † *gemmis ſparſis*: Trichoſtomum.

hypnoides. 9. Br. ſurculo ramoſo decumbente, foliis oblongis apice piliferis, capſulis oblongis, calyptris integris. *Flor. dan. t.* 476. *Hedw. frond. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 43. 44.

microcarpon. 10. Br. ſurculo ramoſo, foliis patulis, ſetis terminalibus, capſulis ſubrotundis. *Dill. muſc. t.* 46. *f.* 29.

indicum. 11. Br. ſurculo ramoſo erecto, foliis lanceolatis convolutis, ſetis ſuperne incraſſatis axillaribus, capſulis oblongis, operculis roſtratis. *Willdenav bot. Mag.* 4. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 1.

faſciculare. 89. Br. ſurculo procumbente, ramis confertis brevibus, foliis lanceolatis margine revoluto-patulis, capſulis ovato-oblongis. *Schrader.*

ericoides. 88. Br. ſurculo erecto, ramis confertis brevibus, foliis lanceolato-acuminatis, apice diaphanis recurvis, capſulis ovatis. *Schrader.*

anguſtatum. 87. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolato-ſubulatis ſiccitate tortilibus, capſulis oblongis. *Schrader.*

lanceolatum. 58. Br. ſurculo ſubſimplici erecto, foliis lanceolatis mucronatis, capſulis ovatis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 81. *t.* 23.

pallidum. 12. Br. ſurculo ſimplici breviſſimo, foliis capillaceis ſubulatis vaginantibus, capſulis cylindricis, operculis conicis, calyptris dimidiatis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 75. *t.* 27.

baſiflorum. 69. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis erectis, capſularum pedunculis ex baſi ramorum bracteatis, operculo conico ſubobliquo. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 448.

tortum. 70. Br. capſula ſubcylindrica flexuoſa, periſtomatis dentibus articulatis, operculo conico, pedunculis intortis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 449. *an diſtincta ſpecies?*

repens. 71. Br. capsula recta, senescente incurva, surculo repente, ramis filiformibus erectis, foliis enervibus lanceolatis patulis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 450.

fontinolioides. 96. Br. trunco longo ramoso, foliis lanceolatis patulis, capsulis lateralibus. *Hedw. crypt.* III. 2. *p.* 36. *t.* 14.

pusillum. 13. Br. surculo simplici brevissimo, foliis subulatis vaginantibus, capsulis oblongis, operculis conicis, calyptris dimidiatis. *Hedw. crypt.* 3 *p.* 78. *t.* 28.

secundum. 60. Br. foliis lanceolatis dentato-cuspidatis, capsulis oblongis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 86. *t.* 25.

⊥⊥ *peristomate præter dentes ciliis spiraliter convolutis munito :* Tortula.

murale. 14. Br. surculo brevissimo subdiviso, foliis ovatis acutis apice piliferis, capsulis oblongis, operculis conicis acutis. *Dill. musc. t.* 45. *f.* 14.

tortuosum. 90. Br. surculo ramoso, foliis lanceolato-linearibus serratis undulatis siccitate crispis, capsulis cylindricis, operculo rostrato. *Dill. musc. t.* 48. *f.* 40.

agrarium. 15. Br. acaule, capsulis cylindricis erectiusculis subulatis, foliis lanceolatis acutis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 139. *an hujus cohortis ?*

acuminatum. 16. Br. capsulis cylindricis erectis subulatis, surculis caulescentibus cespitosis, foliis linearibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 139. *an hujus cohortis ?*

subulatum. 17. Br. surculo brevissimo simplici, foliis ovatis obtusiusculis, capsulis cylindricis, operculo conico acuto. *Curt. flor. Lond. t.* 214. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 38-40.

†††† *peristomate dentibus* 32.

Didymodon. 17*. Br.
Hedw. crypt. 3. *p.* 8.

ר ר ר *gemmis in alia, capsulis in alia planta.*

† *peristomate nudo :* Gymnostomum.

pyriforme. 18. Br. foliis explanatis oblongis acutis, capsulis pyriformibus. *Flor. dan. t.* 537. *f.* 1. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 1. *f.* 2. 3. *t.* 2. *f.* 6. *a. β. t.* 4. *f.* 18. & *f.* 24. b. & *t.* 6 *f.* 31.

Heimii. 19. Br. trunco erecto foliisque spatulato-acuminatis ad apicem denticulatis, capsulis oblongis erectis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 80. *t.* 30.

ovatum. 20. Br. foliis ovatis concavis piliferis, capſulis ovatis. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 16. *t.* 6.

obtuſum. 74. Br. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, capſulis erectis obovatis truncatis, operculo convexo. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 5. *t.* 4. *f.* 7.

truncatulum. 21. Br. foliis explanatis mucronatis, capſulis truncatis. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 13. *t.* 5.

pennatum. 22. Br. ſurculo ſimplici erecto pinnatifido apice fructifero, pinnis diſtichis lanceolatis integerrimis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 81. *t.* 29.

curviroſtrum. 59. Br. ſurculo pallido debili recto, foliis linearibus reflexis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 84. *t.* 24.

ſtelligerum. 73. Br. capſulis erectis ſemigloboſis nudis, foliis linearibus ſtellato-verticillatis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 2. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 4.

†† *periſtomate 16dentato.*

⊥ *ſimplici.*

⊥ *gemmis ſparſis:* Grimmia.

apocarpum. 23. Br. capſulis ſeſſilibus terminalibus, calyptra minima. *Hedw. crypt.* I. 4. *p.* 104. *t.* 39.

ſeſſile. 24. Br. capſulis ſeſſilibus, foliis rectis carinatis. *Dill. muſc. t.* 55. *f.* 10.

ſilvaticum. 25. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis, capſulis oblongis pedunculatis axillaribus terminalibuſque, operculo mucrone obtuſo, calyptris villoſis. *Flor. dan. t.* 648. *f.* 1.

ſetaceum. 26. Br. foliis ſetaceis, capſulis pyriformibus, pedunculis recurvatis. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 102. *t.* 38.

⊥⊥ *gemmis terminalibus capitatis.* Weiſſia.

viridulum. 27. Br. capſulis ovatis erectis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Curt. flor. Lond. t.* 132. a.

Dickſoni. 28. Br. foliis lineari-lanceolatis, capſulis oblongis, operculo acuminato, calyptra dimidiata. *Dickſon crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

recurviroſtrum. 29. Br. foliis lanceolatis imbricato-patulis, capſula gracili, operculi roſtello recurvo. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 19. *t.* 7.

unilaterale. 30. Br. trunco erecto, foliis basi latioribus, cuspide subulata rigida unilaterali, capsularum operculo conico annulato. *Hedw. crypt.* I. *p.* 22. *t.* 8.

minutum. 31. Br. surculo simplici nano capsulaque ovata erectis, foliis capillaribus. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 94. *t.* 29. *f.* A.

⊥⊥ *peristomate duplici.*

⊥ *interno simili.* Orthothrichum.

crispum. 32. Br. foliis imbricatis cuspidatis siccitate crispis, capsulis ovatis. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 111. *t.* 35.

striatum. 33. Br. surculo ramoso, foliis lanceolatis acutis, capsulis oblongis sessilibus axillaribus terminalibusque, operculo acuminato, calyptris pilosis. *Dill. musc. t.* 55. *f.* 8. *Hedw. fund. hist. musc. frond* I. *t.* 8. & 2 *t.* 2. *f.* 7. 8. & *t.* 7. *f.* 36. *crypt.* II. 4. *t.* 36.

tectorum. 34. Br. capsulis subsessilibus, caliptris villosis conicis, setis brevissimis axillaribus. *Dill. musc. t.* 55. *f.* 9. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 35. *crypt.* II. 4. *t.* 37.

diaphanum. 93. Br. foliis lanceolato-acuminatis apice diaphanis, capsula oblonga striata, peristomii dentibus internis capillaceis. *Schrader.*

affine. 94. Br. foliis lanceolatis margine revoluto-patulis, capsula oblonga striata, peristomatis dentibus ciis internis capillaceis. *Schrader.*

⊥⊥ *interno membrana 16dentata.* Pohlia.

* elongatum. 35. Br. trunco erecto, foliis lineari-lanceolatis, capsularum basi elongata. *Hedw. crypt.* I. 4. *p.* 96. *t.* 36.

⊥⊥⊥ *interno membrana plicata canaliculata.* Bartramia.

Bartramia. 67. Br. foliis apice subulatis, capsulis ovatis lateralibus. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 126. *t.* 40.

⊥⊥⊥⊥ *interno ciliato.*

† *ciliis spiraliter convolutis.* Barbula.

murale. 36. Br. surculo ramoso, foliis reflexis obovatis obtusis apice piliferis, capsulis cylindricis, operculis conicis acutis. *Dill. musc. t.* 45. *f.* 12. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 6. *f.* 28. 32.

hercynicum. 92. Br. ſurculo ſubdiviſo, foliis lanceolato-ligulatis obtuſiuſculis piloſis, capſulis oblongis, operculo ſubulato. *Schrader.*

pilloſum. 91. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolato-carinatis piloſis, capſulis ovato-oblongis, operculo ſubulato. *Schrader.*

unguiculatum. 37. Br. ſurculo ſubramoſo, foliis lineari-lanceolatis carinatis, capſulis ſubcylindricis, operculo conico. *Hedr. crypt. 3. p. 63. t. 23. fund. hiſt. muſc. frond. 2. t. 4. f. 20.*

imberbe. 38. Br. foliis patulis recurvis, capſulis oblongis, operculi roſtello obliquo. *Hedw. crypt. 3. p. 66. t. 24.*

barbatum. 39. Br. foliis lanceolatis acutis, ſummis patulis, capſulis erectis oblongis, operculo acuminato obliquo, pedunculo laterali. *Curt. flor. Lond. t. 274.*

rigidum. 40. Br. trunco humillimo, foliis margine inflexis, capſulis oblongis erectis. *Hedw. crypt. I. 3. p. 69. t. 25.*

convolutum. 41. Br. foliis communibus lanceolatis, perigonialibus obtuſis in cylindrum convolutis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium ſetaceum. *Hedw. crypt.* I. 4. *p.* 86. *t.* 32.

†† *ciliis difformibus e membrana carinata.*

androgynum. 42. Br. ſurculo ramoſo erecto, foliis lanceolatis patulis, capſulis cylindricis, operculis acuminatis, ſeta terminali. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium androgynum. *Flor. dan. t. 299. Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 6. *f.* 33-36.

lycopodioides. 43. Br. capſulis erectis, pedunculis abbreviatis ſolitariis, ſurculis elongatis ſubramoſis, foliis patulis linearibus acutis ſerrulatis ſubundulatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 139.

albidum. 44. Br. capſulis erectis, foliis lingulatis obtuſiuſculis patulis. *Dill. muſc. t. 46. f. 21. Swarts obſ. bot. t. 11. f. 1.*

paraſiticum. 45. Br. capſulis erectiuſculis, pedunculis breviſſimis, ſurculis confertis ramoſis brevibus, foliis patulis linearibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p. 139.*

calicinum. 46. Br. capſulis erectiuſculis, perichætio longiſſimo pedunculum æquante, ſurculis erectis, foliis linearibus cirrhatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 139.

flexuoſum. 48. Br. capſulis erectis, pedunculis flexuoſis, foliis ſetaceis. *Dill. muſc. t. 47. f. 33.*

æſtivum. 51. Br. capſulis erectis ſubrotundis axillaribus, foliis ſubulatis diſtantibus. *Dill. muſc. t. 47. f. 36.*

calcarium, 72. Br. acaulon, capsulis erectis obconicis dentatis, foliis erectis teretibus obtusiusculis. *Dicks. crypt. Bryt.* 2. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 3.

paludosum. 52. Br. acaulum, foliis setaceis, capsulis obtusissimis patulis. *Dill. musc. t.* 49. *f.* 53.

verticillatum. 53. Br. capsulis erectis, pedunculis arefactione confertis, foliis piliferis, surculis fastigiatis. *Dill. musc. t.* 47. *f.* 35.

Celsii. 54. Br. capsulis erectiusculis, pedunculis longissimis, foliis setaceis, surculis acaulibus. *Dill. musc. t.* 49. *f.* 54.

squarrosum. 55. Br. capsulis obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo-tomentoso. *Buxb. cent.* 4. *t.* 65. *f.* 1.

argenteum. 56. Br. capsulis pendulis, surculis cylindricis imbricatis lævibus. *Flor. dan. t.* 880. *f.* 2. *Hedw. fund. hist. musc. frond. t.* 6. *f.* 29.

ventricosum. 57. Br. capsulis pendulis ventricosis oblongis, foliis trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis, surculis ramosis. *Dill. musc. t.* 51. *f.* 72.

carneum. 64. Br. capsulis pendulis subglobosis, foliis acutis alternis. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 56. *t.* 20.

alpinum. 65. Br. capsula pendula oblonga, foliis ovatis acuminatis carinatis, surculis ramosis, axillis pedunculiferis. *Dill. musc. t.* 50. *f.* 64.

dendroides. 66. Br. capsulis nutantibus, surculo erecto, ramis verticillatis terminalibus, ramulis alternis, foliis serratis. *Linn. fil. musc. p.* 34. *t.* 1. *f.* 2.

*** *dubiæ tribus.*

† *peristomate dentato.*

reticulatum. 75. Br. capsulis erectis pyriformibus, foliis ovatis serratis reticulatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 4. *t.* 4. *f.* 6.

splachnoides. 76. Br. capsulis erectis obovatis, apophysi subrotunda, foliis lineari-setaceis. *Flor. dan. t.* 538. *f.* 2.

bipartitum. 77. Br. capsulis erectis subobliquis, surculis bifidis, foliis lanceolatis acutis carinatis imbricato-patulis. *Dill. musc. p.* 385. *t.* 49. *f.* 50.

Zierii. 78. Br. capsulis pendulis clavatis elongatis surculis teretibus, foliis radicalibus patentibus longioribus. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 10.

cubitale. 79. Br. capsulis pendulis clavatis oblongis, surculis setisque inflexis, foliis sagittatis acutis marginatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 9. *t.* 5. *f.* 2.

†† *peristomate ciliato.*

margina-tum. 80. Br. capsulis nutantibus, operculo rostrato, foliis ovato-lanceolatis acutis denticulatis marginatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 9. *t.* 5. *f.* 1.

dealba-tum. 81. Br. capsulis erectis subrotundis subincurvis dentato-ciliatis, foliis lanceolatis acutis patentibus. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 5. *f.* 3.

brevifo-lium. 82. Br. capsulis erectis oblongis attenuatis obsolete ciliatis, foliis confertis linearibus carinatis. *Dill. musc. p.* 377. *t.* 47. *f.* 39.

flaves-cens. 83. Br. capsulis erectis cylindricis, surculis subsimplicibus, foliis lanceolato-linearibus carinatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 4. *t.* 4. *f.* 5.

ericeto-rum. 84. Br. capsulis erectis ovato-oblongis annulatis, foliis lineari-lanceolatis exsiccatione contortis. *Dill. musc. p.* 354. *t.* 45. *f.* 13.

patens. 85. Br. capsulis erectis subpyriformibus, setis brevissimis, surculis erectiusculis, ramis patentibus subfastigiatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 6. *t.* 4. *f.* 8.

††† *peristomate annulato.*

tetrago-num. 86. Br. capsulis erectiusculis subglobosis, surculis tetragonis, junioribus scandenti-flexuosis, foliis adpressis subulatis, *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 9.

1195. HYPNUM. *Gemmæ* in alia utplurimum planta. *Capsulæ* pedunculo laterali ex perichætio prodeunti insidentes, peristomate exteriori 16dentato.

* *gemmis capsulisque in eadem planta, peristomate simplici.* Fissidens.

† *fronde pinnata.*

spinifor-me. 1. H. fronde simplicissima, pinnis patentibus subulatis, pedunculis radicalibus. *Dill. musc. t.* 43. *f.* 68. *Swartz obs. bot. t.* 11. *f.* 2. *an hujus tribus?*

taxifolium. 2. H. fronde ſimplici baſi ſetifera, pinnis oblongis acutis, capſulis oblongis, operculo acuminato. *Flor. dan. t.* 473. *f.* 2.

denticulatum. 3. H. fronde ſubſimplici baſi ſetifera, pinnis cuneiformibus acutis conjugatis, capſulis cylindricis, operculo obtuſo. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 5.

bryoides. 4. H. fronde ſimplici apice ſetifera, pinnis oblongis acutis, capſulis oblongis, operculis acutis. *Flor. dan. t.* 473. *f.* 1.

ſemicompletum. 14. H. trunco filiformi ramoſo, foliis alternis, inferioribus bracteolatis, ſuperioribus lanceolatis ſemivaginantibus pinnatis, capſulis ſubſeſſilibus minimis. *Hedw. crypt.* III. 2. *p.* 34. *t.* 13.

acacioides. 5. H. fronde ramoſa apice pedunculifera. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 4. *an hujus tribus?*

adiantoides. 6. H. fronde ſubramoſa medio ſetifera, pinnis oblongis acutis, capſulis ſubcylindricis, operculis acumine brevi. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 3.

ornithopodioides. 6. H. fronde ramoſa, pinnis patentiſſimis ovatis carinatis mucronatis. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 9.

palmatum. 8. H. fronde ſimpliciſſima ſubpalmata apice pedunculifera, pinnis diſtantibus patentibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

polypodioides. 9. H. fronde ſimpliciſſima lanceolata erecta apicem verſus pedunculifera, pinnis obtuſis, pedunculis capſuliſque incurvis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

aſplenioides. 10. H. fronde ſubramoſa erecta lineari apice pedunculifera, capſulis incurvis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140. *Dickſ. crypt. Br.* 2. *t.* 5. *f.* 5. *an eum* 3. *præcedentibus hujus tribus?*

†† *ſurculis confertis.*

ſciuroides. 11. H. ſurculo ſubramoſo, foliis imbricatis ovato lanceolatis apice piliferis, capſulis oblongis, operculo conico. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 54. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 45. 46.

polycarpon. 90. H. foliis linearibus ſiccitate criſpis, capſulis ad apicem confertis. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 99. *t.* 31.

ſtrumoſum. 91. H. foliis lineari-lanceolatis, capſulis incurvis baſi ad latus intumeſcentibus. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 102. *t.* 32.

crispatum. 92. H. erectum, foliis subdistichis basi semivaginantibus apice capillaribus, capsulis ovatis rectis. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 105. *t.* 133.

* * *gemmis in alia, capsulis in alia planta*, peristomatis interni.

r *ciliis apice liberis*: Neckera.

crispum. 12. H. surculis ramosis erectiusculis, foliis distichis oblongis obtusis rugosis, capsulis oblongis, operculo rostrato, rostro reflexo. *Dill. musc. t.* 36. *f.* 12. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 47. 48.

viticulosum. 13. H. surculis ramosis decumbentibus, foliis oblongis acutis patulis, capsulis oblongis, operculis conicis. *Dill. musc. t.* 39 *f.* 43. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 11. & 2. *t.* 8. *f.* 49. 50.

dendroides. 15. H. surculo erecto inferne nudo superne fasciculato ramoso folioso, foliis lineari lanceolatis imbricatis, capsulis subcylindricis erectis, operculi rostello incurvo. *Flor. dan. t.* 823. *f.* 2.

curtipendulum. 16. H. surculis erectis ramosis teretibus foliosis, foliis oblongo-ovatis acutis imbricatis, capsulis nutantibus ovatis, operculis acuminatis. *Dill. musc. t.* 43. *f.* 69.

sericeum. 17. H. surculo ramoso repente, foliis oblongis seta terminatis ante imbricatis, capsulis erectis cylindricis, operculis acuminatis recurvis. *Curt. flor. Londin. t.* 126.

aduncum. 18. H. surculo ramoso erecto, foliis lineari-lanceolatis falcatis carinatis apice setaceis secundis, capsulis obliquis oblongis, operculis conicis oblongis. *Dill. musc. t.* 37. *f.* 26.

heteromallum. 107. H. trunco inferius ramoso superius florido, capsulis heteromallis, foliis ovato-acuminatis concavis. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 38. *t.* 15.

filiforme. 108. H. trunco subramoso filiformi pendulo, foliis ovatis acutis concavis patulis, capsulis basi annulato-pilifera brevissime pedunculatis. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 41. *t.* 16.

filicoides. 109. H. trunco erecto bifariam ramoso, ramis approximatis, foliis ovato-acutis concavis, capsulis axillaribus, operculo ruguloso. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 45. *t.* 18.

pennatum. 110. H. trunco tenui decumbente ramoso, ramis subramosis, foliis lanceolatis confertis bifariam divergentibus, capsula perichætio immerse ovata. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 47. *t.* 19.

jamai-cense. 111. H. trunco debili fubramofo, ramulis patulis bifariis capfuligeris, foliis oblongo-ovatis, vaforum fafciculo profunde fulcato. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 43. *t.* 17.

pumilum. 112. H. trunco ramulofo, foliis lanceolatis refime acuminatis alternatim confertis bifariam divergentibus, capfula ovata pedunculoque exfertis. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 49. *t.* 20.

albicans. 19. H. furculo ramofo afcendente, foliis oblongo-lanceolatis apice fetaceis, capfulis oblongis obliquis, operculis conicis obtufis. *Dill. mufc. t.* 42. *f.* 63.

r r *periftomatis interni ciliis uniformibus bafi membranacea connexis :* Leskea.

trichomanoides. 20. H. furculo ramofo; foliis diftichis oblongis fublunatis obtufis, capfulis fubcylindricis, operculi roftello reflexo. *Willdenow prodr. flor. berol. n.* 941.

filifolium. 21. H. furculis ramofis, ramis breviffimis, foliis fubulatis acutis, capfulis oblongis, operculis conicis obtufis. *Dill. mufc. t.* 42. *f.* 62.

flagellare. 93. H. furculis repentibus, ramis erectis fubfimplicibus, foliis lanceolatis acuminatis apice reflexis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 462.

paluftre. 22. H. furculis repentibus vagis ramofis, foliis ovatis acutis fecundis, capfulis cylindricis, operculis obtufis. *Dill. mufc. t.* 37. *f.* 27.

myofuroides. 23. H. frondibus reptantibus ramofiffimis, ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis erecte imbricatis pilo terminatis, capfulis cylindricis. *Dill. mufc. t.* 41. *f.* 51.

attenuatum. 24. H. furculis ramofiffimis, ramis incurvatis apice gracilefcentibus, foliis fecundis ovatis carinatis obtufis, capfulis erectis cufpidatis. *Schreb. fpic. flor. Lipf. p.* 100. *Hedw. cryptog.* 2. *p.* 34. *t.* 12.

complanatum. 25. H. frondibus complanatis ramofiffimis, foliis diftichis imbricatis ovato-obtufis complicatis, capfulis ovatis, operculo conico. *Dill. mufc. t.* 34. *f.* 7. *Hedw. fund. hift. mufc. frond.* 2. *t.* 10. *f.* 62. 64.

ferpens. 26. H. furculis repentibus filiformibus, foliis fetaceis, capfulis cylindricis inflexis, operculo conico. *Dill. mufc. t.* 42. *f.* 64. A.

fetaceum. 27. H. furculis repentibus, ramis tenuiffimis filiformibus, foliis fetaceis, capfulis erectis, operculis acuminatis. *Schrader.*

lutescens. 28. H. surculis procumbentibus, foliis ovato-lanceolatis subulatis striatis, capsulis obliquis. *Schreb. spic. flor. lips. p. 98.*

††† *peristomatis interni ciliis e membrana difformibus.*

† *frondibus pinnatis.*

Dicksoni. 29. H. fronde ramosa, pinnis imbricatis acutis distichis compressis undulatis, perichætio pedunculum æquante. *Dicks. crypt. Brit. fasc. 1. p. 5. t. 1. f. 8.*

silvaticum. 30. H. fronde ramosa decumbente medio pedunculifera, pinnis acutis. *Dill. musc. t. 34. f. 6.*

†† *surculis vagis.*

lucens. 31. H. surculis ramosis, frondibus subpinnatis, pinnis punctatis. *Dill. musc. t. 34.*

undulatum. 32. H. surculis ramosis, frondibus subpinnatis, foliis undulatis complicatis. *Dill. musc. t. 36. f. 11.*

stramineum. 33. H. surculis subramosis erectis filiformibus, foliis ovato-lanceolatis enervibus imbricatis. *Dicks. cryptog. Brit. fasc. 1. p. 6. t. 1. f. 9.*

fulgens. 34. H. surculis longissimis pendulis, frondibus compressis, foliolis distichis complicato-carinatis nitidis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 140.*

diaphanum. 35. H. surculis erectis subdivisis, foliis bifariis ovatis acuminatis pellucidis planis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 140.*

rugosum. 36. H. surculis erectiusculis, foliis secundis recurvatis basi rugosis. *Mant. p. 131. Dill. musc. t. 37. f. 24.*

fluitans. 37. H. surculis ramosis, foliis ovatis acutis patulis, capsulis oblongis obliquis, operculis conicis. *Willden. prodr. flor. berol. n. 957.*

ruscifolium. 38. H. surculis ramosis, foliis imbricatis lato-lanceolatis, capsulis subrotundis, operculo rostrato. *Roth. flor. germ. 1. p. 466.*

triquetrum. 39. H. ramis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Dill. musc. t. 38. f. 28. Hedw. fund. hist. musc. frond. 1. t. 7.*

striatum. 40. H. ramis recurvis, foliis ovatis lineatis acutis undique patentibus, operculis mucronatis. *Schreb. spicil. flor. lips. p. 91. Hedw. fund. hist. musc. frond. 2. t. 1. f. 1.*

piliferum. 41. H. ramis rectis, foliis ovatis concavis obtusis apice piliferis, operculis cuspidatis. *Schreb. spic. flor. lips. p. 91.*

intricatum. 42. H. ſurculis repentibus, ramis brevibus, foliis laxis lanceolatis acuminatis, capſulis obliquis cernuis, mucrone obliquo. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 99. *Vaill. flor. pariſ. t.* 28. *f.* 2.

albens. 43. H. ſurculis repentibus ramoſis compreſſis, foliis bifariis ovatis acutis pallidis, capſulis ſubnudantibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

††† *ſurculis pinnatis.*

filicinum. 44. *a.* H. ſurculo ſimpliciter pinnato, foliis oblongis acuminatis reflexis ſecundis, capſulis ſubcylindricis, operculis convexis. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 19.

glabellum. 44. H. ſurculis erectiuſculis ramoſis divaricatis, foliis bifariis imbricatis oblongis obtuſis planis ſubdenticulatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

proliferum. 45. H. ſurculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Curt. flor. Lond. t.* 9.

delicatulum. 46. H. ſurculis ſubproliferis plano-pinnatis cuſpidatis, pedunculis aggregatis. *Dill. muſc. t.* 83. *f.* 6.

parietinum. 47. H. ſurculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 14. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 4.

prælongum. 48. H. ſurculis ſubpinnatis decumbentibus, ramulis remotis, foliis ovatis, capſulis cernuis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 15.

Criſta caſtrenſis. 49. H. ramulis approximatis, apicibus recurvis. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 20.

abietinum. 50. H. ſurculis teretiuſculis remotis inæqualibus. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 17.

plumoſum. 51. H. ſurculis repentibus, ramis confertis, foliis imbricatis ſubulatis, capſulis erectis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 16.

†††† *ſurculorum foliis reflexis.*

cupreſſiforme. 52. H. ſurculis ſubpinnatis, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 23.

compreſſum. 53. H. ſurculis compreſſis pinnato-ramoſis, foliis falcatis acuminatis recurvis, capſulis ovatis, operculo brevi conico. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 22.

Schreberi. 54. H. ſurculis pinnato-ramoſis apice ſubulatis, foliis oblongis acutis laxe imbricatis, capſulis oblongis, operculis conicis. *Willden. prodr. flor. Berol. n.* 955.

ſcorpioides. 55. H. ramis vagis procumbentibus recurvis, foliis ſecundis acuminatis. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 25.

patulum. 56. H. ſurculis filiformibus repentibus, ramulis vagis breviſſimis, foliis lanceolatis reflexo-patulis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

ſquarroſum. 57. H. ſurculis ramoſis, foliis lanceolatis acutis, capſulis oblongis, operculis acutis. *Flor. dan. t.* 535. *f.* 2.

loreum. 58. H. ſurculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis ſecundis ſubreflexis, capſulis ſubrotundis. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 40.

reptans. 59. H. ſurculis reptantibus, ramis vagis faſciculatiſque radicantibus filiformibus, foliis capillaribus patulis capſulis nutantibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

††††† *ſurculis faſciculatis.*

faſciculatum. 60. H. ſurculo erecto, ramis terminalibus confertis ſubdiviſis, ramulis compreſſis, foliis oblongis decuſſatis ſparſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

tamariſci. 61. H. ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, foliis bifariis ſubtus medio auriculatis, foliolis ſubrotundis acutis carinatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

alopecurum. 62. H. ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, capſulis ſubnutantibus. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 49. *an cum* 2 *præcedentibus hujus tribus?*

†††††† *ſurculis teretiuſculis.*

flexile. 63. H. ſurculis repentibus penduliſque longiſſimis flexuoſis, ramulis vagis abbreviatis teretibus recurvis, foliis confertis ovatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

nigreſcens. 64. H. ſurculis filiformibus pendulis, ramis brevibus teretibus ſparſis, foliis æqualibus ſubulatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

denſum. 65. H. ſurculis erectis teretibus, ramis vagis ſimpliciuſculis, foliis approximatis lanceolatis acutis carinatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

compositum. 66. H. ſurculis ramiſque pinnato-ſparſis, ramulis confertis, pedunculis breviſſimis, capſulis erectis, calyptris piloſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

purum. 67. H. ſurculis pinnato ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis ſubulatis. *Curt. flor. Lond. t.* 207.

Illecebrum. 68. H. ſurculis ramiſque vagis teretibus erectiuſculis obtuſis. *Flor. dan. t.* 706. *f.* 1.

polytrichoides. 69. H. ſurculis teretibus erectis ſimplicibus, foliis patulis, pedunculis brevibus, capſula erecta, calyptra piloſa. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

riparium. 70. H. ſurculis teretibus ramoſis, foliis acutis patulis diſtantibus. *Flor. dan. t.* 649. *f.* 1.

cuſpidatum. 71. H. ſurculis pinnato-ramoſis apice longe cuſpidatis, foliis oblongo-acuminatis, capſulis cylindricis, operculis conicis. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 34.

††††††† *ſurculis confertis.*

capillare. 72. H. ſurculis repentibus filiformibus ramoſis, ramis confertis capillaribus, foliis appreſſis ſubulatis, capſulis ovatis erectis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

tomentoſum. 73. H. ſurculis repentibus tomentoſis, ramis vagis confertis erectiuſculis, foliis acutis patentibus diſtantibus, capſulis cylindricis nutantibus, operculis incurvis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

depreſſum. 74. H. ſurculis repentibus ramoſis, ramulis depreſſis, foliis lineari-lanceolatis patulis, ſiccis criſpis, capſulis nutantibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

trichophyllum. 75. H. ſurculo repente, ramis diſtantibus erectis, foliis capillaribus patentibus, capſulis erectis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 25. *f.* 1.

velutinum. 76. H. ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, capſulis ſubnutantibus. *Flor. dan. t.* 475.

microphyllum. 77. H. ſurculis repentibus ramoſis, ramulis filiformibus teretibus erectis, foliis incumbentibus ſubulatis, capſulis obliquis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

ceſpitoſum. 78. H. ſurculis ſimplicibus erectiuſculis tereti-compreſſis, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis ſurculo brevioribus, capſulis erectis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

pungens. 79. H. ſurculis teretibus ramoſis apice attenuatis acutis; foliis lanceolatis ſubulatis patulis rigidiuſculis, pedunculis capillaribus brevibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

congeſtum. 80. H. ſurculis ramoſis declinatis, ramis erectiuſculis apice inflexis, foliis ſecundis ſubcapillaribus, pedunculis brevibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

tetragonum. 81. H. ſurculis repentibus, ramis vagis erectiuſculis tetragonis foliis quadrifariam imbricatis concavis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

torquatum. 82. H. ſurculis repentibus, ramis erectis teretibus, foliis ſiccitate ſpiralibus appreſſis, calyptra coriacea, baſi quinquepartita. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

cirrhoſum. 83. H. ſurculis repentibus, ramis ſubdiviſis, foliis ſiccitate revolutis, capſulis globoſis, capſulis baſi multipartitis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

gracile. 84. H. ſurculis repentibus, ramis faſciculatis teretibus erectiuſculis, capſulis erectis ovatis. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 55.

myoſuron. 85. H. ſurculis ramoſiſſimis ſubulatis incurvatis utrinque attenuatis teretibus. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 50.

clavellatum. 86. H. repens, ramis rectis confertiſſimis, capſulis incurvis, operculis reflexis. *Pollich flor. palat. n.* 1055. *ic.*

julaceum. 87. H. ramis erectis teretibus imbricatis obtuſis, perichætiis longitudine fere pedunculorum. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 56.

Halleri. 88. H. ramulis approximatis brevibus, foliis planis recurvatis. *Hall. hiſt. ſtirp. helv. n.* 1734.

nitens. 89. H. ramis breviſſimis, foliis lanceolatis ſubulatis nitentibus. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 37.

*** *incertæ tribus.*

rotundifolium. 94. H. ſurculis repentibus ramoſis, foliis ovalibus patentibus diſtichis, capſulis ovatis dentato-ciliatis cernuis. *Scop. fl. carn.* 2. *p.* 339. *n.* 1333. *t.* 62.

atrovirens. 95. H. ſurculis repentibus ramoſis filiformibus, foliis ovato-lanceolatis laxis, capſulis obovatis ciliatis cernuis. *Dill. muſc. p.* 332. *t.* 43. *f.* 68.

flagellatum. 96. H. ſurculis proſtratis inferne elongatis tenuiſſimis nudis, ſuperne ramoſis curvatis ſtellulatis, foliis reflexis, capſulis ciliatis ſubcylindricis. *Dill. muſc. p.* 306. *t.* 39. *f.* 42.

medium. 97. H. surculis repentibus ramosis, foliis lato-lanceolatis acutis imbricato-patulis, capsulis erectis cylindricis ciliatis. *Dill. musc. p. 331. t. 42. f. 65.*

prolixum. 98. H. surculis ramosis elongatis inferne subnudis, capsulis ovatis ciliatis, setis ascendentibus abbreviatis. *Dill. musc. p. 238. t. 38. f. 32. & t. 85. f. 20.*

pulchellum. 99. H. surculis confertis erectis, ramis subfasciculatis linearibus, setis elongatis, capsulis erectis subobliquis. *Dicks. crypt. Brit. 2. p. 13. t. 5. f. 6.*

filamentosum. 100. H. surculis confertis filiformibus ramosis, capsulis ovatis ciliatis, perichaetio bulbiformi. *Dill. musc. p. 282. t. 36. f. 18.*

molle. 101. H. surculis pendulis filiformibus ramosissimis, foliis imbricatis ovatis acutis, capsulis cernuis subrotundis. *Dicks. crypt. Br. 2. p. 11. t. 5. f. 8.*

Smithii. 102. H. surculis pinnatis undique ramosis, foliis suborbicularibus subconcavis, capsulis ovato-cylindricis, calyptra sursum pilosa. *Dicks. crypt. Br. 2. p. 10. t. 5. f. 4. coll. of. driad. pl. n. 19.*

cylindricum. 103. H. surculis repentibus, ramis capsulisque cylindricis, foliis erecte imbricatis ovatis acutis. *Dill. musc. p. 322. t. 41. f. 57.*

chrysocomum. 104. H. surculis erectis ramosis, foliis oblongo-lanceolatis acutis multinerviis subreflexo-patulis. *Dill. musc. p. 302. t. 39. f. 36.*

Ratabulum. 105. H. ramis vagis erectiusculis, foliis ovatis acutis mucronatis patulis, operculis conicis. *Flor. dan. t. 824. f. 2.*

1196. JUNGERMANNIA.

Scyphuli vesiculiferi, *squamulae* gemmiferae laterales aut *capitula* pulverulenta. *Capsula* pedunculata, nuda, 4valvis, seminibus subrotundis.

* *caulescentes.*

ꝛ *frondibus compositis.*

† *pinnatis.*

asplenioides. 1. J. pinnis ovatis subciliatis. *Dill. musc. t. 69. f. 5. 6.*

adiantoides. 2. J. frondibus erectis subdivisis, pinnis ovatis obliquis ciliatis, capsulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 142.

cristata. 3. J. surculis repentibus, frondibus ramosis erectis, pinnis lanceolatis acuti patentibus incumbentibus margine superiori serratis subtus lobatis conniventibus cristatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 143.

prostrata. 4. J. frondibus filiformibus reptantibus prostratis simpliciusculis, pinnis alternis ovatis integris. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 143.

sphagni. 5. J. frondibus reptantibus latere capsuliferis, pinnis subrotundis integerrimis imbricatis secundis. *Dickson. cript. Brit. fasc.* 1. *t.* 6. *t.* 1. *f.* 10.

angulosa. 6. J. pinnis latiusculis truncatis obtuse tridentatis medio pedunculiferis, capsula campanulata. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 22. C. D.

javanica. 7. J. surculis ramosissimis, pinnis ovatis imbricatis convexis. *Linn. fil. musc. p.* 35. *f.* 2. *t.* 1.

viticulosa. 8. J. pinnis planis nudis linearibus. *Dill. musc. t.* 69. *f.* 7.

polyanthos. 9. J. pinnis integerrimis imbricatis convexis. *Dill. musc. t.* 70. *f.* 9.

scalaris. 10. J. pinnis integerrimis ovatis distichis, extremo caule setifero. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 701. Mnium Trichomanis. *Dill. musc. t.* 31. *f.* 5.

lanceolata. 11. J. frondibus lanceolatis apice pedunculiferis, pinnis integerrimis. *Dill. musc. t.* 70. *f.* 10.

perfoliata. 12. J. frondibus confertis erectis indivisis, pinnis perfoliatis incumbentibus secundis ovatis integris. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 143.

bidentata. 13. J. surculis procumbentibus ramosis apice pedunculiferis, pinnis ovatis bicuspidatis, stipulis lanceolatis quadridentatis. *Dill. musc.* 15. *t.* 70. *f.* 11. *β*) Jungermannia bidentata. *Weiss cryptog.* 116. *Dill. musc. t.* 70. *f.* 12.

bicornis. 14. J. pinnis alternis bicuspidatis, cuspidibus polliniferis. *Flor. dan. t.* 888.

globulifera. 15. J. pinnis emarginato-bidentatis, dentibus apice globuliferis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 481.

emarginata. 16. J. surculis simplicibus erectis, pinnis subrotundis obtuse emarginatis integerrimis patentibus exstipulatis. *Ehrh Hannöv. Mag.* 1784. *n.* 9.

setiformis. 17. J. surculis simplicibus teretibus filiformibus erectis, pinnis quadripartitis, laciniis lato subulatis canaliculatis aequalibus, stipulis nullis. *Ehrh. Hannöv. Magaz.* 1784. *n.* 9.

bicuspidata. 18. J. frondibus medio peduncuIiferis, pinnis distichis inciso-bifidis. *Dill. musc. t.* 70. *f.* 13.

sphaerocephala. 19. J. frondibus apice globuliferis, pinnis distichis inciso-bidentatis. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 701. Mnium fissum. *Dill. musc. t.* 31. *f.* 6.

connata. 20. J. frondibus vagis, pinnis oppositis incubentibus apice retusis subemarginatis posterius connatis bidentatis, capsulis terminalibus, perichaetiis denticulatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 143.

quadridentata. 21. J. frondibus prostratis vage ramosis apice floriferis; pinnis quadratis subquadridentatis. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 154.

quinquedentata. 22. J. frondidus ramosis apice peduncuIiferis, pinnis quinque dentatis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 23.

tenera. 23. J. frondibus congestis repentibus, pinnis alternis distantibus subrotundis integris, auriculis subtus medio minutissimis bifidis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 143.

aquatica. 74. J. frondibus teretibus; foliis siccis subtus excavatis. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 496. *Dill. musc. t.* 69. *f.* 8.

minuta. 75. J. frondibus erectis ramosis, pinnis subtus auriculatis; foliis subrotundis. *Dill. musc. p.* 481. *t.* 69. *f.* 2.

ventricosa. 76. J. frondibus medio floriferis, vagina sphaeroidea, foliis bifidis. *Dill. musc. p.* 489. *t.* 70. *f.* 14.

spinulosa. 77. J. frondibus erectis ramosis, foliis obovatis dentato-spinosis. *Dill. musc. p.* 489. *t.* 70. *f.* 15.

pauciflora. 78. J. surculis repentibus ramosissimis filiformibus medio floriferis, foliis incurvatis bipartitis, vaginis conicis remotis. *Docks. crypt. Brit.* 2. *p.* 15. *t.* 5. *f.* 9.

macrorhiza. 79. J. surculis erectis ramosis apice floriferis, foliolis alternis retusis patulis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 16. *t.* 5. *f.* 10.

† † *frondibus subbipinnatis.*

pallens. 24. J. frondibus erectis ramosis, pinnis pinnatis incumbentibus subrotundis integris basi semicordatis, perichaetiis monophyllis retusis infundibuliformibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 143.

simplex. 25. J. surculis filiformibus repentibus, frondibus erectis simplicibus, pinnis pinnatis ovatis distantibus serrato-ciliatis, capsulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 143.

undulata. 26. J. frondibus supra bipinnatis apice pedunculiferis, pinnulis subrotundis integerrimis undulatis. *Vaill. flor. paris. t.* 19. *f.* 6.

nemorosa. 27. J. frondibus supra bipinnatis apice pedunculiferis, pinnulis ciliatis. *Dill. musc t.* 71. *f.* 18.

resupinata. 28. J. frondibus supra bipinnatis apice pedunculferis, pinnulis crenulatis imbricatis rotundis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 19.

serrulata. 29. J. surculis confertis erectis simpliciusculis obtusis supra bipinnatis, pinnulis ovatis concavis bifidis serratis, capsulis terminalibus, perichætio subulato. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 143.

juniperina. 30. J. frondibus erectis simpliciusculis rigidis supra bipinnatis apice pedunculiferis, pinnulis lanceolato-falcatis bifidis secundis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 144.

albicans. 31. J. frondibus supra bipinnatis apice pedunculiferis, pinnulis linearibus recurvis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 20.

capillaris. 32. J. surculis repentibus ramosis capillaribus supra bipinnatis, pinnulis subimbricatis, omnibus tripartitis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 144.

cupressina. 33. J. frondibus procumbentibus confertis pennatis supra bipinnatis, pinnulis imbricatis convexis quadrifidis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 144.

trilobata. 34. J. frondibus subtus bipinnatis, pinnulis quadratis obsolete trilobis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 22. 23.

reptans. 35. J. surculis decompositis medio pedunculiferis, foliis quadratis anterius incisis, stipulis quadrifidis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 24.

multiflora. 36. J. fronde repente ramosa, foliolis alternis geminis setaceis æqualibus. *Mant. p.* 310. *Pollich. flor. palat. n.* 1063. *ic.*

cochleariformis. 37. J. frondibus subteretibus erectiusculis, foliolis concavis rotundatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 701. Mnium Jungermania. *Dill. musc. t.* 69. *f.* 1.

barbata. 38. J. surculis elongatis medio pedunculiferis, foliis anterius crenatis, cauliculo subtus villoso. *Schreb. spic. flor. Lips. p.* 107.

† † *frondibus imbricatis.*

compla-nata. 39. J. ſurculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Curt. flor. Lond. t.* 271.

tranſver-ſalis. 40. J. frondibus tranſverſalibus repentibus duplicato imbricatis, foliis ſubrotundis integris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

flava. 41. J. frondibus repentibus ramoſis duplicato-imbricatis, foliis ſubrotundis, inferioribus minutis bifidis, perichætio monophyllo retuſo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

diuffuſa. 42. J. ſurculis ramoſiſſimis, frondibus dichotomis erectis duplicato-imbricatis, foliis ovatis convexis, inferioribus ſubrotundis denticulatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

ſtolonife-ra. 43. J. ſtolonibus reptantibus filiformibus, frondibus erectis confertis ſubdiviſis duplicato-imbricatis, foliis lanceolatis tridentatis ſecundis, inferioribus minimis ſubrotundis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

brachiata. 44. J. frondibus erectis dichotomis duplicato-imbricatis, foliis ovatis planis, inferioribus ſubrotundis convexis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

dilatata. 45. J. ſurculis repentibus foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Dill. muſc. t.* 72. *f.* 27.

tamariſ-cifolia. 46. J. ſurculis decompoſitis apice peduncuIiferis, foliis ſubrotundis ſubtus auriculatis, ſtipulis ovatis emarginatis. *Dill. muſc. t.* 72. *f.* 31.

atrata. 47. J. ſurculis ramoſiſſimis pendulis capillaribus duplicato-imbricatis, foliis ovatis retuſis, inferioribus minutis cordatis bifidis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

filifor-mis. 48. J. frondibus erectis filiformibus ſimpliciuſculis duplicato-imbricatis, foliis ſubrotundis integris, inferioribus minutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

platy-phylla. 49. J. ſurculis procumbentibus ſubtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Dill. muſc. t.* 72. *f.* 32. 33.

filicina. 50. J. ſurculis erectis ramoſis pennatis pinnatis linearibus duplicato-imbricatis, pinnis ovatis acutis ſerrulatis, inferioribus ſubemarginatis dentatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

ciliaris. 51. J. ſurculis repentibus ſupra tomentoſis, foliis integris tomentoſiſſimis. *Vaillant. flor. Pariſ. t.* 26. *f.* 11.

vaginata. 52. J. surculis repentibus, foliis alternis cuneiformibus retusis complicatis amplexicaulibus. *Linn. fil. musc. p.* 35. *t.* 1. *f.* 5.

tomentosa. 53. J. surculis erectis confertis pennatis duplicato-imbricatis, pinnis laciniatis tomentosis ciliatis, capsulis terminalibus solitariis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 145.

varia. 54. J. surculis erectiusculis bifariam imbricatis, foliis bipartitis. *Dill. musc. t.* 73. *f.* 36.

pulcherrima. 55. J. surculis repentibus, foliis duplicato-imbricatis inferne auriculatis ciliatis. *Linn. fil. musc. p.* 35. *Dill. musc. t.* 69. *f.* 3. *an. distincta satis a varia?*

bifaria. 56. J. surculis erectis simpliciusculis confertis bifariam imbricatis, foliis subsecundis ovatis acutis denticulatis, capsulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 145.

pygmæa. 57. J. surculis subramosis repentibus apice florigeris, foliis orbiculato-concavis subimbricatis alterne pinnatis. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 152.

pusilla. 58. J. surculis brevissimis apice floriferis, foliis imbricatis anterius crenatis, cauliculo subtus villoso. *Dill. musc. t.* 74. *f.* 46.

julacea. 59. J. surculis teretibus erectis, foliis undique imbricatis bidentatis, capitulis pedunculatis. *Dill. musc. t.* 73. *f.* 38.

rupestris. 60. J. surculis teretibus, foliis subulatis secundis. *Dill. musc. t.* 73. *f.* 40.

trichophylla. 61. J. surculis teretibus, foliis capillaceis æqualibus. *Dill. musc. t.* 73. *f.* 37. *an distincta satis a multiflora & sertularioide?*

alpina. 62. J. surculis teretibus, foliis ovatis patentibus, calicibus imbricatis. *Dill. musc. t.* 73. *f.* 39.

sertularioides. 63. J. surculis repentibus, ramulis undique floriferis, foliis capillaceis æqualibus articulatis. *Suppl. p.* 449. *Linn. fil. musc. p.* 35. *t.* 1. *f.* 6.

curvifolia. 80. J. surculis repentibus ramosis teretibus, foliis subrotundis acuminatis bifidis, apicibus incurvatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 15. *t.* 5. *f.* 7.

cinerea. 81. J. surculis repentibus supra bipinnatis medio floriferis, vagina cylindrica, foliis rotundatis. *Dill. musc. p.* 498. *t.* 72. *f.* 28.

* * *acaules.*

epiphylla. 64. J. folio fundi innato. *Flor. dan. t.* 359.

ſinuata. 65. J. fronde plana integra pinnatifidaque ſinuata, laciniis coadunatis obtuſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

pinguis. 66. J. fronde oblonga ſinuata pingui. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 42.

fucoidea. 67. J. fronde erecta ſupra decompoſita, foliis foliolisque oppoſitis, his linearibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

multifida. 68. J. fronde bipinnatifida. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 43.

macrorhiza. 82. J. fronde bipinnatifida plana ſinuata patula, apicibus inæqualiter bilobis. *Dill. muſc. p.* 511. *t.* 74. *f.* 44.

bipinnata. 69. J. fronde procumbente ramoſa bipinnata, pinnis pinnulisque linearibus acutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

furcata. 70. J. fronde lineari ramoſa, extremitatibus furcatis obtuſiuſculis. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 45.

dichotoma. 71. J. fronde lineari dichotoma eretiuſcula. *Swarts nov gen. & ſp. p.* 145.

linearis. 72. J. fronde reptante lineari dichotoma divaricata. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

polyphylla. 73. J. frondibus congeſtis ſubrepentibus laciniatis palmatiſque capſulis radicalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

1197. TARGIONIA. *Cal.* 2valvis compreſſus, fovens in fundo *capſulam* ſubgloboſam polyſpermam.

hypophylla. 1. T. calicibus dehiſcentibus, fructificationibus ſolitariis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 9.

ſphærocarpos. 2. T. calicibus apice perforatis, fructificationibus aggregatis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 17.

1198. MARCHANTIA. *Capſula* ſeſſilis, campanulata. *Gemma* peltata, pedunculata.

polymorpha. 1. M. furculis obtuſe lobatis, capſulis ſternatim decemfidis. *Schmidel ic. plant. & anal. part. t.* 9.

umbellata. 2. M. capſulis multilobis, pedunculo tetraëdro. *Dill. muſc. t.* 76. *f.* 6. C. D. & *t.* 77. *f.* 7. D.

triloba. 3. M. capſulis hemiſphæricis trilobis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 502.

hirſuta. 4. M. capſulis hemiſphæricis octofidis hirſutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

hemiſphærica. 5. M. ſurculis crenatis, capſulis hemiſphæricis quinquefidis. *Flor. dan. t.* 762.

chenopoda. 6. M. capſula dimidiata palmata quadrifida. *Dill. muſc. t.* 77. *f.* 8.

quadrata. 7. M. ſurculis dichotomis, capſula tetragona quadrifida ſubtus quadriloculari. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 487.

cruciata. 8. M. capſula quadripartita, laciniis tubuloſis. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 5.

conica. 9. M. ſurculis dichotomis ſinuatis, capſula conica ſubtus ſubquinqueloculari. *Flor. dan. t.* 274.

trilocularis. 10. M. ſurculis dichotomis undulatis, capſula hemiſphærica integerrima ſubtus triloculari. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 487.

tenella. 11. M. capſula hemiſphærica apiculata, margine lamellis radiato. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 4.

androgyna. 12. M. ſurculis dichotomis linearibus, capſulis hemiſphæricis integris. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 3.

ALGÆ.

1199. BLASIA. *Flos maſculus* ſeſſilis, ſubgloboſus, frondi immerſus.
Flos femineus Piſt. 1. *Capſ.* ovata, 1locularis, tubo coronata, per quem ſemina prorumpunt.

puſilla. 1. Blasia. *Flor. dan. t.* 45.

1200. RICCIA. *Capſulæ* ſeſſiles, globoſæ, 1loculares, frondi ad apicem innatæ, ſemina 20-30 alba vel fuſca hemiſphærica continentes.

cryſtalina. 1. R. frondibus ſuperficie papilloſis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 12.

natans. 2. R. frondibus obcordatis ciliatis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 18.

minima. 3. R. frondibus glabris bipartitis acutis. *Dill. musc. t. 78. f. 11.*

glauca. 4. R. frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis. *Flor. dan. t. 898. f. 1.* β) Riccia ciliata.

reticulata. 5. R. fronde difformi laciniata glabra reticulata. *Dill. musc. t. 79. f. 21.*

fluitans. 6. R. frondibus dichotomis lineari-filiformibus. *Dill. musc. t. 74. f. 47.*

fruticulosa. 7. R. frondibus compressis ramosis, ramis erectis furcatis subulatis. *Flor. dan. t. 898. f. 3.*

sinuata. 8. R. frondibus ramosis, laciniis sinuatis apice dilatatis crenatis. *Dill. musc. t. 19. f. 29.*

arachnoides. 9. R. frondibus capillaceis implexis. *Flor. dan. t. 898. f. 2.*

pyramidata. 10. R. frondibus indivisis oblongis apice inferne triangulariter incrassatis, capsulis pyramidatis. *Willden. bot. Magaz. 4. p. 9. Dill. musc. t. 78. f. 16.*

1201. ANTHOCEROS. *Scyphuli* sessiles, cylindrici integras gemmas granulosas exhibentes. *Caps.* subulata, subbivalvis, seminibus dissepimento adhærentibus.

lævis. 1. A. fronde plana crenata. *Dill. musc. t. 68. f. 2.*

crispus. 2. A. fronde sinuato-laciniata undulata margine crispa non punctata. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 146. an distincta species.*

punctatus. 3. A. fronde crispa sinuato-laciniata punctata. *Flor. dan. t. 396.*

multifidus. 4. A. frondibus bipinnatifidis linearibus. *Dill. musc. t. 88. f. 4.*

1202. **LICHEN.** *Gemmæ* vel pulverem ſubtiliſſimum inorganicum referentes, vel receptaculis elevatis nitidis farinæ cruſtæ frondisve immixtis contentæ.

* *pulverulenti.*

antiquitatis. 1. L. ater. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus antiquitatis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 18.

cinereus. 2. L. cinereus, rupes operiens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus ſaxatilis. *an mera prioris varietas?*

Jolithus. 3. L. ſanguineus ſaxis innaſcens, violas olens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus Jolithus. *Flor. dan. t.* 899. *f.* 1.

flavus. 4. L. flavus, lignis adnaſcens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus candelaris. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 2.

arcumatus. 5. L. croceus. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 139.

incanus. 6. L. albus, globulis rotundatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus incana. *Dill. muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 3.

botryoides. 7. L. viridis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus botryoides. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 3.

rubens. 8. L. ruber. *Hoffmann lichen. p.* 4. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 5. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 550. *n.* 1578?

roſeus. 9. L. conglomeratus roſeus. *Schreb. ſpicil. flor. Lipſ. p.* 140. *an lichen.*

odoratus. 10. L. fugax odoratus miniatus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491. *an mera rubentis varietas?*

putredinis. 11. L. tenuiſſimus purpureus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491. *an mera rubentis varietas?*

luteſcens. 12. L. verrucoſus ſulphureus. *Hoffm. lichen. p.* 3. *n.* 3.

variegatus. 13. L. cruſta rubro alboque colore varia. *Hagen. lichen. p.* 41. *n.* 8. *t.* 1. *f.* 1.

villoſus. 345. L. ater villoſus. *Haller. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1082.

albus. 14. L. pulverulento-cruſtaceus albiſſimus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus lactea. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 4.

gramineus. 15. L. pulverulento-cruſtaceus elegantiſſime virdis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491.

ferrugineus. 16. L. pulverulento-crustaceus minosus cinereus. *Hoffm. lichen. p. 9. n. 12. t. 2. f. 3. an turberculosi varietas?*

tuberculosus. 17. L. pulverulento-crustaceus verrucosus subcinereus. *Hoffm. lichen. p. 9. n. 11. t. 2. f. 1.*

farinosus. 18. L. crusta pulverulenta candida. *Hoffm. lichen. p. 8. n. 10. t. 1. f. 1.*

** *leprosi.*

Γ *tuberculati*, Verrucariæ.

scriptus. 19. L. albicans, lineolis atris planis divisis simplicibusque. *Hoffm. lichen. t. 11. f. 2.* a. b. c. d. *β)* Lichen hebraicus. *Hoffm. lichen. p. 13. t. 3. f. 2.* e. γ) Lichen pulivaris. *Hoffm. lichen. p. 14. t. 3. f. 2.* f.

geographicus. 20. L. flavescens lineolis ramosis punctisque nigris mappam referens. *Dill. musc. t. 18. f. 5.*

rugosus. 21. L. albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Dill. musc. t. 18. f. 2.*

atrovirens. 22. L. viridis, margine tuberculisque atris. *Wulf. ap. Jacq. coll. 2. t. 14. f. 2.*

parasiticus. 23. L. farinosus albicans, tuberculis stipitatis congestis nigris. *Hoffm. lichen. p. 39. n. 48. t. 8. f. 5.*

fuscus. 24. L. viridis, tuberculis stipitatis congestis fuscis. *Hoffm. lichen. p. 39. n. 47. t. 8. f. 4.*

byssoides. 25. L. farinosus, peltis stipitatis subglobosis. *Mant. p. 133. Dill. musc. t. 14. f. 5. an mera fungiformis varietas?*

fungiformis. 26. L. glauco-virescens, tuberculis planis stipitatis fuscis. *Weber spic. flor. gœtt. p. 196. Dill. musc. t. 14. f. 4.*

fungoides. 27. L. candidus, tuberculis stipitatis capitatis difformibus subcarneis stipite longioribus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 146.*

oculatus. L. fungoso-papillosus albus, tuberculis sessilibus stipitatisve nigris. *Dicks. crypt. Brit. 2. p. 17. t. 6. f. 3.*

rufus. 28. L. fuscus, tuberculis stipitatis planis subfucis. *Dill. musc. t. 14. f. 4.*

ericetorum. 29. L. albidus tuberculis stipitatis convexis carneis. *Hoffm. lichen. t. 8. f. 3.*

capitatus. 30. L. luteo-virescens, tuberculis stipitatis sphæricis concoloribus. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 726. Mucor furfuraceus.

albo-cæ-rulescens. 31. L. albus, tuberculis cærulescentibus annullo atro circumscriptis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 184. *t.* 15. *f.* 1.

sabuletorum. 32. L. virescens, tuberculis substipitatis planiusculis atris. *Schreb. spic. flor. Lips. p.* 134. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 3. *t.* 2. *f.* 1

Icmadophila. 33. L. cinereus, tuberculis sessilibus planis carneis. *Flor. dan. t.* 472. *f.* 4.

candidus. 34. L. candidissimus margine sublobatus, tuberculis sessilibus glauco-cærulescentibus. *Weber spic. flor. gœtt. p.* 193. *Hoffm. lichen. t.* 4. *f.* 6.

elvoloides. 35. L. glauco-virescens, tuberculis sessilibus planis ætate undulatis. *Weber spicil. flor. gœtt. p.* 186.

viridatus. 36. L. crustaceus verniciformis, tuberculis sessilibus planis. *Weber spic. flor. gœtt. p.* 187.

querneus. 37. L. fusco-flavescens, tuberculis subimmersis atris. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 3.

hemisphæricus. 38. L. lutescens, tuberculis immersis atris politis. *Hagen. lichen. p.* 48. *n.* 15.

coccineus. 39. L. farinaceus viridi-sulphureus, tuberculis immersis ruberrimis. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 1.

lacteus. 41. L. albus, tuberculis concoloribus hemisphæricis. *Mant. p.* 132. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 4. a. b.

rupicola. 42. L. albidus, tuberculis pallidis albo-marginatis. *Mant. p.* 132. *Hoffm. lichen. t.* 6. *f.* 3.

pertusus. 43. L. verrucis subtessellatis lævigatis pertusis poro uno alterove cylindrico. *Mant. p.* 131. *Flor. dan. t.* 766. *Hoffm. lichen. p.* 16. 17. *t.* 3. *f.* 3. β) *Hoffm. lichen. t.* 3. *f.* 4. γ) *Hagen lichen. t.* 1. *f.* 3. δ) *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 510. *n.* 1489.

punctiformis. 336. L. cinereus, tuberculis punctiformibus nigris pertusis immersis tandem prominulis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 573.

muscorum. 44. L. farinosus incanus, tuberculis atris. *Rethan flor. cant. p.* 424. *ic.*

petræus. 45. L. farinaceus viridi-cinerascens, tuberculis inæqualibus convexis atris. *Wulfen. berl. Naturforsch. Schr.* 8. *p.* 89. *nonne idem cum l. sabuletorum ?*

canescens. 46. L. icanus, tuberculis nigris confertis. *Dill. musc. t.* 18. *f.* 17. A.

cæruleo-nigricans. 47. L. cærulescens tuberculis nigricantibus. *Lightf. flor. scot.* 805. *Dill. musc. t.* 82. *f.* 2.

esculentus. 48. L. albus, tuberculis rugosis griseis. *Pall. it.* 3. *p.* 760. *t.* 1. *f.* 4.

graniformis. 49. L. crusta albescente granulata, tuberculis atris. *Hagen. lichen. p.* 47. *t.* 1. *f.* 2.

concentricus. L. albus, tuberculis planis atris spiræ in modum congestis. *Linck. Ann. Naturgesch.* 1. *p.* 36.

confluens. 50. L. subcinereus, tuberculis maximis aterrimis ætate confluentibus. *Weber spicil. flor. gœtt. p.* 180. *t.* 2.

lutereus. 50*. L. cinereus, tuberculis sparsis lutescentibus. *Arboreus. Schrader.*

sphæroides. 51. L. cinereo-virescens, tuberculis globosis incarnatis. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 2.

flavo-fuscus. 51*. L. crustaceus flavus, tuberculis carnosis irregularibus pallide fuscis. *Ad. arenarium. Schrader.*

sanguinarius. 52. L. cinereo-virescens, tuberculis atris. *Mant. p.* 507. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 5. *f.* 3. b. β) *Hoffm. lichen. t.* 5. *f.* 4. γ) *Hoffm. lichen. t.* 5. *f.* 5.

colliculosus. 53. L. cinereo-virescens, tuberculis albis. *Hoffm. lichen. p.* 17. *n.* 19. *t.* 2. *f.* 2. *nonne potius sphæria?*

viridulus. 54. L. tuberculis hemisphæricis viridibus. *Hoffm. lichen. p.* 18. *n.* 20. *t.* 2. *f.* 6.

sulphureus. 55. L. rimosus gibbosiusculus sulphureus, tuberculis nigris irregularibus minutis. *Hoffm. lichen. p.* 32. *n.* 40. *t.* 4. *f.* 1. *pl. lichen.* 2. *t.* 11. *f.* 3.

fusco-ater. 56. L. fuscus, tuberculis atris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 3. 4. & 3. *t.* 6. *f.* 2. bb.

vernalis. 57. L. albidus, tuberculis subrotundis ferrugineis. *Hoffm. lichen. t.* 5. *f.* 1.

verniciformis. 58. L. crusta verniciformi glauco-virescente linea duplici grisea circumscripta, tuberculis planis albidis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 494.

calcarius. 59. L. candidus, tuberculis atris. *Dill. musc. t.* 18. *f.* 8.

albo-ater. 60. L. albus, tuberculis nigricantibus. *Hoffm. lichen. p.* 30. *n.* 35.

cinerascens. 61. L. tuberculis nigris albo-marginatis. *Mant. p.* 132. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 5. 6.

atro-albus. 62. L. niger, tuberculis a bis submarginatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 1.

niger. 63. L. ater, tuberculis subrotundis concoloribus. *Suppl. p.* 449. *Hoffm. lichen. t.* 3. *f.* 6. *β*) Lichen terminalis. *Flor. dan. t.* 879. *f.* 1.

Oederi. 64. L. rimosus ruber, tuberculis nigris congestis innatis. *Flor. dan. t.* 470. *f.* 1.

ventosus. 65. L. flavus, tuberculis rubris. *Flor. dan. t.* 472. *f.* 1. *an cruenti varietas?*

fagineus. 66. L. albus, tuberculis albis farinaceis. *Hoffm. lichen. t.* 2. *f.* 4. *β*) *Dill. musc. t.* 18. *f.* 11. C. *γ*) *Dill. musc. t.* 18. *f.* 11. A. B. *δ*) *Dill. musc. t.* 18. *f.* 11. D.

beatulinus. 67. L. albus, tuberculo centrali concolore. *Hudf. flor. angl. ed.* 2. *p.* 525.

ferruginosus. 68. L. albicans, tuberculis rufis. *Dill. musc. t.* 18. *f.* 4. & *t.* 55. *f.* 8.

rosaceus. 69. L. tuberculis niveis nigro-punctatis. *Flor. dan. t.* 825. *f.* 1.

cinereo-fuscus. 70. L. tenuis cinereus, tuberculis fuscis planis ætate convexis. *Weber spic. flor. gœtt. p.* 188.

flavo-virescens. 71. L. crustaceus tener adhærens albo-subvirescens, tuberculis lentiformibus triste luteolis. *Wulfen berl. Naturf. Schr.* 8. *p.* 122. *ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 13. *f.* 46.

flavo-rubescens. 72. L. virescens, tuberculis flavo-rubescentibus. *Hudf. flor. angl. p.* 443. *n.* 11.

petrosus. 73. L. crusta subnulla, tuberculis duris convexis. *Weber spic. flor. gœtt. p.* 190.

circumscriptus. 74. L. crustaceus canus, margine serpentino atro, tuberulis disci lentiformibus concoloribus. *Wulfen. berl. Naturf. Schr.* 8. *p.* 123.

ochrochlorus. 316. L. albicans, tuberculis lævibus subglobosis olivaceo-flavis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 101. *t.* 2. *f.* 1.

rutilus. 317. L. nigricans, tuberculis globosis saturate aurantiis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p* 101. *t.* 6. *f.* 2. *litt.* c.

calvus. L. albidus nigro-perulosus, tuberculis pulvinatis sparsis glabris nitidis obscure fulvis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 18. *t.* 6. *f.* 4.

ɼ ɼ *scutellato-tuberculati.*

carpineus. 75. L. albidus, tuberculis sessilibus confertis, junioribus scutelliformibus marginatis, ætate convexis cinerascentibus.

lentiger. 76. L. albus margine subfoliaceus, tuberculis confertis sessilibus, junioribus scutelliformibus albo-marginatis, ætate convexis flavescentibus. *Weber spic. flor. gœtt. p.* 192. *Hoffm. lichen.* 2. *t.* 9. *f.* 4.

angulosus. 77. L. sc. albidus, scutellis confertis albidis in tubercula demum abeuntibus. *Schreb. spic. flor. Lips. n.* 1137.

viir-diater. 78. L. pallide e flavo virescens, tuberculis atris tandem subscutellatis. *Wulff. apud Jacq. coll.* 2. *p.* 186.

candelarius. 79. L. crustaceus luteus, junior pulverulentus scutellatus, ætate subfoliaceus tuberculosus. *Hoffm. lichen.* 2. *t.* 9. *f.* 3. *β*) Lichen flavescens. *Dill. musc. t.* 18. *f.* 18. A. C.

elegans. L. imbricatus margine foliaceus, foliis appressis explicatis aurantiis, tuberculis concoloribus. *Linck Ann. Naturg.* 1. *p.* 37.

Linckii. L. pulverulentus flavus, scutellis immersis aurantiis. *Linck Ann. Naturg.* 1. *p.* 37.

gelidus. 80. L. albicans, peltis tuberculosis rugosis testaceis. *Mant. p.* 133. *Flor. dan. t.* 170. *f.* 2.

carbonarius. 80*. L. farinosus ater, tuberculis scutellisque concoloribus. *Wulfen. Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 93. *& ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 6. *f.* 2. 1. bb.

vitellinus. 80**. L. vitellinus, patellis concoloribus. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 5. *t.* 26. *f.* 1. & *t.* 27. *f.* 2.

viridescens. 80***. L. viridis, tuberculis confertis rugosis fusconigrascentibus. *Ad arenarium. Schrader.*

androgynus. 81. L. crustaceus albicans, tuberculis pulverulentis scutellisque pallidis, margine albo crenulato-pulverulento. *Hoffm. lichen. p.* 56. *n.* 70. *t.* 7. *f.* 3.

ocellatus. 82. L. crustaceus ramosus cinereo-fuscescens, scutellis tuberculisque nigris, margine cinereo integro. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 96.

griseus. 84. L. ater tenuissimus, tuberculis griseis. *Willden. botan. Mag.* 4. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 4.

Hæmatomma. 85. L. tartareus albidus, verrucis marginatis truncatis sanguineis. *Hoffm. pl. lichen.* 2. *p.* 53. *t.* 11. *f.* 1.

roſatus. 318. L. pallide roſeus cruſtaceo-gleboſus late effuſus. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 100. *t.* 1. *f.* 1.

albo-in-319. L. tener glebuloſus albus, tuberculis lentiformibus incar-
carnatus. natis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 106. *t.* 2. *f.* 3.

elvelifor-320. L. glebulis concavo-pelviformibus ſupra rubens, ſubtus
mis. & margine albus, tuberculis ſubmarginalibus globoſis atris. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 108. *t.* 3. *f.* 3.

ſangui- 321. L. albido-vireſcens, tuberculis hemiſphærico-convexis
neo-ater. immarginatis ſaturate ſanguineis ex rubro tandem atris. *Wulff. ap. Jacq. collect.* 3. *p.* 117.

ɼ ɼ ɼ *ſcutellati*, Scutellariæ.

pannoſus. 86. L. cruſtaceus ſubtus nigro-tomentoſus ſuperne ſubloba-tus obſolete multifidus, ſcutellis convexis ruſis. *Swarts. nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

goſſypi- 87. L. cruſtaceus capillaceus mollis tomentoſus candidus,
nus. ſcutellis nigris margine albidis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

ſcrupoſus. 88. L. cruſtaceus cinereus granoſus, ſcutellis immerſis atris, margine crenulato. *Schreb. ſpicil. flor. Lipſ. p.* 133. *Hoffm. pl. lichen.* 2. *p.* 54. *t.* 11. *f.* 2. *β) Scop. flor. carn. ed.* 2. *n.* 1375.

clauſus. 89. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis immerſis concavis clauſis. *Hoffm. lichen. p.* 48. *n.* 62.

fulvus. 90. L. ſc. luteo-viridis, ſcutellis fulvis. *Schreb. ſpic. fil. Lipſ. n.* 1139.

badius. 92. L. cruſtaceus fuſcus, ſcutellis planis badiis. *Swarts nov. act. upſ.* 4.

excavatus. 94. L. cruſtaceus obſcure viridis, ſcutellis immerſis excavatis. *Hoffm. lichen. p.* 47. *n.* 61. *t.* 7. *f.* 4. *nonne ſphæriæ ſpecies?*

ærugino- 95. L. cruſtaceus æruginoſus, ſcutellis cernuis. *Jacq. flor.*
ſus. *auſtr.* 3. *t.* 275.

flaveolus. 96. L. albido-vireſcens, ſcutellis rubris planiuſculis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 13. *f.* 4. a? *β) Hoffm. lichen. t.* 6. *f.* 6.

tartareus. 97. L. cruſtaceus ex albido vireſcens, ſcutellis flaveſcentibus, margine albo. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 12. 13.

luteus. 98. L. cinereo-virefcens, fcutellis luteis margine concoloribus. *Dickf. crypt. Brit. fafc.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 6.

cruentus. 99. L. cruftaceus rimofus viridi-flavefcens, fcutellis rubrofufcis fubmarginatis. *Weber fpicil. flor. gœtt. p.* 148. *t.* 1. *an diftinctus a ventofo?*

rimofus. 100. L. albicans, crufta rimofa, infulis fubrotundo-angulofis, fcutellis glaucis margine albis. *Flor. dan. t.* 468. *f.* 3.

flavefcens. 101. L. cruftaceus verrucofus flavefcens; fcutellis rubris, margine albo. *Wulfen apud. Jacq. mifc. auftr.* 2. *p.* 79. *t.* 9. *f.* 1. *β)* Lichen flavo rubefcens. *Hudf. flor. angl.* 528. *an idem cum ventofo?*

gibbofus. L. cruftaceus verrucofus fufcus, fcutellis fubimmerfis atris crufta marginatis. *Dickf. crypt. Brit.* 2. *p.* 20. *t.* 6. *f.* 5.

Dickfoni. L. ferrugineo-ochraceus, fcutellis elevatis atro-cærulefcentibus obtufe marginatis. *Dickf. crypt. Brit.* 2. *p.* 19. *t.* 6. *f.* 6.

fufco-luteus. L. cruftaceus granofo glebaceus albidus, fcutellis planis fordide luteis obfolete marginatis. *Dickf. crypt. Brit.* 2. *p.* 18 *t.* 6. *f.* 2.

pallidus. 102. L. cruftaceus fubvillofus albicans, fcutellis elevatis planis fcabris brunneis, margine albo undulato. *Hoffm. lichen. p.* 50. *n.* 66. *t.* 5. *f.* 2. *an varietas fubfufci?*

fubfufcus. 103. L. cruftaceus albicans, fcutellis fubfufcis, margine cinereo fubcrenato. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1005.

falicinis. 103*. L. flavus, fcutellis convexiufculis aurantiis margine pallidioribus. *Arboreus. Schrader.*

ater. 104. L. cruftaceus albicans rugofus, fcutellis atris, margine albo fubcrenato. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 710. Lichen fubfufcus. *Dill. mufc. t.* 18. *f.* 16.

pallefcens. 105. L. cruftaceus albicans verrucofus, fcutellis pallidis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 5.

cupularis. 106. L. cruftaceus albo-virefcens nigro-punctatus rimofus, fcutellis hemifphæricis dilutiffime lateritiis, margine convexo exalbido. *Hedw. cryp.* II. 2. *t.* 20. B.

marmoreus. 107. L. fubcinereus, fcutellis fubconcavis intus cerneis exterius & margine fubhirfutis albis. *Hoffm lichen. t.* 6. *f.* 4.

rufefcens. 108. L. cruftaceus lividus, fcutellis minutis rufis. *Flor. dan. t.* 825. *f.* 2.

cærulefcens. 109. L. albido-cærulefcens, fcutellis copiofiffimis concoloribus. *Hagen lichen. p.* 50. *n.* 26. *t.* 1. *f.* 5.

canus. 110. L. cruftaceus expanfus glauco-candicans, fcutellis nigerrimis. *Dickf. crypt. Brit. fafc.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 5.

aurantiacus. 111. L. albido-cinereus, fcutellis aurantiacis. *Willden prodr. flor. berol. n.* 1004.

Parellus. 112. L. cruftaceus albus, peltis concavis concoloribus obtufis tumentibus. *Hoffm. lichen. p.* 55. *t.* 6. *f.* 2. *pl. lichen.* 2. *t.* 12. *f.* 5.

byffinus. 113. L. pulverulentus nigricans, fcutellis planis minutiffimis flavis albo-marginatis. *Hoffm. lichen. p.* 46. *n.* 59. *t.* 4. *f.* 7.

corallinus. 114. L. ramofus teres fafciculatus faftigiatus confertiffimus albus, fcutellis terminalibus minutiffimis concoloribus. *Mant. p.* 131. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 13. *f.* 2.

pezizoides. 115. L. crufta fugaci-glauca, fcutellis luteo-fufcis confertis ferratis. *Weber fpic. flor. gœtt. p.* 200. *Dickf. crypt. Brit. fafc.* 1. *t.* 2. *f.* 4.

urceolaris. 337. L. cinereus aut viridis, fcutellis pallidis hemifphæricis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 514. *n.* 1501.

upfalienfis. 116. L. cruftaceus, foliolis fubulatis ftriatis. *Dickf. crypt. Brit. fafc.* 1. *t.* 2. *f.* 7.

cinereofufcus. 117. L. cruftaceus cinereus, patellis complanatis rufefcentibus tenuiffime marginatis. *Weber fpic. flor. gœtt. p.* 244. *Hoffm. pl. lichen. t.* 12. *f.* 1.

fulgens. 118. L. cruftaceus flavicans fublobatus, verrucis carneis. *Swarts nov. act. Upf.* 4.

albefcens. 119. L. cruftaceus cinereus, fcutellis planis albis farinaceis. *Dill. mufc. t.* 18. *f.* 11. *an mera faginei varietas?*

verrucofus. 120. L. cruftaceus cinereus, fcutellis virefcentibus. *Dill. mufc. t.* 18. *f.* 9.

melanoftictos. 121. L. cruftaceus albicans, fcutellis rugofis nigris. *Dill. mufc. t.* 18. *f.* 15.

flavicans. 122. L. cruftaceus luteo-virefcens, fcutellis flavis. *Dill. mufc. t.* 18. *f.* 18.

fubimbricatus. 123. L. cruftaceus cinereus fubimbricatus, fcutellis atris confertis margine albo. *Relh. flor. cantabr. p.* 427. *ic.*

minutiffimus. 124. L. flavefcens, fcutellis fufcis vix prominentibus, margine albo craffiori. *Hagen lichen. p.* 61. *n.* 29. *t.* 1. *f.* 7.

marmo-ratus. 125. L. pallide roseus, ambitu rivisque serpentinis, scutellis pulverulentis atro-sanguineis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 178. *t.* B. *f.* 1.

*** *Imbricati.*

† *crustacei*, Psoræ.

muralis. 126. L. flavo-virescens, scutellis concoloribus demum lutescentibus, margine pallido. *Schreb. spic. flor. lips. p.* 130. *Hoffm. lichen.* 2. *t.* 9. *f.* 1. *β)* Lichen murorum. *Hoffm. lichen.* 2. *p.* 64. *n.* 80. *t.* 9. *f.* 2.

granosus. 127. L. foliolis oblongis lobatis incisis cinereis lævibus, scutellis nigris, margine crenulato. *Schreb. spic. flor. lips. p.* 130.

radiosus. 128. L. foliolis obsolete lobatis radiantibus cinereis, scutellis minimis fuscis. *Hoffm. lichen. p.* 62. *n.* 78. *t.* 4. *f.* 5.

cæsius. 129. L. albido-cinereus, scutellis concoloribus tuberculis pulverulentis cæsiis. *Hoffm. plant. lichen. fasc.* 2. *p.* 37. *t.* 8. *f.* 1.

cinnaba-rinus. 130. L. foliolis minutissimis linearibus miniatis, scutellis concoloribus. *Hoffm. lichen. p.* 62. *n.* 79.

luridus. 131. L. foliolis crassis minutis luridis sinuatis subtus albidis, scutellis nigris. *Swarts nov. act. ups.* 4. *Dill. musc. t.* 30. *f.* 134.

melano-leucos. 132. L. depressus, fronde glabra obtuse lobata albida inferne atra. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 9. *t.* 1. *f.* 2.

candidus. 132*. L. Ps. albicans sublobatus, tuberculis glaucis cærulescentibus. *Web. spic. flor. gœtt. n.* 279.

orbicula-ris. 133. L. Ps. foliolis margine verrucosis pulverulentis, scutellis fusco-nigricantibus. *Hoffm. lichen.* 2. *p.* 63. *n.* 85. *t.* 9. *f.* 1.

obscurus. 134. L. foliolis linearibus multifidis subfuscis, scutellis fuscoatris. *Huds. flor. angl. ed.* 2. *p.* 533.

crassus. 135. L. foliolis rotundatis crenatis virescentibus, scutellis planis fulvis. *Huds. flor. angl. ed.* 2. *p.* 530. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 19. *f.* 1.

Acetabu-lum. 136. foliolis obtusis lævibus, scutellis margine duplicato serratis. *Hoffm. lich.* 3. *p.* 92. *n.* 102. *t.* 18. *f.* 2.

tiliaceus. 137. L. rotunde lobatus pulverulentus albido-glaucus. *Hoffm. lich.* 3. *p.* 96. *n.* 104. *t.* 16. *f.* 2.

verruca-rius. 138. L. scrobiculatus, foliis subrotundis sinuatis, scutellis rufis. *Hoffm. pl. lich. fasc.* 1. *t.* 1. *f.* 1.

ꝛꝛ *foliacei*, Pulmonariæ.

carnosus. L. foliolis confertissimis erectiusculis rotundatis laceris, margine farinaceo, scutellis crassis elevatis planis rufis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 7.

squamatus. L. foliolis minutis crassiusculis rotundatis sinuato-angulatis glauco-viridibus, scutellis convexo-planis scabris nigris obsolete marginatis. *Dill. musc. p.* 228. *t.* 30. *f.* 135.

centrifugus. 139. L. foliolis obsolete multifidis lævibus albidis centrifugis, scutellis rufo-fuscis. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 10. *f.* 3.

saxicola. 140. L. foliolis multifidis adpressis albo-viridantibus centrifugis, scutellis parvis flavicanti-fuscescentibus in centro congestis, margine albido crenulato. *Polich. flor. palat. n.* 1098. *an idem eum murali ?*

leucophæus. L. foliolis minutissimis crenato-multifidis glauco-fuscis, apicibus incrassatis obtusissimis albo-farinaceis, scutellis planis nigris albido-marginatis. *Flor. dan. t.* 955. *f.* 2.

rigidus. 141. L. foliolis teretibus compressis ramoso-multifidis atris centrifugis, scutellis sessilibus concavis concoloribus. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 87. *t.* 9. *f.* 6. & *coll.* 2. *t.* 13. *f.* 5.

pictus. 142. L. foliolis multifidis sinuatis adnatis centrifugis albidis, scutellis atris albo-marginatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 146.

speciosus. 325. L. centrifugus supra exalbido virore per exsiccationem lacteo-cærulescens, foliolis lineari-frondosis, frondibus pinnatifido-lobatis ciliatis, scutellis fusco-rufis, margine incano-virescente integro crenulatove. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 119. *t.* 7.

quercifolius. 326. L. centrifugus dilute glaucescens frondoso-lobatus, frondibus sinuato-pinnatifidis, laciniis rotundatis sinuatis, scutellis obscure rubris albo-marginatis. *Wulff. ap. Jacq. Coll.* 3. *p.* 127. *t.* 9. *f.* 2.

patellatus 227. L. saturate viridis depressus plicato-lobatus, lobis sinuato-undatis, scutellis subcutaneis subsessilibus subcrenulatis concoloribus, exterius tuberculis albis farinaceo-leprosis inæqualibus. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 125. *t.* 9. *f.* 1.

laciniatus. 338. L. foliolis multilobis, lineis elevatis reticulatis farinoſis, ſubtus niger hiſpidus. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 520. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 42. 43.

omphalodes. 143. L. foliolis multifidis glabris obtuſis incanis, punctis vagis eminentibus. β) *Hoffm. lich.* 2. *t.* 12. *f.* 2. b. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 15. *f.* 2. a. b.

lanuginoſus. 144. L. foliolis planis multifidis margine pulverulentis ſubtus lanuginoſis. *Hoffm. lichen. p.* 82. *n.* 97. *t.* 10. *f.* 4.

ciliatus. 145. L. foliolis linearibus multifidis obſcure viridibus, ſcutellis pullis ciliatis. *Hoffm. lichen. p.* 60. *n.* 86. *t.* 14. *f.* 1.

diffuſus. 146. L. foliolis anguſtiſſimis multifidis in centro pulverulentis, ſcutellis ſubfuſcis. *Hoffm. lichen. t.* 70. *n.* 87.

fahlunenſis. 147. L. foliolis linearibus dichotomis planiuſculis acutis nigris, ſcutellis atris. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 10. *f.* 2.

ſtellaris. 148. L. foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 13. *f.* 1. 2.

ſtellariformis. 149. L. foliolis oblongis planis laciniatis, ſcutellis fuſcis. *Hoffm. lichen. p.* 73. *n.* 89. *an diſtinctus ſatis a ſtellari ?*

pullus. 151. L. foliolis lobatis olivaceis, ſcutellis integerrimis. *Schreb. ſpicil. flor. lipſ. p.* 131. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 13. *f.* 4. B. *an varietas ſequentis ?*

olivaceus. 152. L. foliolis lobatis nitidis olivaceis, ſcutellis crenatis. β) *Hoffm. lich.* 3. *t.* 13. *f.* 5.

pulchellus. 153. L. canus foliolis ſubpinnato-lobatis centrifugis ciliatis, ſcutellis cinereis albo-marginatis. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 2. *p.* 199. *t.* 16. *f.* 2.

pulverulentus. 154. L. foliolis lobatis crenatis obtuſis viridibus polline conſperſis, ſcutellis nigris margine crenatis. *Schreb. ſpicil. flor. lipſ. p.* 128. *Hoffm. pl. lichen.* 2. *p.* 39. *t.* 8. *f.* 2. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 15. *f.* 2. a. b.

quercinus. 155. L. frondibus obtuſe lobatis glaucis glabris, ſcutellis badiis margine crenatis. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1018.

ſtygius. 156. L. foliolis palmatis recurvis atris. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 14. *f.* 2. *plant. lichen.* II. 1. *p.* 3. *t.* 25. *f.* 2.

ſaxatilis. 157. L. foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 15. *f.* 1. β) *Hoffm. lich.* 3. *t.* 16. *f.* 1.

Cocoës. 158. L. foliolis ſinuatis candidis adnatis, ſcutellis ſparſis atris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

parieti-nus. 159. L. foliolis crispis fulvis, peltis concoloribus. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 18. *f.* 1.

angusta-tus. 160. L. foliolis linearibus diffusis crenatis, punctis eminentibus nigris. *Hoffm. lichen. p.* 77. *n.* 94. *t.* 11. *f.* 1.

luteolus. 161. L. viridi-cinerascens centrifugus, tuberculis lentiformibus aggregatis pallide luteolis. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 86.

physodes. 162. L. foliolis angustis apice inflatis, scutellis pedicellatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 8.

squamo-sus. 163. L. scutellis margine crispis fuscis. *Hoffm. lichen. p.* 100. *n.* 107.

atratus. 314. L. scutellis atratis concoloribus. *Hedwig cryptogam.* II. 3. *t.* 21. *f.* A.

cerinus. 315. L. crustaceus abidus, scutellis concoloribus medio cerinis. *Hedw. crypt.* II. 3. *t.* 25. *f.* B.

laquea-tus. 322. L. supra viridis subtus & margine albus, scutellis flavis albo-marginatis in hemisphærica demum tubercula abeuntibus. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 3. *p.* 109. *t.* 5. *f.* 2.

albofla-vescens. 323. L. albus noduloso verrucosus, scutellis aurantiis, magine tumidiusculo albo. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 111. *t.* 5. *f.* 1.

fusco-ru-bens. 324. L. tenacissimus ex fusco rubens, scutellis rubellis, margine tumido concolore introrsum crenato. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 112. *t.* 2. *f.* 2.

tenax. 165. L. plumbeus sinuato-lobatus, scutellis sparsis excavatis aureis. *Swarts nov. act. Ups.* 4.

**** *Gelatinosi.*

crispus. 166. L. foliolis imbricatis lobatis truncatis crenatis atro-viridibus, scutellis crenulatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 10. *f.* 1.

jacobææ-folius. 339. L. ex atro virescens, foliolis multipartitis crispis, scutellis ex atro sanguineis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 530. *Dill. musc. t.* 19. *f.* 50.

cristatus. 167. L. foliolis imbricatis dentato-ciliatis, scutellis rubris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 12. *f.* 1.

pulcher. 168. L. imbricatus viridis exasperatus undique concolor, scutellis rufescentibus, margine crenulato. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 259. *Dill. musc. t.* 19. *f.* 22.

herba-ceus. 169. L. lobatus, foliis imbricatis obtuse crenatis glabris, scutellis fulvis. *Hoffm. pl. lich.* 2. *p.* 51. *t.* 10. *f.* 2.

granulatus. 170. L. imbricatus, foliolis subrotundis crenatis scabriusculis atro-viridibus, scutellis fulvis, disco depresso. *Suppl. p.* 450. *Dill. musc. t.* 19. *f.* 24. *Wulf. ap. Jacq. Col. lect.* 3. *t.* 10. *f.* 2.

Tremella. 171. L. atro-viridis, foliorum segmentis capillaceis scutello exiguis puniceis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 714. Tremella lichenoides. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 11. *f.* 1.

nigrescens 169*. L. foliaceus subrotundus lobatus rugosus atro-virens, scutellis confertis rugosis. *Suppl. p.* 451. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 10. *f.* 3.

fascicularis. 172. L. foliaceus erectus, scutellis terminalibus, junioribus concavis virescentibus ætate turbinatis refuscentibus. *Mant. p.* 133. *Flor. dan. t.* 462. *f.* 2.

rupestris. 174. L. foliaceus lobatus, lobis obtusis, scutellis sparsis minutis concoloribus. *Linn. fil. de musc. p.* 37. *Dill. musc. t.* 19. *f.* 22.

oputioides. 328. L. prostratus ramosissimus, ramis diffusis subarticulatis subreniformi-lobatis granulis, globosis undique obtusis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 133. *Dill. musc. t.* 19. *f.* 29.

fugax. 329. L. suborbiculatus undoso-plicatus sublobatus hyalino-nigricans. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 141. *t.* 12. *f.* 2.

coriiformis. 330. L. atro-subvirescens repens sinuato-lobatus, lobis suberectis repando-crispis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 142.

***** *Foliacei laciniosi.*

chrysophthalmus. 175. L. subimbricatus linearis lacerus ciliatus, peltis elevatis radiatis fulvis. *Mant. p.* 311. *β*) *Jacq. Collect.* 1. *t.* 4. *f.* 3. a. b. *Nonne potius fruticulosis accensendus.*

Burgassii. 176. L. crispus, peltis elevatis exterius muricato-crispis, fundo depresso plano. *Suppl. p.* 450. *Lightf. fl. scot. t.* 26.

ciliaris. 178. L. erectiusculus, laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Flor. dan. t.* 711.

tenellus. 179. L. albus tener, laciniis erectiusculis obtusis ciliatis ætate tubulosis apertis, scutellis nigris sessilibus. *Dill. musc. t.* 20. *f.* 46.

islandicus. 180. L. ascendens, marginibus elevatis ciliatis, peltis terminalibus. *Flor. dan. t.* 155. *Hoffm. pl. lich. fasc.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

citrinus. 181. L. lobatus supra citrinus subtus albus, scutellis concoloribus inæqualiter marginatis, disco rufo. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 60. *t.* 20. C.

Endocarpon. 181*. L. trunco plano minuto rotundato-angulato crassiusculo obscuro-viridi nigro-punctato supra albido, peltis immersis. *Hedw. cryp.* II. 2. *t.* 20. A.

nivalis. 182. L. ascendens crispus glaber lacunosus, margine elevato. *Flor. dan. t.* 227.

pulmonarius. 183. L. repens supra reticulato-lacunosus subtus fusco-tomentosus, peltis marginalibus. *Hoffm. pl. lich. fasc.* I. *t.* I. *f.* 2. *β)* Lichen viviparus. *Roth. bot. Mag.* 4. *p.* 6. *t.* I. *f.* 3.

plumbeus. 184. L. repens obtuse lobatus supra lacunosus virescenti-plumbeus globulis farinosis scutellisque croceis albo-marginatis sparsis subtus tomentosus ferrugineus. *Roth. bot. Mag.* 4. *p.* 4. *t.* I. *f.* 2. *an idem cum verrucario ?*

sepincola. 185. L. ascendens subcrenulatus glaber superne castaneus, scutellis concoloribus subterminalibus. *Ehrh. hann. Mag.* 1783. *p.* 207. *Hedw. crypt.* II. I. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 1-10.

furfuraceus. 185*. L. decumbens furfuraceus, laciniis acutis subtus lacunosis atris. *Hoffm. pl. lich. fasc.* 2. *p.* 45. *t.* 9. *f.* 2.

ampullaceus. 186. L. planiusculus lobatus crenulatus, peltis globosis inflatis. *Jacq. Collect.* I. *t.* 4. *f.* 3. c.

leucomelas. 187. L. linearis ramosus nigro-subciliatus, peltis subpedunculatis radiatis. *Swarts obs. bot. t.* II. *f.* 3.

farinaceus. 188. L. erectus compressus ramosus, verrucis marginalibus farinosis *Dill. musc. t.* 23. *f.* 63.

linearis. 189. L. erectus dichotomus, ramis linearibus divaricatis altero latere canaliculatis, peltis minutis marginalibus. *Linn. fil. musc. p.* 36.

Filix. 190. L. fronde stipitata bifida laciniata lobata, lobis obtusis crenatis, scutellis sparsis planiusculis. *Linn. fil. musc. p.* 36. *t.* 2. *f.* 2.

calicaris. 191. L. erectus linearis ramosus lacunosus convexus mucronatus. *Dill. musc. t.* 23. *f.* 62. A. B. C.

tinctorius. 192. L. erectus, laciniis angustis compressis anastomosantibus, extremitatibus liberis furcatis. *Weber spic. flor. gœtt.* 241.

fraxineus. 193. L. erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis. *Dill. musc. t.* 22. *f.* 59.

fuciformis. 194. L. rectiusculus lævis subtomentosus ramosus, laciniis lanceolatis. *Mant. p.* 507. *Dill. musc. t.* 22. *f.* 61.

fucoides. L. ramosissimus porosus albido-canescens, ramis fasciculatis teretibus, ramulis abbreviatis fastigiatis subulatis obtusiusculis, tuberculis lateralibus planiusculis farinaceis. *Dill. musc. p.* 167. *t.* 22. *f.* 60.

saturninus. L. rotunde lobatus supra nigricans subtus villosus cinereus, scutellis rufis marginatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 8.

membranaceus. L. depressus plicato-rugosus farinaceus albido-subsulphureus, scutellis subconcavis concoloribus. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 1.

prunastri. 195. L. erectiusculus lacunosus subtus tomentosus albus. *Dill. musc. t.* 22. *f.* 54. 55.

fallax. 196. L. tenuis superne glaucus inferne candidus nigro-maculatus, scutellis terminalibus. *Weber spic. flor. gœtt. p.* 244.

juniperinus. 197. L. crispus fulvus, peltis fuscis. *Hoffm. lich. fasc.* 2. *p.* 35. *t.* 7. *f.* 2.

caperatus. 198. L. pallide viridis rugosus margine undulatus.

crocatus. 199. L. lacunosus luteo-rufescens flavo-granulatus, laciniis sinuatis rotundis, scutellis subconcavis fusco-atris a fronde marginatis. *Dill. musc. t.* 48. *f.* 12.

glaucus. 200. L. depressus lobatus glaber, margine crispo farinaceo. *Flor. dan.* t. 598.

japonicus. 201. L. depressus inciso-lobatus farinaceus crispus subtus villosus. *Thunb. flor. jap. p.* 344.

tremelloides. 202. L. plumbeus rugoso-crispus glaber, peltis sparsis rubris. *Suppl. p.* 450.

ornatus. 203. L. erectiusculus pellucidus crispus, scutellis marginalibus plano-depressis rubris margine crispis. *Suppl. p.* 450.

tenuissimus. 204. L. fusco-virescens, foliis digitato-multifidis, scutellis subimmersis fusco-rufescentibus margine obtusis. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 8.

cochleatus. 205. L. membranaceus lobatus plicatus obscuro-virens, scutellis rufis. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 13. *t.* 2. *f.* 9.

pinastri. 205*. L. ascendens lobatus crispus, margine pulverulento flavo. *Hoffm. lich. fasc.* 2. *p.* 33. *t.* 7. *f.* 1. & *t.* 22. *f.* 2.

fraudulentus. 206. L. tenuis superne glaucus inferne candidus nigro-maculatus, scutellis terminalibus. *Weber spic. flor. gœtt. p.* 244. *Dill. musc. t.* 22. *f.* 58. *an glauci varietas?*

semipinnatus. 204*. L. fronde semipinnata canaliculata cinerea. *Leers flor. herb. ed. 2. p. 261. Dill. musc. t. 20. f. 46.*

damæcornis. 207. L. multipartito-dichotomus glaber subtus tomentosus, apicibus bifidis, peltis marginalibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 146.*

lacerus. 209. L. depressus rigidus irregularis incisus glaber subtus tomentosus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 146.*

flavens. 210. L. foliis lineari-teretibus ramosis fulvis, scutellis planis marginalibus concoloribus. *Swarts. nov. pl. gen. & sp. p. 146.*

ceratophyllus. 211. L. rectus, foliolis obtusis cornigeris. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 147.*

diaphanus. 212. L. membranaceus pellucidus cærulescens tenerrimus plicato-undulatus, laciniis crispis, scutellis sparsis ferrugineis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 147.*

marginellus. 213. L. membranaceus pellucidus lobatus plicato-undulatus, scutellis marginalibus minutis ferrugineis albomarginatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 147.*

vesiculosus. 214. L. membranaceus pellucidus lobatus undulatus vesiculosus, vesiculis turbinatis inferne apertis, apice scutelliger, scutellis convexis rufis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 147.*

dissectus. 215. L. depressus laciniato-lobatus obtusus lævis utrinque albidus, peltis concavis sparsis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 147.*

tomentosus. 216. L. depressus membranaceus rotundatus inciso-lobatus lævissimus, lobis bifidis inferne villoso-tomentosus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p. 147.*

roridus. 217. L. foliis pulposis calcariis glauco polline villosis, scutellis atris. *Leers flor. herb. ed. 2. p. 260.*

pulposus. 218. L. foliis pulposis calcariis fuscis, scutellis atris. *Leers flor. herb. ed. 2. p. 260.*

lobatus. 219. L. fronde rotunde lobata glauca polline concolore scabra subtus hirta atra. *Leers flor. herb. ed. 2. p. 261. Michel. nov. pl. gen. t. 45. f. 1.*

serratus. 220. L. viridis concolor, scutellis planis serratis. *Leers flor. herb. p. 261.*

laciniosus. 221. L. repens lobatus glaber, lobis sinuatis, scutellis fulvis. *Hudf. flor. angl. p. 449. Dill. musc. t. 26. f. 99.*

cornicu-latus. 222. L. erectiusculus sublacunosus glaber, laciniis angustis corniculatis. *Relh. flor. cantabr. p.* 433. *Dill. musc. t.* 21. *f.* 54.

****** *Coriacei*, Pettigeræ.

fluviatilis. 223. L. repens lobatus obtusus, lobis margine integerrimis, supra viridis, subtus ochroleucus parum lacunosus. *Weber spic. flor. gœtt. p.* 265. *t.* 4.

aquaticus. 224. L. repens lobatus obtusus, peltis hemisphæricis maximis. *Dill. musc. t.* 20. *f.* 44.

scopulorum. 225. L. rectus compressus linearis nitidus, lateribus verrucosis. *Dill. musc. t.* 20. *f.* 60.

resupinatus. 225*. L. repens lobatus, peltis marginalibus posticis. *Flor. dan. t.* 764.

venosus. 226. L. repens ovatus planus subtus venosus villosus, peltis marginalibus horizontalibus. *Hoffm. pl. lich. fasc.* 1. *t.* 6. *f.* 2.

aphthosus. 228. L. repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali ascendente. *Flor. dan. t.* 767. *f.* 1.

verrucifer. 229. L. repens lobatus obtusus planus, lobis pulmariis superne lente viridibus verrucosis subtus maxima parte atris, peltis lateralibus marginatis. *Weber spic. fl. gœtt. p.* 273.

arcticus. 230. L. repens lobatus obtusus planus lævis subtus avenius villosus.

antariticus. 231. L. repens lobatus obtusus planus glaber supra lacunosus subtus bullatus, peltis planis amplissimis. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 370. *t.* 10. *f.* 1.

caninus. 232. L. repens lobatus obtusus planus subtus venosus villosus, pelta marginali ascendente. *Flor. dan. t.* 767. *f.* 2.

rufus. 233. L. repens profunde lobatus, marginibus obtusis introflexis, subtus villosus cirris nigricantibus, peltis marginalibus ascendentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 508. *n.* 101. *Dill. musc. t.* 27. *f.* 103.

polydactylos. 234. L. repens planus lobatus subtus venoso-villosus, lobis digitatis divaricatis peltigeris, peltis ovatis ascendentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *pl.* 508. *Hoffm. p. lich. fasc.* 1. *t.* 4. *f.* 1.

horizontalis. 235. L. repens planus subtus avenius, peltis marginalibus horizontalibus. *Flor. dan. t.* 533. β) *Flor. dan. t.* 765.

silvaticus. 236. L. repens laciniatus lacunosus, peltis marginalibus ascendentibus fossulisque albis sphæricis, osculo regulari. *Hoffm. pl. lich. fasc.* 1. *t.* 4. *f.* 2.

perlatus. 237. L. repens lobatus glaber ſubtus ater, ſcutellis pedunculatis integris. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 39. *β*) *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 42.

ſaccatus. 238. L. repens ſubrotundus, peltis depreſſis ſubtus ſaccatis. *Flor. dan. t.* 532. *f.* 3.

croceus. 239. L. repens ſubrotundus planus ſubtus venoſus villoſus croceus, peltis ſparſis adnatis. *Flor. dan. t.* 263.

ſarcoides. 240. L. gelatinoſus carneus, ſcutellis ſimilibus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 22. *an tremellæ potius ſpecies?*

perforatus. 241. L. repens lobatus glaber ciliatus ſubtus ater, lobis extimis aurantiis, peltis perforatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 116. *t.* 3.

fuliginoſus. 242. L. repens ſinuato-lobatus ſcaber ſubtus ſpongioſo-villoſus lacunoſus, ſcutellis planis ferrugineis margine pallidis. *Diſc. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 13. *Dill. muſc. t.* 29. *f.* 100.

******* *Umbilicati*, Umbilicariæ.

miniatus. 243. L. gibbus punctatus ſubtus fulvus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 10. *f.* 3.

exaſperatus. 245. L. undique lævis ſuperius aſper, tuberculis contortis nigris. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *p.* 7. *t.* 2. *f.* 1. 2.

velleus. 244. L. ſubtus hirſutiſſimus. *Dill. muſc. t.* 82. *f.* 5. *Hoffm. pl. lich.* II. 1. *p.* 9. *t.* 26. *f.* 3.

puſtulatus. 245*. L. ſubtus lacunoſus furfure nigro aſperſus. *Flor. dan. t.* 597. *n.* 2.

proboſcideus. 246. L. peltis turbinatis truncatis perforatis. *Hedw. crypt.* II. 1. *t.* 1. A.

deuſtus. 247. L. undique lævis ſupra cinereus, tuberculis nigris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 15. *f.* 3.

polyphyllus. 250. L. polyphyllus undique lævis atrovinea crenatus. *Dill. muſc. t.* 10. *f.* 129. & 3. *t.* 2. *f.* 4.

eroſus. 251. L. diaphanus inferne albens fibroſus. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 259.

polyrhizos. 252. L. polyphyllus utrinque lævis polyrhizos. *Dill. muſc. t.* 30. *f.* 130. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 2. *f.* 3. 4.

jacquini. 253. L. utrinque lævis plicato-criſpus lobatus ſubtus papilloſus ater ſupra peltis convexo-depreſſis concoloribus notatus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 9. *f.* 3.

mesentericus. 254. L. utrinque lævis plicato-crispus lobatus subtus glaber supra pellatus. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 85. *t.* 9. *f.* 5.

anthracinus. 255. L. undique lævis plicato-crispus lobatus, peltis omnino nullis. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 9. *f.* 4.

viridis. 256. L. subtus niger supra viridis, punctis elevatis. *Suppl. p.* 451.

flocculosus. 335. L. coriaceus suborbiculatus crispo-lobatus fusco-niger supra squamoso-flocculosus subtus lævis sublacunosus. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 99. *t.* 1. *f.* 2.

******** *Scyphiferi.*

foliaceus. 257. L. foliis ascendentibus multifido-laciniatis subtus niveis scyphiferis, scyphulis conicis brevissimis. *Hudf. flor. angl. p.* 457. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 12.

simplex. 258. L. simplicissimus, scyphulis conicis margine integerrimis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 510.

cocciferus. 259. L. simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 7.

cornucopioides. 260. L. simplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 9. *an mera cocciferi varietas?*

pyxidatus. 261. L. simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 6. B. C. *et f.* 8. B. *β*) Lichen prolifer. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 552. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 6. D.

fimbriatus. 262. L. simplex denticulatus, stipite cylindrico. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 8. 9. *an mera pyxidati varietas?*

gracilis. 263. L. dichotomo-ramosus, tuberculis fuscis. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 13. C. *β*) Lichen polycerus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 535. *Dill. musc. t.* 15. *f.* 16. E. *an sola ætate minore a deformi distinctus?*

filiformis. 264. L. simplex integerrimus filiformis, tuberculis fuscis. *Hudf. flor. angl. p.* 456. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 10.

digitatus. 265. L. ramosissimus, ramis cylindricis, calicibus integris nodosis. *Dill. musc. t.* 15. *f.* 19. *β*) Lichen impetiginosus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 538. *n.* 1552.

ventricosus. 266. L. ramosissimus ventricosus, scyphis dentatis, tuberculis fuscis. *Dill. musc. t.* 15. *f.* 17.

deformis. 267. L. simpliciusculus subventricosus, calicibus dentatis *For. lapp. t.* 11. *f.* 3.

cornutus. 268. L. ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calicibus integris. *Hoffm. plant. lichen.* II. 1. *p.* 1. *t.* 25. *f.* 1. β) Lichen clavæformis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 556. *an mera pyxidati varietas ?*

radiatus. 269. L. ſubramoſus cylindricus elongatus, ſcyphis inæqualiter dentatis radiatiſque, tuberculis fuſcis. *Schreb. ſpic. flor. lipſ.* 122. *Dill. muſc. t.* 15. *f.* 16.

flammeus. 272. L. tubuloſus ramoſus retuſus croceus. *Suppl. p.* 451. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 3. *f.* 1. *an fruticuloſis potius adſcribendus ?*

********* *Fruticuloſi*, Coralloides.

botrytis. 270. L. ſubramoſus, tuberculis terminalibus ſphæricis flavobruneis maximis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 512.

triſtis. 271. L. ceſpitoſus, ramis compreſſis ramoſis ſuperne nigricantibus ſcutelliferis. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1966. *t.* 47. *f.* 1.

rangiferinus. 273. L. perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. α) alpeſtris. *Flor. dan. t.* 180. β) ſilvaticus. *Flor. dan. t.* 539.

furcatus. 274. L. tubuloſus ramoſus, ramis erectis furcatis. *Hudſ. flor. angl. p.* 458. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 27.

ſpinoſus. 275. L. tubuloſus ſpinoſus ramoſiſſimus, ramulis tuberculatis ſubdigitatis. *Hudſ. flor. angl. p.* 459. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 25.

hiſpidus. 276. L. ſolidus ramoſiſſimus badius, ramis divaricatis ſubcompreſſis glabris ſpinuloſis, angulis obtuſis. *Lightf. flor. ſcot.* 883. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 3. *f.* 2. 3.

uncialis. 277. L. perforatus, ramulis breviſſimis acutis. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 22. β) Lichen ceranoides. *Dill. muſ. t.* 16. *f.* 21. γ) Lichen ramoſus. *Hall. hiſt ſtirp. helv. n.* 1961.

ſubuliformis. 278. L. tubuloſus filiformis ſubulatus ſimplex ceſpitoſus aſcendens lævis albiſſimus, ramis pauciſſimis breviſſimis ſæpe nullis. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 15. *t.* 29. *f.* 1-3. *Ehrhart hann. Magaz.* 1784. *n.* 9. *an vere diſtincta ſpecies ?*

ſubulatus. 279. L. ſubdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 26.

Cuinam tribui inſerendi lichenes a Clariſſ. Fabricio in *Angliæ fodinis carbonariis urbi Whitehaven vicinis reperti*, & *apud* Ill. Ferber *neue Beytr. zur Mineralg. verſch. Lænder*, &c. I. *p.* 405. *nominati* cryptarum *atque* urceolatus ?

vermicellaris. 280. L. lævis ſubulatus candidus ſubramoſus, ramis diffuſis, tuberculis lateralibus globoſis. *Linn. fil. muſc. p.* 37. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 2. *t.* 12. *f.* 2.

globifer. 281. L. ſolidus lævis, tuberculis globoſis cavis terminalibus. *Mant. p.* 133. *Dill. muſc. t.* 17. *f.* 35.

paſchalis. 282. L. ſolidus tectus, foliolis cruſtaceis. *Flor. dan. t.* 251.

ramuloſus 283. L. ſolidus ramoſus tectns, foliolis filamentoſis, tuberculis globoſis ſolidis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

fragilis. 284. L. ſolidus, ramulis teretibus obtuſis. *Dill. muſc. t.* 17 *f.* 34.

ſertularia. 340. L. ſolidus multifidus albus baſi ferrugineus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 542. *n.* 1553.

ceſpitoſus. 285. L. erectus ſolidus deſiſſime ceſpitoſus ramoſiſſimus, ramis teretibus furcatis obtuſis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 513.

filiquoſus. 286. L. ſolidus ſubramoſus, tuberculis lateralibus concavis. *Hudſ. flor. angl. p.* 460. *Dill. muſc. t.* 17. *f.* 38.

aculeatus. 287. L. compreſſus ramoſiſſimus ſolidus caſtaneus, ramis furcatis ſpinuloſis, tuberculis radiatis. *Weber ſpicil. flor. goett. p.* 207. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 5. *f.* 2.

quiſquiliaris. 288. L. cinereus ſcaber, ramis brevibus acutis furfure albido tectis, ſcutellis nigerrimis. *Leers flor. herbom. n.* 993. *Mich. nov. pl. gen. t.* 53. *f.* 8.

melanocarpus. 289. L. ſolidus ramoſus albidus, ramulis foliolisque compreſſis, tuberculis globoſis depreſſis atro-tomentoſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

aggregatus. 290. L. perforatus ramoſiſſimus, ramulis erectis, tuberculis granuloſis aggregatis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

ſpadiceus. 290*. L. erectus ramoſiſſimus fiſtuloſus, ramis vagis ſpinoſiſſimis, ſcutellis terminalibus magnis laceris ſpinoſis ramiferis. *Roth. bot. Mag.* 4. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1. *an idem cum aculeato?*

verruciger. 291. L. ſolidus, ramulis teretibus capitatis. *Suppl. p.* 451.

Papillaria. 292. L. fiſtuloſus aphyllus albidus, ramis pauciſſimis obtuſis breviſſimis, tuberculis terminalibus carneis. *Ehrh. Hann. Mag.* 1783. *p.* 218. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 28.

Roccella. 293. L. ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis. *Pluckn. alm. t.* 205. *f.* 6.

decipiens. 294. L. ſimplex compreſſiuſculus ſupra lateritius ſubtus margineque albus, ſcutellis nigris convexis marginalibus. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* B.

cinchonæ. 295. L. teres erectus ramoſiſſimus fulvus. *Wilden. bot. Mag.* 4. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 3.

madreporæformis. 331. L. e viridi canus, cauliculis erectis fiſtuloſis denſiſſime aggregatis apicem verſus digitato-ſubramoſis, ramulorum apicibus dilute fuſcis. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 3. *p.* 105. *t.* 3. *f.* 2.

fucinus. 332. L. ater tereti-compreſſus ramoſus, ramulis utrinque tuberculoſo-denticulatis, ſcutellis ſubterminalibus concoloribus ſeſſilibus pedunculatiſque. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 143. *t.* 12. *f.* 3.

muſcicola. L. cruſtæformis ramoſiſſimus, ramis breviſſimis contextis atroviridibus, ſcutellis concoloribus. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 23. *t.* 6. *f.* 9.

********* *Filamentoſi*, Uſneæ.

floridus. 296. L. ramoſus erectus, ſcutellis radiatis. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *t.* 30. *f.* 2. *Tenax.*

plicatus. 297. L. pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Dill. muſc. t.* 11. *f.* 1. *Tenax.*

barbatus. 298. L. pendulus ſubarticulatus, ramis patentibus. *Dill. muſc. t.* 12. *f.* 6. *Tenax.*

citricolorus. 341. L. erectus ramoſiſſimus flavus rufeſcens, ramis ſubulatis. *Dill. muſc. t.* 13. *f.* 16.

albidus. 342. L. albus filamentis ſubramoſis longiſſimis complicatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 548. *n.* 1569.

ſaxoſus. 343. L. niger durus. *Dill. muſc.* 2. *t.* 13. *f.* 8.

hippotrichioides. 344. L. ſubſimplex niger capillaris. *Dill. muſc. t.* 13. *f.* 11.

ſubvireſcens. 344. *a.* L. erectus dichotomo-ramoſus, ramis divaricatis apice furcatis nigris. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 7. *t.* 26. *f.* 2.

radiciformis. 300. L. teres ramoſiſſimus glaber radiciformis. *Linn. fil. muſc. p.* 37. *an hujus familiæ?*

ſetoſus. 301. L. ſimplex ſubcompreſſus nigricans, tuberculis globoſis acuminatis atris. *Leyſſ. flor. hal. n.* 1171.

307. L.

divarica-tus. 302. L. pendulus angulatus articulatus intus tomentosus, ramis divaricatis, peltis orbiculatis sessilibus. *Dill. musc. t.* 12. *f.* 5. *Tenax.*

bicolor. 303. L. ramosissimus erectiusculus teres inarticulatus glaber inanis nitidus infra nigricans supra sordide albus, ramis patentissimis subulatis. *Ehrh. hann. Magaz.* 1784. *n.* 9.

usnea. 304. L. pendulus compressus ramosus lævis. *Mant. p.* 131. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 31. & *t.* 54. *f.* 10.

jubatus. 305. L. pendulus, axillis compressis. *Dill. musc. t.* 12. *f.* 7. *Fragilis.*

lanatus. 306. L. ramosissimus decumbens implicatus opacus. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 10. *f.* 5. *Fragilis.*

pubescens. 307. L. ramosissimus decumbens implexus nitidus. *Jacq. misc. austr. t.* 9. *f.* 7. *Fragilis.*

chalybei-formis. 308. L. ramosus divaricatus decumbens implicato-flexuosus. *Flor. dan. t.* 262. *Fragilis.*

hirtus. 309. L. ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Hoffman. pl. lichen.* II. 1. *p.* 17. *t.* 30. *f.* 1. *Tenax.*

vulpinus. 310. L. ramosissimus erectus fastigiatus inæquali-angulosus. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 10. *f.* 4. *Fragilis.*

articula-tus. 311. L. articulatus, ramulis tenuissime punctatis. *Dill. musc. t.* 11. *f.* 4. *Tenax.*

aurantia-co-ater. 311*. L. ramosus aurantiacus apicibus ater, scutellis supra atris subtus aurantiis. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 369. *t.* 11. *f.* 2.

capensis. 312. L. ramosus erectus ciliatus flavus, peltis fulvis radiatis. *Suppl. p.* 451. *Hoffm. pl. lichen. fasc.* 2. *p.* 48. *t.* 10. *f.* 2.

flavidus. 313. L. dichotomo-ramosus teres erectiusculus inanis ochroleucos, ramis divaricatis apice furcatis nigris. *Ehrh. Hann. Mag.* 1784. *n.* 9.

gujanen-sis. 314. L. purpurascens ramosissimus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 971. *an distincta species.*

reticula-tus. 314*. L. ramosissimus decumbens ater, opacus, filamentis reticulatis coadunatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 187. *t.* 13. *f.* 6.

1205. **FUCUS.** *Globuli* carpomorphi, vel *ſemina* graniformia ſub punctis perforatis latentia.

* Veſiculoſi ſ. *veſiculis mucifluis in ſubſtantia frondium aggregatis.*

uvarius. 1. F. caule filiformi ramoſo, foliis confertis ovatis fornicatis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 13. *f.* 1.

lendigerus. 2. F. caule filiformi, ramoſo, foliis lanceolatis ſerratis, veſiculis racemoſis filiculoſis tuberculoſis.

natans. 3. F. caule filiformi ramoſo, foliis lanceolatis ſerratis, veſiculis globoſis pedunculatis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 76. *f.* 1. 2.

acinarius. 4. F. caule filiformi ramoſo, foliis linearibus integerrimis, veſiculis globoſis pedunculatis. *Mant. p.* 508. *Seb. muſ.* 3. *t.* 101. *f.* 3.

ſalicifolius. 5. F. caule ſimplici planiuſculo, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, veſiculis globoſis axillaribus ſeſſilibus. *S. G. Gmelin. fuc. p.* 98. *Buxb. cent.* 3. *t.* 65. *n.* 1.

turbinatus. 6. F. caule filiformi ſubramoſo, veſiculis racemoſis, una turbinata folio cordato crenato peltata. *S. G. Gmel. fuc. t.* 5. *f.* 1.

ſerratus. 7. F. fronde plana dichotoma coſtata ſerrato-dentata, veſiculis terminalibus tuberculoſis. *Reaumur. act. Pariſ.* 1711. *t.* 9. *f.* 1.

veſiculoſus. 8. F. fronde plana dichotoma coſtata integerrima, veſiculis axillaribus geminis, terminalibus tuberculatis. *Borrich. act. Hafn.* 1671. *t.* 7.

divaricatus. 9. F. fronde plana dichotoma integerrima, axillis divaricatis, veſiculis axillaribus geminis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 5. *an mera veſiculoſi varietas?*

inflatus. 10. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata ovato-lanceolata inflata, apice diviſo.

ceranoides. 11. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, veſiculis tuberculatis bifidis terminalibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 13. *β*) Fucus lacerus. *Sp. pl. p.* 1627. *n.* 4.

ſpiralis. 12. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata, inferne lineari-canaliculata, veſiculis tuberculatis geminis. *Flor. dan. t.* 286. *an veſiculoſi varietas?*

canaliculatus. 13. F. fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari, vesiculis tuberculatis bipartitis obtusis. *Flor. dan. t.* 244. *β*) Fucus excisus. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 715. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 11.

geniculatus. 14. F. caule ramisque geniculatis, fronde dicothoma pellucida æquali, vesiculis terminalibus. *S. G. Gmelin fuc. p.* 75. *t.* 1. A. *f.* 3.

distichus. 15. F. fronde plana dicothoma integerrima lineari, vesiculis tuberculatis mucronatis. *Flor. dan. t.* 351.

peucedanifolius. 16. F. caule compresso ramis ramulsique alternis punctis creberrimis geminis exasperatis, frondibus subdichotomis lanceolato-oblongis, vesiculis terminalibus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 76. *t.* 1. A. *f.* 4.

articulatus. 17. F. caule plano subdichotomo articulato, frondibus lanceolatis geminato-denticulatis, denticulo altero vesiculam ovatam tuberculatam portante. *S. G. Gmelin fuc. p.* 77.

nodosus. 18. F. fronde compressa dichotoma, foliis distichis integerrimis, vesiculis innatis solitariis dilatatis. *Fl. dan. t.* 146.

pyriferus. 19. F. stirpe filiformi dichotoma, frondibus membranaceis ensiformibus solitariis serratis, terminalibus petiolo inflatis. *Mant. p.* 311.

siliquosus. 20. F. fronde compressa ramosa, foliis distichis alternis integerrimis, vesiculis pedunculatis oblongis mucronatis. *For. dan. t.* 106.

siliculosus. 21. F. fronde filiformi-compressa, foliis alternis subserratis, vesiculis subglobosis pedunculatis mucronatis.

denticulatus. 22. F. caule tereti ramoso, foliis linearibus denticulatis, vesiculis globosis pedunculatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

undulatus. 23. F. caule tereti subramoso, foliis confertis sessilibus ovalibus denticulatis undulato-crispis, vesiculis pedunculatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

subrepandus. 24. F. caule compresso, ramis alternis, foliis lineari-lanceolatis subrepando-dentatis, vesiculis pedunculatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192.

elongatus. 25. F. fronde filiformi compressa dichotoma articulata, geniculis tumidiusculis. *Reaum. act. Paris.* 1712. *p.* 24. *f.* 2.

Rosa marina. 26. F. caule tereti carnoso ramoso, foliis perfoliatis verticillatis subternis annulo in medio notatis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 102. *t.* 5. *f.* 2. & 2, a.

loreus. 27. F. fronde filiformi compressa dichotoma undique utrinque tuberculata. *Flor. dan. t.* 710. *an hujus tribus?*

fœniculaceus. 28. F. fronde filiformi ramosissima, vesiculis ovatis terminatis foliolis multipartitis obtusis apice granulosis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 86. *t.* 2. a. *f.* 3. β) Fucus barbatus. *Sp. plant. n.* 19.

Myrica. 29. F. caule hirto ramosissimo, ramis alternis tenuissime alternatim denticulatis, vesiculis globosis pellucidis pedunculatis ramos terminantibus in dentes exeuntibus. *S. G. Gmelin fuc. p.* 88. *t.* 3. *f.* 1.

abrotanoides. 30. F. caulibus filiformibus teretibus ramosis, frondibus lineari-multifidis integerrimis, vesiculis ramorum ramulorumque medio immersis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 89. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 17.

baccatus. 31. F. caule lignoso teretiusculo ramoso, vesiculis lateralibus pedunculatis immersisque. *S. G. Gmelin fuc. p.* 90. *t.* 3. *f.* 2. *an distincta satis species?*

triqueter. 32. F. fronde ancipiti ramosa, foliis petiolatis denticulatis, vesiculis immersis oblongis triquetris. *Mant. p.* 312.

granulatus. 33. F. fronde filiformi ramosissima, ramulis accumulatis, vesiculis subrotundis cumulatis, ramulis foliisque acutis omnibus innatis. *Flor. dan. t.* 591.

selaginoides. 34. F. fronde filiformi ramosissima, ramis dichotomis, foliis subulatis alternis basi vesiculosis. *Mant. p.* 134. *S. G. Gmelin fuc. p.* 83. *t.* 2. a. *f.* 1.

concatenatus. 35. F. fronde filiformi ramosissima, ramulis dichotomis; vesiculis moniliformibus distantibus innatis, foliis subulatis.

racemosus. 36. F. caule tereti repenti-ramoso aphyllo, vesiculis obovatis conferte racemosis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

trinodis. 37. F. caule tereti ramoso, ramulis in tres vesiculas inflexis apice subulatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192.

seticulosus. 38. F. teres ramosus sparsim papillosus, ramis basi in vesicam papillosam ampliatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

penicilliformis. 39. F. caule plano firmo alato, foliis amplexicaulibus oppositis ovato-oblongis, vesiculis ad foliorum exortum ternis. *Seb. mus.* 3. *p.* 186. *t.* 98. *f.* 1. *an vere distincta species?*

edulis. 40. F. caule tereti glabro ramoso, ramulis confertis erectis apice bifidis. *Rumpf. amb.* 6. *p.* 181. *t.* 74. *f.* 3. & *t.* 76. A. B. C.

angulatus. 41. F. caule planiusculo, ramis divaricatis dichotomis apice bifidis, verrucis lateralibus axillaribusque sparsis minutis opacis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 112.

viridis. 42. F. stirpe tereti, ramis ramosissimis capillaceis. *Flor. dan. t.* 887. *an hujus tribus?*

rotundus. 43. F. mollis, caule tereti dichotomo, verrucis difformibus caulium ramorumque medio immersis. *S. G. Gm. fuc. p.* 110. *t.* 6. *f.* 3.

furcellatus. 44. F. fronde filiformi dichotoma ramosissima acuminata. *Flor. dan. t.* 419.

fastigiatus. 45. F. fronde filiformi dichotoma ramosissima fastigiata obtusa. *Flor. dan. t.* 393.

lanosus. 46. F. frondibus capillaceis dichotomis ramosissimis scabris.

** globuliferi, *globulis simplicibus per plantam sparsis.*

pseudoceranoides. 47. F. caulibus ramosis infra teretibus, globulis insignibus lateralibus congestis pellucidis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 119. *t.* 7. *f.* 4. *an vere distincta species?*

lichenoides. 48. F. cartilagineus pellucidus albus, caule superne flexuoso ramosissimo, ramulis denticulatis subdichotomis, globulis pellucidis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 120. *t.* 8. *f.* 1. 2.

Bursa pastoris. 49. F. caule superne ramoso, ramis pinnato-ramosis, ramulis denticulatis, extimorum ad apicem squamulis reniformibus alatis sessilibus apice mucronatis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 121. *t.* 8. *f.* 3.

triangularis. 50. F. caule ramisque linearibus triquetris serratis, denticulis trifariam imbricatis patentibus bimucronatis, globulis seriatis sessilibus. *S. G. Gm. fuc. p.* 122. *t.* 8. *f.* 4.

capitatus. 51. F. caule tereti-depresso, ramis teretibus subulatis alternis confertissimis, globulis racemosis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 123.

corymbiferus. 52. F. fronde lineari plana dichotoma elongata nigra, laciniis arrectis alternis distantibus in denticulos exeuntibus, globulis terminalibus creberrimis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 124. *t.* 9.

dentatus. 53. F. membranaceus enervis rubens, fronde subpinnata, laciniis denticulatis creberrime punctatis. *Mant. p.* 135. *Flor. dan. t.* 354.

Pilularia. 54. F. caule plano, ramis alternis, fronde pinnatifida, laciniis lanceolatis serratis mucronatis, globulis solitarii

geminisque sessilibus pedunculatisque. *S. G. Gmelin fuc. p.* 126. *t.* 10. *f.* 2.

hirsutus. 55. F. fronde filiformi tereti dichotoma obtecta undique hirsutie. *Mant. p.* 134. *t.* 11. *f.* 1.

ericoides. 56. F. filiformis ramosissimus hirtus. *S. G. Gm. fuc. t.* 11. *f.* 2.

aculeatus. 57. F. fronde filiformi compressa ramosissima, dentibus marginalibus subulatis alternis erectis. *Flor. dan. t.* 355. β) Fucus muscoides. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 317. *S. G. Gmel. fuc. t.* 12.

lycopodioides. 58. F. fronde filiformi tereti subramosa obtecta undique setis. *Flor. dan. t.* 357.

discors. 59. F. fronde tereti inermi aculeatissima, foliis distichis subpinnatis lineari-lanceolatis serratis.

marginalis. 142. F. subcartilagineus, fronde filiformi tereti compressa ramosissima, margine laterali utroque supra tuberculis umbilicatis obsito. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 153.

musciformis. 143. F. fronde membranacea filiformi ramosissima, ramulis setaceis, marginibus caulis ramorumque ciliatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 154. *t.* 14. *f.* 3.

Tendo. 60. F. fronde filiformi simplici cartilaginea subdiaphana. *Amoen. ac.* 4. *t.* 3. *f.* 2.

Filum. 61. F. fronde filiformi subfragili opaca. *Flor. dan. t.* 821.

longissimus. 62. F. cartilagineus, caule erecto tereti, ramis longissimis, globulis lateralibus sessilibus. *S. G. Gm. fuc. p.* 134. *t.* 13.

scorpioides. 63. F. lividus, caule tereti lignoso, ramis apice capillaribus supra dentatis, dentibus tumidiusculis, recurvatis. *Flor. dan. t.* 887.

confervoides. 64. F. filiformis teres ramosissimus, ramis simplicibus, globulis lateralibus. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 14. *f.* 1.

albus. 65. F. filiformis teretiusculus subdichotomus, geniculis tumidiusculis, ramis distantibus acutis. *Huds. flor. angl. p.* 470. *n.* 20.

purpureus. 66. F. filiformis teres ramosissimus, ramis alternis, ramulis confertis globuliferis. *Huds. flor. angl. p.* 471. *n.* 22.

coralloides. 67. F. caulibus tereti-triquetris, ramis alternis patentibus, ramulis utrinque denticulatis superne dichotomis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 141.

plicatus. 68. F. capillaris uniformis ramosissimus implicatus subdiaphanus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 142. *t.* 14. *f.* 2.

corneus. 69. F. cartilagineus, caule teretiusculo compresso ramosissimo, ramis subpinnatis, laciniis acutis globuliferis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 144. *t.* 14. *f.* 3.

capillaceus. 70. F. cartilagineo-membranaceus, caule teretiusculo, medio complanato, ramis oppositis congestis, foliolis setaceis apice globuliferis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 146. *t.* 15. *f.* 1.

rudis. 71. F. caule tereti ramosissimo, ramulis alternis fasciculatis brevissimis tuberculatis scabris. *S. G. Gmelin fuc. p.* 147. *t.* 15. *f.* 2.

aphyllanthos. 72. F. cartilagineus, caulibus teretibus implexis, setis terminalibus subulatis apice incrassatis vel bifariam divaricatis, globulis ad divaricationem pellucidis. *S. G. Gm. fuc.* 148. *Buxb. cent.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

sericeus. 73. F. caule planiusculo ramoso, ramis superioribus corymbosis, setis tenuissimis creberrimis per paria oppositis. *S. G. Gm. fuc. p.* 149. *t.* 15. *f.* 3.

serra. 74. F. caule cartilagineo simplici prostrato setis subulatis per paria oppositis obsesso. *S. G. Gmel. fuc. p.* 150. *Buxb. cent.* 2. *t.* 8. *f.* 3.

sertularioides. 75. F. cartilagineus, caule erecto depresso tenuissimo ramoso, frondibus setiformibus imbricatis pinnatis, pinnis numerosissimis incurvis integerrimis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 151. *t.* 15. *f.* 4.

plumosus. 76. F. frondibus cartilagineis lanceolatis bipinnatis plumosis, caule filiformi compresso ramoso. *Mant. p.* 134. *Flor. dan. t.* 350.

Osmunda. 77. F. caulibus teretibus ramosissimis, apice obtuso incrassatis globuliferis, frondibus copiosissimis cartilagineis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 155. *t.* 16. *f.* 2.

pinnatifidus. 78. F. frondibus planis ramosis, ramis dentato-pinnatifidis margine callosis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 156. *t.* 16. *f.* 3.

abrotanifolius. 79. F. fronde filiformi compressa bipinnata, apicibus vesiculosis dilatatis terminatis globulis hinc tuberculatis. *S. G. Gmel. fuc. t.* 17. *f.* 1.

cartilagineus. 80. F. fronde cartilaginea compressa supra decomposito-pinnata, laciniis linearibus. *Giseck. pl. ic. fasc.* 1. *t.* 25.
β) Fucus placomium. *S. G. Gmel. fuc. p.* 153. *t.* 16. *f.* 1.

pistillatus. 81. F. cartilagineus, caule depresso ramoso, ramis setiferis, setis subulatis ex opposito pinnatis, apice globuliferis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 159. *t.* 18. *f.* 1.

crinitus. 82. F. cartilagineus, caule plano ramosissimo, ramulis denticulatis, dentibus simplicibus dichotomisque, globulis sparsis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 160. *t.* 18. *f.* 2. *an hujus tribus?*

spinulosus. 83. F. cartilagineus, caule ramosissimo inferne depresso teretiusculo, ramis explanatis patentibus, ramulis suboppositis utrinque pinnatim setiferis, setis subulatis apice incrassatis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 161. *t.* 18. *f.* 3.

vermicularis. 84. F. mollis pellucidus, caulibus teretibus ramosis, frondibus teretibus alternatim subpinnatis petiolatis brevissimis apice tumescentibus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 162. *t.* 18. *f.* 4.

gigantinus. 85. F. fronde cartilaginea filiformi-compressa dichotoma, globulis pedunculatis terminalibus subjacente arista.

spinosus. 86. F. aphyllus cartilagineus ramosus, denticulis verticillatoternis. *Mant. p.* 313. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 15. *f.* 1.

spermophorus. 87. F. fronde membranacea dichotoma compressa capillacea, globulis pedunculatis lateralibus, foliis linearibus multifidis.

papillosus. 88. F. aphyllus, caule tereti ramoso, undique seriebus spiralibus papillarum apice multilobarum. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

cespitosus. 89. F. caule tereti ramoso confertim papilloso, papillis attenuatis simplicibus ramulosis. *Forsk. flor æg. arab. p.* 190.

uvifer. 90. F. teres, ramis sparsis, glandulis confertis ovatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192. *an cum 2 præcedentibus hujus tribus?*

*** penicilliferi, *corpusculis ovatis penicillo terminatis.*

Gærtnera. 91. F. caulibus filiformibus, ramis numerosis trifariam alternis, mediis longissimis, corpusculis penicilliferis ternis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 164. *t.* 19.

Baillouviana. 92. F. caule supra planiusculo ramoso, filamentis penicillorum minutissimis congestis laxis fluitantibus. *Gris. epist. cum ic.*

Bastera. 93. F. caule tenui superne ramoso, corpusculis monospermis ovatis alternis. *Bast. op. subs.* 2. *l.* 3. *p.* 127. *t.* 12. *f.*

**** membranacei, *fronde pellucida colorata, prolibus deciduis.*

volubilis. 94. F. fronde plana spirali perfoliata repando-dentata. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 13. *f.* 2.

sanguineus. 95. F. frondibus membranaceis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, caule tereti ramoso. *Mant. p.* 136. *Flor. dan. t.* 349.

ciliatus. 96. F. frondibus membranaceis lanceolatis proliferis ciliatis. *Mant. p.* 136. *S. G. Gmel. fuc. t.* 20. *f.* 2. *β*) Fucus ciliatus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 176. *t.* 21. *f.* 1.

holosetaceus. 97. F. frondibus membranaceis subpinnato-ramosis enervibus, disco & margine setis simplicibus dichotomisque. *S. G. Gmel. fuc. p.* 177. *t.* 21. *f.* 2.

ligulatus. 98. F. frondibus membranaceis planis enerviis, margine setis longissimis simplicibus dichotomisque ciliato. *S. G. Gmel. fuc. p.* 178. *t.* 21. *f.* 3.

laceratus. 99. F. frondibus membranaceis aveniis glaberrimis margine undulato-ciliatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 179. *t.* 21. *f.* 4.

crispus. 100. F. frondibus membranaceis dichotomis, laciniis dilatatis. *Mant. p.* 134. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 6.

crispatus. 101. F. frondibus membranaceis sublinearibus ramosissimis crispis coloratis. *Flor. dan. t.* 826.

alatus. 102. F. frondibus membranaceis subdichotomis costatis, laciniis alternis decurrentibus bifidis. *Mant. p.* 135. *Flor. dan. t.* 352.

rubens. 103. F. frondibus membranaceis oblongis undulatis sinuatis, stirpe tereti ramosa. *Mant. cent.* 32. *t.* 32. *an idem cum F. Palmetia?*

venosus. 104. F. fronde plana oblonga picta venis verrucosis. *Mant. p.* 312.

vittatus. 105. F. frondibus membranaceis divisis ensiformibus dentato-crispatis. *Flor. dan. t.* 353. *β*) Fucus cornatus. *Mant. p.* 312.

ramentaceus. 106. F. frondibus filiformibus simplicibus, hinc ramentis foliaceis confertis. *Flor. dan. t.* 356.

contortus. 107. F. frondibus planis enervibus apicem versus proliferis ad axillas subcontortis margine denticulatis utrinque subundulatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 181. *t.* 22. *f.* 1.

laciniatus. 108. F. frondibus membranaceis ramosis, ramis dilatatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 181. *t.* 22. *f.* 2.

Palmetta. 109. F. caule plano ramoso, frondibus membranaceis aveniis multifido-palmatis crenatis undulatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 183. *t.* 22. *f.* 3. & *t.* 23.

crenatus. 110. F. caule tereti ramoso, frondibus membranaceis ovatis nervosis crenatis subundulatis pinnato. *S. G. Gmel. fuc. p.* 182. *t.* 24. *f.* 1.

polypodioides. 111. F. caule teretiusculo flexuoso ramoso, foliis membranaceis enervibus alternatim pinnatis obtusis integerrimis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 186. *Mart. cent. t.* 32. *n.* 1.

Koelreuteri. 112. F. membranaceo-cartilagineus, caule brevissimo tereti ramoso, frondibus integris linearibus, adultioribus papillosis. *Koelreut. act. Petrop.* 11. *p.* 424. *t.* 23. *f.* 1. 2.

digitatus. 113. F. fronde palmata, foliolis ensiformibus, stirpe tereti. *Mant. p.* 134. *Flor. dan. t.* 392.

bicornis. 114. F. fronde membranacea pulverulenta dilatata apice bifida. *S. G. Gmel. fuc. p.* 192.

serrulatus. 115. F. caulibus teretibus ramosis, foliis linearibus serrulatis simplicibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 189.

linearis. 116. F. frondibus planis linearibus dichotomis sensim angustioribus apice acutis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

plumaris. 117. F. caule tereti repente sursum ramoso, ramis plumiformibus foliatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

laminosus. 118. F. frondibus planis dichotomis sensim latioribus margine nudis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

foliifer. 119. F. frondibus planis sensim dilatatis dichotomis, extimis verrucosis margine & apice folia lineari-lanceolata integra protrudentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

truncatus. 120. F. frondibus membranaceis trichotomis tetrachotomisque, laciniis truncatis apice crenato-crispis. *Pall. it.* 3. *p.* 760.

glacialis. 121. F. fronde plana lineari dichotomo multifida ramosissima ramentis subtilissimis ciliata. *Pall. it.* 3. *p.* 760.

filicinus. 144. F. fronde coriacea teretiuscula ramosissima ramis in orbem diffusis apicem versus ramoso-frondosis. *Wulff. ap. Jacq. col.* 3. *p.* 157. *t.* 15. *f.* 2.

fruticulosus. 145. F. caule coriaceo tereti filiformi supra decomposito-ramosissimo, ramis subsetaceis alternatim laxe ramulosis, ramulis exiguis subpinnato-denticulatis. *Wulff. ap. Jacq. coll. 3. p. 159. t. 16. f. 1.*

***** radicati, *radice ramosa affixi, bullis frondium mucifluis.*

palmatus. 122. F. fronde palmata plana. *S. G. Gmel. fuc. t. 26.*

buccinalis. 123. F. stirpe fistulosa, fronde pinnato-palmata coriacea, foliolis ensiformibus integerrimis. *Mant. p. 312.*

esculentus. 124. F. fronde simplici indivisa ensiformi, stirpe tetragona pinnata folium percurrente. *Mant. p. 135. Flor. dan. t. 417.*

saccharinus. 125. F. fronde subsimplici ensiformi, stirpe tereti brevissima. *Flor. dan. t. 416.*

bifidus. 126. F. cartilagineus, frondibus subsessilibus planis glabris hinc inde vesiculosis apicem versus angustatis trifidis. *S. G. Gmel. fuc. p. 201. t. 29. f. 2.*

angustifolius. 127. F. frondibus subsessilibus membranaceo-cartilagineis simplicissimis sensim dilatatis apice rotundatis. *S. G. Gmel. fuc. p. 205.*

polyphyllus. 128. F. cartilagineus, caule teretiusculo ad apicem plano utrinque dentato, frondibus sensim dilatatis integris. *S. G. Gmel. fuc. p. 206. t. 31. f. 1.*

Flagellum. 129. F. stirpe simplicissima aphylla coriaceo-cartilaginea. *S. G. Gmelin fuc. p. 208.*

acerosus. 130. F. aphyllus, caulibus teretibus ramosis, ramis distichis confertis, undique setis filiformibus patentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p. 190.*

fragilis. 131. F. caulibus filiformibus dichotomis fragilibus fastigiatis aphyllis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 190.*

debilis. 132. F. caulibus teretibus ramosis subfastigiatis tubulosis debilibus aphyllis, *Forsk. flor. æg. arab. p. 191.*

cuneiformis. 133. F. aphyllus, ramis alternis triquetris articulatis, articulis cuneiformibus, angulis subulatis dentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 191. an hujus generis?*

viscidus. 134. F. caulibus teretibus dichotomis ramosis fastigiatis apicibus bicornibus. *Forsk. flor. æg. arab. p. 192.*

prolifer. 135. F. frondescens viridis, articulis ovatis planis proliferis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192.

hypnoides. 136. F. caule ramulisque vage sparsis filiformibus tereti-compressis cartilagineis pinnatis, pinnis subulatis. *Wulfen ap. Jacq. collect.* 1. *p.* 352.

flavus. 137. F. spongiosus, ramis erectis subquinquangularibus laciniato-dentatis areolatis nitidis. *Suppl. p.* 452. *an hujus tribus?*

pinnatus. 138. F. caule repente ramosissimo, frondibus simplici-pinnatis, pinnis obtusis æqualibus approximatis, peltis verticillatis. *Suppl. p.* 452.

****** Agara, *caule frondi ipsi applicato foraminibus cribri instar pertusæ.*

Agarum. 139. F. caule erecto plano, fronde orbiculata, margine rarius dentato. *S. G. Gmel. fuc. p.* 210. *t.* 32.

Clathrus. 140. F. caule tereti sulcato, fronde orbiculata, margine integerrimo. *S. G. Gmel. fuc. p.* 211. *t.* 33. *an distinctus ab Agaro?*

bracteatus. 141. F. frondibus lato-lanceolatis margine sinuato-proliferis crenatis. *Seb. muf.* 3. *t.* 103. *n.* 1.

1206. ULVA. *Gemmæ* vel *Gongyli* rotundi in membrana diaphana.

pavonia. 1. U. plana reniformis sessilis decussatim striata. *Sp. pl. p.* 1630. Fucus pavonius. *Ellis corall. t.* 33. *f.* C.

squamaria. 2. U. plana reniformis supra longitudinaliter, subtus transversim & concentrice striata. *S. G. Gmel. fuc. p.* 171. *t.* 20. *f.* 1.

montana. 3. U. plana reniformis sessilis aggregata zonata subtus incana. *Swartz nov. pl. gen. & sp. p.* 148.

umbilicalis. 4. U. plana orbicularis sessilis peltata coriacea. *Dill. musc. t.* 8. *f.* 3.

latissima. 5. U. plana oblonga undulata membranacea viridis.

purpurea. 6. U. plana oblonga coriacea purpurascens siccata purpureo-violacea. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 524.

lanceolata. 7. U. plana lanceolata. *Dill. musc. t.* 9. *f.* 5.

reticulata. 8. U. fronde reticulata, ramis linearibus planis varie perforatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 187.

intestinalis. 9. U. tubulosa simplex æqualis. *Dill. musc. t. 9. f. 7.*

Priapus. 10. U. tubulosa simplex intus cellulosa subtus bulbosa. *S. G. Gmel. fuc. p. 231. t. 31. f. 2.*

glandiformis. 11. U. tubulosa simplex glaberrima integerrima utrinque obtusa. *S. G. Gmel. fuc. p. 232.*

lumbricalis. 12. U. tubulosa isthmis intercepta. *Mant. p. 311.*

compressa. 13. U. tubulosa ramosa compressa. *Dill. musc. t. 9. f. 8.*

rugosa. 14. U. tubulosa ramosa rugosa. *Mant. p. 311.*

articulata. 15. U. tubulosa ramosissima articulata, articulis cylindricis, ramis oppositis. *Moris. hist. pl. 3. t. 8. f. 14.*

vermicularis. 16. U tubulosa filiformis subramosa aggregata sursum incrassata, isthmis intercepta candida. *Roth. flor. germ. 1. p. 523.*

confervoides. 17. U. filiformis articulata, articulis alternatim compressis. *Dill. musc. t. 6. f. 39.*

stellata. 18. U. aggregata subsessilis subovata simplicissima, utriculis intercutaneis translucentibus in stellam caudatam digestis. *Wulfen apud Jacq. Coll. 1. p. 351.*

oryziformis. 19. U. articulis vesicularibus congestis cohærentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p. 188.*

moccana. 20. U. vesiculis ovatis compressis, apicis foramine oblongo. *Forsk. flor. æg. arab. p. 188.*

cuneata. 21. U. caule tereti undique imbricato, vesiculis cuneiformibus compressis apice perforatis, limbo dilatato concavo. *Forsk. flor. æg. arab. p. 188.*

labyrinthiformis. 22. U. cellulis labyrinthiformibus prominentiisque clavatis. *Vandell therm. 120. t. 2.*

Linza. 23. U. fronde oblonga bullata. *Flor. dan. t. 889.*

papillosa. 24. U. lanceolato-subulata undique papillis muricata. *S. G. Gmel fuc. t. 6. f. 4.*

Lactuca. 25. U. palmata prolifera membranacea, ramentis inferne angustatis. *Dill. musc. t. 8. f. 1.*

ramosa. 26. U. fronde ramosa plana undulata purpurea. *Hudf. flor. angl. p. 476.*

dichotoma. 27. U. fronde dichotoma viridi. *Hudf. flor. angl. p. 476.*

Sagarum. 28. U. fuſca ſuperne punctis elevatis granulata, ſubtus plana. *S. G. Gmelin fuc.* 228. *Buxb. comm. Petr.* 3. *t.* 14. *f.* 3.

porrifolia. 29. U. fronde tenui lævi dilute viridi plana integra ſurſum anguſtata. *Dill. muſc. p.* 46. *t.* 9. *f.* 5.

calenduli-folia. 30. U. atrovirens ſubſtipitata, ſupra verrucis irregularibus rugoſa. *Dill. muſc. p.* 46. *t.* 9. *n.* 4.

1207. CONFERVA. *Fibræ* ſimplices aut ramoſæ, intra quas *gemmæ* globuloſæ.

* *filamentis ſimplicibus.*

† *æqualibus.*

rivularis. 1. C. filamentis ſimpliciſſimis longiſſimis. *Flor. dan. t.* 881.

fontinalis. 2. C. filamentis ſimpliciſſimis digito brevioribus. *Flor. dan. t.* 651. *f.* 3.

punctalis. 3. C. punctorum ſerie longitudinali. *O. Fr. Müller. nov. act. petrop. p.* 3. *hiſt.* 90. *t.* 1. *f.* 1.

porticalis. 4. C. punctorum lineis transverſis arcuatis. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 90. *t.* 1. *f.* 2. 3.

pectinalis. 5. C. filamentis transverſim confertim ſtriatis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 91. *t.* 1. *f.* 4. 7.

piſcium. 63. C. filamentis imbricatis pellucidis ſubclavatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 553.

Chætophora. 60. C. filamentis e baſi orbiculari parallelis. *O. F. Müller. flor. dan. t.* 660.

lobata. 61. C. graminea filamentis e baſi lobata parallelis. *Schranck Naturf.* 19. *t.* 7. *f.* 2. 3.

lanceolata. 62. C. filamentis e baſi ſimplici lanceolata obtuſa. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 490.

moniliformis. 6. C. filamentis ſerie corpuſculorum ovalium. *O. F. Müller n. act. Stock.* 1783. *p.* 77. *t.* 3. *f.* 1. 5.

† † *filamentis geniculatis.*

fluviatilis. 7. C. filamentis ſimpliciſſimis ſetiformibus rectis, geniculis craſſioribus angulatis. *Dill. muſc. t.* 7. *f.* 47. 48.

filiformis. 8. C. ſimpliciſſima, globulorum glomerulis duobus in quovis articulo longitudinaliter diſpoſitis. *Schranck ap. v. Moll oberd. Beytr.* 1787. *p.* 136. *t.* 2. *f.* 1366.

capillaris. 9. C. articulis alternatim compreſſis. *Dill. muſc. t.* 5. *f.* 25.

jugalis. 10. C. filamentis ſæpe conjugatis globiferis. *Flor. dan. t.* 883.

armillaris. 11. C. articulis tripartitis, diſco roſaceo. *O. F. Müller nov. act. Stock.* 1783. *p.* 80. *t.* 3. *f.* 6. 7.

ſerpentina. 12. C. articulis elongatis æqualibus. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 92. *t.* 1. *f.* 8. 11.

transverſina. 13. C. articulis inæqualibus, faſcia duplici. *O. F. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 93. *t.* 1. *f.* 12.

ſtellina. 14. C. articulis brevibus æqualibus, puncto radiato duplici. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 93. *t.* 2. *f.* 1.

decimina. 15. C. articulis quadruplici notatis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 93. *t.* 2.

quinina. 16. C. articulis æqualibus, lineis in zic zac obliquis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *p.* 94. *t.* 2. *f.* 4. 5.

** *filamentis ramoſis.*

† *æqualibus.*

bulloſa. 17. C. filamentis bullas aëreas includentibus. *Dill. muſc. t.* 3. *f.* 11.

canalicularis. 18. C. filamentis baſin verſus ramoſioribus. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 15.

amphibia. 19. C. filamentis exſiccatione coeuntibus in aculeos. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 15.

littoralis. 20. C. filamentis ramoſiſſimis elongatis ſcabriuſculis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 19.

æruginoſa. 21. C. filamentis mollibus digito brevioribus viridiſſimis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 20.

ſeticuloſa. 22. C. teres viridis, ſetulis ſparſis numeroſis brevibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 188.

plana. 23. C. compreſſa rubro-violacea, ramis diſtichis confertis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 188.

furcata. 24. C. filamentis apice ramoſis, ramis ſubſimplicibus. *Dill. muſc. t.* 2. *f.* 6. β) *Dill. muſc. t.* 3. *f.* 10.

An hujus generis & cujus tribus cohortisve Conferva thermalis Forsk. fl. æg. ar. p. 189.

fœnicula-cea. 25. C. filamentis ramosissimis, ramis ramulisque longissimis sparsis. *Dill. musc. t.* 2. *f.* 8.

rigida. 26. C. filamentis ramosissimis, ramulis brevissimis alternis. *Dill. musc. t.* 4. *f.* 16.

tomentosa. 27. C. filamentis ramosissimis, ramis simplicibus confertis fuscis. *Dill. musc. t.* 3. *f.* 12. 13.

spongiosa. 28. C. ramulis simplicibus imbricatis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 9. *f.* 67.

nigra. 29. C. ramis fasciculatis brevissimis. *Hudʃ. flor. angl. p.* 481.

scoparia. 30. C. filamentis proliferis fastigiatis hirtis. *Dill. musc. t.* 4. *f.* 23.

cancellata. 31. C. filis ramosis, filamentis alternis brevibus multipartitis digitatis. *Dill. mus. t.* 4. *f.* 22.

reticulata. 32. C. filamentis reticulato-coadunatis. *Dill. mus. t.* 4. *f.* 14.

dichotoma. 33. C. filamentis dichotomis. *Dill. musc. t.* 3. *f.* 9.

vesicata. 34. C. filamentis subramosis medio & apice in vesicam productis. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hist. p.* 95. *t.* 2. *f.* 6.

bursata. 35. C. filamentis divaricatis vesicas laterales emittentibus. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hist. p.* 96. *t.* 2. *f.* 10.

saccata. 36. C. filamentis in idem latus pluries divaricatis area globifera alternatim expletis. *O. F. Müller nov. act petrop.* 3. *hist. p.* 96. *t.* 2. *f.* 11.

thermalis. 64. C. filamentis ramosissimis, ramis immersis membranæ ope combinatis. *Schranck flor. bav. p.* 556. *n.* 1594.

infusionum. 65. C. filamentis intricatis, junioribus solitariis ramosis. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 556. *n.* 1595.

† † *filamentis geniculatis.*

gelatinosa. 37. C. filis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis. *Weis crypt. flor. goett. p.* 33. *ic.*

Helminthochorton. 38. C. rufescens filamentis dichotomis, ramis horizontalibus. *Gazette de santé.* 1773. *n.* 5.

corallina. 39. C. filis dichotomis albis, ramulis acutis, geniculis purpureis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 36.

catenata. 40. C. articulis cylindricis. *Dill. musc. t.* 5. *f.* 27.

pellucida. 41. C. filamentis ramosissimis, articulis cylindricis, ramis oppositis. *Hudʃ. flor. angl. p.* 483.

42. C.

sericea. 42. C. filamentis ramosissimis e centro confertissimis elongatis viridibus, ramulis confertis tenuissimis. *Leyss. flor. hal. n.* 1254.

polymorpha. 43. C. ramis fasciculatis. *Flor. dan. t.* 395.

flexuosa. 44. C. filamentis flexuosis, ramis intricatis pinnatis, exterioribus longissimis simplicibus. *Flor. dan. t.* 882.

fulva. 45. C. ramis ramulisque brevissimis alternis. *Hudf. flor. angl. p.* 484.

plicata. 46. C. filamentis ramosissimis implexis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 19.

vagabunda. 47. C. filamentis flexuosis, ramis ramulisque brevioribus. *Dill. musc. t.* 5. *f.* 32.

glomerata. 48. C. ramulis brevioribus multifidis. *Flor. dan. t.* 651. *f.* 2.

trichodes. 49. C. ramis fasciculatis confertis viridibus. *Dill. musc. t.* 5. *f.* 33.

fucoides. 50. C. filamentis ramosissimis, ramulis multifidis fasciculatisque. *Hudf. flor. angl. p.* 485.

fusca. 51. C. filamentis ramosissimis, ramulis alternis simplicibus. *Hudf. flor. angl. p.* 486.

rupestris. 52. C. filamentis ramosissimis viridibus. *Dill. musc. t.* 5. *f.* 29.

elongata. 53. C. filamentis ramosissimis, ramulis longissimis distantibus acutis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 38.

pennata. 54. C. ramis duplicato-pinnatis fuscis. *Hudf. flor. angl. p.* 486.

Ægagropila. 55. C. filamentis ramosissimis e centro confertissimis globum constituentibus.

corallinoides. 56. C. filamentis dichotomis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 37. β) *Dill. musc. t.* 5. *f.* 36.

tubulosa. 57. C. articulis alternatim compressis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 39.

parasitica. 58. C. filis pinnatis. *Hudf. flor. angl. p.* 486.

catenulata. 59. C. articulis linearibus apice nodosis, medio nigropunctatis. *Dill. musc. t.* 7. *f.* 48.

1208. BYSSUS. *Fibræ* simplices uniformes lanuginosæ.

septica. 1. B. capillacea mollissima parallela fragilissima pallida. *An agarici varietas aut rudimentum?*

Flos aquæ. 2. B. filamentis plumofis natantibus. β) *Dill. mufc. t. 1. f. 1.*

cancellata. 3. B. filis exacte undique cancellata. *Lederm. microfc. t. 72.*

phofphorea. 4. B. lanuginofa violacea lignis adnafcens. *Dill. mufc. t. 1. f. 6.*

velutina. 5. B. capillacea viridis, filamentis ramofis. *Dill. mufc. t. 1. f. 14.*

petræa. 6. B. capillacea atra, filamentis ramofis breviffimis erectis denfiffime ftipatis, panno holofericeo fimilis. *Wulfen Schr. berl. Naturf. 8. p. 101.*

fanguinea. 7. B. capillacea velutina perennis coccinea, cortici adnafcens. *Swarts nov. pl. gen. & fp. p. 148.*

aurea. 8. B. capillacea pulverulenta, gemmis fparfis, filamentis fimplicibus ramofisque. *Flor. dan. t. 718. f. 1.*

coriacea. 9. B. perennis denfiffima albicans. *Schreb. fpic. flor. lipf. p. 144.*

alutofa. 10. B. alba membranacea tenera alutæ fimilis. *Falck. it. 2. p. 279.*

nigra. 11. B. filamentis ramofis rigidis atris, faxis adnafcens. *Hudf. flor. angl. p. 487.*

fulva. 12. B. filamentis ramofis fulvis. *Dill. mufc. t. 1. f. 17.*

barbata. 13. B. filamentis erectiufculis, fummitatibus ramofis fubfaftigiatis fulvis. *Dill. mufc. t. 1. f. 19.*

candida. 14. B. filamentis ramofiffimis, ramis faftigiatis albidis. *Dill. mufc. t. 1. f. 15. an hydni potius fpecies?*

bombycina. 15. B. lanuginofa albiffima, filamentis longioribus implexis, lignis adnafcens. *Willden. prodr. flor. berol. n. 1081.*

atra. 16. B. filamentofo-pulverulenta atra. *Wiggers prim. fl. holf. p. 92.*

cryptarum. 17. B. capillacea perennis cinerea tenax rupi innata.

radiciformis. 18. B. nivea tenerrima, filamentis ramofis pendulis, globis floccofis hinc inde adhærentibus. *Lesk. it. 1. p. 92.*

globofa. 19. B. alba, filamentis in globum glomeratis. *Lesk. it. 1. p. 92. t. 3. Scop. diff. hift. nat. 1. p. 84.*

aquatica. 20. B. hyalina, filamentis fimplicibus apice clavatis. *Flor. dan. t. 896.*

conoidea. 21. B. capitulis conico-acuminatis, ftipite fetaceo. *Flor. dan. t. 897. n. 2. an hujus generis?*

Flos cobalti. 22. B. capillacea perennis rosea, filamentis tenerrimis, sericei panni instar arcte intertextis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 175. *t.* 12. *f.* 1.

tremelloides. 23. B. ex luteo fuscescens gelatinosa, fibris intricatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 552. *n.* 1585.

FUNGI.

1209. AGARICUS. *Fungus* subtus lamellosus.

* *stipitati.*

† validi, *pileo pleno, stipite valido.*

‡ *stipite volva & annulo cincto.*

cæsareus. 1. A. pileo convexo aureo, carne ochroleuca, lamellis medio latioribus, minoribus mediis brevissimis. *Bulliard herb. Franc. t.* 120.

muscarius. 2. A. pileo sanguineo, verrucis lamellis stipiteque albis, hoc basi globoso. *Kern. Schwaemm. t.* 33. β) *Schæff. fung. t.* 28. γ) *Balt. fung.* 1. 27. *t.* 27.

margaritiferus. 3. A. pileo pallescente verrucis carneis tuberculisque albidis aspero, lamellis albis. *Bulliard herb. Franc. t.* 316. β) *Schæff. fung. t.* 261.

maculatus. 4. A. pileo badio lividove, margine verrucis albis inæquali, lamellis albidis brevibus latis. *Schæff. fung. t.* 90. *Bull. herb. Franc.* 2. Agaricus phalloides.

Mappa. 5. A. pileo convexo ex flavescenti cinerascente, lamellis alternatim longioribus stipiteque flavescentibus. *Schæff. fung. t.* 20.

solitarius. 6. A. pileo convexo, medio parumper concavo verrucis squamisve convolutis inæquali, lamellis liberis. *Bulliard. herb. Franc. t.* 48. β) Agaricus verrucosus. *Bolton* II. 47. *t.* 47.

subgracilis. 7. A. pileo hemisphærico glabro canescente, lamellis albis, stipite fistuloso. *Batsch el. fung.* 59.

vernus. 8. A. totus albus, pileo plano humidiusculo, medio impresso, stipite farcto basi bulboso, lamellis numerosis divisis. *Bulliard herb. Franc. t.* 108. β) *Bolton fung.* 2. *t.* 48.

‡ ‡ *stipite volva cincto, annullo nullo.*

giganteus. 9. A. albus pileo subsquamoso, lamellis crassis, stipite crasso cylindrico. *Batsch el. fung.* 51.

plumbeus. 10. A. pileo medio fuſceſcente marginem verſus livido ſtriato, lamellis duplici ordine poſitis albidis poſterius obtuſis ſublividis, ſtipite fiſtuloſo baſi bulboſo. *Schæff. fung. t.* 85. 86. *β*) *Schæff. fung. t.* 257. *γ*) *Schæff. fung. t.* 244. *δ*) *Bull. herb. Franc. t.* 512. *ε*) *Bolton fung.* II. 49. *t.* 49.

badius. 11. A. pileo ex caſtaneo fulvo, margine plicato, lamellis flaveſcentibus integris æqualibus, ſtipite thalaſſino ſubæquali baſi bulboſo. *Schæff. t.* 245.

fulvus. 12. A. pileo fulveſcente medio ſubmaculato marginem verſus plicato, lamellis ochroleucis inæqualibus, ſtipite elongato albo fuſco-floccoſo baſi bulboſo. *Schæff. fung. t.* 95.

denudatus. 13. A. pileo convexo cucullo ex luteo fuſco obvoluto, margine nudo vireſcente fibroſo, ſtipite albido farcto baſi bulboſo. *Schæff. fung. t.* 98.

griſeo-albus. 14. A. pileo caneſcente impellucido lucido, marginis plicis acute carinatis, carina fuliginoſo-pulverulenta, lamellis confertis inæqualibus ſtipiteque farcto pulverulentis albidis. *Batſch. el fung. cent. p.* 85.

nævius. 15. A. pileo convexo albo ambino-radiato, lamellis inæqualibus cinnamomeis poſterius liberis, ſtipite cinereo deorſum incraſſato. *Bulliard herb. Franc. t.* 264.

trilobus. 16. A. pileo glabro fulvo, margine ſtriato, lamellis dilute cinnamomeis æqualibus antrorſum dilatatis obtuſis ſimplici ordine poſitis, ſtipite flavicante baſi tuberoſo. *Bolton fung. p.* 38. *t.* 38.

lucens. 395. A. luteſcens, pileo ſupra lucido ſubtus fuſco. *Bulliard herb. Franc. t.* 431. *f.* 1.

helvolus. 396. A. helvolus, ſtipite exalbido. *Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 5. *β*) *Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 4.

præaltus. 17. A. pileo hemiſphærico, junioris tomentoſo, ſtipite quadruplo longiore gracili cinereo, lamellis ferreis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 189. *t.* 81. *f.* 3.

vaginatus. 18. A. albus, pileo plano, medio papilloſo, margine ſtriato, lamellis diviſis apice acutis, ſtipite fiſtuloſo bulboſo, baſi latente. *Bull. herb. Franc. t.* 98. *an ſatis diſtinctus a plumbeo?*

minor. 19. A. pileo ex cervino cæruleſcente tela araneoſa obvoluto, lamellis rarioribus latis cinnamomeis ſtipiti farcto contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 330. *β*) *Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 2. 3.

† † † *stipite annulato, volva nulla.*

procerus. 20. A. pileo medio papilloso, centro frustulis transversis seriatis, disco floccis sparsis atris vario, stipite concolore squamoso elongato basi bulboso, colore lamellisque albis. *Flor. dan. t.* 772.

bulbosus. 21. A. pileo glaberrimo integerrimo carneo niveo, stipite lineari concolore, basi semiovata supra truncata, lamellis pallidissime flaventibus stipiti contiguis. *Schæff. fung. t.* 241.

pistillaris. 22. A. pileo spadiceo-flavente, margine undulato-plicato, stipite concolore clavato farcto, lamellis dilute lateritiis confertis. *Batsch el.* 55. *β*) Agaricus putridus. *Scop. flor. carn.* 2. *n.* 1468.

obscurus. 23. A. pileo convexo obscure castaneo piloso-squamoso, lamellis latis duplici serie digestis, stipite æquali fusco, annulo albo. *Schæff. fung. t.* 74.

excoriatus. 24. A. pileo convexo ex lateritio dilute cinereo, disco tela dilute carnea tecto, lamellis inæqualibus stipiteque fistuloso basi bulboso albidis. *Schæff. fung. t.* 18. 19.

campestris. 25. A. pileo convexo canescente, maculis piloso-squamosis, lamellis inæqualibus introrsum rotundatis (adulti) rufescentibus, stipite albido recti. *Bull. herb. Franc. t.* 134. *β*) *Bolton fung.* 2. *t.* 45. *γ*) *Schæff. fung. t.* 310. 311.

pratensis. 26. A. pileo convexo albido vel ex thalassino dilute cinereo striato, lamellis sordide carneis, stipite crasso albido, basi inflexa fuscescente. *Schæff. fung. t.* 96.

laceratus. 27. A. pileo ex carneo fuscescente maculis squamosis medio majoribus vario, margine lacero, lamellis sordide carneis, stipite fuscescente fistuloso. *Schæff. fung. t.* 242.

nitens. 28. A. pileo convexo flavescente nitido, lamellis atris nigro-punctatis divisis, stipite farcto basi tuberoso. *Bull. herb. Franc. t.* 84. *β*) *Schæff. fung. t.* 210.

radicosus. 29. A. pileo convexo fusco albo-maculato, lamellis numerosis subserratis umbrinis, stipite squamoso, radice fusiformi fibrillosa. *Bull. herb. Franc. t.* 160.

squamosus. 30. A. pileo convexo umbonato fulvo squamis erectis aspero, margine undulato, lamellis ligneis triplici ordine digestis, stipite infra annulum squamoso. *Bull. herb. Franc. t.* 266. *nonne idem cum floccoso?*

floccosus. 31. A. pileo convexo piloso-squamoso lamellis flavicantibus, stipite farcto annuloque squamosis. *Schæff. fung. t.* 61. *Batsch el. fung. t.* 38. Agaricus flammeus. β) Agaricus pilosus. *Schæff. fung. t.* 80. γ) *Schæff. fung. t.* 409. δ) Agaricus amanitea. *Batsch el. fung. cent.* 1. 109. *f.* 113. ε) Agaricus cæsius. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 113. *f.* 114. ζ) Agaricus Pallor. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 115. *f.* 115.

imbricatus. 32. A. pileo pallide sulphureo sericeo-unctuoso fasciculis sericeis obducto, lamellis quintuplici serie digestis ex flavo subolivaceis, stipite elongato superne pallido inferne ferrugineo. *Batsch el. fung.* 149.

villosus. 33. A. pileo fulvo-villoso, lamellis confertis triplici ordine digestis dilute cinereis, cortica alba, stipite fragili sordide albo ascendente. *Bolt. fung. p.* 42. *t.* 42.

vitellinus. 351. A. totus sulphureus, pileo conico fasciculatim tomentoso margine undulato, lamellis liberis lanceolatis in unam seriem digestis, stipite glabro deorsum crassiori. *Bolton fung.* 2. *t.* 50.

mutabilis. 34. A. pileo glabro fusco-ochraceo, lamellis dilute fuscis, stipite pallidiori lineari superne squarroso, inferne lævi albo. *Schæff. fung. t.* 9.

durus. 364. A. pileo convexo lutescente, lamellis numerosis pallidis triplicis ordinis, stipite fragili velo fugaci. *Bolton fung.* 2. *t.* 67. *f.* 1.

orichalceus. 370. A. bulbosus stipite flavente, pileo livido ex flavente pallidissime virente, disco lamellisque elongatis ferrugineis. *Batsch el. fung. cent* 2. *p.* 1. *t.* 31. *f.* 184.

olivascens. 371. A. bulbosus lividus ex cinereo olivascens, pileo subviscido umbonato, stipite magis cinerascente, lamellis dilatatis annuloque brunneis. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 3. *t.* 31. *f.* 185.

ferruginascens. 372. A. bulbosus, pileo pulvinato crasso glabro ex albido subferrugineo, stipite sericeo-fibroso albo, annulo ex ferrugineo brunneo, laminis angustis ochraceis margine subfuscis. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 9. *t.* 32. *f.* 187.

subantiquatus. 383. A. pileo brunneo maculato, disco brunneo, stipite lævi elongato, lamellis ordine triplici. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 59. *t.* 37. *f.* 205.

arcuatus. 394. A. lamellis arcuatis. *Bull. herb. Franc. t.* 443. *an distincta species?*

† † † † *stipite annulo volvaque destituto.*

virgineus. 35. A. niveus, lamellis arcuatim per stipitem cylindricum farctum decurrentibus. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 15. *f.* 1. *Schæff fung. t.* 39. 232. *Batsch el. fung. cent.* 2. *f.* 200. β) Agaricus eburneus. *Bulliard herb. Franc. t.* 118. γ) Agaricus denticulatus. *Bolton fung.* 4. *t.* 4. δ) *Schæff. fung. t.* 307.

integer. 36. A. solitarius, pileo viscido purpureo, lamellis albis integris æqualibus. *Bolton fung.* 1. *t.* 1.

Russula. 37. A. fragrans dulcis solitarius, pileo rubro, carne albida tenera firma, lamellis crassis æqualibus rigidis. *Krapf œsterr. Schw.* 1. *t.* 1. *f.* 1-7. & *t.* 2. *f.* 4-6. β) *Schæff. fung. t.* 75. γ) *Krapf. œsterr. Schw.* 1. *t.* 4. *f.* 1-4. 7. & *t.* 5. *f.* 1. 2.

emeticus. 38. A. acris graveolens solitarius, pileo sanguineo, lamellis æqualibus crassis fragilibus apice bifurcis stipiti farcto tereti intus albo continuis. *Schæff. fung. t.* 15. 16. 254.

cyanoxanthus. 39. A. pileo pallido vel subrubello, margine cærulescente, lamellis æqualibus albidis crassis, stipite farcto brevi terete. *Krapf œsterr. Schw. t.* 6. *f.* 1-6. *t.* 7. *f.* 1-7. & *t.* 8. *f.* 1. 2. 4. 7.

xerampelinus. 40. A. pileo carnoso punctato obsolete purpureo, lamellis crassis flavis, stipite elongato tereti farcto albido purpurascente-obumbrato. *Schæff. fung. t.* 214. 215. β) Agaricus olivaceus. *Schæff. fung. t.* 204.

virescens. 41. A. pileo vario luridove viscido, lamellis albidis æqualibus, stipite tereti farcto. *Krapf. œsterr. Schw. t.* 9. *f.* 6-7 & *t.* 10. *f.* 1. 2. 3. 7.

glutinosus. 42. A. pileo viscido nitente ochroleuco exsiccatione nigrescente, lamellis concoloribus crassis ramosis æqualibus, stipite tereti farcto incurvo basi incrassato. *Krapf. œsterr. Schw. t.* 11. *f.* 1-7.

violaceus. 43. A. pileo convexo aspero punctato, margine violaceo, lamellis dilute badiis margine purpurascentibus, stipite cærulescente crasso basi bulboso. *Kern. Schw. t.* 1. *f.* 1. β) Agaricus cærulescens. *Schæff. fung. t.* 34. γ) Agaricus amethystinus. *Schæff. fung. t.* 56. δ) Agaricus glaucopus. *Schæff. fung. t.* 53.

araneofus. 44. A. pileo fpadiceo, margine filis araneofis fimbriato, lamellis latis pofterius divifis ftipiti albido brevi craffo concoloribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 96.

ventricofus. 45. A. pileo convexo lævi croceo badioque, lamellis dilute fulphureis decurrentibus, brevioribus interfitis, ftipite brevi ventricofo ochroleuco laterali. *Schæff. fung. t.* 71. 72. *an mera araneofi varietas?*

armeniacus. 46. A. pileo caftaneo-ferrugineo, ftipite albido farcto bafi incraffato, lamellis rubentibus. *Schæff. fung. t.* 81.

fericeus. 47. A. pileo luteo maculis obfoletis fquamofo, ftipite brevi bafi bulbofo fulphureo, lamellis concoloribus. *Schæff. fung. t.* 24.

varius. 48. A. pileo fpadiceo, lamellis flexofis purpurafcentibus margine flavefcentibus, ftipite tereti farcto albido, inferne fpadiceo incraffato. *Schæff. fung. t.* 42. 54.

rutilus. 49. A. pileo aurantio umbonato, lamellis flavis, ftipite tereti farcto flavicante, fuperne purpurafcente. *Schæff. fung. t.* 219.

croceus. 352. A. luteus, ftipitis parte inferiori pileoque conico villofis, lamellis numerofis denfis ftipitisque parte fuperiori albis. *Bolton fung.* 2. *t.* 51. *f.* 2.

fulvidus. 357. A. fulvus, pileo convexo glabro, lamellis remotis craffis triplici ferie decurrentibus, ftipite dilutiori. *Bolton fung.* 2. *t.* 56.

Georgii. A. pileo flavo convexo, lamellis albis. *Sterb. fung. t.* 11. *f.* 3.

clypeatus. A. pileo hemifphærico acuminato vifcido, lamellis ftipiteque elongato cylindrico albis.

fragilis. A. pileo convexo vifcido pellucido lamellisque luteis. *Vaill. fl. parif. t.* 11. *f.* 16-18.

gilvus. 50. A. pileo lutefcente, lamellis craffis ochroleucis, ftipite albo tereti inferne incraffato. *Schæff. fung. t.* 221. *an aurantii varietas?*

truncatus. 51. A. pileo obfcure lateritio, lamellis rubellis vel fordide albis, ftipite brevi craffo farcto albido inferne fufcefcente. *Schæff. fung. t.* 251.

punctatus. 52. A. pileo granulato aurantio margine flavo, difco conico, lamellis flavis bafi aurantiis, ftipite elongato tereti farcto flavo. *Schæff. fung. t.* 21.

vaccinus. 53. A. pileo vaccino obscurius maculato, stipite concolore tereti inferne incrassato, lamellis dilute fuscis. *Schæff. fung. t.* 25. *An hujus cohortis? stipes fistulosus annulatus.*

luteus. 54. A pileo granulato aureo, disco spadiceo obumbrato, lamellis stipiteque tereti farcto basi tuberoso flavicantibus. *Schæff. fung. t.* 41.

ferrugineus. 55. A. pileo ferrugineo-fusco fibroso-striato, lamellis fuscescentibus, stipite tereti farcto inferne incrassato. *Schæff. fung. t.* 37.

striatus. 56. A. pileo castaneo, margine dilutius striato, stipite tereti crasso brevi farcto albido. *Schæff. fung. t.* 38.

ceraneus. 57. A. pileo punctato pallide lateritio, lamellis olivaceis, stipite tereti longitudinaliter striato fistuloso albo. *Schæff. fung. t.* 40.

mollis. 58. A. pileo campanulato albente-croceo, carne molli, pileo elongato subconcolore glauco. *Batsch el. fung.* 45. *f.* 15. *Bull. herb. Franc.* 1. *t.* 400.

Rudolphi. 59. A. gregarius, pileo ovali-conico obtuso scabro ferrugineo, stipite flexuoso sulphureo, inferne opaco fusco. *Batsch el. fung.* 45. *f.* 23.

subgranulatus. 60. A. pileo sicco aspero fusco crasso, margine attenuato revoluto, lamellis concoloribus sinuatis, stipite pallidiore striato fistuloso basi bulboso. *Batsch el. fung.* 45. *f.* 22.

adhærens. 61. A. pileo atro glutinoso, lamellis sordidis ramosis subdecurrentibus, stipite farcto tereti albido. *Schæff. fung. t.* 36. β) *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 43. *t.* 35. *f.* 200.

terreus. 62. A. pileo umbrino maculis pilosis fuscescentibus vario, lamellis stipiteque tereti farcto inferne incrassato albis. *Schæff. fung. t.* 64. β) Agaricus luridus. *Schæff. fung. t.* 69. γ) Agaricus multiformis. *Schæff. fung. t.* 14.

mitratus. 63. A. pileo sulphureo-ferrugineo maculis pilosis parvis confertis adsperso, lamellis fulvo-violaceis, stipite squamoso fistuloso flavescente. *Schæff. fung. t.* 84.

undulatus. 64. A. pileo obtuse conico cano maculis obscurioribus inæqualibus angulosis transversim seriatis vario, lamellis sordide albis, stipite tereti brevi albido basi bulboso. *Schæff. fung. t.* 89.

spadiceus. 65. A. pileo viscido depresso spadiceo, lamellis fuscis difformibus, extimis minimis, stipite cano clavato sericeo-fibroso. *Batsch el. fung.* 49. *f.* 16.

ochraceus. 66. A. pileo ochraceo nitente ſubcampanulato, ſtipite concolore ſubclavato ſericeo-fibroſo, lamellis ferrugineo-fuſcis anguſtis. *Batſch el. fung.* 51.

faſtigiatus. 67. A. pileo conico umbonato luteo longitudinaliter ſtriato, lamellis fuſceſcentibus, ſtipite tereti farcto elongato lineari flaveſcente. *Schæff. fung. t.* 26. *β*) Agaricus conicus. *Schæff. fung. t.* 2.

latus. 68. A. pileo convexo marino fuſcove ſicco, lamellis numeroſis latiſſimis teneris triplici ſerie diſpoſitis, ſtipite tereti recto farcto ſordide albo. *Bolton fung.* 2. *t.* 2.

pompoſus. 69. A. pileo rotundo coccineo, lamellis numeroſis anguſtis teneris olivaceis triplici ſerie diſpoſitis, ſine acuminato ſtipiti flavicanti inferne fuſco anguſtiori contiguis. *Bolton fung.* 5. *t.* 5. *β*) Agaricus aureus. *Bulliard herb. Franc. t.* 92. *an diſtinctus ſatis a lateritio Schæff.?*

cæruleſcens. 70. A. pileo hemiſphærico ſicco aſpero cæſio, lamellis craſſis albis ſerie triplici diſpoſitis, ſtipiti ſubconcolori recto tereti contiguis. *Bolton fung.* 12. *t.* 12.

cinnamomeus. 71. A. tenax pileo ſicco lævi rufo, lamellis teneris coriaceis dilute cinnamomeis triplici ordine diſpoſitis, ſtipite luteo inferne anguſtato compreſſo fibroſo. *Schæff. fung. t.* 4. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 158. *n.* 117. *t.* 117.

elephantinus. 72. A. pileo craſſo hemiſphærico ſubluteo viſcido, lamellis diſtantibus craſſis latis cereis triplici ſerie digeſtis, ſtipite albo craſſo ſpongioſo baſi fibrilloſo. *Bolt. fung.* 28. *t.* 28.

politus. 73. A. pileo convexo thalaſſino lævigato, lamellis numeroſis latiuſculis ferrugineis flexilibus duplici ordine poſitis, ſtipite brevi farcto terete fuſco. *Bolton fung.* 30. *t.* 30. *vix diſtinctus a Beryllo.*

molliſſimus. 74. A. pileo pulvinato, molli murino, lamellis anguſtis teneris albidis inæqualibus triplici ordine diſpoſitis, ſtipite bulboſo craſſo ſpongioſo. *Bolton fung.* 40. *t.* 40.

Offa. 75. A. pileo convexo lubrice humido fuſco pellucido, margine undulato, lamellis concoloribus poſterius rotundatis liberis, ſtipite tomentoſo farcto terete. *Bulliard herb. Franc. t.* 308.

turbinatus. 76. A. pileo flavicante convexo, lamellis numeroſis diviſis dilute ligneis, ſtipite craſſo inferne bulboſo undulato. *Bull. herb. Franc. t.* 110.

lycoperdo-noides. 77. A. pulverulentus, pileo rotundo crasso flavescente, lamellis brevibus ex atro flavis, stipite terete brevi. *Bulliard herb. Franc. t.* 167.

contiguus. 78. A. pileo convexo luteo tomentoso, margine involuto, lamellis boleti poros mentientibus, stipitique brevi crasso concoloribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 240. *vix distinctus ab involuto.*

involutus. 79. A. pileo lævi subviscido fibroso spadiceo fusco convexo, disco depresso, margine involuto, lamellis angustis crassiusculis densis ramosis flavescentibus, stipiti concolori lævi venoso contiguis. *Batsch el. fung. cent.* 39. *f.* 61. *Schæff. fung. t.* 72. β) Agaricus subinvolutus. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 57. *t.* 37. *f.* 204. γ) Agaricus ascendens. *Bolt. fung.* 11. *t.* 55.

libertatis. 80. A. pileo obscuro fuscescente umbonato parvo, margine canescente involuto, lamellis canis semipellucidis angustis inæqualibus arcuatis integris bifidisque, stipite elongato cano solido bulboso. *Batsch el. fung. cent.* 43. *f.* 62. β) Agaricus peltigerus. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 17. *t.* 32. *f.* 190. γ) Agaricus Clavus. *Batsch ib. p.* 41. *t.* 35. *f.* 199.

pileatus. 81. A. pileo opaco sicco ferrugineo cano-tomentoso umbonato parvo, lamellis angustis crassis confertis, paucioribus bifidis cum stipite elongato fistuloso bulboso flavescentibus. *Batsch el. fung. cent.* 47. *f.* 63.

nivosus. 82. A. niveus, pileo parvo convexo, margine stipiteque crasso elongato solido furfuraceo-pruinosis, lamellis angustis confertis stipiti continuis, brevioribus intermistis. *Botsch el. fung. cent.* 49. *f.* 64.

nimbatus. 83. A. pileo humescente glabro cano fusco obumbrato, limbo albo, lamellis latis triplicis longitudinis albis stipiti concolori furfuraceo contiguis. *Batsch el. fung. cent.* 50 *f.* 65.

pusillus. 84. A. pileo glabro subconico cano medio fusco obumbrato margine intusque albo, lamellis latis truncatis albidis, stipite subfuraceo cano-cærulescente intus atro. *Batsch el. fung. cent.* 51. *f.* 66. *an vere distincta species?*

tuberosus. 85. A. albidus, pileo convexo margine subplicato, lamellis (junioris) decurrentibus, stipite tenui farcto tomentoso infra bulboso. *Bull. herb. Franc. t.* 256.

crassipes. 86. A. pileo fusco sicco convexo, margine involuto, stipite concolore fusiformi, lamellis dilute fuscis divisis. *Schæff. fung. t.* 87.

corallinus. 87. A. pileo lævi fuſceſcente convexo parvo, lamellis diſtantibus minutis ſubdecurrentibus, ſtipite medio craſſiori. *Scop. diſſ. hiſt. nat.* 1. *p.* 109. *t.* 9. *f.* F.

fuſipes. 88. A. pileo dilute umbrino rimoſo, margine undulato, lamellis concoloribus rarioribus truncatis, ſtipite deorſum attenuato. *Schæff. fung. t.* 87. (*fig. ſup.*) 88. 260.
β) Agaricus luxurians. *Batſch el. fung.* 28. *p.* 49.

longipes. 89. A. pileo conico fuliginoſo, ſtipite concolore ſtriato farcto deorſum turgido infra terram denuo attenuato, lamellis latis inæqualibus cano-fuliginoſis. *Bulliard herb. Franc.* t. 232. *an vere diſtinctus a clypeato?*

œdematoſus. 90. A. pileo ſubconico hepatico pulverulento, lamellis anguſtis ſubdecurrentibus ſtipiteque farcto carnoſo medio craſſiore rufeſcentibus. *Schæff. fung. t.* 259.

rigidus. 91. A. pileo craſſo hepatico, (ſeneſcentis) margine rimoſo, lamellis anguſtis rigidis fragilibus duplici ſerie poſitis flaveſcentibus, ſtipite elongato inæquali fuſco griſeo. *Bolton fung.* 43. *t.* 43.

laricinus. 92. A. pileo convexo anguſto fulvo, lamellis anguſtis craſſis albis duplici ſerie poſitis, ſtipite fuſco ramoſo craſſo ſpongioſo. *Bolton fung.* 19. *t.* 19.

faſciatus. 93. A. pileo ſubconico ſpadiceo, lamellis paucioribus parvis brevibus purpuraſcentibus, ſtipite anguſto terete farcto fuſceſcente faſciato *Schæff. fung. t.* 223.

rufeſcens. 94. A. rufeſcens, pileo ſtriato, centro excavato, lamellis decurrentibus, ſtipite tereti. *Schæff. fung. t.* 55.

hepaticus. 95. A. pileo convexo lævi ſicco, margine involuto lamellisque carneo-ſpadiceis, ſtipite pallidiori ſicco opaco lineari inæquali. *Batſch el. fung.* 43.

flavidus. 96. A. pileo ochroleuco, lamellis albidis, ſtipite tereti flexuoſo inferne craſſiori fuſceſcente ſuperne flaveſcente. *Schæff. fung. t.* 35.

tuberculoſus. 97. A. pileo convexo vitellino, margine tuberculato ſtriato, ſtipite lineari breviuſculo ſtriato concolore ſuperne albo, lamellis latis brevibus inæqualibus ſulphureis. *Schæff. fung. t.* 79.

leoninus. 98. A. pileo umbonato luteo, margine ſtriato, lamellis brevibus latis inæqualibus carneis, ſtipite elongato tenui farcto flaveſcente flexuoſo ſtriato. *Schæff. fung. t.* 48.

fascicularis. 99. A. pileo luteo, lamellis cinereis margine flavicantibus, stipite flavo lineari elongato. *Schæff. fung. t.* 49. 35. *Batsch el. fung.* 83. *t.* 29.

pallidus. 100. A. ochroleucus, pileo convexo, lamellis congestis divisis, stipite brevi farcto tereti. *Schæff. fung. t.* 50.

incertus. 101. A. sparsim squamulosus, pileo badio, lamellis lutescentibus, stipite elongato subclavato flavescente deorsum fuscescente. *Schæff. fung. t.* 62.

viscosus. 102. A. pileo lævi coriaceo viscido convexo pallide ochraceo, lamellis concoloribus distantibus margine inferiori sinuatis superiori undulatis triplicis longitudinis, stipite solido. *Batsch el. fung. cent.* 63. *f.* 70.

umbrinus. 103. A. pileo humescente ochraceo-albo, margine pellucido tenui, lamellis concoloribus latissimis decurrentibus, minoribus interstitis, stipite brevi crasso farcto. *Batsch el. fung. cent.* 65. *f.* 71.

risigallinus. 104. A. pileo lævi lato deformi tenui ochraceo-lutescente, lamellis latiusculis oblongis integris lutescente-carneis flexuosis, stipite brevi opaco albo. *Batsch el. fung. cent.* 67. *f.* 72.

defossus. 105. A. pileo lævi rigido pulvinato, lamellis subæqualibus canescenti-cærulescentibus, stipite sericeo-fibroso basi bulboso. *Batsch el fung. cent.* 69. *f.* 73.

subpurpurascens. 106. A. pileo lævi subviscido pulvinato cinereo-fuscescente, lamellis latis triplicis ordinis furfureque a velo superstite ferrugineis, stipite sericeo-fibroso lilacino basi bulboso. *Batsh el. fung. cent.* 73. *f.* 74.

subannulatus. 107. A. pileo pallide fusco lævigato venoso pulvinato, lamellis angustis oblongis utrinque obtusis teneris confertis rubellis, minoribus interstitis, stipite lævi basi bulboso flavente supra annulum spurium albo. *Batsch el. fung. cent.* 75. *f.* 75.

impuber. 108. A. siccus, pileo carneo-fulvo lanato squamis lanatis mollibus obsesso margine repando, stipite pallidiore fistuloso, lamellis subcarneis. *Batsch el. fung.* 155. *f.* 116.

squamulosus. 109. A. siccus, pileo obscure flavo squamulis villosis brunneis appressis tenerrimis densissime obsito, lamellis latis extrorsum angustatis lutescente-ferrugineis triplici ordine digestis, stipite flavescente sericeo-fibroso. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 19. *t.* 33. *f.* 190.

subferrugineus. 373. A. bulbosus fibrosus, lividus ex brunneo canus, stipite crasso, laminis laxis ferrugineis ordine triplici. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 7. *t.* 31. *f.* 186.

elatior. 374. A. pileo angusto ex ochraceo carneo, stipite albo elongato torto sericeo-fibroso, lamellis ordine quadruplici ferrugineo-fulvescentibus. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 11. *t.* 32. *f.* 188.

Fusus. 375. A. testaceus, pileo glabro rimoso, stipite sericeo-fibroso sursum incrassato, laminis pallidioribus ordine triplici. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 13. *t.* 32. *f.* 189.

nebularis. 376. A. griseus, pileo obscuriore glabro margine involuto, stipite pallidiore fibroso-hispido basi albo-tomentoso, laminis utrinque angustis pallide ochraceis, ordine triplici. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 25. *t.* 33. *f.* 193.

laterinus. 377. A. laterititus, pileo pulvinato subviscido, stipite pallidiore floccoso-aspero, lamellis fulvescentibus angustis. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 29. *t.* 33. *f.* 195. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 308.

discors. 378. A. albus, stipite floccis inferne longitudinalibus superne transversis aspero, pileo umbonato, deflexo sublivescente subviscido. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 31. *t.* 34. *f.* 196.

senescens. 379. A. ochraceus mutabilis, stipite floccis pallidis transversim striatis squamoso, pileo viscido, lamellis latis pallidis fulvescentibus, ordine quadruplici. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 35. *t.* 34. *f.* 197.

subtestaceus. 380. A. opacus ex ochraceo carneus, stipite floccis hirto, pileo glabro subviscido, laminis fulvescentibus triplici ordine. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 39. *t.* 35. *f.* 198.

cruentatus. 381. A. opacus rigidus ex ochraceo niveus, lamellis ordine quadruplici dispositis margine stipite maculis, pileo punctis & zonis purpurascentibus vario. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 47. *t.* 36. *f.* 201.

madreporeus. 382. A. rigidus fragilis, pileo cinereo fusco-fibroso, stipite niveo lamellis dilatatis griseo-livescentibus, ordine triplici. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 53. *t.* 36 *f.* 203.

horizontalis. 110. A. pileo convexo subhemisphærico, lamellis horizontalibus, stipite fistuloso annulato, annulo reflexo sulcato. *Hoffm. Blætterschw. t.* 5. *f.* 1. *an una cum* 4 *sequentibus hujus cohortis?*

testaceus. 111. A. pileo albido, margine pallidissime ochraceo, centro lutescente, lamellis albis, stipite elongato basi ascendente pallide ochraceo. *Planer fung. Erf. p.* 14. *n.* 49.

suaveolens. 112. A. cinerascenti albus opacus, lamellis triplici ordine positis, stipite lineari elongato subflexuoso fistuloso. *Planer fung. Erf. p.* 14. *n.* 50.

violaceofulvus. 113. A. pileo convexo violaceo, stipite lineari concolore, lamellis umbrinis. *Planer fung. Erf. p.* 17. *n.* 65.

holosericeus. 114. A. pileo campanulato tomentoso brunneo-ferrugineo, stipite elongato gracili fusco sursum luteo, lamellis pallidissimis. *Planer fung. Erf. p.* 17. *n.* 67.

††††† *pileo infundibuliformi vel obliquo.*

infundibuliformis. 115. A. siccus albus senio subtinctus, pileo maximo umbonato, lamellis inaequalibus ramosis, stipite laevi. *Buxb. cent.* 4. *t.* 1.

subalutaceus. 384. A. subrufescens subcoriaceus, pileo margine involuto, stipite albo-tomentoso vel floccoso, lamellis ordine quadruplici. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 27. *t.* 33. *f.* 194.

cochleariformis. 116. A. siccus albidus, pilei margine undulatim striato, lamellis crassis ramosis, stipite obliquo brevi crasso. *Schaeff. fung. t.* 225.

flammeus. 117. A. luteus pileo lacerato-squamoso, squamis diversicoloribus, lamellis crenatis, stipite brevi farcto. *Schaeff. fung. t.* 29. 30.

tubaeformis. 118. A. pileo pallide aureo, lamellis decurrentibus simplicibus subdentatis albis, stipite longo tereti fusiformi recurvo. *Schaeff. fung. t.* 248. 249.

cyathiformis. 119. A. albidus vel pallidus, lamellis decurrentibus angustis divisis, stipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 248.

impressus. 120. A. pileo obconico griseo, margine revoluto plicato, lamellis numerosis virescentibus, stipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 38.

sanguinolentus. 121. A. stipite farcto pileoque sanguineis, lamellis simplicibus apice fissis albidis fragilibus stipiti continuis. *Bulliard herb. Franc. t.* 42.

obconicus. 122. A. murinus, pilei margine undulato, lamellis decurrentibus utrinque acuminatis duplici ordine digestis, stipite farcto sursum dilatato. *Bulliard herb. Franc. t.* 286.

furcatus. 123. A. pileo farinoſo viridi-cinereo, lamellis furcatis ſtipiti farcto ſpongioſo continuis. *Bulliard herb. Franc. t.* 26.

atro-tomentoſus. 124. A. pileo obliquo ſubſcabro ferrugineo-fuſco, lamellis pallide ochraceis diſtincte adnatis, ſtipite brevi craſſo tereti ſubincurvo fuliginoſo tomentoſo. *Batſch el. fung.* 89. *f.* 32.

caliciformis. 125. A. pileo lævi carneo-fulveſcente, margine involuto, ſtipite craſſo concolore griſeo-tomentoſo ſurſum ampliato, lamellis pallide ochraceo-carneis decurrentibus. *Schæff. fung. t.* 252.

degener. 126. A. pileo carneo-fulveſcente circulis concentricis ſaturatioribus picto, margine lacero, ſtipite concolore lineari elongato ſurſum ampliato, lamellis pallide carneo-ochraceis decurrentibus. *Schæff. fung. t.* 243.

liveſcens. 127. A. humeſcens, pileo cinereo-livido, lamellis inæqualibus ut plurimum integerrimis contiguis ſtipitique elongato ſubfibroſo ſubconcoloribus. *Batſch el. fung. cent.* 55. *f.* 67.

cervinus. 128. A. ſtipite in pileum oblique reflexum dilatato cervino ſubtus tuberoſo tomentoſo, lamellis anguſtiſſimis albis inæqualiter decurrentibus. *Hoffm. nomencl. fung. n.* 139. *t.* 2. *f.* 2.

neptuneus. 129. A. glaber ochraceo-carneus, ſtipite ſubelongato in pileum dilatato, lamellis anguſtis diſtantibus ſæpe bifidis. *Batſch el. fung. cent.* 161. *f.* 118.

alutaceus. 130. A. glaber pallide carneus, pileo biſcido, lamellis latiuſculis inæqualibus. *Batſch el. fung. cent.* 163. *f.* 119.

alabaſtrinus. 131. A. totus niveus diaphanus, pileo obliquo umbonato, lamellis rarioribus ſubdecurrentibus, ſtipite ſurſum incraſſato, baſi pallide roſeo. *Plan. fung. Erf. p.* 5. *n.* 8.

flabellatus. 132. A. pileo difformi fuſco vel lurido vario, lamellis ſubrepandis ſtipiteque brevi cylindrico ſordide albis. *Schæff. fung. t.* 43. 44.

ſemipetiolatus. 133. A. pileo ochraceo-croceo ſubcarneo ſubfaſciato, margine undulato, ſtipite concolore farcto obconico, lamellis pallidioribus ramoſis. *Schæff. fung. t.* 208.

tremulus. 134. A. nigro-fuſcus lividus faſciatus, lamellis ſordide albis, ſtipite tereti farcto. *Schæff. fung. t.* 224.

craſſus. 135. A. pileo obliquo tomentoſo fuſco-olivaceo, lamellis bifidis ſubramoſis flavis, ſtipite craſſo dilatato luteo, tomento olivaceo. *Plan. fung. Erf. p.* 5. *n.* 7.

ostreatus. 136. A. pileo coriaceo stipiteque planiusculo pallide ochraceis, lamellis umbrinis. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 104.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *pileo dimidiato, stipite laterali.*

dimidiatus. 137. A. pileo squamiformi maculis latis tubellis vario, lamellis pallide sulphureis, stipite brevi albido. *Schæff. fung.* *t.* 233.

aggregatus. 138. A. gregarius, pileo fusco, margine lobato crispo, lamellis rufescentibus ramosis subdecurrentibus, stipite crasso curvo farcto fuscescenti-albo. *Schæff. fung. t.* 305. 306.

palmatus. 139. A. gregarius, pileo convexo obliquo spadiceo vel obscure ligneo, lamellis concoloribus inæqualibus margine undulatis, stipite albido farcto brevi. *Bull. herb. Franc. t.* 216.

petalodes. 140. A. pileo violaceo-fusco, margine undulato, lamellis confertis decurentibus flavicantibus, stipite albido farcto. *Bull. herb. Franc. t.*226. *β*) *Batsch el. fung.* 89. *t.* 8. *f.* 33.

conchatus. 141. A. pallide cinnamomeus, pileo conchiformi, lamellis inæqualibus longioribus decurrentibus, stipite arcuato farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 298.

fallax. 142. A. fucescenti-aurantius, pileo semiorbiculari, lamellis latiusculis, tribus brevioribus inter duas longiores positis, stipite brevi horizontali. *Bull. herb. Franc. t.* 324.

glaucus. 143. A. canus pileo sericeo tenello, lamellis distantibus alterne brevioribus, stipite albidiore brevi pruinato. *Batsch el. fung. cent.* 170. *f.* 123.

flurstedtiensis. 144. A. ochraceo-pallens, stipite brevi posterius lato tomentoso pede adnato. *Batsch el. fung. cent.* 171. *f.* 124.

bucinalis. 385. A. tener ex cæsio albus, pileo membranaceo fovente, lamellis in stipitem brevem flexuosum decurrentibus. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 85. *t.* 39. *f.* 214.

fragillimus. 386. A. ochraceus pileo convexo fragilli, medio umbilicato, stipite gracili brevi. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 87. *t.* 39. *f.* 215.

obesus. 387. A. crassus ochroleucus, pileo pulvinato inæquali, stipite brevi rufescente. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 89. *t.* 39. *f.* 216.

flabelliformis. A. cespitosus, pileo subfurfuraceo pallido, lamellis subcinnamomeis, stipite laterali compresso apice dilatato. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 140. Agaricus stypticus.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *fauciati fuccum fundentes*, lactiflui.

deliciofus. 145. A. pileo luteo-fufcefcente, vertice depreffo, ftipite tereti maculato, lamellis luteis fucco luteo refertis inæqualibus, longioribus decurrentibus. *Kern. Schwamm. t. 6. f.* 1.

tormino-fus. 146. A. pileo lutefcente, vertice depreffo, margine pilofo ftriato, lamellis inæqualibus luteis fucco luteo refertis. *Schæff. fung. t.* 12.

necator. 147. A. fuccum albidum fundens, pileo umbrino, vertice concentrice ftriato, margine deflexo fibrofo, lamellis alternis pallidioribus, ftipite farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 13.

zonarius. 148. A. pileo fpadiceo concentrice ftriato, vertice depreffo, lamellis albidis, ftipite fufcefcenti-albido brevi farcto tereti. *Schæff. fung. t.* 235.

dulcis. 149. A. fordide ruber intus albus, fuccum album dulcem fundens, pileo (adulti) infundibuliformi, lamellis numerofis fubdecurrentibus. *Bull. herb. Franc. t.* 224.

rufus. 150. A. pileo aurantio, vertice (adulti) umbilicato, lamellis tenuibus anguftis fragilibus fufcefcentibus fuccum luteum fundentibus, fecundi tertiique ordinis inæqualibus, ftipite farcto fragili. *Bolton. fung.* 9. *t.* 9.

fcrobicu-latus. 151. A. fuccum lacteum demum fulphureum fundens, pileo luteo pilofo convexo, vertice depreffo, lamellis pallidioribus ramofis, ftipite tereti craffo brevi. *Schæff. fung. t.* 227. *β*) Agaricus crinitus. *Schæff. fung. t.* 228.

livens. 388. A. rigidus fragilis, pilei maculis obfoletis fufcis, lamellis ochroleucis. *Batefch el. fung. cent.* 2. *p.* 51. *t.* 36. *f.* 202.

lactifluus. 152. A. fuaveolens dulcis fuccum vix acrem fundens, pileo fufcefcente firmo, lamellis fragilibus flavicantibus carneisve ftipite farcto tereti fpongiofo. *Schæff. fung. t.* 5. *α*) Agaricus fulvens. *Kern. Schw. t.* 11. *f.* 1. *β*) Agaricus aureus. *Krapf œfterr. Schw.* 2. *t.* 1. *f.* 1. 3. *γ*) Agaricus argenteus. *Kern. Schw. t.* 11. *f.* 2.

acerri-mus. 153. A. inodorus aut graveolens acris fuccum acerrimum fundens, pileo fufcefcente firmo, lamellis fragilibus flavicantibus carneifve, ftipite farcto tereti fpongiofo. *α*) *Krapf œfterr. Schw.* 2. *t.* 3. *f.* 5. *β*) *Krapf œfterr. Schw.* 2. *t.* 4. *f.* 8. 9. & *t.* 5. *f.* 1. 2. *γ*) *Krapf œfterr. Schw.* 2. *t.* 5. *f.* 5. *δ*) *Krapf œfterr. Schw.* 2. *t.* 5. *f.* 8. *ε*) *Krapf œfterr. Schw.* 2. *t.* 6. *f.* 4. 9. *ζ*) *Bull. herb. Franc. t.* 282.

ichoratus. 154. A. pileo opaco tenello ſicco ochraceo-fulvo, vertice depreſſo, margine croceo elevato, lamellis inæqualibus extrorſum bifidis cum ſtipite pallide ochraceis. *Batſch el. fung. cent.* 37 *f.* 60.

cimicarius. 155. A. ferrugineo-fulvus, pileo opaco humeſcente infundibuliformi, lamellis triplicis longitudinis per regulas ſæpe connexis, ſtipite teretiuſculo fiſtuloſo. *Baſch el. fung. cent.* 59. *f.* 69. *nonne mera rufeſcentis varietas?*

opacus. 156. A. ſuccum acrem album fundens, pileo rigido humeſcente viſcoſo, fuſceſcente-cinereo, vertice excavato obſolete concentrice faſciato, lamellis latis triplicis longitudinis utrinque anguſtioribus ochraceo-carneis, ſtipite albido. *Batſch el. fung. cent.* 57. *f.* 68. *an varietas agacris?*

piperatus. 157. A. albus ſuccum acrem fundens, pileo lævi fragili, vertice (ſeneſcentis) excavato, margine deflexo, lamellis inæqualibus irregularibus anguſtis, ſtipite farcto utrinque anguſtato. *Bolton fung.* 21. *t.* 21. *Schæff. fung. t.* 83.

Bulliardi. 158. A. acris, pileo lævi dilute cinnamomeo, vertice excavato, margine inflexo crenulato, lamellis duplicis longitudinis, ſtipite tereti craſſo. *Bull. herb. Franc. t.* 292.

amarus. 159. A. ſuccum acrem fundens, pileo ochroleuco, vertice (adulti) excavato, margine undulato, ſtipite concolore craſſo tereti farcto, lamellis ramoſis flavicantibus. *Kern Schw. t.* 9. *f.* 1.

acris. 360. A. pileo diſtorto mutabili fuſceſcente, lamellis triplicis ordinis, ſtipite compreſſo ſulcato deorſum anguſtato. *Bolton fung.* 2. *t.* 60. *nonne plumbeo affinis?*

††*læves, membranacei, vix carnoſi.*

⊢ Coriacei, *pileo lamelliſque coriaceis.*

melleus. 160. A. pileo convexo pallide ſulphureo ferrugineoque, margine pallido ſtriato, lamellis albidis. ſtipite elongato tereti ſublineari fiſtuloſo cereo. *Schæff. fung. t.* 45.

caryophyllæus. 161. A. pileo convexo exſolete aureo, vertice elevato ſubferrugineo, margine crenulato, lamellis pallide cinnamomeis, ſtipite flavicante tenui tereti farcto. *Schæff. fung. t.* 77.

cereolus. 162. A. pileo campanulato pallide ſulphureo, margine ochraceo ferrugineo, lamellis cinereo-fuſcis, ſtipite elongato niveo farcto. *Schæff. fung. t.* 51.

lacrimalis. 163. A. pileo depreſſo fuſceſcente ochraceove, lamellis ochraceo-fuſcis inæqualibus ſtipite obſcuriori elongato lineari baſi bulboſo. *Batſch el. fung.* 75. *f.* 7. 8.

auricomus. 164. A. pileo lævi ſicco depreſſo, medio elevato, luteo fuſco-radiato, lamellis anguſtis fuſco-cinereis duplicis longitudinis, ſtipite lineari brevi ſemipellucido fuſceſcente. *Batſch el. fung.* 75. *f.* 21.

farinoſus. 165. A. farinoſus, pileo conico depreſſo lævi pallidiſſime ochraceo, medio flavicante, lamellis exſolete terreis, ſtipite elongato lineari albido ſemipellucido baſi bulboſo, *Schæff. t.* 205. *an hujus cohortis?*

candicans. 166. A. pileo convexo ſubviſcido nitente flavicante, lamellis fuſcis, ſtipite lineari albo farcto annulato. *Schæff. fung. t.* 21.

umbilicatus. 167. A. ochroleucus, pilei vertice umbilicato flavicante, lamellis, ſubdecurrentibus, ſtipite tereti farcto ſurſum ampliato. *Schæff. fung. t.* 207.

decurrens. 168. A. ochroleucus, pilei vertice umbilicato, margine plicato-ſtriato, lamellis decurrentibus, minoribus interſitis, ſtipite elongato tereti fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 232. *an varietas umbilicati?*

fuſceſcens. 169. A. pileo convexo fuſco, lamellis fuſco-fulventibus, ſtipite lineari ſubelongato pallido fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 60.

collinus. 170. A. pileo convexo umbonato albo vel pallide-ochraceo nitente, ſtipite concolore elongato ſemipellucido fiſtuloſo, lamellis griſeo-albis. *Schæff fung. t.* 220.

criſtatus. 171. A. pileo lacteo ſquamis faſciculatis ſpadiceis vario, lamellis teneris altis triplici ordine digeſtis, ſtipite tereti fiſtuloſo fuſceſcente. *Bolton fung.* 7. *t.* 7. *Bull. herb. Franc. t.* 405. *β*) *Bulliard herb. Franc. t.* 70. *t.* 506. *f.* 2.

tigrinus. A. pileo convexo ſquamato albido, centro depreſſo, lamellis decurrentibus luteſcentibus. *Bull. herb. Franc. t.* 70.

caſtaneus. 172. A. pileo lævi ſericeo caſtaneo, lamellis teneris rubello-fuſcis, tertii ordinis breviſſimis, ſtipite lineari albo fiſtuloſo elaſtico. *Bulliard herb. Franc. t.* 268.

irregularis. 173. A. pileo ſordido viſcido ſpadiceo, margine lobato-undulato, lamellis diſtantibus obſcure carneis triplici ordine digeſtis, ſtipite tereti lævi fiſtuloſo cineraſcente duro. *Bolton fung.* 13. *t.* 13.

elasticus. 174. A. pileo convexo ferrugineo, carne cortinaque elasticis lamellisque triplici ordine digestis latiusculis distantibus albis, stipite inæquali farcto elastico ferrugineo. *Bolton fung.* 16. *t.* 16.

plumosus. 175. A. pileo hemisphærico murino squamulis lanatis obsesso, lamellis latis numerosis albis flexilibus triplici ordine positis, stipite lineari elongato squamato. *Bolton fung.* 33. *t.* 33.

nigro-villosus. 176. A. pileo humescente tomentoso nigricante (adulti) cucullato, margine inæquali, stipite lineari albo, lamellis introrsum latioribus (senescentis) rubellis. *Bulliard herb. Franc. t.* 214.

fissus. 177. A. pileo conico fusco, margine striato olivaceo, lamellis latis numerosis tenuibus flexilibus aurantio-carneis triplici ordine positis, stipite murino elastico fistuloso compresso. *Bolt. fung.* 35. *t.* 35.

rubens. 178. A. ruberimus mollis, pileo opaco, lamellis latis teneris pellucidis triplici ordine digestis, stipite farcto elongato. *Bolton fung.* 36. *t.* 36. *an satis distinctus a sanguineo?*

ramealis. 179. A. pileo (adulti) excavato albo, medio fusco rubellove, lamellis numerosis divisis stipiteque farcto tereti albidis. *Bulliard herb. Franc. t.* 336.

velutipes. 180. A. gregarius, pileo convexo flavo lævi, lamellis ligneis, minoribus intersitis, stipite fistuloso inferne tomentoso nigro superne igneo. *Bulliard herb. Franc. t.* 344. *Curtis flor. Lond.*

ardesiacus. 181. A. pileo hemisphærico concentrice striato stipiteque fistuloso superne cærulescentibus, hoc inferne albo, lamellis latis igneis inter binas longiores quinis brevioribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 348.

repens. 182. A. pileo convexo flavicante, centro depresso, lamellis concoloribus divisis, stipite repente fistuloso fibroso ramoso, ramis rubris. *Bulliard herb. Franc. t.* 90.

croceus. 183. A. pileo croceo lævi sicco truncato-conico, vertice mammillari, margine repando-lacero, lamellis rarioribus, stipite flavicante farcto tereti. *Bulliard herb. Franc. t.* 50. *β)* Agaricus coccineus. *Schæff. fung. t.* 302. *γ)* Agaricus psittacinus. *Schæff. fung. t.* 301.

Hyacinthus. 184. A. pileo conico luteo-vel virescenti-fusco, lamellis pallidioribus, stipite elongato lineari recto fistuloso. *Batsch el fung.* 81. *t.* 28. *an distinctus satis a fastigiato?*

vinosus. 185. A. fuscus vinum olens subacris, pileo orbiculari sicco, medio verrucoso, lamellis confertis, stipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 54.

auratus. 365. A. pileo convexo viscido stipiteque fistuloso exterius aurantiis, lamellis sulphureis. *Bolton fung.* 2. *t.* 67. *f.* 2.

scissus. 366. A. sulphureus pileo subconico margine lacero, lamellis latissimis basi angustis triplicis ordinis, stipite fistuloso contorto. *Bolton fung.* 2. *t.* 68.

superstitiosus. 186. A. albidus, pileo orbiculari sicco, centro impresso luteo, lamellis subflexuosis duplicis longitudinis, stipite lineari superne fistuloso. *Bull. herb. Franc. t.* 56.

ramosus. 187. A. albus, pileo orbiculari sicco, margine convexiusculo, lamellis minoribus paucioribus inter longiores, stipitibus pluribus farctis flexuosis e communi trunco. *Bull. herb. Franc. t.* 102.

piluliformis. 188. A. pileo sicco globoso fuscescente, margine albido, lamellis albis divisis, stipite fistuloso albido superne incrassato. *Bull. herb. Franc. t.* 112.

contortus. 189. A. pileo sicco umbrino convexo, vertice papilloso, lamellis fragilibus stipiteque spirali albidis. *Bulliard herb. Franc. t.* 36.

amaricans. 190. A. pileo unguinoso flavo-viridi, stipite concolore subflexuoso fistuloso, lamellis viridibus, minoribus inter longiores positis. *Bulliard herb. Franc. t.* 30.

cyaneus. 191. A. unguinosus, pileo rotundo cæruleo, vertice mammillari fuscescente, margine albo-floccoso, stipite concolore subtomentoso, lamellis umbrinis divisis. *Bulliard herb. Franc. t.* 170. *an diversus a Beryllo?*

Beryllus. 192. A. pileo convexo conico flavo extrorsum thalassino fibroso, lamellis inæqualibus pallide rubellis, stipite elongato lineari flavescente, annulo nigricante. *Schæff. fung. t.* 1. Agaricus viridulus.

moschatus. 193 A. moschum olens, pileo plano thalassino sicco, lamellis numerosis divisis, stipiteque lineari firmo albidis. *Bull. herb. Franc. t.* 176.

sulphureus. 194. A. sulphureus, pileo subconico sicco, lamellis numerosis triplici ordine digestis, longioribus stipiti fibroso contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 168.

olivaceus. 195. A. pileo convexo-conico laevi integro aureo, centro ferrugineo, lamellis numerosis confertis olivaceis margine sinuatis quintuplicis longitudinis, stipitibus aggregatis divaricatis ascendentibus elongatis linearibus fistulosis, annulo striato. *Mich. nov. pl. gen. p.* 199. *t.* 80. *f.* 7.

abbreviatus. 196. A. pileo obtuse conico ferrugineo aut fuliginoso, lamellis albidis aut flavescentibus, stipite elongato exalbido (senescentis) fistuloso. *Schaeff. fung. t.* 250. & 253.

subcorneus. 197. A. pileo conico depresso castaneo, margine aurantio, lamellis crassis inaequalibus, stipiteque elongato lineari flexuoso fistuloso pallidis. *Batsch el. fung.* 83.

sanguineus. 198. A. sanguineus, pileo convexo laevi, lamellis divisis, stipite tereti lineari farcto, annulo fibroso aurantio. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 15. *f.* 3.

cereus. 199. A. pileo hemisphaerico sicco laevi cereo, lamellis tenuibus distantibus integris divisisque flavescentibus, stipite tereti lineari flavo, medio fistuloso. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 105. *t.* 15. *f.* 2.

sordidus. 200. A. lamellis simplicibus rectis pileoque plano livido-fuscis, centro umbilicato, margine depresso, stipite basi crassiore. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 56. *t.* 3. *f.* 1.

flavo-floccosus. 201. A. pileo umbonato sulphureo ocrhaceo obumbrato furfuraceo, margine crenulato stipiteque farcto subferrugineo floccis furfuraceis inaequali, lamellis subquadruplicis longitudinis albentibus. *Batsch el. fung. cent.* 117. *f.* 97.

circumseptus. 202. A. pileo subcarneo ante marginem stipiteque medio saepe floccis furfuraceis cincto, lamellis latis ferrugineis triplicis longitudinis. *Batsch el. fung. cent.* 119. *f.* 98.

rosellus. 203. A. pileo subcarneo convexiusculo opaco, lamellis laxis triplicis longitudine stipiteque farcto torto fibroso rubellis. *Batsch el. fung. cent.* 121. *f.* 99.

subcarneus. 204. A. humescens, pileo mutabili ochraceo, stipite fistuloso recto fibroso, lamellisque carneolis, his semipellucidis triplicis longitudinis, longissimis stipiti adnatis. *Batsch el. fung. cent.* 123. *f.* 100.

cinerascens. 205. A. pileo glabrato stipiteque fibrilloso farcto fusco-cinereis, lamellis flavescentibus quadruplicis ordinis, longioribus stipite affixis. *Batsch el. fung. cent.* 125. *f.* 101.

obsolescens. 206. A. pileo pulvinato laevi ochraceo-carneo, lamellis latiusculis lividis, stipiti concolori farcto spongioso affixis subquadruplici ordine dispositis. *Batsch el. fung. cent.* 127. *f.* 102. β) Agaricus obsoletus. *Batsch el. fung. cent.* 129. *f.* 103.

tremebundus. 207. A. pileo pallide carneo, medio crassiusculo, stipite fibroso torto fistuloso, lamellis inaequalibus pileo soli adnatis. *Batsch el. fung. cent.* 129 *f.* 104. β) *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 73. *t.* 38. *f.* 209. γ) *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 75. *t.* 38. *f.* 210.

canobrunneus. 208. A. humescens, pileo tenero stipiteque fibroso fistuloso carneo canescentibus, lamellis brunneis subquadruplicis longitudinis, extremo margine farinaceo. *Batsch el. fung. cent.* 133 *f.* 105.

candidobulbosus. 209. A. pileo umbonato stipiteque solido validiusculo basi bulboso pileum sustentante albis sericeo-nitentibus, lamellis lividis subtriplicis longitudinis, extimo margine albo. *Batsch el. fung. cent.* 133. *f.* 106.

auriveniius. 210. A. pileo umbonato obscurius fibroso-venoso stipiteque obsolete fibroso basi bulboso flaventibus, lamellis inaequalibus pileo soli adnatis margine crenato furfuraceo-albis. *Batsch el. fung. cent.* 137. *f.* 107. *Bull. herb. Franc. t.* 388.

bulbularis. 211. A. pileo laevi pulvinato hemisphaerico depresso lutescente, stipite albo sericeo-nitente farcto bulboso pileum sustentante, lamellis semiorbiculatis pileo soli adnatis livido-fulventis triplicis ordinis. *Batsch el. fung. cent.* 137. *f.* 108.

coriaceus. 212. A. pileo drepresso-convexo carneo-ochraceo, stipite farcto elongato torto, pileum sustentante lamellisque pileo soli adnatis pallidioribus. *Batsch el. fung. cent.* 139. *f.* 109.

tomentosus. 213. A. pileo convexo-conico tomentoso fulvo, stipite gracili, annulo fugaci. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 241. *t.* 2. *f.* 1.

muscorum. 214. A. pileo impresso striato flavo-fusco, stipite brevi basi incrassato, lamellis horizontalibus pallidioribus. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 242. *t.* 5. *f.* 3.

semiglobatus. 215. A. pileo glabro semigloboso flavescente, stipite subconcolore opaco, medio nigro-pruinato gracili elongato pi-

leum ſuſtentante, lamellis cinereis obſcurius maculatis, majoribus ſtipiti adnexis. *Batſch el. fung. cent.* 141. *f.* 110. β) Agaricus clypeatus. *Bolton fung.* 2. 57. *t.* 57.

diffuſus. 216. A. pileo tenero lævi livido-carneo, lamellis elongatis violaceo-fulvis quadruplicis ordinis, majoribus ſtipiti adnexis, ſtipite niveo elongato fiſtuloſo pileum ſuſtentante. *Batſch el. fung. cent.* 143. *f.* 111.

purpureus. 217. A. pileo hemiſphærico ſtipiteque brevi fiſtuloſo purpureis, lamellis triplicis ordinis albidis. *Bolton fung.* 41. *t.* 41. *f.* B.

contortilis. 218. A. pileo fuſco ſtriato undulato, lamellis ſtipiteque brevi carneis. *Bolton fung.* 41. *t.* 41. *f.* A.

granuloſus. 219. A. pileo albo-granulato ſtipiteque lineari valido ochraceo-ferrugineis, lamellis albis. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 24.

hiſpidus. 220. A. pileo brunneo, vertice hiſpido, ſtipite lineari valido lamelliſque pallidiſſime concoloribus. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 25.

fuliginatus. 221. A. pileo conico ſtriis niveis caneſcentibus & obſolete fuligineis ſubſquamoſo, ſtipite lineari ſubelongato valido lamelliſque niveis. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 26.

atro-ſquamoſus. 222. A. pileo fuſceſcente-niveo maculis ſtriatis nigris ſubſquamoſo, ſtipite ſubulato valido lamelliſque albis. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 27. β) Agaricus conſpurcatus. *Willd. prodr. fl. berol. n.* 1104 *Mich. nov. pl. gen. t.* 78. *f.* 6-8. *an diſtincta ſatis a criſtato ſpecies?*

umbraculum. 223. A. pileo rorido depreſſo-conico lamelliſque rarioribus triplicis longitudinis fuſceſcenti-cinereis, ſtipite ſubulato albo ſtriato torto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 4.

Placenta. 224. A. pileo depreſſo umbonato cinereo fuſceſcente, lamellis carneo-albis, ſtipite lineari elongato valido fibroſo torto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 18. *nonne forſan olypanti varietas?*

murinus. 225. A. pileo depreſſo atro, lamellis ſtipiteque elongato lineari valido atro-ſtriato cinereis. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 19.

farinaceus. 226. A. pileo rubro-violaceo convexo, vertice ſubdepreſſo, lamellis violaceis, ſtipite fuſceſcente. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1117. *Schæff. fung. t.* 8. *t.* 12. *t.* 13. *f.* 1-3. *t.* 223.

janthinus. 227. A. violaceo-rubens, pileo ſubconvexo, lamellis diſtantibus convexis decurrentibus, ſtipite elongato lineari. *Schæff. fung. t.* 13. *f.* 2. 4. 5-8.

laccatus. 228. A. subcarneus, pileo striato convexo, vertice depresso, stipite tereti recto. *Batsch el. fung.* 79. *f.* 20.

majalis. 229. A. suaveolens, pileo convexo sicco dilute coriaceo, stipite concolore deorsum incrassato, lamellis membranaceis subdecurrentibus utrinque acuminatis. *Bull. herb. Franc. t.* 142.

mammo-sus. 230. A. suaveolens dilute fuscus, pileo difformi, lamellis latiusculis divisis a stipite lineari farcto spirali distantibus. *Bull. herb. Franc. t.* 144.

alliatus. 231. A. allium redolens sapiensque canus, pilei margine undulato striato, lamellis divisis stipiti contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 153. *vix distinctus ab alliaceo.*

alliaceus. 232. A. allium sapiens reddensque, pileo convexo glabro e fusco-pallescente, lamellis albidis, stipite atro nitido fistuloso. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 82.

plicatus. 233. A. allium sapiens olensque, pileo planiusculo, margine luteo-rufo undulato-plicato, lamellis inaequalibus albidis stipite tereti lineari rufo. *Schaeff. fung. t.* 99. *f.* 2. 5-8.

abietis. 234. A. pileo glaberrimo subviscido depresso-convexo, lamellis albidis, stipite lineari elongato fulvo. *Schaeff. fung. t.* 99. *f.* 1. 3. 4.

pineti. 235. A. cespitosus, pileo depresso-convexo umbonato glaberrimo subniveo, lamellis subconcoloribus inaequalibus, stipite gracili lineari obscuro. *Batsch el. fung.* 73. *f.* 9.

esculen-tus. 236. A. pileo convexo terreo, stipite gracili fistuloso sordide ochroleuco, lamellis albis. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 14. *f.* 4.

Clavus. 237. A. pileo planiusculo umbonato luteo, margine striato plicatove, lamellis sordide albis, stipite lineari tereti farcto, inferne torto. *Schaeff. fung. t.* 59.

fibrillosus. 238. A. pileo convexo lamellisque paucioribus griseis, stipite gracili lineari fistuloso subspadiceo. *Schaeff. fung. t.* 236. *an mera Clavi varietas?*

crenula-tus. 239. A. pileo dilute cinnamomeo albo-pulverulento, margine crenato, lamellis stipiteque gracili fistuloso concoloribus *Schaeff. fung. t.* 226.

subcoria-ceus. 240. A. pileo convexiusculo fuscescente-ochraceo, margine integro, lamellis fusco-lividis, stipite lineari elongato subgracili flavicante. *Schaeff. fung. t.* 203.

atro rufus. 241. A. pileo convexo umbonato hepatico albido-ſtriato, margine crenato, lamellis ſtipiteque lineari gracili elongato fiſtuloſo pallidioribus. *Schæff. fung. t.* 234.

ſetaceus. 242. A. pileo umbonato miniato, lamellis aureis, ſtipite elongato ſubſubulato pallide ſulphureo. *Schæff. fung. t.* 222.

angulatus. 243. A. albus pileo plano, margine fimbriato repando-angulato, lamellis raris, ſtipite elongato gracili. *Mich. nov. pl. gen. p.* 146. *t.* 74 *f.* 4.

Clavis. 244. A. ſuaveolens, pileo rotundo luteo-fuſco, lamellis ramis diviſis ſtipiti nigricanti tereti brevi farcto contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 148.

Fibula. 245. A. ochroleucus, pileo rotundo infundibuliformi, lamellis decurrentibus, ſtipite lineari lævi farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 186.

Campanella. 246. A. pileo conico-convexo umbilicato glabro ſtriato ſtipiteque tereti farcto fragili gracili croceis, lamellis pallide ſulphureis. *Schæff. fung. t.* 230.

minutus. 247. A. parvus, pileo campanulato fuſceſcente ſtriato, ſtipite brevi incurvo. *Hoffm. nomencl. fung.* I. *n.* 277. *t.* 6. *f.* 3. 4.

ferruginatus. 248. A. pileo minuto conico luteſcente, medio ferrugineo, lamellis ſtipiteque elongato torto ſubſubulato pallidiſſime fuſceſcentibus. *Batſch el. fung. cent.* 109. *f.* 92.

hypni. 249. A. pileo umbonato pallide ochraceo, margine plicato ferrugineo, lamellis ferrugineis triplicis ordinis, intimis ſtipiti gracili fiſtuloſo affixis. *Batſch el. fung. cent.* 117. *f.* 96.

ſtriatellus. 250. A. pileo conico ſubovato albo griſeo-flavente denſe plicato, lamellis plumbeis inæqualibus, ſtipite filiformi fiſtuloſo albo. *Schæff. fung. t.* 211.

Fumus. 251. A. pileo conico ſubovato acuminato fuſco vel flavente, lamellis rubris, ſtipite lineari elongato pallidiori. *Schæff. fung. t.* 63. 70. 229.

fuliginarius. 252. A. pileo conico ſubovato acuminato atro ſcabro, ſtipite valido ſubconcolore ſuperius albente, lamellis carneis. *Batſch el. fung.* 71. *f.* 40.

contractus. 253. A. pileo nigro-fuſceſcente ſtriato oblongo, margine conſtricto albidiore, ſtipite fibroſo flexuoſo ſtriato ſubconcolore, baſi hiſpidula albidiore. *Batſch el. fung. cent. f.* 85.

glandifer. 254. A. pileo oblongo nigro-fusco striato, margine constricto albo, stipite lineari nigro-fusco, lamellis albis elongatis. *Batsch el. fung. cent.* 99. *f.* 86.

atro-cyaneus. 255. A. niger cyaneo-pruinatus, pileo cucullato dense striato-sulcato, margine extremo lamellisque albidioribus, stipite elongato lineari striato-sulcato. *Batsch el. fung. cent.* 1101. *f.* 87.

luridus. 256. A. pileo glabro humescente ochraceo-cinerascente, stipite lineari albo basi clavato lamellis duplicis ordinis spadiceis. *Batsch el. fung. cent.* 107. *f.* 90.

rimosus. 389. A. pileo fusco-griseo pruinato sæpius albo-rimoso, stipite sericeo fibroso niveo, laminis albidis latis laxis subundulatis. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 63. *t.* 37. *f.* 206.

marginatus. 390. A. pileo glabro subferrugineo margine membranaceo, stipite fibrilloso ex livido ochraceo basi niveo, lamellis ferrugineis triplicis ordinis. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 65. *t.* 37. *f.* 207.

alterabilis. 391. A. pileo lutescente depresso-conico, stipite fibrilloso, lamellis fusco-ferrugineis. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 69. *t.* 38. *f.* 208.

visceralis. 392. A. ex hepatico fulvus, pileo convexo fovente stipite gracili basi albo, lamellis crassis rarioribus, ordine triplici. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 77. *t.* 38. *f.* 211.

chrysodon. 393. A. albus pilei margine crenato lutescente, stipite superne luteo-pruinato, laminis margine sulphureo-pruinatis. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 79. *t.* 38. *f.* 212.

┼ ┼ tenelli, *pileo lamellisve & stipite pellucidis, ut plurimum concoloribus, illo striato, plicato.*

gracilis. 353. A. pileo subconico elastico sicco, lamellis paucis trifidis rubris stipite prælongo gracili. *Bolton fung.* 2. *t.* 51. *f.* 1.

sulphuratus. 257. A. pileo lutescente-cano convexo plicis latis inæquali, lamellis albidis duplicis ordinis, stipite lineari elongato fistuloso sulphureo. *Schæff. fung. t.* 31.

adustus. 258. A. fuscus, pileo convexo-conico late plicato extorsum pallide griseo, stipite lineari elongato fistuloso. *Schæff. fung. t.* 32.

pilosulus. 259. A. fusco-cinerascens, pileo convexo ad latera late plicato, margine dentato-repando, lamellis duplicis longitu-

dinis, ſtipite filiformi inferne ad latera piloſo. *Batſch el. fung. 67. f. 2.*

Tintinabulum. 260. A. cinereus, pileo ſemiovato integro ad latera denſe ſtriato, ſtipite lineari elongato flavicante. *Batſch el. fung. 67. f. 3. Schæff. fung. t. 237.* Agaricus palleſcens.

minutulus. 261. A. pileo campanulato obſolete aureo, lamellis raris flavicantibus, ſtipite tereti farcto curvulo albido. *Schæff. fung. t. 308.*

hirtus. 262. A. pileo conico ſtipiteque fiſtuloſo ſub tomento tenero glabris ſtriatis cinereis, lamellis concoloribus numeroſis diviſis utrinque acuminatis duplicis ordinis. *Bull. herb. Franc. t. 138.*

androſaceus. 263. A. pileo conico pellucido ſtriato crenato lamelliſque albidis, ſtipite gracili obſcuro. *Schæff. fung. t. 239.*

trichopus. A. albus, pileo campanulato ſubſtriato, ſtipite procero ſetaceo caudato albo. *Scop. flor. carn. ed. 2. n. 1493.*

bicolor. 264. A. lamellis raris diſtantibus pileoque caduco (ſeneſcentis) fuſceſcentibus, ſtipite capillari duro pellucido nigro. *Bolton fung. 32. t. 32.*

nothus. 265. A. albidus ciueraſcens flavicanſve, lamellis decurrentibus, carne albo, ſtipite gracili farcto. *Bull. her. Franc. t. 276.*

umbellatus. 266. A. albidus, pileo convexo ſubconico tandem planiuſculo umbonato plicato, lamellis diſtantibus, ſtipite gracili terete fiſtuloſo. *Schæff. fung. t. 309.*

umbelliferus. 267. A. minutus albus pellucidus, pileo hemiſphærico, margine plicato, lamellis diſtantibus, ſtipite filiformi. *Bolton fung. 39. t. 39. f. A.*

candidus. 268. A. minutus albus, pileo hemiſphærico margine involuto, lamellis flexilibus, ſtipite tereti flexuoſo. *Bolton fung. t. 39. f. D.*

radiatus. 269. A. pileo cinereo radiate plicato ſtipiteque filiformi pellucidis. *Bolton fung. 39. t. 39. f. C.*

perforans. 270. A. pileo hemiſphærico marginato ſtriato, ſtipite ſetaceo nigro perforante. *Hoffm. nomencl. fung. 1. n. 304. t. 4. f. 2. an ſatis diſtinctus ab androſaceo?*

membranaceus. 271. A. pileo campanulato murino fuſco-ſtriato, ſtipite elongato fiſtuloſo ſubtus incraſſato. *Hoffm. nomencl. fung. 1. n. 305. t. 6. f. 1.*

stellatus. 272. A. pileo striato, stipite gracili involucro radicali stellato cincto. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 306. *t.* 6. *f.* 2.

papillatus. 273. A. albus, pilei papilla fuscescente, lamellis convexis, stipite filiformi. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 307. *t.* 3. *f.* 2.

mammillaris. 274. A. pileo hemisphærico longe papillato, stipite fistuloso caudato. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 308. *t.* 4. *f.* 1.

turfaceus. 275. A. pileo terreo pallide striato pellucido contorto, lamellis rugosis, stipite arcuato. *Bolton fung.* *t.* 41. *f.* c.

luteo-albus. 276. A. pileo conico striato, stipiteque filiformi flavescentibus, lamellis albis latiusculis triplicis ordinis. *Bolton fung.* 38. *t.* 38. *f.* 1.

tenuis. 277. A. albidus, pileo campanulato membranaceo, lamellis triplicis ordinis stipiteque longissimo fistuloso pellucidis. *Bolt. fung.* 37. *t.* 37.

confertus. 278. A. gregarius albidus, pileo glabro conico acuminato apice fusco, lamellis æqualibus confertis tenellis fusco obumbratis, stipite farcto. *Bolton fung.* 18. *t.* 18.

norwegicus. 279. A. sulphureus, pileo umbonato striato angulato-repando, lamellis linearibus alternatim minoribus stipiteque lineari-fistuloso pallidioribus. *Gunn. flor. norv. n.* 994. *t.* 7. *f.* a. b.

Rotula. 280. A. albidus, pileo convexo umbonato extrorsum striato, lamellis latiusculis distantibus annulo peculiari annexis. *Mich. nov. pl. gen.* 195. *t.* 79. *f.* 7.

conicus. 281. A. pileo campanulato acuto nitido livido striato, lamellis albis, stipite fistuloso cinereo. *Schæff. fung.* *t.* 52. *f.* 1. 6.

peronatus. 359. A. pileo hemisphærico, lamellis paucis angustis triplici serie digestis, stipite superius glabro inferius lanuginoso basi arcuato. *Bolton fung.* 2. *t.* 58.

equinus. 361. A. sulphureus, pileo mutabili fuscescente luteo-radiato, stipite fistuloso, lamellis triplicis ordinis. *Bolton fung.* 2. *t.* 65.

variegatus. 362. A. pileo obtuso - conico nigro fuscescente vel cinereo, lamellis triplicis ordinis stipiteque fistuloso cinereis. *Bolt. fung.* 2. *t.* 66. *f.* 1.

cuspidatus. 363. A. pileo acute-conico subspadiceo, lamellis triplicis ordinis angustis subfuscis, stipite fistuloso. *Bolton fung.* 2. *t.* 66. *f.* 2.

nuceus. 367. A. pileo globoso castaneo, margine lobato incurvo, lamellis undulatis triplicis ordinis, stipite gracili albo fistuloso. *Bolton fung.* 2. *t.* 70.

sulcatus. 282. A. cinereus pileo conico, vertice acuminato fuscescente, stipite elongato lineari deorsum incrassato. *Schæff. fung. t.* 52. *f.* 7. 9. *an mera conici varietas?*

griseus. 283. A. pileo conico explanato umbonato opaco plicis latis obtusis arato, stipite elongato basi fibrilloso, lamellis triplicis longitudinis. *Batsch el. fung.* 87. *f.* 80.

clavularis. 284. A. tener virescenti-albus, pileo subhemisphærico umbilicato obsolete plicato, lamellis paucioribus inæqualibus, stipite gracili basi bulboso. *Batsch el. fung. cent.* 89. *f.* 81.

Mucor. 285. A. minutissimus griseus, pileo convexo, lamellis paucis, stipite tenero pellucido, basi bulbo annulari inserta. *Batsch el. fung. cent.* 91. *f.* 82.

sacchari-nus. 286. A. albus, pileo conico-explanato opaco laxe plicato undulato, lamellis paucis angustis crassis, stipite subulato rubente. *Batsch. el. fung. cent.* 93. *f.* 83.

acicularis. 287. A. minimus albidus, pileo hemisphærico, lamellis paucis crassiusculis, stipite setaceo. *Hoffm. nomencl. fung.* I. *n.* 322. *t.* 5. *f.* 2.

††† partim in liquorem nigrum diffluentes aut lamellis nigris instructi.

momenta-neus. 288. A pileo conico subpapilloso cinerascente-fusco striato crenulato, lamellis stipiteque fistuloso lineari canis. *Bull. herb. Franc. t.* 128.

spadiceo-griseus. 289. A. pileo pallido, umbone magis flavo, margine tenuissime striato griseo, lamellis (senescentis) nigrescentibus, stipite elongato fistuloso albido sursum graciliori. *Schæff. fung. t.* 237.

papyra-ceus. 290. A. albus, pileo hemisphærico membranaceo, lamellis triplicis ordinis distantibus ætate nigrescentibus, stipite fistuloso. *Bolt. fung.* 11. *t.* 11.

umbilica-ris. 291. A. coriaceus albidus in liquorem fuscum deliquescens, lamellis triplicis ordinis distantibus, stipite farcto. *Bolton fung.* 17. *t.* 17.

fascicula-tus. 292. A. fuscescendo diffluens, pileo convexo lævi luteo, lamellis numerosis angustis olivaceis, stipite flexuoso fistuloso flavo. *Bolton fung.* 29. *Vix distinctus a fasciculari.*

acuminatus. 293. A. pileo conico acuminato pallide murino, lamellis atris, ſtipite tereti anguſto fiſtuloſo atrorubente. *Schæff. fung. t.* 202.

ſordidulus. 294. A. pileo ſquamoſo ſordide luteo, lamellis terreis nigro-pulverulentis, demum atris, ſtipite gracili elongato fiſtuloſo fuſceſcente. *Schæff. fung. t.* 210.

carbonarius. 295. A. pileo conico nitente plumbeo, lamellis ſubquadruplicis longitudinis nigris margine albidis, ſtipite ſemipellucido inferne ſpadiceo. *Batſch el. fung.* 69. *f.* 6. β) *Batſch el. fung. cent.* 107. *f.* 91.

ſubatratus. 296. A. pileo opaco umbonato denſe & alternatim plicato ſtriato ſtipiteque elongato fiſtuloſo ocrhaceo caneſcentibus, lamellis confertis bruneo-atris margine albidis. *Batſch el. fung. cent.* 103. *f.* 89.

marcoticus. 297. A. pileo convexo extrorſum plicis furcatis radiato, lamellis cineraſcentibus alternis integris & dimidiatis, ſtipite ſubulato albo. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 77.

ciliaris. 354. A. pileo conico ochroleuco, primo niveo-rorido, poſtea glutinoſo, margine ciliato, lamellis triplici ordine diſpoſitis, ſtipite albo baſi incraſſato. *Bolton fung.* 2. *t.* 53.

tricolor. 355. A. pileo campanulato fuſco ſtriato glabro, lamellis atris margine criſpis, ſtipite fiſtuloſo. *Bolton fung.* 2. *t.* 54.

papilliger. 298. A. pileo campanulato lacero griſeo-furfuroſo, margine ſtriato, vertice papillifero, ſtipite lineari pellucido nigro-pulverulento, lamellis atris margine niveis longioribus brevioribuſque alternis. *Batſch el. fung. cent.* 81. *f.* 78.

lacrimabundus. 299. A. pileo campanulato luteo, lamellis ſuccum atrum ſtillantibus fuſceſcentibus nigro maculatis inæqualibus. *Bull. herb. Franc. t.* 194.

clypeiformis. 358. A. pileo viſcido umbonato, lamellis utrinque acuminatis triplici ordine digeſtis prima ætate murinis, ſtipite longo cylindrico. *Bolton fung.* 2. *t.* 57.

††† Fuliginoſi, *pileo opaco conico, lamellis seneſcendo fuliginoſis tandem in ſeniem nigram difluentibus, ſtipite fiſtuloſo.*

congregatus. 300. A. gregarius, pileo flaveſcente-cano crenulato digitiformi, lamellis diviſis ſtipiteque lineari recto albidis. *Bull. herb. Franc. t.* 94.

301. A.

ſuccineus. 301. A. pileo convexo-campanulato lacero glabro pallide aurantio ſtriato, lamellis plumbeis, ſtipite ſubelongato albo. *Schæff. fung. t. 6.*

aqueus. 302. A. pileo glabro lacero cano-fuſceſcente leviter ſtriato plicatoque, lamellis nigro-fuſcis, ſtipite ſubelongato albo. *Schæff. fung. t.* 17.

tortus. 303. A. pileo lacero ſubcarneo confertiſſime ſtriato-ſulcato, lamellis atris, ſtipite elongato albo torto valido. *Schæff. fung. t.* 201.

cinereus. 304. A. pileo caneſcente umbonato confertiſſime ſtriato, lamellis connatis, ſtipite elongato fuſceſcente albo. *Schæff. fung. t.* 100.

margaritaceus. 305. A. pileo argenteo purpuraſcente miſto extrorſum ſtriato, ſtipite tereti ſqualido inferne incraſſato. *Schæff. fung. t.* 216.

ovatus. 306. A. pileo ſquamato ſtriato cano, ſtipite annulato elongato albo terete deorſum craſſiori, volva ovata ſquamoſa. *Schæff. fung. t.* 7.

Vaillantii. 307. A. gregarius, pileo ſtriato cinereo ovato tandem ſpadiceo campanulato, lamellis latiuſculis ſerrulatis, ſtipite lineari tereti albo. *Vaill. flor. par. t.* 12. *f.* 10. 11. *β*) Agaricus cylindricus. *Schæff. fung. t.* 8. *γ*) Agaricus fugax. *Schæff. fung. t.* 67. 68.

Balanus. 308. A. pileo dilute ochraceo demum fuſceſcente extorſum ſulcato lacero revoluto, lamellis livido-rubellis, ſtipite elongato gracili tereti albido. *Schæff. fung. t.* 66.

porcellaneus. 309. A. pileo aquoſe albo ſtriis longitudinalibus purpuraſcentibus ſquamiſque luteſcentibus vario fuſiformi demum campanulato, lamellis utrinque acuminatis, ſtipite flexuoſo. *Schæff. fung. t.* 47. 48.

ſqualidus. 310. A. pileo viſcido olivaceo cinereo, margine inæquali, lamellis æqualibus numeroſis confertis latiuſculis, ſtipite duro flexuoſo. *Bolton fung.* 25. *t.* 25. *an diſtinctus ſatis ab aqueo?*

domeſticus. 311. A. pileo primum ovato floccis fuſceſcentibus aſpero, margine undulato lacero, lamellis æqualibus latiuſculis numeroſis, ſtipite niveo. *Bolt. fung.* 26. *t.* 26.

papilionaceus. 312. A. pileo convexo-conico ſublacero, lamellis latiuſculis cinereo-vireſcentibus maculatis, ſtipite flexuoſo. *Bull. herb. Franc. t.* 88.

fimipu- 313. A. pileo umbrino (senescentis) plano, margine inæquali,
tris. lamellis concoloribus nigro-maculatis divisis, stipite nigro-annulato deorsum incrassato. *Bull. herb. Franc. t. 66.*

pullatus. 314. A. pileo campanulato plicato atro viscido, stipite elongato ventricoso argenteo. *Bolton fung.* 20. *t.* 20. *an distinctus satis a cinereo?*

stercora- 315. A. pileo convexo diaphano cinerascente nigro, margine
rius. lacero revoluto, lamellis canis, stipite subobliquo angusto inferne incrassato. *Bull. herb. Franc. t.* 68.

campa- 316. A. pellucidus, pileo campanulato vario striato, lamellis
nulatus. cinereis ascendentibus duplici ordine positis, stipite lineari gracili nudo. *Bolt. fung.* 31. *t.* 31.

atramen- 317. A. gregarius, pileo humescente lævi plicato fusco hinc
tarius. inde maculato, lamellis latiusculis divisis albidis, stipite tereti lineari. *Bulliard herb. Franc. t.* 164.

Digitalis 318. A. pileo semiovato crenulato livido-canescente extrorsum confertissime striato, vertice glabro ferrugineo, lamellis triplicis longitudinis atris, stipite ascendente elongato pallidissimo. *Batsch el. fung.* 61. *f.* 1.

sobolife- 319. A. pileo conico striato-piloso, stipite sobolifero albido.
rus. *Hoffm. nomencl. fung. n.* 357. *t.* 3. *f.* 1.

micaceus. 320. A. pileo humescente atro striato lamellisque primo albidis partialis micantibus consitis. *Bull. herb. Franc. t.* 246.

picaceus. 321. A. ater, pileo striato rudimentis cuculli albis vario, lamellis latiusculis duplicis longitudinis, stipite albo inferne crassiusculo. *Bulliard herb. Franc. t.* 206.

rostratus. 322. A. pileo conico-campanulato striato plumbeo caducis cuculli rudimentis aspero, lamellis atris, stipite albido, medio incrassato deorsum subulato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 80. *f.* 5.

gossypi- 396. A. stipite fistuloso, albido, junioris tomentoso. *Bull.*
nus. *herb. Franc. t.* 425. *f.* 2.

** acaules.

glandulo- A. subacaulis fuscus subtus albus, granulis intersitis. *Bull.*
sus. *herb. Franc.* 1. *t.* 426.

depluens. 323. A. subacaulis, pileo cano-sericeo dimidiato opaco, lamellis latiusculis fusco-rubellis margine arcuatis quadruplicis longitudinis. *Batsch el. fung.* 167. *f.* 122.

perennis. 324. A. subacaulis suberoso-coriaceus pallide ochraceus, lamellis pallidioribus. *Plan. fung. Erf. p.* 8. *n.* 25. *an coriaceus?*

dichrous. 325. A. pileo spadiceo nigricanti misto, margine repando-lobato, lamellis bifidis pallide sulphureo-ochraceis. *Schaeff. fung. t.* 246.

applicatus. 326. A. inversus orbicularis cinereo-nigricans, lamellis in centro contingentibus albido-caerulescentibus centrum impresso-adnatum tendentibus. *Batsch el. fung. cont.* 171. *f.* 125.

violaceo-fulvens. 327. A. violaceo fulvus, pileo coriaceo aspero semiorbiculato. *Batsch el. fung.* 95. *f.* 39.

Lingua. 328. A. semiorbicularis glaber fulvus, lamellis purpureis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 123. *t.* 65. *f.* 3.

fulvescens. 329. A. coriaceo villosus albicans, lamellis fulvis. *Vaill. flor. par. t.* 1. *f.* 4.

cespitosus. 330. A. spatulatus convexus luteus glabriusculus, lamellis fereis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 123. *t.* 65. *f.* 5. 6. β) Agaricus ochraceus. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1095.

niveus. A. subacaulis albus tener siccus, pileo glabro subtus pallide ferrugineo, margine (senescentis) inaequali. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 288.

versicolor. 331. A. suberoso-coriaceus tomentosus fusco-griseoque fasciatus, lamellis albis simplicibus tenuibus. *Plan. fung. Erf. p.* 4. *n.* 3.

striatulus. 332. A. ferrugineus pubescens, margine integro, lamellis alternis interruptis cinereis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 148.

radians. 333. A. flabelliformis albidus villosus, margine inciso crenato, lamellis concoloribus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 148.

gelatinosus. 334. A. pileo diformi albido sublanato, lamellis ochroleucis simplicibus inaequalibus. *Schaeff. fung. t.* 213.

planus. 369. A. erectus planus semicircularis margine undulatus fuscus, lamellis lanceolatis triplicis ordinis. *Bolton fung.* 2. *t.* 72. *f.* 3.

plumatus. 370. A. pileo multiformi apice crenato revoluto pennas struthionis referente. *Walt. flor. carol. p.* 261.

fagineus. 397. A. pileo suberoso tomentoso albido, lamellis cervinis * margine subvenosis. *Schrader an distinctæ satis species?*

MERULIUS. *Fungus* subtus venosus.

* *stipitati.*

cornucopioides. 1. M. fuscus tenax, pileo lobato, venis subquadruplici ordine decurrentibus. *Bolton fung.* 8. *t.* 8. β) *Schaeff. fung. t.* 275.

umbonatus. 2. M. pileo umbonato cinereo, ſtipite concolori tereti, venis albis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 109. *t.* 16. *f.* 1. Agaricus muſcoides.

Cyathus. 3. M. coloris lignei, pileo infundibuliformi, venis decurrentibus, ſtipite tereti fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 208.

infundibuliformis. 4. M. murinus mollis, pileo infundibuliformi, venis argenteis, ſtipite compreſſo rugoſo fiſtuloſo. *Bolt. fung.* 34. *t.* 34.

helvelloides. 5. M. pileo infundibuliformi zonato, ſtipite fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 294. *t.* 46. Helvella tubæformis.

agaricoides. 6. M. mollis luteſcens pileo infundibuliformi zonato, ſtipite fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 208. Agaricus cornucopioides.

cantharelloides. 7. M. ſtipite aurantio fiſtuloſo bulboſo, pileo fuſceſcenti unicolore. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 297. *t.* 473. *f.* 3. Hevella cantharelloides.

hydropipes. 8. M. fuſco-nigricans, ſtipite ad baſin fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 292. *t.* 465. *f.* 2. *An diſtincta hujus generis ſpecies?*

aurantiacus. 9. M. pileo ſicco aurantio, venis rubris, ſtipite tereti lineari farcto. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 101. *t.* 14. *f.* 3.

alectorolophoides. 10. M. obſcure aureus, pileo punctato, margine lobato, venis rectis. *Schæff. fung. t.* 206. *An mera varietas aurantiaci?* β) *Schæff. fung. t.* 212.

criſpus. 11. M. coriaceus, pileo infundibuliformi, margine criſpo, ſtipite ſolido. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 293. *t.* 465 *f.* 1.

Cantharellus. 12. M. vitelinus ſuaveolens, pileo (ſeneſcentis) excavato, margine undulato lobato, venis ſubcriſpis decurrentibus, ſtipite tereti farcto ſurſum dilatato. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 722. Agaricus Chantarellus. *Schæff. fung. t.* 82. *Bolton fung.* 2. *t.* 62.

pruinatus. 13. M. pileo plano crenulato fuſco-cinereo, venis cinereo-griſeis pruinatis, ſtipite luteo lineari elongato valido. *Batſch el. fung.* 93. *f.* 35. *An diſtincta ſatis ſpecies?*

ſquamula. 14. M. pileo albente convexo-plano, venis rarioribus obſoletis radiantibus, ſtipite tenerrimo ſubulato-ſetaceo. *Batſch el. fung. cent.* 95. *f.* 84.

inflexus. 15. M. luteus pileo infundibuliformi, margine inflexo criſpo, venis luteſcentibus decurrentibus, ſtipite aureo, medio incraſſato ſurſum attenuato, *Vaill. flor. par. t.* 11. *f.* 9. 10. β) *Vaill. flor. par. t.* 11. *f.* 11-13. *ad ſequent.*

fiffus. 16. M. pileo infundibuliformi fiffo cinereo, venis decurrentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 534.

mufcigenus. 17. M. grifeo-lutefcens fubacaulis dimiatus fuborbiculatus. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 288. Agaricus mufcigenus.

pezizoides. 18. M. fubacaulis infundibuliformis, difco patente finuato-punctato, venis obfoletis. *Schaeff. fung. t.* 165. 166. *Syft. Nat. Ed.* XII. 2. Peziza infundibuliformis.

* * *acaules.*

niveus. 19. M. lævis horizontalis niveus fubtus fufcus. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 152.

alneus. 20. M. coriaceus albidus cano-tomentofus femiorbicularis, margine repando, venis ramofis. *Bulliard herb. Franc. t.* 346. *An forfan diftincti generis ?*

fquamofus. 21. M. membranaceus, pileo rubiginofo fquamofo, venis cervinis. *Schrader.*

reticulatus. 22. M. verticulis fubrotundus membranaceus lævis canus, venis reticulatis cinerafcentibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 289. *t.* 498. *f.* 1. Helvella utiruga.

dimidiatus. 23. M. membranaceus horizontalis lævis fufcefcens. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 290. *t.* 498. *f.* 2.

alutaceus. 24. M. coriaceus fupra grifeus erectus villofus. *Bull. herb. Franc. t.* 394.

lichenoides. 25. M. laminis depreffis decumbentibus connatis ex centro dilatatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 575. *n.* 1633.

betulina. 26. M. coriaceus villofus fuborbicularis margine obtufo, venis confertis anaftomofantibus ochroleucis flavifve. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 723. Agaricus betulinus. *Bull. herb. Franc. t.* 290. Auricularia tremelloides. *β*) *Batfch. el. fung. p.* 95. *n.* 138. *f.* 34. Agaricus Chantarellus.

quercinus. 27. M. fuberofo-coriaceus planus villofus femiorbicularis annulis diverfi coloris pictus, venis confertis cartilagineis anaftomofantibus albidis vel fufcefcentibus. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 723. Agaricus quercinus. *Schaeff. fung. t.* 57. *Bull. herb. Franc. t.* 362. 442. *f.* 1.

labyrinthiformis. 28. M. lignofus fufcus deformis, venis pallidioribus labyrinthiformibus. *Schaeff. fung. t.* 231. *Nonne mera quercini varietas ?*

vastator. 29. M. orbicularis (adultus) aureus, venis crispis centrum versus in plicas abeuntibus, tuberculis intus albis utplurimum agregatis caulescentibus intermediis. *Tode Abh. hall. Ges.* 1. *p.* 351. *t.* 2. *f.* 1-4.

serpens. 30. M. coriaceus niveus orbicularis, venis crispis fuscescentibus medium versus in plicas transeuntibus. *Tode Abh. hall. Ges.* 1. *p.* 355.

1210. BOLETUS. *Fungus* subtus porosus.

* *stipitati.*

perennis. 1. B. perennis, pileo utrinque planiusculo peltato fusco, poris punctiformibus ochraceo-albis, stipite laevi. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 334. *t.* 28. & *t.* 449. *f.* 2.

annularius. 2. B. perennis, pileo albo, centro concavo papillato, margine deflexo, stipite basi nigro. *Bull. herb. Franc. t.* 124. *An satis distinctus a leptocephalo?*

leptocephalus. 3. B. pileo plano tenui supra cervino subtus albo. *Jacq. misc. austr.* 1. *p.* 142. *t.* 12.

dimidiatus. 4. B. perennis, pileo dimidiato undulato laevi, poris albis. *Thunb. flor. jap. p.* 348. *t.* 39.

viscidus. 5. B. pileo pulvinato viscido, poris teretibus convexis immersis distinctis, stipite lacero. *Schaeff. fung. t.* 103. 104.

granulatus. 6. B. pileo pulvinato viscido, poris teretibus subangulatisque truncatis, angulo granulato.

luteus. 7. B. pileo pulvinato viscido porisque rotundatis convexis flavissimis, stipite annulato. *Schaeff. fung. t.* 114. & 115. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 316. *t.* 332.

bovinus. 8. B. pileo pulvinato glabro marginato, poris acutis compositis, porulis angularis brevioribus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 322. *t.* 60. 494. β) Boletus aestivus. *Schlotterb. act. helv.* 4. *p.* 54. *t.* 5. *f.* 2.

mutabilis. 9. B. pileo pulvinato fusco, tubis flavescentibus rubisve, stipite incrassato brevi fuscescente rubellove. *Schaeff. fung. t.* 108. 133. β) Boletus bulbosus. *Schaeff. fung. t.* 134. 135.

ferrugineus. 10. B. pileo pulvinato ochraceo-fusco glabro poris ferrugineo-brunneis, stipite subferrugineo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 318. *t.* 451. *f.* 2. *Batsch el. fung. cent. p.* 181. *f.* 128. β) Boletus suspectus. *Gled. meth. fung. p.* 66. *n.* 1. *var.* 1.

tuberosus. 11. B. pileo pulvinato stramineo, poris flavis, stipite brevi basi tuberoso. *Bull. herb. Franc. t.* 100.

cereus. 12. B. pileo pulvinato pullo, poris ochroleucis, stipite albido. *Bull. herb. Franc. t.* 385.

cinnamomeus. 13. B. cinnamomeus fragilis, pileo concavo villoso in centro infundibuliformi fulvo, poris annulatis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 116. *t.* 2.

aurantiacus. 14. B. pileo fulvo-canescente, stipite rugoso maculoso. *Bull. herb. Franc. t.* 236.

exasperatus. 105. B. pileo flavescente margine deflexo hispidulo, poris rhomboideis albis, stipite fuscescenti. *Schrader. Mich. nov. pl. gen. t.* 70. *f.* 5.

fasciculatus. 106. B. pileo fusco fasciculatim piloso, poris flavescentibus, stipite lævi fuscescenti. *Schrader.*

pallescens. 107. B. lævis, pileo planiusculo flavescente poris tenuissimis, stipite subgracili subcompresso. *Schrader.*

fuscidulus. B. pileo plano acute castaneo, poris subrotundis flavescentibus, stipite subflexuoso. *Schrader.*

pusillus. B. pileo convexo cinereo, poris subangulatis albidis, stipite crassiusculo. *Schrader.*

supinus. 15. A. pileo castaneo, margine costato sinuatoque, poris albidis. *Flor. dan. t.* 894. β) Boletus castaneus. *Weber suppl. flor. holf. p.* 13.

biennis. 95. B. pileo infundibuliformis crenato rufescente ad marginem albido, carne alba coriacea. *Bull. herb. de la Franc. t.* 449. *f.* 1.

lacteus. 16. B. pileo convexo peltato orbiculato fusco, stipite lineari valido diffuso porisque linearibus confertissimis catenulatis niveis. *Batsch el. fung. p.* 103. *f.* 42. β) *Schæff. fung. t.* 111. 265. 266. γ) *Mich. nov. pl. gen. t.* 71. *f.* 1. δ) *Schæff. fung. t.* 127.

ramosissimus. 17. B. ramosissimus, pileis numerosis hemisphæricis multiplex. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 172.

frondosus. 18. B. frondosus cespitosus fuscus, frondibus imbricatis planiusculis reflexis, poris albis. *Schæff. fung. t.* 128. 129.

strobiliformis. 19. B. pileo hemisphærico tessellato-squamoso fusco, poris angulatis albis. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 17. *t.* 3. *f.* 2.

fragilis. 20. B. pileo peltato pallidiſſime flavo, poris pallide ſulphureo-virentibus, ſtipite diffuſo valido craſſo albo teretiuſculo. *Schæff. fung.* t. 121. 122. 264. 3.

carolinianus. 85. B. pileo aſcendente ſubdimidiato pulvinato marginato, poris minutiſſimis fulvis. *Walt. flor. carol. p.* 262.

procerus. 21. B. pileo parvo convexo glabro ſtipiteque longo ſubfuſiformi ſubolivaceis, poris tenuiſſimis numeroſis albidis. *Bolt. fung.* 2. t. 86. *An diſtincta ſatis ſpecies?*

hirſutus. 22. B. cinereus, pileo rimoſo, poris latis irregularibus, ſtipite elongato valido ſublineari hirſuto-ſquamuloſo. *Mich. nov. pl. gen.* t. 71. *f.* 2.

ſubtomentoſus. 23. B. pileo ſubtomentoſo ſtipiteque flavis, poris ſubangulatis difformibus fulvis planis. *Bull. herb. Franc.* t. 490. *f.* 3. *β*) *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 317. t. 451. *f.* 1. Boletus paraſiticus.

ſquamoſus. 24. B. pileo flaveſcente ſquamoſo, poris difformibus oblonge flexuoſis niveis, ſtipite laterali. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 344. *t.* 19. & *t.* 312.

infundibuliformis. 25. B. fulvens, ſtipite in pileum infundibuliformem dilatato, poris dilatatis brevibus. *Mich. nov. pl. gen.* t. 70. *f.* 4. 8. 10.

lucidus. 26. B. pileo coriaceo caſtaneo lucido concentrice ſulcato, poris minutiſſimis albis, ſtipite laterali. *Leyſſ. fl. hal. n.* 1245.

hypocrateriformis. 90. B. albus pileo coriaceo depreſſo, ſtipite æquali. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 621. *n.* 1749. *An Hydnum ſublamelloſum?*

umbilicatus. 91. B. pileo coriaceo depreſſo, merilo excavato, margine fuſco, ſtipite baſi bulboſo, poris connexis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 621. *n.* 1748.

Bulliardi. 27. B. hepaticus ſubtus dilutior, pileo viſcido, ſtipite laterali. *Bull. herb. Franc.* t. 74.

ſubveſcus. 92. B. carnoſus, pileo convexo ſubtus miniato, carne flavicante ad aërem nigreſcente, ſtipite brevi craſſo rufeſcente. *Schranck flor. bavar.* 2. *p.* 620. *n.* 1747. *Schæff. fung.* t. 107. *An a mutabilli ſatis diſtinctus?*

lapidum. 93. B. carnoſus, pileo convexo ſupra fuſco ſubtus flavo, carne alba, ſtipite ſolido ſubrugoſo exalbido. *Schæff. fung.* t. 105.

nigreſcens. 94. B. carnoſus, pileo viſcido fuſco, carne alba ad aërem cæruleſcente. *Pallas it.* 1. *p.* 31. *An mutabilis forſan varietas?*

scaber. 28. B. mollis spongiosus albidus, pileo superne griseo, poris longissimis, stipite rugosissimo. *Bull. herb. Franc. t.* 132.

obliquatus. 29. B. exsiccabillis badius nitidus coriaceo-suberosus, pileo obliquo fluctuante, tubis albo-ferrugineis, stipite laterali. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 335. *t.* 7. & 459.

elegans. 30. B. subacaulis tenax auriformis, supra nitens spadiceus. *Bulliard herb. Franc. t.* 46.

ramulorum. 31. B. coriaceus, pileo orbiculari, stipite laterali. *Bulliard herb. Franc. t.* 124. *β)* Boletus flabelliformis. *Leyss. fl. hal. ed.* 1. *n.* 1093.

Batschii. B. perennis, pileo glabro ferrugineo ad marginem lacero crenato, stipite laterali. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 181. *f.* 129.

fagineus. B. substipitatus, pileo nitido albido, poris subrotundis rufescentibus stipite laterali. *Schrader.*

** *acaules.*

agaricoides. 32. B. coriaceus lævis, poris angulatis lineari-oblongis undulatis. *Tunb. flor. jap. p.* 347.

lacrymans. 33. B. coriaceus semiovalis aurantiacus rugoso-reticulatus, fascia marginali lata nivea fornicata. *Wulfen. ap. Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 111. *t.* 8. *f.* 2.

rufus. 109. B. explanatus coriaceus rufus, poris minutissimis rotundatis. *Scrader.*

citrinus. B. pulvinatus inbricatus flavus lævis, poris tenuissimis concentricis. *Lemmig. fl. posoon. p.* 525.

cristatus. B. fasciculatus squamosus, poris minutissimis, lobis laciniato fimbriato-cristatis. *Geld. meth. fung. p.* 75. *n.* VIII.

tuberculosus. B. durus tuberculosus, ex albo cinereoque fulvescens, poris minutissimis connexis. *Geld. meth. fung. p.* 80. *n.* 12. *var. c.*

lobatus. 34. B. coriaceus convexus lobatus flavus lævis, poris tenuissimis. *Willd. prodr. flor. Berol. n.* 1136.

fasciatus. 35. B. durus superne inæqualis fuscus nigro-fasciatus, poris albis tenuissimis. *Swarts nov. pl. gen. p.* 149.

microporus. 36. B. ligneus durus difformis inæqualis, poris inæqualibus impalpabilibus pallidis. *Brown jam. p.* 77. *Poria* 4.

hydnoides. 37. B. crassus setis crassis ramosis erectis dansis nigris superne tectus, poris tenuissimis teretibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 149.

Favus. 38. B. subpulvinatus scaber setis erectis ramosis, poris patulis angulatis. *Flor. dan. t.* 893. *Bull. herb. Franc. t.* 421.

lipsiensis. 39. B. pulvinatus suberosus supra glaber incrementis convexis tuberculisque gradatus, margine declivi fasciato. *Batsch el. fung. cent.* 1. *f.* 130.

suberosus. 40. B. pulvinatus albus lævis, poris acutis difformibus. *β) Bull. herb. Franc. t.* 491. *f.* 1. *γ) Bolt. fung.* II. 78. *t.* 78.

nitens. 41. B. pulvinatus læviusculus nitens varie rubicundus, poris albis flavidisve. *Schæff. fung. t.* 109. 110.

fomentarius. 42. B. pulvinatus inæqualis obtusus, poris teretibus æqualibus glaucis.

igniarius. 43. B. pulvinatus lævis, poris tenuissimis. *Bull. herb. Franc. t.* 82. 401. & 454. *Batsch el. fung. cent.* 1. *f.* 1305.

purgans. 44. B. pulvinatus subconicus suberoso-carnosus levis inæqualis supra incrementis convexis circulariter fimbriatus & gradatus. *Jacq. misc. austr.* 1. *n.* 6. *t.* 20. 21.

cinnabarinus. 45. B. pulvinatus totus intus & foris ruber. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 304.

sanguineus. 59. B. submembranaceus ruber, poris impalpabilibus.

villosus. 46. B. submembranaceus fuscus griseo-albidus villosus, poris difformibus dentatis. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 148.

membranaceus. 47. B. submembranaceus prolifer gregarius lævis radiatus-albus, poris erosis difformibus. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 148.

betulinus. 48. B. gregarius, pileo pellicula rufescente tecto. *Bulliard herb. Franc. t.* 312. *An distinctus satis a fomentario?*

Calceolus. 99. B. subacaulis excavatus, margine elevato repando. *Bull. herb. Franc. t.* 300. & 494. *f.* 2.

salignus. 100. B. suaveolens unicolor albidus intus niveus dimidiatus supra lævis, tubis brevissimis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 340. *t.* 433. *f.* 1.

fraxineus. 101. B. dimidiatus glaber intus lutescens subtus lateritius, pilei margine albo, tubis brevibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 341. *t.* 433. *f.* 2.

sulphureus. 102. B. viscidus mollis dimidiatus aureus subtus sulphureus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 347. *t.* 429. *Schæff. fung. t.* 131. 132.

ramosus. 103. B. albidus fragilis utrinque porosus ramosus, ramis cylindricis. *Bull. herb. Franc. t.* 418.

decipiens. B. coriaceus dimidiatus fupra villofus fafciatus, tubis dædaleis fubrutilo-cinereis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 365. *t.* 408. & 501. *f.* 3. *Willdenow bot. Mag.*

imbricatus. 49. B. gregarius lutefcens, pileis fimbriatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 366.

fcalaris. 86. B. fubacaulis, pileo excavato fcalæ inftar coccinellæ quafi circumvoluto. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 617. *n.* 1737.

ferruginofus. B. refupinatus explanatus inæqualis coriaceus fufco-ferrugineus, poris fubrotundis. *Scrader.*

abietinus. B. refupinatus effufo-reflexus, pileo tenui hirfuto albido, poris angulatis margine acutis fufcis. *Perfoon.*

falicinus. B. refupinatus fuberofus late effufus undulato-rugofus cinnamomeus. *Perfoon.*

verficolor. 50. B. fafciis difcoloribus, poris albis. *Bull. herb. Franc. t.* 86.

hifpidus. 51. B. fupra vifcidus pilofus badius. *Bulliard. herb. Franc.* 1. *p.* 251. *t.* 210. & 493. *An vere diftinctus ab. hepatico?*

fuaveolens. 52. B. totus albus fuperne lævis, poris inæqualibus. *Bull. herb. Franc. t.* 310.

fufcus. 53. B. lateralis membranaceus fuberofo-lignofus, fupra lævis fufcus fubfafciatus, poris brevibus fubcircularibus canefcentibus. *Batfch el. fung. cent.* 1. *p.* 178. *f.* 127.

aduftus. 54. B. fufcefcens, margine nigro, poris tenuiffimis reticulatis. *Willden prodr. flor. berol. n.* 1138. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 339. *t.* 445. *f.* 1. *B. imberbis.*

fulvus. 55. B. totus fulvus inæqualis, poris tenuiffimis æqualibus teretibus. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1134.

globatus. 56. B. convexus fubglobatus rufus lævis, poris teretibus flavis. *Willden prodr. flor. berol. n.* 1133.

refupinatus. 57. B. refupinatus fubtus glabriufculus albus, fuperne poris impulpabilibus fufcis. *Swarts nov. pl. gen. & fp. p.* 149.

hirfutulus. 58. B. femicircularis plano-convexus niveus fupra hirfutus, lineis concentricis alternis depreffis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 149.

odoratus. 59. B. plano-convexus fubpulvinatus aurantiacus, poris angulatis, caryophyllum olens. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 150.

cornutus. 82. B. coriaceus lobatus, lobis linguiformibus. *Bolton fung.* 2. *t.* 76.

hepaticus. 84. B. lævis carnosus sanguineus mollis dimidiatus tubullis liberis inæqualibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 314. *t.* 74. 464. 497. *An distincti generis ?*

sebaceus. 60. B. undulatus late expansus albido-spadiceus. *Leyss. flor. hal. n.* 1250.

papyraceus. 89. B. albus siccus papyraceus, poris inconspicuis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 618. *n.* 1739.

Medulla panis. 75. B. crustaceus albus effusus difformis. *Jacq. misc. austr.* 1. *p.* 141. *t.* 11.

obliquus. 76. B. ligneus poris obliquis rostratis inæqualibus. *Bolton fung.* 2. *t.* 74.

1211. HYDNUM. *Fungus* subtus fibris subulatis echinatus.

* *stipitata.*

imbricatum. 1. H. fuscum, pileo subconvexo squamoso, squamis imbricatis suberectis. *Schæff. fung. t.* 140. H. squamosum. *Bats. el. fung. f.* 43. *Bull. herb. Franc. t.* 409.

carnosum. 2. H. pileo convexo glabro rubello, aculeis griseis stipiteque subconcoloribus. *Schæff. fung. t.* 273.

sublamellosum. 3. H. album senescens ochroleucum, pileo infundibuliformi, papillis duplicatis tortuosis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 306. *t.* 453. *f.* A–E.

zonatum. 4. H. pileo conico excavato coriaceo fasciato stipiteque lævi atris, aculeis griseo-albis. *Schæff. fung. t.* 272.

repandum. 5. H. pileo convexo rufo subtus albo, stipite basi incrassato. *Flor. dan. t.* 310. β) *Schæff. fung. t.* 318. γ) *Bolton fung.* II. 88. *t.* 88.

tomentosum. 6. H. pileo plano-infundibuliformi. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 3.

coralloides. 7. H. albidum ramosissimum, ramis compressis, apicibus deflexis. *Schæff. fung. t.* 142. Hydnum ramosum. *Bull. herb. Franc. t.* 390.

An distincta species Boletus canceolatus a Cl. Fabricio *in fodinis carbonariis prope Whitehaven repertus & ab* Ill. Ferber *n. Beytr. zur Mineralg. f.* 1. *p.* 405. *memoratus ?*

floriforme. 8. H. coriaceum, pileo turbinato velutino purpurascente, stipite nigro sublignoso. *Schæff. fung. t.* 146.

hybridum. 28. H. rufescens vel atrum, pileo infundibuliformi ad marginem crenato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 307. *t.* 451. *f.* F. I.

cyathiforme. 9. H. gregarium, pileo infundibuliformi fasciato fibroso elastico, stipite brevi. *Bulliard herb. Franc. t.* 156. *β*) Hydnum cinereum. *Bull. herb. Franc. t.* 419.

suberosum. 10. H. lignoso-suberosum, pileo colorato supra fovento-plicato, margine acuto crispove, stipite obconico. *Batsch el. fung. f.* 45. 221. 222. 223.

clandestinum. 11. H. carnosum albidum, pileo obtusato supra glabro, stipite obconico. *Schæff. fung. t.* 144. 145.

Auriscalpium. 12. H. pileo dimidiato hirsuto fusco inferne albicante, stipite fusco. *Curt. flor. Lond. t.* 190.

gelatinosum. 13. H. gelatinosum, pileo dimidiato supra glaberrimo. *Jacq. flor austr.* 3. *t.* 239.

* * *acaulia.*

parasiticum. 14. H. arcuato-rugosum subvillosum. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 12. *f.* 5. *An potius agaricus aut merulius?*

rubicundum. 15. H. album, aculeis rufescentibus brevissimis. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 13. *f.* 6.

candidum. 16. H. album, aculeis longis concoloribus. *Will. bot. Mag.* 4. *p.* 14. *f.* 7.

Erinaceum. 17. H. subacaule convexum cordiforme ochroleucum, aculeis longiusculis apice subulatis imbricatis lubro-fuscis gradatim pendulis. *Bulliard herb. Franc. t.* 34.

agaricoides. 18. H. convexum læve pallidum subtus ferrugineum. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 149.

resupinatum. 19. H. planum imbricatum subtus scabrum supra setis ramentaceis ferrugineis tectum. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 149.

sericeum. 20. H. imbricatum planum molle utrinque sericeum exalbido-virescens. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 149.

Occarium. 21. H. villosum album, aculeis magnis oblongis obtusis planis. *Mich. nov. plant. gen. t.* 64. *f.* 3.

pectiniforme. 22. H. villosum album, aculeis subulatis validis abbreviatis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 64. *f.* 4. 5.

hyſtricinum. 23. H. ſubclavatum album, aculeis elongatis validis ſubulatis patenti-arrectis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 64. *f.* 1.

carolinianum. 24. H. ovatum, ſupra ſubtuſque echinatum. *Walt. flor. carol. p.*263. *An forſan thælæphora?*

ſtalacticum. 25. H. ramoſiſſimum, ſtipite immerſo craſſiſſimo, ramis ramuliſque aculeis ramoſiſſimis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 624. *n.*1756. *An potius coralloides?*

clatroides. 26. H. ſtrigoſum ramoſiſſimum hinc papilloſum inde villoſum. *Pall. it.* 2. *p.* 744. *t.* K.

papyraceum. 27. H. membranaceum niveum ſupra læve, ſubtus aculeis ſimplicibus multifidiſque. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 1. *p.* 345.

mucidum. H. effuſum album, aculeis teretibus integerrimis. *Perſoon fung. ined.*

ochraceum. H. effuſo-reflexum, pileo coriaceo tenui zonato ochraceo, aculeis minutis ochraceo-carneis. *Perſoon.*

Barba jovis. H. membranaceum, ſtramineo-rufeſcens, aculeis multifidis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.*303. *t.* 481. *f.*2. *An hujus generis?*

THÆLÆPHORA. *Fungus* ſuberoſus ſubtus papillatus fructificans.

† *horizontales.*

meſenteriformis. 1. Th. ſubſtipitata imbricata floccoſo-faſciata fuſca, margine laciniato albido. *Willd. prodr. fl. berol. t.*7. *f.*15. *Schæff. fung. t.* 328. Elvela caryophyllea. *Batſch. el. fung. t.*24. *f.* 41. Agaricus triſtis. *Bull. herb. Franc. t.*274. & *t.*483. *f.* 6. 7.

meſenterica. 2. Th. acaulis gelatinoſo-coriacea imbricata tortuoſa ſupra villoſa faſciata, ſubtus glabra violacea. *Mich. nov. pl. gen. t.* 66. *f.* 4. *Bull. herb. Franc. t.* 290. Auricularia tremelloides.

hirſuta. 3. Th. acaulis imbricata coriacea ſupra villoſa faſciata variegata ſubtus glabra pallida. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Helvella pineti. *Bolt. fung. t.* 82. Boletus auriformis. *Bull. herb. Franc. t.* 274. 483. *f.*1. 3. Auricularia reflexa.

lilacea. 4. Th. acaulis ochraceo-pallida ſupra tomentoſa ſpadiceo-faſciata, margine extimo ſupra ſubtuſque roſeo-lilacino. *Batſch. el. fung. cent.* 1. *p.* 187. *f.* 131. Elvela lilacina; *An diſtincta ſatis ſpecies?*

sericea. 5. Th. acaulis imbricata coriacea supra sericea fasciata pallescens subtus glabra flavescens. *Schrader fung. ined.*

striata. 6. Th. acaulis subimbricata coriacea supra striata tomentosa fusco-ferruginea subtus piloso-exalbida. *Schrader fung. ined.*

rubiginosa. 7. Th. acaulis imbricata rubiginosa supra tomentosa subtus pilosa. *Bull. herb. Franc. t.* 378. Auricularia ferruginea.

variegata. 8. Th. acaulis imbricata membranacea supra sericea fasciata variegata subtus pilosa ochracea. *Schrader fung. ined.*

fusca. 9. Th. acaulis subimbricata membranacea supra tomentosa fasciata fusca subtus nivea. *Schrader fung. ined.*

†† *explanatæ.*

undulata. 10. Th. coriaceo-lignosa supra glabra carnea subtus undulata fusco-purpurea. *Schrader fung. ined.*

applanata. 11. Th. appressa coriaceo-lignosa supra glabra flava subtus tomentosa. *Schrader fung. ined.*

ferruginosa. 12. Th. membranacea supra albida, subtus tomentosa ferruginea. *Schrader fung. ined.*

glabra. 13. Th. lævis exalbida. *Willd. prodr. fl. Berol. n.* 1104.

carnea. 14. Th. membranacea supra glabra carnea subtus tenuissime tomentosa nigra. *Bull. herb. Franc. t.* 436. Auricularia corticalis.

phylacteris. 15. Th. membranacea plicata supra glabra fuliginoso-fusca subtus tomentosa. *Bull. herb. Franc. t.* 436. *f.* 2. Auricularia phylacteris.

papyracea. 16. Th. membranacea tenuissima supra glabra carnea subtus tomentosa nivea. *Schrader fung. ined.* β) *Bull. herb. Franc. t.* 402. Auricularia papyrina.

alutacea. 17. Th. membranacea tenuissima supra exalbida subtus tomentosa albida. *Schrader fung. ined.*

††† *effusæ.*

crocea. 18. Th. tenuis fragilis tota crocea. *Schrader fung. ined.*

XYLOSTROMA. *Fungus* expanſus coriaceus deformis interpolatus lævis æqualis, ſeminibus globuloſis minutiſſimis intus fungi fibrillis inſidentibus.

giganteum. 1. XYLOSTROMA. *Tode ſung. meklenb. ſel.* 1. *p.* 36. *t.* 6. *f.* 51.

HELOTIUM. *Fungus* pileo carnoſo-membranaceo convexo-hemiſphærico ſubtus lævi ſemina nuda portante.

glabrum. 1. H. pileo plano ſtipiteque glabris. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 22. *t.* 4. *f.* 35. β) *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 96. *t.* 473. *f.* 1.

cucullatum. 2. H. ferrugineum flavum, ſtipite lineari gracili, pileo ſemiovali. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 189. *f.* 132. Elvella cucullata.

unctuoſum. 3. H. pileo ſubtus ſtipiteque glabris, pileo ſupra unctuoſo, margine calloſo. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 193. *f.* 134. Elvella unctuoſa.

hirſutum. 4. H. pileo ſupra ſtipiteque hirſutis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 23. *t.* 4. *f.* 36.

agaricoides. 5. H. candidum, ſtipite longo baſi piloſo ſubtuberoſo. *Bolton fung.* 3. *p.* 98. *t.* 98. *f.* 1.

aureum. 6. H. luteum, pileo lato craſſiuſculo, ſtipite brevi. *Bolton fung.* 3. *p.* 98. *t.* 98. *f.* 2.

1216. CLAVARIA. *Fungus* elongatus (ſimilaris) ſubſolidus in ſuperficie omni fructificans.

* acaules.

† indiviſæ.

piſtillaris. 1. Cl. clavæformis ſimpliciſſima glabra ſolida. *Schæff. fung.* *t.* 169.

glabra. 2. Cl. clavæformis ſimpliciſſima glabra fiſtuloſa. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 212. *t.* 463. *f.* 1.

3. Cl.

atra. 3. Cl. clavata integerrima subcompressa tomentosa atra. *Schr. Schm. anal. pl. t.* 25. *β) Mich. n. pl. gen. t.* 87. *f.* 8.

ophioglossoides. 4. Cl. clavata integerrima compressa obtusa. *Bulliard herb. Franc. t.* 372. *An forsan helvellae propior?*

simplicissima. 5. Cl. simplicissima teres subulata flava apice fusca. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1180. *Baumg. fl. Lips. t.* 4. *f.* 2. a.

atro-purpurea. 6. Cl. clavata tereti-pliculata, cute glabra fusvo-atra. *Batsch el. fung. p.* 133. *f.* 47. *β*) Clavaria rugosa. *Bull. herb. Franc. t.* 448. *f.* 2. *An forsan helvellae species?*

serpentina. 7. Cl. viridis, clava oblonga. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 571. *n.* 1623.

viridis. 8. Cl. cespitosa integerrima viridis, clava integra rugosa. *Schrader.*

cornea. 9. Cl. lanceolato-subulata valida fulvens gelatinosa. *Batsch el. fung. p.* 139. *n.* 15. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 204. *t.* 463. *f.* 4.

resinosorum. 10. Cl. conico-oblonga obtusa valida abbreviata gelatinosa. *Mich. nov. pl. gen. t.* 92. *f.* 1.

tubulosa. 11. Cl. simplex teres gracilis tubulosa, pilis deciduis vestita. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 213. *t.* 463. *f.* 2.

purpurea. 12. Cl. cespitosa rufo-fusca subcompressa apice acuminata. *Flor. dan. t.* 837. *f.* 2.

inaequalis. 13. Cl. cespitosa compresso-lata apice acuminata. *Flor. dan. t.* 836. *f.* 1.

cespitosa. 14. Cl. cespitosa simplicissima basi nonnunquam unita oblongo-clavata farcta aquose luteola. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 98. *t.* 12. *f.* 2.

elveloides. 15. Cl. cespitosa simplicissima crassissima basi unita obverse pyramidata striata. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 99. *t.* 12. *f.* 5.

fusca. 16. Cl. cespitosa fusca subsimplex compressa basi coalita tomentosa apice interdum furcata. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 150.

subdivisa. 17. Cl. subdivisa minuta fuscescens. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1185.

An distinctum genus Tabularia, *ab* Clariss. Fabricio *apud* Ill. Ferber *n. Beytr.* 2. *Mineralg.* 1. *p.* 405. *memorata*, *& quae ejus notae?*

†† *ramosæ*, Coralloïdæ, s. Ramariæ.

vermicularis. 18. Cl. rugosa, ramorum extimorum apice obtuso. *Hall. stirp. helv. hist. n.* 2202.

anthocephala. 19. Cl. rufescens ramosa, planis apice albo sublobato-crenatis. *Bull. herb. Franc. t.* 452. *f.* 1. *An hujus generis?*

cornuta. 20. Cl. ramis simplicissimis conoideis plano-truncatis. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 98. *t.* 14. *f.* 2. *An eadem cum demæcorni?*

coralloides. 21. Cl. ramis confertis ramosissimis inæqualibus. *Schæff. fung. t.* 175. 177. *β*) *Bulliard herb. Franc. t.* 354. *γ*) *Bull. herb. Franc. t.* 452. *f.* 2.

plebeia. 22. Cl. ramosissima, ramis simpliciusculis subovatis apice denticulatis. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 101. *t.* 13. *β*) Caput medusæ. *Bull. herb. Franc. t.* 412.

fastigiata. 23. Cl. ramis confertis ramosissimis fastigiatis obtusis luteis. *Bulliard herb. Franc. t.* 358. D. E.

muscoides. 24. Cl. ramis ramosis acuminatis inæqualibus luteis. *Flor. dan. t.* 775. *β*) *Flor. dan. t.* 836. *f.* 2. *γ*) *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 2.

crispa. 25. Cl. foliacea ramosissima, ramis planis crispis per oras serratis. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 100. *t.* 14. *f.* 1.

bifida. 26. Cl. bifida, laciniis subbifidis. *Kœnig apud. Retz. obs. bot.* 5. *p.* 32. *Bull. herb. Franc. t.* 263.

Cornu Alces. 27. Cl. albens fusiformis, apice truncato lobulato lacero cristato. *Schæff. fung. t.* 291. *Bolt. fung.* III. 115. *t.* 115.

Cornu Cervi. 28. Cl. ochracea, ramis apicem versus sensim attenuatis acutiusculis teretibus. *Schæff. fung. t.* 289. *β*) *Schæff. fung. t.* 273.

damæcornis. 29. Cl. alba supra truncata subramosa, ramis extimis compressis palmatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 666. *n.* 1845.

corticalis. 30. Cl. firma exalbida, ramis brevibus rudibus vagis apice subbarbatis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 231. *f.* 162.

brachiata. 31. Cl. lanceolata alba, ramis lanceolatis vagis subdivisis subbrachiatis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 233. *f.* 163.

** stipitatæ, *capitulo distincto solo semina elidente.*

gracilis. 32. Cl. stipite pellucido, capite clavato. *Bolt. fung.* III. 111. *t.* 111. *f.* 1.

fistulosa. 33. Cl. cespitosa alba fistulosa deorsum crassa sursum sensim acuminata. *Michel. nov. pl. gen. p.* 209. *t.* 87. *f.* 13.

granulata. 34. Cl. clavata alba simplicissima fistulosa teres, radice granulata nigra. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1179.

parasitica. 35. Cl. clavata nigra simplicissima, stipite tereti capitulo oblongo-tereti obtuso papilloso. *Willden. prodr. flor. ber. n.* 1178. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 302. *f.* 12.

placorhiza. 36. Cl. simplicissima tenuissima clavata fistulosa fusca, clava subulata albida, radice lentiformi clava. *Reich. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 315. *t.* 9. *f.* 4. 5.

capillaris. 37. Cl. stipite capillari violaceo lævi fistuloso, capitulo albo clavato. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 287. *f.* 2.

farinosa. 38. Cl. sanguinea albo-farinosa, ramis abbreviatis truncatis crenulatis. *Holm. bav. act. dan.* 1. *p.* 299. *f.* 6.

media. 39. Cl. candidoflavescens, capitulo simplicissimo obtuso integro. *Flor. dan. t.* 775. *f.* 2. & *t.* 837. *f.* 1.

ascendens. 40. Cl. cespitosa simplicissima farcta acuminata alba. *Flor. dan. t.* 837. *f.* 1.

delicatula. 41. Cl. candida, capitulo simplicissimo integro obtuso. *Gled. meth. fung. p.* 29. *t.* e. *β*) Clavaria alba. *Baumgart. fl. Lipf. p.* 652.

cylindrica. 42. Cl. luteo rufa, capitulo integro simplicissimo tenuissimo longissimo. *Mich. nov. pl. gen. p.* 208. *t.* 87. *f.* 7.

pedunculata. 43. Cl. nigra, stipite elongato gracili hirto, capitulo valido subovato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 87. *f.* 8.

lumbricalis. 44. Cl. cespitosa alba vel lutea lanceolato-clavata teres. *Mich. nov. pl. gen. t.* 87. *f.* 10. 11.

polymorpha. 45. Cl. rufa cespitosa apice sæpius fissa, stipite flexuoso. *Flor. dant. t.* 73. *f.* 1.

phalloides. 46. Cl. simplex fistulosa, stipite niveo undulato, apice capitato ovato-oblongo aurantio. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 214. *t.* 3. *f.* 3. *An hujus generis ?*

1204. TREMELLA. *Fungus* gelatinofus uniformis diaphanus, feminibus latitantibus.

granulata. 1. Tr. fphærica aggregata viridis. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 720. Ulva granulata. *Flor. dan. t.* 705.

Pifum. 2. Tr. globofa farcta viridis. *Mant. p.* 136. Ulva Pifum. *Flor. dan. t.* 660. *f.* 2.

moniliformis. 3. Tr. globofa pallide viridis in lineas difpofita. *Will. prodr. flor. berol. n.* 1224.

cavernofa. 4. Tr. fubglobofa folitaria rugofo-plicata intus varia. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 187. Ulva cavernofa.

fucata. 5. Tr. fubglobofa fubacaulis granulofa coccionellæ colore. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 218. *t.* 455. *f.* 2.

pruniformis. 6. Tr. fubglobofa folitaria intus fubulata. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 720. Ulva pruniformis. *Weig. obf. bot. t.* 2. *f.* 4.

hemifphærica. 7. Tr. hemifphærica fparfa. *Weig. obf. bot. t.* 2. *f.* 3.

punctiformis. 8. Tr. furdide aurantia acaulis e globulis irregularibus conflata. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 561. *n.* 1602.

adnata. 9. Tr. rotunda imbricata livida.

difformis. 10. Tr. fubrotunda finuata difformis.

arborea. 11. Tr. fubrotunda feffilis undulata nigrefcens. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 37. *t.* 8. *f.* 1.

ftipitata. 12. Tr. tota rubra diaphana ftipitata, corpore cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1225.

orbicularis. 13. Tr. feffilis pateriformis fordide viridis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 560. *n.* 1601. *An hujus generis ?*

rufa. 14. Tr. longitudinaliter dimidiato-infundibuliformis. *Jacq. mifc. auftr.* 1. *p.* 143. *t.* 14.

meteorica. 15. Tr. finuofo-gyrofa alba fubtus membrana coarctata. *Perfoon.*

veficaria. 16. Tr. grifeo-fufca membranacea faccata. *Bull. herb. Franc. t.* 427. *f.* 3.

clavariæformis. 17. Tr. gregaria fimplex aurantiaca compreffo-fubulata fubpyramidata bicornifve. *Wulf. ap. Jacq. Coll.* 2. *p.* 174. *An hujus generis ?*

viridis. 18. Tr. oblonga læte viridis convexa. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1222.

lithophila. 19. Tr. fusco-viridis oblongo-convexa. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17.

sepincola. 20. Tr. convexa sparsa crocea diaphana. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 18.

mesenterica. 21. Tr. subrotunda sessilis plicato-undulata aurea. *Jacq. misc. austr.* 1. *t.* 13.

Nostoc. 22. Tr. plicata undulata. *Flor. dan. t.* 885. *f.* 1. *Bull. herb. Franc. t.* 184.

persistens. 23. Tr. membranacea plicata rubra. *Bull. herb. Franc. t.* 304.

cinnabarina. 24. Tr. plicata mollis crassa ramosa rubra. *Bulliard herb. Franc. t.* 306.

juniperina. 25. Tr. plicata sessilis ascendens flava. *Mant. p.* 508. *Bull. herb. Franc. t.* 427. *f.* 1.

Sagarum. 26. Tr. membranacea sinuata rufo-fusca. *Flor. dan. t.* 885. *f.* 3.

undulata. 27. Tr. ascendens sinuato-undulata purpurea. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 32. *t.* 7. *f.* 1.

ustulata. 28. Tr. membranacea nigra lævis plicata. *Bull. herb. Franc. t.* 420. *f.* 2.

ancephaloides. 29. Tr. oblonga sessilis dilute carnea plicato-rugosa. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17. *f.* 14.

cerebrina. 30. Tr. carnosa in gyros plicata. *Bull. herb. Franc. t.* 386.

intestinalis. 31. Tr. tortuosa nigro-virens. *Flor. dan. t.* 805. *f.* 2.

torta. 32. Tr. flavescens minuta intestinorum instar torta. *Willd. bot. mag.* 4. *p.* 18.

allii. 33. Tr. sessilis membranacea labyrinthiformis grisea intus alba. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 286. *f.* 1.

violacea. 34. Tr. sessilis rugosa violacea inferne lævis. *Relh. flor. cant. p.* 442. *n.* 899. *An a persistente satis distincta ?*

plana. 35. Tr. expansa plana undulata atrovirens. *Wigg. prim. flor. holf. p.* 95.

ruberrima. 36. Tr. ruberrima crispo-undata sinuoso-plicata. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* VIII. 1. *p.* 155.

verticalis. 37. Tr. verticalis atra elaſtica varie plicata recens pollinem tenuiſſimum explodens. *Bull. herb. Franc. t.* 272.

crispa. 38. Tr. terreſtris tenera criſpa. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 140.

atra. 39. Tr. atra ſeſſilis minutim criſpata. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 562. *n.* 1606.

digitata. 40. Tr. linearis dentata fulva. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 33. *t.* 7. *f.* 2.

hydnoidea. 41. Tr. compreſſo-plana difformibus digitata hirſuta. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 145. *t.* 16. *Nonne eadem cum Puccinia?*

verrucoſa. 42. Tr. ſeſſilis tuberculoſa ſolida. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 39. *t.* 8. *f.* 2.

glanduloſa. 43. Tr. ſubſeſſilis diaphana nigra intus fuliginoſa glandulis conſperſa. *Bull. herb. Franc. t.* 420. *f.* 1.

miliaris. 44. Tr. rubra, verrucis confluentibus ſicco fiſſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 563. *n.* 1609.

rubra. 45. Tr. ſupra tomentoſa ſubtus glabra nitida, punctis ſparſis. *Flor. dan. t.* 884.

rubella. 46. Tr. rubra, ſtipite brevi. *Schæff. fung. t.* 323. 324. Ulva purpurea.

annulata. 47. Tr. oblonga fuſca ætate annulata. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17. *f.* 15.

deliqueſcens. 48. Tr. flava adultior flaveſcens deliqueſcens. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 219. *t.* 455. *f.* 3.

coralloides. 49. Tr. rubra fruticuloſa, ramis brachiatis obtuſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 562. *n.* 1608. *An tremella?*

1212. PHALLUS. *Fungus* ſubtus lævis, ſupra cellulis reticulatus.

fungoides. 1. Ph. pileo acute lobato glabriuſculo, ſtipite glabro ſurſum attenuato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 9.

undoſus. 2. Ph. pileo conico margine criſpo, rugis undulatis anaſtomoſantibus, ſtipite ſulcato-teſſellato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 84. *f.* 2.

Gigas. 3. Ph. pileo conico margine ſubundulato, rugis flexuoſis anaſtomoſantibus, ſtipite clavato ſquamoſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 84. *f.* 1.

Rete. 4. Ph. pileo conico margine crenato-ſinuato, rugis anaſtomoſantibus areoliſque decurrentibus, ſtipite clavato integro. *Mich. nov pl. gen. t.* 34. *f.* 3.

inpudicus. 5. Ph. pileo conico margine crenulato vertice perforato, ſtipite baſi volvato. *Schæff. fung. t.* 196. *f.* 198.

caninus. 6. Ph. pileo conico anguſto acuto impervio ſtipiteque celluloſis, hoc volvato. *Curt. flor. Lond. t.* 235. *Schæff. fung. t.* 335.

Mokuſin. 7. Ph. pileo acuto quinquepartito, laciniis conniventibus, ſtipite pentagono, volva radicali. *Suppl. p.* 452.

Anaſtomoſis. 8. Ph. pileo oblongo margine adnato, rugis decurrentibus anaſtomoſantibus, ſtipite craſſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 85. *f.* 3.

eſculentus. 9. Ph. pileo ovato margine adnato, rugis undulatis undique anaſtomoſantibus, ſtipite tenuiori. *Schæff. t.* 298-300.

patulus. 10. Ph. pileo rugoſo ſupra ſubconico ſubtus libero. *Schæff. fung. t.* 199. *f.* 1. 3.

1213. CLATHRUS. *Fungus* ſubrotundus ramis carnoſis inter ſe continuis cancellatus.

cancellatus. 1. CLATHRUS. *Schæff. fung.* 4. (*tab. tit.*) *Bull. herb. Franc. t.* 441.

1214. HELVELLA. *Fungus* pileo inflato difformi concavoque lævi ſemina ſuperne elaſtice protrudente.

* ſtipitatæ.

gelatinoſa. 1. H. ſtipite fiſtuloſo, pileo convexo lævi ſubtus undulato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 296. *t.* 473. *f.* 2.

fuliginoſa. 2. H. pileo inflato angulato plicato nigricante, ſtipite fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 242.

revoluta. 3. H. ſtipite fiſtuloſo compreſſiuſculo, pileo plano depreſſo, margine revoluto integerrimo. *Vaill. flor. par. p.* 58. *t.* 13. *f.* 7-9.

pezizoides. 4. H. ſtipite fiſtuloſo, pileo deflexo bilobo libero ſubtus ſcabro. *Ad. Afzel. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 299. *t.* 10. *f.* 2. a. b. c.

brunnea. 5. H. stipite fistuloso laevi, pileo deflexo adnato-rugoso brunneo. *Schaeff. fung. t.* 159. 161. *β) Michel. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 8.

Mitra. 6. H. stipite fistuloso sulcis lacunisque inaequali pileo deflexo multilobato adnato. *Schaeff. fung. t.* 154. 162 *β) Jussieu act. paris. ad.* 1728. *t.* 14 *γ) Schaeff. fung. t.* 322.

sulcata. 7. H. stipite solido rimoso regulariter sulcato, pileo deflexo bilobo adnato. *Ad. Afzel. n. act. Stockh. ad.* 1783. *p.* 297. *t.* 10. *f.* 1. *β*) Helvella alba. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 541. *γ*) Helvella cinerea. *Batt. fung. t.* 3. F. B.

atra. 8. H. stipite solido, pileo deflexo bilobo libero subtus scabro. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 1.

horizontalis. 9. H. stipite solido tereti, pileo plano infundibuliformi, margine horizontali crenulato. *Ad. Afzel. n. act. Stockh* 1783. *p.* 302. *t.* 10. *f* 3. a. b.

clavata. 10. H. stipite subcompresso albido pileum intrante, pileo deflexo. *Schaeff. fung. t.* 149. *Bolt. fung.* III. *t.* 97.

caliciformis. 11. H. pileo ochraceo glabro subtus stipiteque brevi carneis furfuraceo-granulosis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 197. *f.* 135.

hispida. 12. H. pileo plano aut concavo exterius subaspero. *Bolton. fung.* III. 96. *t.* 96. *β*) Elvella villosa. *Schaeff. fung. t.* 321.

aeruginosa. 13. H. minima viridissima, pileo difformi. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 2.

cerasina. 14. H. subsessilis gregaria pyriformi-campanulata rubra, margine dentato. *Wulfen. ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 347.

** acaules. *An forsan pezizis jungendae ?*

cochleata. 15. H. turbinata cochleata albicans, intus aurantiaco coccinea. *Schaeff. fung. t.* 150. *Syst. nat.* XII. 2. Peziza cochleata.

liliacea. 16. H. gregaria ceracea plano-concava lilacina; margine elevato tumidiusculo. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 317. *An cum praecedente atque sequentibus hujus generis? nonne potius pezizae?*

ciliaris. 17. H. ceracea hemisphaerico-concava coccinea, margine nigro-ciliato. *Mich. nov. pl. gen. p.* 206. *n.* 12.

versicolor. 18. H. membranacea, fasciis discoloribus subtus laevis alba. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 149.

atrata. 19. H. membranacea fragilis utrinque lævis nigra. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 149.

pallida. 20. H. coriacea fragilis utrinque lævis supra fusca subtus albescens. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 150.

tremellina. 21. H. coriacea undulata lævis plumbea subtus incana villosa. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 149.

coccinea. 22. H. subgloboso-campanulata intus coccinea, margine integro. *Schæff. fung. t.* 148. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 269. *t.* 474. Peziza coccinea.

mesenterica. 23. H. gelatinoso-coriacea rugosa resupinata supra spongioso-villosa cinerea subtus lævis violacea. *Mich. n. plant. gen.* 26. *p.* 124. *t.* 66. *f.* 4.

1215. PEZIZA. *Fungus* sæpe concavus, sine capsulis aut seminibus nudo oculo conspicuis.

† stipitatæ.

coriacea. 1. P. infundibuliformis, stipite tortuoso. *Bulliard herb. Franc. t.* 438. *f.* 1.

Tuba. 2. P. fulva conico-dilatata, stipite lineari elongato radicato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 10.

carpini. 31. P. ochraceo-albens, stipite lineari elongato in cyathum planiusculum terminato. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 150.

echinophila. 3. P. crassiuscula firma fragilis glabra subfuliginosa in stipitem crassum desinens, patera scutellato-cupulari ferruginea. *Bull. herb. Franc. t.* 500. *f.* 1.

tenella. 4. P. alba, stipite gracili elongato in cyathum excavatum subdiffuso. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 151.

tuberosa. 5. P. stipite gracili elongato in cyathum fuscum intus dilutiorem terminato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 39. *t.* 10. B.

sceptrum. 6. P. depresso-globosa grisea extrinsecus rugoso-costata, ore contracto rugarum apicibus dentato, stipite albo elongato distincte inserto. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 3.

bulbosa. 7. P. rotundata exterius albo-punctata intus atra, stipite bulbilloso elongato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 26. *t.* 10. C.

Hirudo. 8. P. cinereo-fusca, stipite elongato sursum diffuso in discum superne pulvinatum reflexum cicatrice notatum, margine ferrugineo. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 214. *f.* 149.

Halleri. 9. P. sordide lutea, stipite longissimo patella parabolica margine punctato serrata. *Hall. hist. stirp. helv. n.* 2225. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *t.* 13. *f.* 2.

Fungoidaster. 10. P. stipite exili gracili elongato albido patella fuscescente terminato. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 53. *t.* 19. A.

villosa. 11. P. stipite mediocri elongato patellaque convexo-marginata villosa, villis connexis sursum spectantibus. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 54. *t.* 19. B.

Craterella. 12. P. albicans stipite gracili elongato patellaque ampliuscula æqualiter marginata brevissime tomentosis. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 55. *t.* 19.

quercina. 13. P. subfuscescens tomentosa, stipite elongato, patella concava lævi nigra. *Schrader.*

Caliculus. 14. P. convexa hemisphærica patens, stipite subelongato lineari valido distincte inserto. *Mich. nov. pl. gen.* t. 86. *f.* 5. 11. *Batsch el. fung. p.* 125. *f.* 57.

nutans. 14*. P. stipite filiformi erectiusculo, cyatho nutante acute conico. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 12. 13.

varia. 15. P. lævis fuscescens, stipite cartilagineo in cyathum dilatato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 26. *t.* 6. *f.* D.

violacea. 16. P. lævis dilute violacea, stipite in cyathum violaceum dilatato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 32. *t.* 8. *f.* A.

Infundibulum. 17. P. hemisphærica ferruginea, stipite sursum incrassato cum medio pileo confluente. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 211. *f.* 147.

sulphurea. 18. P. convexo-depressa patens, stipite confluente brevi valido. *Batsch el. fung. p.* 122. *n.* 18. *cent.* 1. *p.* 210. *f.* 147.

Crater. 19. P. cano fuscescens depresso-convexa pateris subundulata, stipite subelongato subsubulato valido. *Schæff. fung. t.* 167.

dubia. 20. P. albens farta supra plana subtus convexa, stipite distincto deorsum incrassato. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 209. *f.* 145.

caliciformis. 21. P. convexa intus fuscescens exterius cinerascens. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1174. *Hedw. cryptogam.* II. 3. *p.* 78. *t.* 22. *f.* B.

ciliaris. 22. P. infundibuliformis nivea, ciliis longis. *Schrader.*

umbrina. 23. P. pulvinata umbrina, patella planiuſcula concolore. *Schrader.*

urceolata. 24. P. luteſcens urceolata, margine ciliato. *B. h. Fr. t.* 416. *f.* 4.

clandeſtina. 25. P. villoſa cinerea intus lævis. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 5.

purpurea. 26. P. purpurea, ſtipite coriaceo, in cyathum exterius axalbidum terminato. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 77. *t.* 22. *f.* A.

paleacea. 27. P. minima fuſca, margine palearum ordinibus coronato. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 8.

urticæ. 28. P. margine radiis cuneiformibus demum cirratis cincto. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 7.

ſtipitata. 29. P. hemiſphærica exterius fuſco hiſpida, ſtipite cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1164. *β*). Octoſperma ſetigera. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 506.

pyriformis. 30. P. albicans, ſtipite gracili in patellam pyriformem terminato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 38. *t.* 10. A.

pedunculata. 31*. P. plana orbiculata ruſeſcens ſtipitata. *Pallas it.* 1. *p.* 503.

hians. 32. P. intus fulva exterius alba, ſtipite lævi conico in cyathum infundibuliformi-foveatum diffuſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 6.

convivalis. 33. P. albicans acute conica patens, ſtipite ſubdiſtincto lineari brevi. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 14.

ſigillatoria. 34. P. alba inverſe conico patens, ſtipite confluente brevi. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 204. *f.* 142.

cruciformis. 35. P. procumbens oblonga truncato-aperta, ore ſubconſtricto, ſtipite brevi. *Mich. nov. pl. gen. t.* 68. *f.* 16.

virginea. 36. P. nivea depreſſo-convexa patens circularis, ſtipite brevi lineari valido. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 15.

minutiſſima. 37. P. alba minutiſſima convexo-depreſſa patens, ſtipite brevi diſtincto. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 206. *f.* 143.

miniata. 38. P. ruberrima convexo-depreſſa farcta leniter excavata, ſtipite brevi ſubconfluente. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 210. *f.* 144.

bolaris. 39. P. convexo-depreſſa patens intus fulva opaca extrinſecus ochraceo-carnea deorſum fulva, ſtipite brevi. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 222. *f.* 155.

candidissima. 40. P. infundibuliformis nivea, ſtipite breviſſimo. *Mich. nov. pl. gen. p.* 205. *t.* 86. *f.* 15.

minima. 41. P. plano-convexa, margine nudo, ſtipite breviſſimo. *Muray comm. gœtt.* 1772. *p.* 82. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *t.* 13. *f.* 5.

citrina. 42. P. flava plana, ſtipite breviſſimo anguſto. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 33. *t.* 8. B.

albidula. 43. P. lævis albida plana, margine convexo, ſtipite breviſſimo. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 36. *t.* 9. B.

luteſcens. 44. P. lævis luteſcens, plana margine inflexo, ſtipite breviſſimo anguſto. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 37. *t.* 9. C.

cupularis. 45. P. globoſo-campanulata lutea margine crenata, ſtipite breviſſimo. *Flor. dan. t.* 469. *f.* 3.

infundibuliformis. 46. P. ſubſtipitata conico-dilatata intus fuſca exterius alba. *Schæff. fung. t.* 152.

diſcolor. 47. P. ſubſeſſilis exterius fuſca intus dilute ochracea. *Hedw. cryptog.* II. 3. *p.* 80. *t.* 22. *f.* C.

ſpadicea. 48. P. ſubſeſſilis ſaturate ſpadicea ſuperne nitens inferne ſcabra, margine crenulato. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 93. *t.* 39. *f.* 217.

lactea. 49. P. ſubſeſſilis alba plana exterius villoſiſſima. *Bulliard herb. Franc. t.* 376. *f.* 3.

†† ſeſſiles.

cyathoides. 51. P. cyathiformis, margine obtuſo erecto. *Raj. ſtirp. angl.* 5. 2. *t.* 24. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 3.

tremelloides. 52. P. infundibuliformis, margine crenato. *Bull. herb. Franc. t.* 410. *f.* 1.

Crucibulum. 53. P. ſubalbide inverſe conica ſubrudis hians. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 1.

cupreſſi. 54. P. lutea ſeſſilis inverſe conico-oblonga truncato-ſubcavata. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 20.

ſarcoides. 55. P. purpurea lobulis criſpa plicata hemiſphærica infundibuliformis floriformis. *Bolton fung.* III. 101. *t.* 101. *f.* 2.

ſepulcralis. 56. P. ventricoſa depreſſa ochracea, ore baſi anguſtiore acuto. *Schæff. fung. t.* 280.

coronata. 57. P. inverse ovata ventricosa albo-grisea, margine erecto dentato. *Batsch el. fung. p.* 121. *Mich. n. pl. gen. t.* 86. *f.* 2. β) *Bolton fung.* III. *t.* 106. *f.* 2.

pinguis 58. P. urceolata sanguinea, tomento cano obducta. *Bull. herb. Franc. t.* 396. *f.* 1.

lanuginosa. P. lanuginosa fusca intus canis, juniores margine brevi.

lacera. 59. P. campanulata sessilis albicans, margine lacero. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1166.

flava. 60. P. globoso-campanulata flava intus pubescens exterius glaberrima, margine integro. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 150.

nigrescens. 61. P. globoso-campanulata obliqua intus glabra atra exterius incano-villosa, margine integro. *Swarts nov. pl. gen. & sp. p.* 150.

Diadema. 62. P. nigra globosa extrinsecus rugoso-costata, vertice late aperto, ore contracto marginato-crenato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 18.

Hæmastigma. 63. P. sessilis subglobosa minuta dilute sanguinea. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 21. *t.* 5. B. *f.* 1. 5.

Labellum. 64. P. hemisphærica fragilis cerea diaphana ciliata exterius pilosa. *Bull. herb. Franc. t.* 204.

rhizophora. 65. P. hemisphærica convexa fusca inferne albido-concava, radicibus simplicibus teretibus. *Reich. berl. Naturf. Besch.* 3. *p.* 214. *t.* 4. *f.* 4. 6.

hemisphærica. 66. P. hæmisphærica concava atra exterius tomentosa intus lævis. *Wulfen. Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 141.

hispida. 67. P. hemisphærica exterius fusca hispida intus lævis glauca. *Schæff. fung. t.* 151.

hirta. 68. P. hæmisphærica extrinsecus pilosa spadicea intus coccinea glabra. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 15. *t.* 3. *f.* B. 1-6.

pustulata. 69. P. subhemisphærica sessilis extrinsecus albo-punctata. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 23. *t.* 6. A. *f.* 1. 5.

crenata. 70. P. turbinata margine crenulata intus fusca extrinsecus albido pulvere consperta. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1168. β) *Bull. herb. Franc. t.* 396. *f.* 3.

epiphylla. 71. P. subturbinata fusca, margine crenulato. *Naturf.* 19. *p.* 126. *t.* 7. *f.* 5-8.

hypocrateriformis. 72. P. hypocrateriformis flava lævis ſeneſcens plana, margine glabro. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 596.

fimetaria. 73. P. ſeſſilis carnoſa fragilis ochroleuca patellata, margine calloſo crenulato. *Bull. herb. Franc. t.* 376. *f.* 1.

calloſa. 74. P. cæruleſcens ſcutellata ſubvilloſa intus lævis, margine caloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 1.

araneoſa. 75. P. concava margine crenulata tela araneoſa veſtita. *Bull. herb. Franc. t.* 280.

tomentoſa. 76. P. concava tomentoſa nivea intus lævis albida. *Schrader.*

hiſpidula. 77. P. concava extrinſecus hiſpidula nigra intus lævis albida. *Schader.*

hirſuta. 78. P. concava extrinſecus nigra villis flavis hirſuta flava intus lævis carnea. *Schrader.*

pulla. 79. P. concava coriacea fuſca undique lævis nitida. *Schrader.*

membranacea. 80. P. minima concava albida ſubdiaphana. *Schrader.*

hirtella. 80. *a*) P. concava dilute nigra extrinſecus fuſco-piloſa, margine albido. *Schrader.*

puſilla. 81. P. plana albida ſubdiaphana extrinſecus tenuiſſime tomentoſa. *Schrader.*

nigra. 81. *b*) P. plana marginata ſcabra nigra. *Schrader.*

atra. 82. P. concava atra. *Hall. ſtirp. helv. n.* 2243.

viridans. 83. P. ſeſſilis cava, margine viridi. *Hedw. cryptogam.* II. 1. *p.* 24. *t.* 6. B.

ciliata. 84. P. fulva concava exterius lævis, margine ciliato. *Bull. herb. Franc. t.* 438. *f.* 2.

granulata. 85. P. fulva concava exterius granuloſa, margine nudo. *Bull. herb. Franc. t.* 438. *f.* 3.

leporina. 86. P. coriacea ſpatulata concava fuſca extrinſecus albida. *Schæff. fung. t.* 156.

marchica. 87. P. gregaria fuſca concavo-compreſſa lobata extrinſecus ochracea papillata. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 14. *f.* 9.

floccoſa. 88. P. ſemiovalis vel oblonga cava margine involuta intus fuſco extrinſecus cana floccis cinereis diſtantibus conſperſa. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 225. *f.* 156.

cartilaginea. 89. P. coccifer pulvinata glabra. *Bolton fung.* III. 101. *f.* 1.

jenensis. 90. P. sessilis crassa membranacea sulphurea patens convexo-depressa exterius tomentosa. *Batsch el. fung. p.* 125. *n.* 21. *cent.* 1. *p.* 221. *f.* 153.

Schenkii. 91. P. membranacea convexo-depressa patens atra intus nitidissima, margine brunneo. *Batsch el. fung. p.* 126. *n.* 27. *f.* 52.

pulvinata. 92. P. sessilis ochraceo-canescens farta, margine pulvinato, disco glabro. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 95. *t.* 39. *f.* 219.

livida. 93. P. plana livido-violaceo-glabra extrinsecus pulvinata. *Schrader.*

immarginata. 94. P. orbicularis miniata, margine nullo. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 504.

virescens. 95. P. minuta dilute viridis, margine nullo. *Schrader.*

aquifolii. 96. P. minutissima plana membrana hyalina obvoluta. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 10.

rugosa. 97. P. explanata marginata rugosa nigra. *Schrader.*

expallescens. 98. P. sessilis plana cana lævis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 504. *An vere distincta a chrysocoma?*

cærulea. 99. P. plana cærulea, margine obtuso ciliato. *Bolton fung.* III. 108. *t.* 108. *f.* 2.

crocea. 100. P. plana crocea utrinque glabra. *Wigg. prim. flor. hols. p.* 107.

stercorea. 101. P. plana flava extrinsecus hirsuta. *Wigg. prim. flor. holf. p.* 106.

palpebralis. 102. P. aurantia plana longe ciliata. *Wigg. prim. flor. holf. p.* 106.

chrysocoma. 103. P. sessilis lævissima lutescens plana. *Bulliard herb. Franc. t.* 376. *f.* 2.

scutellata. 104. P. plana margine convexo piloso. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 12. *t.* 3. A.

flava. 105. P. plana orbiculata flava. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1175.

cinerea. 106. P. plana diaphana cinerea. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1173.

nivea. 107. P. nivea tota plana vel angusta marginata. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1172. *Batsch el. fung. f.* 56.

fulva. 108. P. plana fulva, margine convexo glabro. *Vaill. flor. parif. t.* 13. *f.* 14.

grifea. 109. P. opaca cinerea tota plana vel angufte marginata. *Batfch el. fung. p.* 118. *f.* 55.

Seminul-110. P. atra lævigata explanata. *Batfch el. fung. p.* 118. *n.* 3. lum.

comitia-111. P. feffilis plana canefcens fuperficie marginali externa lis. fufca nigro-venofa in marginem erectum lobato-coronatum producta. *Batfch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 152.

applana-112. P. expanfa plana rugofa cinnamomea fubtus pallidior. ta. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 22. *t.* 5. C.

carnea. 113. P. infra ventricofa fuperne plana margine inæquali, *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 31. *t.* 7. B.

nana. 114. P. lævis cinnamomeo rubella fubtus anguftata fupra plana, annulo obfcuriori craffo. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 35. *t.* 9. A.

leucolo-115. P. minuta depreffa ruberrima, margine albo fimbriato. ma. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 17. *t.* 4. A.

olivacea. 115*. P. membranacea orbicularis plana intus nigra opaca extrinfecus rugulofa olivacea, margine angufto convexo. *Batfch el. fung. p.* 127. *f.* 51.

punicea. 116. P. feffilis orbicularis opaca farta fupra miniata, margine pallido. *Batfch el. fung. cent.* 2. *p.* 97. *t.* 39. *f.* 220.

crinita. 117. P. feffilis orbicularis cana nigro-pilofa intus lævis fanguinea. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 2.

viridis. 118. P. viridis complanata, margine callofo. *Bull. herb. Franc. t.* 876. *f.* 4.

Pileolus. 118*. P. nigra minutiffima fubcordata margine fimbriata. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 12.

crifpa. 119. P. cinerea reflexa, margine crifpo finuato-lobato. *Batfch el. fung. cent.* 1. *p.* 197. *f.* 137.

hepatica. 120. P. atropurpurea reflexa difco fæpius fcrobiculo notata. *Batfch el. fung. cent.* 1. *p.* 199. *f.* 138.

pinati. 121. P. canefcente-alba reflexa, margine ochraceo fufcefcente fublurido. *Batfch el. fung. cent.* 1. *p.* 201. *f.* 140.

papyra-122. P. membranacea fufcefcens. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 620. cea. *n.* 1761.

minuta. 123. P. ſeſſilis fuſca, margine concolori æquali. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 25. A. 6. C.

porphyroſperma. 124. P. minuta ſeſſilis ſordide viridis ſubhirta. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 30. *t.* 7. A.

aceris. 125. P. junior cinerea ſeneſcens nigra, margine albo lacero. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 507.

cerea. 125*. P. pellucida ceracea, margine eroſo. *Bull. herb. Fr. t.* 44.

exilis. 126. P. ſupra flava ſubtus lanuginoſa alba. *Flor. dan. t.* 779. *f.* 2.

bicolor. 127. P. villoſa nivea intus lævis fulva. *Bull. h. Fr. t.* 410. *f.* 3.

ſanioſa. 128. P. ſeſſilis coriacea pulvinata extrinſecus pulverulenta umbrina intus glabra e fuſco purpurea. *Schrader.*

limbata. 129. P. ſeſſilis viridis, margine nigro. *Bolton fung.* III. 109. *t.* 109. *f.* 1.

⊢⊢⊢ *gelatinoſæ.*

Acetabulum. 130. P. cyathiformis ſeſſilis exterius angulata, venis ramoſis. *Schæff. fung. t.* 150. 155. 156. *Bulliard herb. Franc. t.* 485. *f.* 4.

porphyrea. 131. P. cylindrica truncato-foveata intus ſanguineo-fulva nitidiſſima exterius carneo-fulva. *Batſch el. fung. p.* 129. *f.* 53.

elaſtica. 132. P. carnoſa polymorpha intus atra extrinſecus anguloſo-fuſco-brunnea. *Hedw. cript.* II. 1. *p.* 28. *t.* 6. E.

polymorpha. 133. P. atra ſupra rugoſa inæqualis concava viſcoſa. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 236. *t.* 116. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon truncatum.

Auricula. 134. P. rugoſa auriformis concava. *Syſt. nat.* XII. 2. Tremella Auricula. *Blackw. herb. t.* 334.

gelatinoſa. 135. P. ferruginea in ſtipitem brevem ſublateralem baſi attenuatum deſinens, patella planiuſcula. *Bull. herb. Franc. t.* 460. *f.* 2.

VOLUTELLA. *Fungus* hypocrateriformis ſtipitatus, pilei ſuperficie ſuperiori punctato-umbilicata, margine primum revoluto, ſeminibus ſimilaribus, ſtipite brevi ſetaceo.

volvata. 1. V. coriacea ſparſa, volva marginali diſcreta diſſiliente, ſeminibus unguinoſis. *Tod. fung. mekl. ſel.* 1 *p.* 28. *t.* 5. *f.* 43.

nuda. 2. V. nuda fugacissima sparsa, pileo plano nudo demum disciformi. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 29. *t.* 6. *f.* 44. *Batsch el. fung. cont.* 1. *t.* 27. *f.* 148. *Cum volutellae genus a Forskaehlio constitutum* Vahlii *curatius examen non sustinuerit, inventoris nomen huic generi restituo.*

TYMPANIS. *Fungus* cyathiformis, cupula supra volvata, seminibus siccis confertis in pulverem fatiscentibus.

saligna. 1. TYMPANIS. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 24. *t.* 4. *f.* 37.

MYROTHECIUM. *Fungus* sessilis cyathiformis, cupula supra volvata, seminibus lento-viscidis.

roridum. 1. M. bombacinum niveum, thecis hemisphaericis connatis roridis, margine in volvam continuato, seminibus turgidis fuscis. *Tode fung. meklenb. sel.* 1. *p.* 25. *t.* 5. *f.* 38.

inundatum. 2. M. candidum bombacino-membranaceum, thecis polymorphis connatis inundatis, margine in volvam continuato, seminibus viridi nigrescentibus. *Tode fung. meklenb. sel.* 1. *p.* 25. *t.* 5. *f.* 39.

Stercoreum. 3. M. membranaceum nigrum aggregatum, seminibus turgidis albido-fuscescentibus. *Tode fung. meklenb.* 1. *p.* 26. *t.* 5. *f.* 40.

hispidum. 4. M. coriaceum hispidum fuscum sparsum, cupulae margine in volvam continuato, seminibus fuscescentibus diaphanis. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 27. *t.* 5. *f.* 42.

dubium. 5. M. parabolicum aggregatum, cupula cortice volvaque marginali destituta, seminibus nigrescentibus pauco. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 27. *t.* 5. *f.* 42.

EPICHYSIUM. *Fungus* rotundato-concavus, seminibus ecaudato-globosis, filo ramoso intus reptanti affixis.

argenteum. 1. EPICHYSIUM. *Tode fung. mekl. sel.* 2. *p.* 1. *t.* 8. *f.* 60.

CYATHUS. *Fungus* campanulatus cylindricusve capſulas lentiformes intus gerens.

lævis. 1. C. campanulatus exterius villoſus intus lævis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.*725. Pezziza lentiſera. *Flor. dan. t.*105. *Bull. herb. Franc. t.* 300. A. B.

ſtriatus. 2. C. campanulatus exterius hirſutus intus ſtriatus. *Flor. dan. t.* 469. *f.* 1. *Schæff. fung. t.* 178.

cylindricus. 3. C. cylindricus arhizos totus glaber. *Wilden. prodr. flor. Berol. n.* 1161.

deformis. 4. C. arhizos rugoſus albus, capſulis oblongis brunneis. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 14. *f.* 8.

crucibuliformis. 5. C. ventricoſus glaber aureus. *Schæff. fung. t.* 179. 181.

fructiger. 6. C. cyathiformis totus lævis albidus ſtipitatus. *Bull. herb. Franc. t.* 228.

coronarius. 7. cyathiformis utrinque glaber, limbo laciniato erecto. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 140. *t.* 10. *An hujus generis?*

Cupula. 8. C. globoſus glaber, ore late patulo ſubconſtricto lobato crenulato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 102. *f.* 4.

ATRACTOBOLUS. *Fungus* ſeſſilis cupularis operculatus, veſicula ſeminifera fuſiformi ejicienda.

annularis. 1. ATRACTOBOLUS. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 45. *t.* 7. *f.* 59. *Batſch el. fung. cent.* 1. *t.* 26. *f.* 139.

ASCOBOLUS. *Perſoon fung. ined.* *Fungus* hemiſphæricus; *Veſicula* oblonga diſco ſparſim ſubimmerſa elaſtice ejiciens ſemina.

pezizoides. 1. ASCOBOLUS. *Bull. herb. Franc. t.* 376. *f.* 1. & *t.* 438. *f.* 4. Peziza ſtercoraria.

THELEOBOLUS. *Fungus* ſeſſilis gelatinoſus ſolidus, placenta ſeminifera dejicienda.

ſtercoreus. 1. THELEOBOLUS, *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 41. *t.* 7. *f.* 56.

SPHÆROBOLUS. *Fungus* ſeſſilis globoſo-concavus radiatim dehiſcens, capſulam globoſam ejaculans.

ſtellatus. 1. Sph. globoſus volvatus liber. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon carpobolus. *Flor. dan. t.* 895.

roſaceus. 2. Sph. urceolatus nudus immerſus. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 44. *t.* 7. *f.* 57.

PILOBOLUS. *Fungus* ſtipitatus, ſtipite capillari ſupra ventricoſo hydrophoro, pileo hemiſphærico ſemina elaſtice ejiciente.

cryſtallinus. 1. P. pileo compreſſo glutinoſo atro. *Wigg. prim. fl. holſ. p.* 110. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* III. *t.* 480. *f.* 1. Mucor urceolatus.

conglomeratus. 2. P. capſulis luteis ſphæricis ſeſſilibus conglomeratis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 557.

roridus. 3. pileo globoſo nigro. *Bolton fung.* 3. *t.* 132. *f.* 4.

PUCCINIA. *Fungus* cylindricus ſeminibus caudatis radiatim poſitis elaſtice proſilientibus farctus.

ſimplex. 1. P. corpore ſimpliciſſimo obtuſo. *Willden. prodr. flor. ber. n.* 1186.

byſſoides. 2. P. ramoſus, ramis primum glabris clavatis niveis, tum depreſſis piloſis cinereis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 200. *t.* 415. *f.* 2.

1217. **LYCOPERDON.** *Fungus*, fila ſeminifera cum thecæ parietibus internis connexa.

* *ſolida, ſubterranea, radice deſtituta.*

cervinum. 1. L. globoſum ſolidiuſculum, centro farinifero. *Bolt. fung.* III. 116. *t.* 116.

ſcabrium. 2. L. fuſceſcens ſcabrum ſubgloboſum. *Willd. prodr. flor. ber. n.* 1192.

æſtivum. 3. L. ſubgloboſum glabrum. *Wulf. ap. Jacq. Coll.* 1. *p.* 349.

** *pulverulenta, ſupra terram creſcentia, plurima radicata.*

Proteus. 4. L. ſubrotundum ſubſtipitatum lacero-dehiſcens, carne alba, ſeminibus atris. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 148. α) L. cepæforme. *t.* 435. *f.* 2. β) L. ovoideum. *t.* 435. *f.* 3. B. & *t.* 475. *f.* B. C. D. M. N. P. γ) L. pyriforme. *t.* 32. *t.* 340. & *t.* 475. *f.* B. D. M. δ) L. hyemale. *t.* 72. & *t.* 475. *f.* E. ε) L. lacunoſum. *t.* 72. ζ) L. hirtum. *t.* 340. & *t.* 475. *f.* A. B. C. D. F. G. H. I. M. η) L. excepuliforme. *t.* 450. *f.* 2. & *t.* 475. *f.* F. G. H. I. *An forſan diverſæ ſpecies?*

verrucoſum. 5. L. ſubrotundum verrucoſum. *Bull. herb. Franc. t.* 22.

circum-ſciſſum. 6. L. ſubſeſſile ſubrotundum exaſperatum, parte inferiore perſiſtente circumſciſſo-lacera, polline brunneo. *Schæff. fung. t.* 186. 189-191. β) *Bull. herb. Fr. t.* 340.

ſpadiceum. 7. L. ſubrotundum ſolidiuſculum radicatum ſpadiceum. *Schæff. fung. t.* 188.

ſquamoſum. 8. L. depreſſo-globoſum acuminatum, acumine truncato-aperto, ſtipite elongato ſquamoſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 7.

admorſum. 9. L. ſubgloboſum ſcabriuſculum, parte infera perſiſtente circumſciſſo-lacera, ſtipite abbreviato valido. *Schæff. fung. t.* 187.

capitatum. 10. L. ſubgloboſum glabrum, ſtipite valido incraſſato, radicibus fuſiformibus flexuoſis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 98. *f.* 1.

diſpar. 11. L. ſubgloboſum fuſcum, ſtipite lineari valido brevi diſtincte albo, polline atro-purpureo. *Schæff. fung. t.* 188.

gemmatum. 12. L. ſtipitatum ſubgloboſum aculeis acutis denſe obſitum. *Willd. prodr. flor. ber. n.* 1195. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 1.

aurantium. 13. L. ſphæroidale baſi rugoſum ſtipitatum laciniis obtuſe emarginatis dehiſcens. *Bulliard herb. Fr. t.* 279. β) *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 125. *t.* 41. *f.* 229. Lycoperdum defoſſum.

equinum. 14. L. sphæricum circumscissum, stipite cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1198. *An hujus generis?*

Bovista. 15. L. globosum lacero dehiscens, stipite validissimo clavato ventricoso, carne alba, seminibus atris. *Schæff. fung. t.* 292. 295.

pusillum. 16. L. atrum globosum sessile, orificio angusto. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 123. *t.* 41. *f.* 228.

gossypinum. 17. L. globosum subacaule albidum atro-villosum. *Bull. herb. Franc. t.* 435. *f.* 1.

furfuraceum. 18. L. sessile globosum, superficie furfuraceo squamosa. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 6.

polyrhizon. 19. L. globosum æquale lacero dehiscens, stipite brevissimo incrassato, radice brevi ramosissima, polline sordide purpureo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 99. *f.* 2.

rufum. 20. L. globosum circumscissum, stipite brevi. *Schmid. ic. plant. p.* 91. *t.* 24.

lanatum. 21. L. globosum piloso-hirtum, stipite subelongato valido incrassato lineari. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 2.

giganteum. 22. L. ochraceo-album glabrum sessile deforme globosum, filamentis teneris densis flavo-virentibus. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 237. *f.* 165.

ardesiacum. 23. L. cærulescens globoso-acuminatum. *Bulliard herb. Fr.* 1. *p.* 146. *t.* 192.

lacerum. 24. L. subsessile globoso-pyriforme depressum, parte infera persistente circumscisso-lacera, polline virente. *Schæff. fung. t.* 193. 194.

muricatum. 25. L. sessile pyriforme extrinsecus muricatum, ore subrotundo. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1194. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 5. β) *Schæff. fung. t.* 184. γ) *Bull. herb. Franc. t.* 430.

subalpinum. 26. L. album turbinatum læve horizontaliter dehiscens. *Schr. flor. bav.* 2. *p.* 627. *n.* 1764. *an distincta species?*

Infundibulum. 27. L. infundibuliforme sordide albidum interius cellulosum. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 15. *f.* 11.

phalloides. 28. L. deflexum campanulatum supra pulverulentum calyptratum, subtus glabrum liberum, stipite volvato. *Woodward angl.* 74. *p.* 423. *t.* 16.

utriforme. 29. ſubcylindricum ſubhiſpidum rufeſcens ſolidum. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 153. *t.* 450. *f.* 1.

piſtillare. 30. L. clavatum, ſtipite torto. *Mant. p.* 313.

carcinomale. 31. L. clavatum, ſtipite cylindrico recto. *Suppl. p.* 453.

herculeum. 32. L. truncato-clavatum extrinſecus album ſcarioſum. *Pall. it.* 1. *p.* 553. *n.* 132.

arhizon. 33. L. ferrugineum celluloſum, cellulis ſubſtantia ſpongioſo-filamentoſa repletis. *Scop. del. inſubr.* 1. *p.* 40. *t.* 18.

Hypoxylon. 34. L. rufeſcens, ſtipite albido filiformi. *Pall. it.* 1. *p.* 503. *n.* 133.

pruinatum. 35. L. ſeſſile lævigatum cinereum pruinatum, cicatrice radicali obſoleta, ore anguſtato lobato, filamentis laxis brunneis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 239. *f.* 166.

*** ſtellata.

ſtellatum. 36. L. volva multifida, capitulo ſubrotundo ſeſſili, ore integro. *Flor. dan. t.* 360.

Geaſter. 37. L. volva multifida, capitulo oblongo ſeſſili acuminato, ore piloſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 1.

pedicellatum. 38. L. volva multifida, capitulo oblongo-acuminato pedicellato, ore fimbriato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 2.

radicans. 39. L. volva multifida, capitulo globoſo ſeſſili, ore ſtellato. *Schæff. fung. t.* 182. *Nonne idem cum Geaſtro?*

corollinum. 40. L. volva multifida, capitulo ſeſſili globoſo acuminato, ore fimbriato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 3.

multifidum. 41. L. volva multifida, laciniis dilatatis fiſſis, capitulo ſeſſili globoſo, ore ſtellato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 5.

feneſtratum. 42. L. volva multifida fornicata, tunica exteriori filamentoſa, capitulo nigricante ſtipitato, radice fibroſa. *Sch. fung. t.* 183. *β*) *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 168. a. *γ*) *Batſch el. fung. f.* 168. b. *An ſatis diſtinctum a petiolato?*

coliforme. 43. L. volva multifida patente, capitulo depreſſo-ſphærico, pedunculis oſculisque numeroſis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 24. *t.* 3. *f.* 4.

**** paraſitica in farinam fatiſcentia. *An hujus generis?*

piſiforme. 44. L. globoſum ſcabrum, ore perforato. *β*) *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 137. *t.* 7.

Epidendrum. 45. L. cortice farinaque purpurea. *Flor. dan. t.* 720.

ramofum. 46. L. pyriforme fcabrum, radice filiformi ramofiffima prolifera. *Jacq. flor. auftr.* 3. *t.* 224.

corticale. 47. L. luteo-fufcefcens glabrum, pulvere concolore. *Batfch el. fung. p.* 155. *Nonne ftemonitis?*

nitidulum. 48. L. luteum fragile nitens, pulvere atro arenaceo. *Sch. fung. t.* 192.

fcabridum. 49. L. brunneum induratum fcabrum. *Batfch el. fung. t.* 155.

gregarium. 50. L. congeftum fphæricum, cortice fufco nitente, pulvere aureo. *Retz. obf. bot.* 1. *p.* 33.

SPUMARIA. *Folliculi* ramofi intus filis feminiferis repleti, cortice cellulofo furfuraceo tecti.

Perfoon fung. ined.

Mucilago. 1. Spumaria. *Bull. herb. Franc.* 1. *t.* 326. Reticularia alba. *Mich. n. pl. gen. t.* 96. *f.* 2. *Leyff. fl. hal.* Mucor fpongiofus.

FULIGO. *Fungus* cortice cellulofo-fibrofo, fibris per maffam feminalem reticulatim penetrantibus.

feptica. 1. F. flava laciniata. *Syft. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor fepticus. *Flor. dan. t.* 778. *β)* Reticularia hortenfis. *Bull. herb. Franc. t.* 424. *f.* 2.

capitata. 2. F. flava capitata. *Hall. hift. ftirp. Helv. n.* 2135.

panicea. 3. F. minima alba feffilis panici granum referens. *Gled. meth. fung. p.* 159. *n.* 11. *var.* b.

Lycoperdon. 4. F. marfupialis feffilis alba intus atra. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 9. *t.* 446. *f.* 4. & *t.* 476. *f.* 1. *β) Bolt. fung.* III. *t.* 133. *f.* 1.

STEMONITIS. *Fungus*, cortice (fugaci membranaceove), thecæ rupto fila seminifera reticulato-compacta elaſtice ſeſe expandentia.

† *receptaculo ſubulato fila ſeminifera penetrante.*

⊢ *capitulo elongato.*

typhina. 1. St. fuſco-rubens ſtipite tereti æquali. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus nudus. *Bull. herb. Franc. p.* 119. *t.* 477. *f.* 1. *Bolt. fung. t.* 93. *f.* 1.

fuſca. 2. St. ſtipite nigro baſi dilatato, capitulo fuſco. *Bull. herb. Franc. t.* 477. *f.* 2.

Embolus. 3. St. ſtipite nigro albo-villoſo, capitulo fuſco. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor Embolus. *Hall. enum. ſtirp. Helv. t.* 1. *f.* 1. *An vere diſtincta a typhina?*

⊢ ⊢ *capitulo rotundato.*

nigra. 4. St. tota nigra. *Perſoon fung. ined.*

†† *filis ſeminiferis receptaculo hemiſphærico integro inſidentibus*, Arcyriæ.

crocea. 5. *a*) St. coccinea, receptaculo ſubtus ſtriato, filis ſeminiferis oblongo-ovatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus denudatus. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *t.* 6.

recutita. 5. *b*) St. albida filis ovatis, ſtipite brevi. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus recutitus.

incarnata. 6. St. tota dilute incarnata, filis ſeminiferis ovato-oblongis formæ fluxilis. *Perſoon func. ined. ic.*

nutans. 7. St. flavicans, ſtipite breviſſimo, capitulo longiſſimo decumbente. *Bull. herb. Franc. p.* 122. *t.* 502. *f.* 3.

cinerea. 8. St. leucophæa, capitulis ſubcylindricis baſi complanatis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 129. *t.* 477. *f.* 3.

leucocephala. 9. St. receptaculo infundibuliformi, filis ſeminiferis ſubprominulis furfuraceo-albis. *Perſoon fung. ined. ic.*

nivea. 10. St. ſtipite flaveſcente filiformi, receptaculo globoſo niveo. *Hoffmann cryptog. veget.* 2. *t.* 4. *f.* 1.

Sphæroce-phala. 11. St. ſtipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor ſphærocephalus. *Hoffm. veget. crypt.* 2. *t.* 4. *f.* 2. *An hujus generis?*

lichenoides. 12. St. ſtipite ſubulato nigro, capitulo lentiformi cinereo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Muchor lichenoides. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 4. *f.* 13. *Batſch fung. t.* 26. *f.* 133. *An hujus generis?*

furfuracea. 13. St. ſtipite filiformi, capitulo ſubgloboſo fuſco glabro, ſeminibus viridibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1726. Mucor furfuraceus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 267. *f.* 178. *An diſtincti forſan generis, perinde ac* 11 & 12?

fulva. 14. St. capitulo globoſo coccineo, filis ſeminiferis fuſcis. *Bolton fung. t.* 93. *f.* 3. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor fulvus.

flava. 15. St. capitulo globoſo, filis ſeminiferis flavis. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 1.

olivacea. 16. St. capitulo globoſo ſtipiteque olivaceis. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 2.

ſemitri-choides. 17. St. ſtipite ſimplici ſtriato, capitulo globoſo parte dimidia ſuperiori cancellato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 125. *t.* 387. *f.* 1.

cancellata. 18. St. ſtipite ſimplici, capitulo globoſo exterius cancellato, receptaculo nullo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 124. *t.* 387. *f.* 2. *Batſch el. fung. t.* 42. *f.* 242. Mucor cancellatus. *Nonne una cum præcedentis diſtincti generis?*

††† *cortice toto membranaceo irregulariter diſſiliente.* Trichicæ.

† *ſtipitatæ.*

botrytis. 19. St. faſciculata, capitulo pyriformi purpureo. *Hoffm. cript. veget.* 2. *t.* 1. *f.* 1. Trichoa pyriformis.

faſciculata. 20. St. chalybea faſciculata, capitulo ſubturbinato, ſtipite breviſſimo. *Perſoon fung. ined.*

graniformis. 21. St. rubra, ſtipite cylindrico ſimplici, capitulo globoſo, ſeminibus coccineis. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 1. *f.* 2. Trichia graniformis.

rufa. 22. St. tota rufa capitulo ſubrotundo. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 2. *f.* 5. Trichia rufa.

coccinea. 23. St. rubra, ſtipite cylindrico ſimplici. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 126. *t.* 368. *f.* 1.

antiades. 24. St. ſtipite craſſiuſculo ſulcato ſubramoſo, capitulo globoſo luteo-ſubfuliginoſo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 127. *t.* 368. *f.* 2.

violacea. 25. St. ſtipite nigro, capitulo lentiformi depreſſo, filis ſeminiferis albis, ſeminibus violaceis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 448. *Hoffm. veget. crypt.* 2. *t.* 2. *f.* 1.

cinnabarina. 26. St. gregaria ruberrima clavata. *Roth. flor. german.*

pyriformis. 27. St. lutea lucida, capitulo turbinato in ſtipitem cylindricum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 129. *t.* 417. *f.* 2.

pomiformis. 27. St. fulva, ſtipite breviſſimo, capitulo globoſo, filis ſeminiferis fulvis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 448.

ficoides. 28. St. fuſco-nigrans, capitulo turbinato-elongato in ſtipitem baſi turgidum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 130. *t.* 417. *f.* 3.

turbinata. 30. St. aurantio-ſubferruginea, capitulo apice compreſſo in ſtipitem cylindricum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 132. *t.* 484. *f.* 1.

aurantia. 31. St. ſtipite nigro ſtriato baſi ventricoſo, capitulo orbiculari exterius luteo intus fuſco-nigricante. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 133. *t.* 484. *f.* 2.

globulifera. 32. St. capitulo orbiculari, ſeminibus nigro-fuſceſcentibus inter globulos diſcolores diſperſis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 134. *t.* 484. *f.* 3.

viridis. 33. St. ſtipite filiformi, capitulo orbiculari umbilicato granuloſo vireſcente, ſeminibus fuſco-nigricantibus. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 135. *t.* 407. *f.* 1.

bicolor. 34. St. ſtipite filiformi, capitulo orbiculari umbilicato granuloſo exterius niveo, filis ſeminiferis luteis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 136. *t.* 407. *f.* 2.

alba. 35. St. ſtipite cylindrico ſimplici, capitulo globoſo umbilicato granuloſo cano, ſeminibus filisque atris. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 137. *t.* 407. *f.* 3. & *t.* 470. *f.* 1.

argillacea. 36. St. ſtipite nigreſcente, capitulo globoſo terreo. *Perſ. fung. ined.*

floriformis. 37. St. ſtipite filiformi, capitulo luteo-ſtramineo primum globoſo demum ſtellatim patente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 142. *t.* 371.

leucopus. 38. St. ſtipite niveo baſi dilatato, capitulis elongatis nigricantibus, ſeminibus ellipticis. *Bull. herb. Franc. t.* 502. *f.* 2. *An diſtinctæ tribus?*

†† acaules.

veſparia. 39. St. cylindrica rufeſcens, ſeminibus rufis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 172. Lycoperdon veſparium.

veſiculoſa. 40. St. globuloſa, ſeminibus ferrugineo-ochraceis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 171. Lycoperdon veſiculoſum.

bombacina. 41. St. ſubgloboſa-ferruginea, ſeminibus concoloribus. *Batſch. el. fung. p.* 153. *n.* 28. Lycoperdon bombacinum.

favaginea. 42. St. globoſa lutea, ſeminibus concoloribus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 257. *f.* 173. Lycoperdon favagineum. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 3. *Bull. herb. Franc. t.* 417. *f.* 4.

vitellina. 43. St. ſubrotunda glabra lutea, ore fuſco. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 138. *t.* 5. Lycoperdon luteum. *An forſan varietas fuliginis ſepticæ?*

Trichia. 44. St. globoſa purpurea. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 449.

globularis. 45. St. orbicularis extrinſecus atra intus aurea. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 132. *t.* 417. *f.* 5.

ſulphurea. 46. St. pyriformis ſulphurea, filis ſeminiferis pallidioribus. *Wiggers fl. holſ. p.* 110. *n.* 1153.

varia. 47. St. capitulis decumbentibus oblongis ſubreniformibusque. *Perſoon fung. ined.*

lumbricalis. 48. St. filiformis lutea. *Batſch el. fung. f.* 172. Lycoperdon lumbricale.

MICROCARPON. *Fungus*, Theca membranacea *Schrader.* (irregulariter dehiſcens) ſeminibus filamentis reticulato-compactis baſi fixis interſitis repleta.

nigrum. 1. MICROCARPON. *Schrader fung. ined.*

CRIBRARIA. *Fungus*, Theca membrana duplici instructa, externa tenella fugaci interna reticulata semina filamentis orba per foramina emittentia.

pallida. 1. CRIBRARIA. *Schrader fung. ined.*

RETICULARIA. *Fungus* subrotundus, theca rigida seminibus inter fila reticulata dispersis repleta.

† *stipitatae.*

fragilis. 1. R. obovata fusca, cortice nitido, seminibus nigris, stipite brevissimo. *Dicks. crypt. Brit.* 1. *p.* 25. *t.* 3. Lycoperdon fragile.

utricularis. 2. R. stipite brevissimo tenuissimo, capitulo ovato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 128. *t.* 417. *f.* 1. Sphaerocarpus utricularis.

hemisphaerica. 3. R. stipite simplici, capitulo hemisphaerico. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 93. *t.* 446. *f.* 1.

ramosa. 4. R. stipite ramoso, capitulis subglobosis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 89. *t.* 380. *f.* 3.

†† *acaules.*

Lycoperdon. 5. R. sacciformis cinerea fuscescensve. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 95. *t.* 476. *f.* 2-4.

Lycogala. 6. R. albida, seminibus fuscis. *Bolton fung. t.* 96. *f.* 1. Mucor Lycogala.

Epixylon. 7. R. pulvinata ex cinereo nigricans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 90. *t.* 472. *f.* 1.

caesia. 8. R. globoso-ovata nigro-caesia sensim albicans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 139. *t.* 470. *f.* 2. Reticularia capsulifera.

cinerea. 9. R. cinereo-caesia globosa scabra, seminibus atris, filis albis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 249. *f.* 169. Lycoperdon cinereum. *An satis distincta a caesia?*

complanata. 10. R. cinereo-caesia depressa diffusa, seminibus atris, filis albis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 251. *f.* 170. Lycoperdon complanatum.

ſphæroidalis. 11. R. ſuborbicularis albicans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 94. *t.* 446. *f.* 2.

angulata. 12. R. ſubdepreſſa angulata alba. *Perſoon fung. ined.* in foliis.

ſinuoſa. 13. R. laminis duabus parallelis flexuoſis. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 94. *t.* 446. *f.* 3.

Uſtilago. 14. R. fuſco-nigricans. *Syſt. nat. Ed.* XII. 1. *p.* 1326. *n.* 4. Chaos Uſtilago. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 90. *t.* 472. *f.* 2. Reticularia ſegetum. *An forte diſtincti generis?*

nigra. 15. R. ſeneſcens nigra, ſeminibus nigris. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 88. *t.* 380. *f.* 2.

alba. 16. R. ovata alba, ſeminibus nigris. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 635. *An ſatis diſtincta a nigra?*

TUBIFERA. *Fungus*, Thecæ (membranæ expanſæ ſuperimpoſitæ) inter ſe connatæ ſeminibus nudiuſculis repletæ.

cylindrica. 1. R. cylindrica ferruginea, apice acuminato primum niveo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 140. *t.* 470. *f.* 3.

fragiformis. 2. R. cylindrico-clavata primum roſea poſt ferruginea. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 141. *t.* 384.

ferruginoſa. 3. R. glabra veſicularis verſicolor, ſeminibus terreis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 263. *f.* 175. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 144. *t.* 15. Tubulifera arachnoidea. *Fl. dan. t.* 659. *f.* 2.

ÆCIDIUM. *Fungus*, Theca (membranacea) utrinque glabra ſeminibus nudis non cohærentibus plena.

Perſoon fung. ined.

† *thecæ cortice diſtincto membranaceo.*

† *ceſpitoſa.*

cornutum. 1. Æ. flavum, thecis longiſſimis ſubarcuatis olivaceo-griſeis. *Flor. dan. t.* 838.

rhamni. 2. Æ. thecis cylindricis roſeis, ſeminibus aurantiis. *Perſ.*

cancellatum. 3. Æ. thecis latere fiſſis apice integris. *Suppl. p.* 443. Lycoperdon cancellatum. *Flor. dan. t.* 704.

penicillatum. 4. Æ. flavum, thecis rectis dehiſcentibus. *Flor. dan. t.* 839. *An ſatis diſtinctum a cancellato?*

berberidis. 5. Æ. orbiculare subconvexum, thecis prominentibus seminibusque flavis. *Jacq. coll. austr.* I. *p.* 122. *t.* 4. *f.* 1. Lycoperdon pauciforme.

enonymi. 6. Æ. crassum effusum, thecis prominentibus seminibusque aurantiis. *Persoon.*

rubellum. 7. Æ. rubrum. α) rumicis, thecis congestis seminibusque albis β) grossulariæ, thecis sparsis seminibusque pallidis. *Persoon.*

tussilaginis. 8. Æ. thecis subprominentibus flavis, seminibus aurantiis. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon epiphyllum.

†† *thecis solitariis.*

pini. 9. Æ. oblongo-compressum pallidum, seminibus aurantiis. *Willden bot. Mag.* 4. *t.* 4. *f.* 12.

euphorbiæ. 10. Æ. confertum cylindricum, ore reflexo, seminibus aurantiis. *Persoon.*

anemones. 11. Æ. sparsum subglobosum pallidum, seminibus concoloribus. *Persoon.*

scutellatum. 12. Æ. sparsum albidum, seminibus fuscis. *Schranck fl. bav. n.* 1776. Lycoperdon scutellatum.

pyrolæ. 13. Æ. sparsum depressum luteum, seminibus concoloribus. *Persoon.*

†† *cortice distincto orbata, seminibus sub epidermide effusis.*

fuscum. 14. Æ. seminibus fuscis. *Persoon.*

nigrum. 15. Æ. subrotundum seminibus nigricantibus. *Persoon.*

flavum. 16. Æ. oblongum, seminibus flavis. *Persoon.*

candidum. 17. Æ. difforme effusum, seminibus candidis. *Persoon.*

lineare. 18. Æ. lineare, seminibus fusco-atris. *Schranck fl. bav. n.* 1852. Lycoperdon lineare.

SPHÆRIA. *Fungus*, Thecæ subrotundis seminibus nudis gelatinosis repletæ.

* *caulescentes, pileo multicapsulari.*

† *molles.*

agariciformis. 1. Sph. stipite flavo tereti, pileo ovato castaneo, radice tuberosa volvata intus nigra. *Bolton fung. p.* 130. *t.* 130. *Fl. dan. t.* 570.

entomorhiza. 2. Sph. pileo ſubrotundo fuſco, ſtipite longo attenuato. *Dickſ. cryptog. Brit.* 1. *p.* 22. *t.* 3. *f.* 3.

militaris. 3. Sph. pileo clavato elongato rubro, ſtipite læviuſculo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria militaris. *Flor. dan. t.* 637. *f.* 1. *Bolton fung. t.* 128.

ophiogloſſoides. 4. Sph. pileo clavato atro-viridi, ſtipite longiuſculo baſi intusque flavo. *Bull. herb. Franc. t.* 440. *f.* 2.

† † *ſuberoſæ.*

truncata. 5. Sph. nivea plana, thecis nigricantibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Peziza punctata. *Bolton fung. t.* 127. *f.* 2.

Carcharias. 6. Sph. pileo rugoſo ſubramoſo, thecis apicem ambientibus. *Weig. obſ. bot. t.* 3. *f.* 6.

digitata. 7. Sph. nigra ramoſa, pileo tereti acuminato. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria digitata. *Bull. herb. Franc. t.* 220.

bulboſa. 8. Sph. pileo ramoſo ſubtereti, radice bulboſa. *Perſoon fung. ined. ic.*

Hypoxylon. 9. Sph. pileo ramoſo compreſſo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria Hypoxylon. *Bull. herb. Franc. t.* 180. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *t.* 3. *f.* 1.

flexuoſa. 10. Sph. ſimpliciſſima ſubulata, pileo flexuoſo. *Schranck flor. bavar.* 2. *t.* 1844.

* *compoſitæ.*

caſtorea. 11. Sph. aggregato-ſparſa æqualis nigra monoſticha ſubgloboſa, volva fuſca fugaci, ſphærulis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 28. *t.* 12. *f.* 100.

æruginoſa. 12. Sph. ſparſa oblonga convexa ſparſa monoſticha, ſubſtantia ſphærulisque atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 27. *t.* 12. *f.* 99.

atro-purpurea. 13. Sph. ſparſa atropurpurea monoſticha rotundato-plana, ſphærulis ovalibus papillatis connatis nigris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 32. *t.* 13. *f.* 105.

decidua. 14. Sph. aggregata oblongo-convexa monoſticha, ſubſtantia flava, glebulis globoſo-papillatis rubris prominentibus deciduis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 31. *t.* 13. *f.* 104.

ribis. 15. Sph. aggregata convexo-oblonga purpuraſcens monoſticha, glebulis ovalibus papillatis prominulis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 31. *t.* 12. *f.* 103.

16. Sph.

lenta. 16. Sph. aggregata lentiformis lenta pulla monosticha, glebulis globosis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 30. *t.* 12. *f.* 102.

natans. 17. Sph. aggregata atra subrotunda convexo-plana monosticha, cortice superne colliculoso substantiam viscidulam indurescentem includente, glebulis aggregatis albis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 27. *t.* 12. *f.* 98.

Cucurbitula. 18. Sph. aggregata convexa plana monosticha, glebulis ovalibus contabescendo concavis insitis rubris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 38. *t.* 14. *f.* 110.

sanguinaria. 19. Sph. limitata glauca monosticha rotundato-polymorpha crustacea, glebulis globosis obsolete papillatis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 40. *t.* 14. *f.* 112.

insitiva. 20. Sph. corticalis plana lineari-acuminata candida monosticha, velo cum substantia connato, glebulis papillatis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 36. *t.* 13. *f.* 108.

Macula. 21. Sph. planissima atra monosticha polymorpha, glebulis globoso-papillatis, singulis velo fugaci tectis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 33. *t.* 13. *f.* 106.

Placenta. 22. Sph. rotundo-complanata tuberculosa monosticha, glebulis globoso-acuminatis connatis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 26. *t.* 12. *f.* 97.

Talus. 23. Sph. nivea monosticha tuberculosa, tuberculis truncatis polymorphis, glebulis globosis atris. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 23. *t.* 11. *f.* 80. 92. 95.

radians. 24. Sph. aggregato-sparsa subtuberculosa subglobosa atra submonosticha, volva pulverulenta fulva, glebulis atris. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 29. *t.* 12. *f.* 101.

tunicata. 25. Sph. subcaulescens fusca monosticha subovalis tuberoso-bicorticata stilo-cirrifera, tunicis glebulisque biformibus connatis, velis particularibus confluentibus fugacibusque. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 59. *t.* 17. *f.* 130.

gelatinosa. 26. Sph. pulvinato-gelatinosa lutea monosticha globifera, globulis spermaticis stramineis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 48. *t.* 16. *f.* 123. 124.

fragifera. 27. Sph. plana nigra monosticha stilifera, stilis spermaticis e singulis capsulis successive protrusis brevissimis coadunatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 55. *t.* 17. *f.* 132.

deusta. 28. Sph. nigra polymorpha convexo-bicorticata monosticha stilifera, glebulis biformibus, stilis spermaticis

obſolete nodoſis ſubuncinatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 55. *t.* 17. *f.* 129. Sphæria verſipellis.

Hyſtrix. 29. Sph. nigra ovalis convexo-plana aggregata monoſticha ſtilifera, ſtilis ſpermaticis proceris ſuperne ſubincraſſatis cum glebulis connatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 53. *t.* 16. *f.* 127.

Ceratoſpermum. 30. Sph. nigra aggregata ſubrotunda pulvinato-convexa ſtilifera, glebulis bifariis, ſtilis ſpermaticis ſcabro-rudibus cum glebulis connatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 53. *t.* 17. *f.* 131. *Bull. herb. Franc. t.* 492. *f.* 1.

ſuccenturiata. 31. Sph. oblongo-pulvinata ſparſa bicorticata atra, glebulis ſuccenturiatis ſimplicibusque. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 37. *t.* 14. *f.* 109.

convergens. 32. Sph. aggregata roſacea, glebulis atris excipuliformibus liberis cônvergentibus. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 39. *t.* 14. *f.* 111.

ceſpitoſa. 33. Sph. aggregata globoſo-ceſpitoſa atra lamellata, lamellis radiatis ſubtus connatis apice glebuliferis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 41. *t.* 14. *f.* 113.

fiſſivela. 34. Sph. globoſa atra, maſſa glutinoſo-farinacea rimas agente capſularum congeriem obtegente. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 18. *t.* 10. *f.* 86.

carpini. 35. Sph. atra, ſpiculis minutiſſimis terminata. *Batſch el. fung. p.* 274. *t.* 30. *f.* 187. Sphæria ſpiculoſa. β) *Batſch el. fung. cent.* 2. *t.* 41. *f.* 231. Sphæria coryli.

bullata. 36. Sph. convexa nigra intus alba. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 5. *t.* 2. *f.* 1.

Stigma. 37. Sph. corticalis nigra punctata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 7. *t.* 2. *f.* 2.

pulvinata. 38. Sph. atra convexo-tuberculoſa. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 3. *An diſtincta vere ſpecies?*

vireſcens. 39. Sph. convexo-plana nigra intus vireſcens. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 4.

diſciformis. 40. Sph. ſubrotunda plana punctata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 15. *t.* 4. *f.* 1.

papillata. 41. Sph. papillis minutiſſimis atris apice pertuſis cruſtæ fuſcæ vel nigricanti innatis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 19. *t.* 4. *f.* 3. *An hujus tribus diſtincta ſpecies?*

fragiformis. 42. Sph. convexa obfcure rubra. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 20. *t.* 5. *f.* 1.

coronata. 43. Sph. oftiolis epidermide perforata fpinulofis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 24. *t.* 5. *f.* 4. 5.

puftulata. 44. Sph. lentiformis perforata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 26. *t.* 5. *f.* 3.

cirrata. 45. Sph. atra, oftiolis cirrhofis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 27. *t.* 6. *f.* 1.

nivea. 46. Sph. tuberculofa, tuberculis truncatis niveis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 28. *t.* 6. *f.* 3.

granulofa. 47. Sph. cinereo-nigricans tenax, loculis prominulis numerofiffimis in congeriem cruftaceam connatis. *Bull. herb. Franc. t.* 482. *f.* 2.

melanogramma. 48. Sph. fuliginofo-nigricans irregulariter bullata, loculis hiantibus. *Bull. herb. Franc. t.* 492. *f.* 1.

globularis. 49. Sph. aggregata globofa claufa nigra opaca indurata. *Batfch el. fung. cent.* 1. *p.* 271. *f.* 180.

acinofa. 50. Sph. aggregata globofa claufa nigro-fufca verrucofa fparfim pilofa. *Batfch el. fung. cent.* 1. *p.* 269. *f.* 179. *An hujus tribus?*

byffina. 51. Sph. aggregata fulva, cortice floccofo niveo. *Wigg. prim. flor. holf. p.* 84.

Bombarda. 52. Sph. aggregata oblonga nigro-fufca, glebulis albis. *Batfch el. fung. cent.* 1. *p.* 271. *f.* 181. *An diftincta hujus generis & tribus fpecies?*

cancellata. 53. Sph. fubcompofita atra aggregato-fparfa rotundo-ovalis convexa monofticha, velo prominente, glebulis connatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 34. *t.* 13. *f.* 107.

*** *fimplices.*

tubæformis. 54. Sph. aggregata atra globofa collabefcendo cupularis ftilifera, ftilo fpermatico connato craffiufculo bicolori. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 51. *t.* 16. *f.* 128.

Lingua. 55. Sph. aggregata atra fubovalis pulvinata collabefcendo concavo-rugofa ftilifera, ftilo fpermatico breviufculo decumbente. *Tode fung. meckl.* 2. *p.* 51. *t.* 16. *f.* 126.

Gnomon. 56. Sph. aggregata nigra globofa collabefcendo concava ftilifera, ftilo fpermatico procero fubrecto. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 50. *t.* 16. *f.* 125.

Acrofpermum. 57. Sph. conferto-aggregata pulla globifera cylindrico-ventricofa collabefcendo ftrigofa. *Tode fung. mekl. p.* 47. *t.* 15. *f.* 119.

Peziza. 58. Sph. aggregata hydrophora rubens globofa collabefcendo concava. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 46. *t.* 15. *f.* 122.

penetrans. 59. Sph. globofo-acuminata collabefcendo excavata aggregata nigra globifera, globo fpermatico nigro. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 45. *t.* 9. *f.* 74. & *t.* 15. *f.* 121.

dubia. 60. Sph. elongato-attenuata aggregata grifea globifera, guttula fpermatica diaphana albo-lutefcente. *Tode fung. meckl.* 2. *p.* 45. *t.* 15. *f.* 118.

fubulata. 61. Sph. fubulato-granulata aggregata fufca globifera, globo fpermatico flavo atrefcente. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 44. *t.* 15. *f.* 117.

conica. 62. Sph. conico-tomentofa aggregata globifera, globo fpermatico flavo atrefcente. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 43. *t.* 15. *f.* 116.

parabolica. 63. Sph. globifera parabolica lævis aggregata nigra, globo fpermatico livido. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 43. *t.* 15. *f.* 115.

cylindrica. 64. Sph. globifera cylindrica fparfa nigra, globo fpermatico candido. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 42. *t.* 15. *f.* 114.

moriformis. 65. Sph. aggregato-fparfa atra ovalis tuberculofa. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 22. *t.* 11. *f.* 90. 91.

epifphæria. 66. Sph. aggregato-fparfa purpurea globofa, collabefcendo complanata, papilla convexo-oblonga. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 21. *t.* 11. *f.* 89.

complanata. 67. Sph. aggregata mammiformis pulla collabefcendo complanata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 21. *t.* 11. *f.* 88.

artocreas. 68. Sph. fparfa atra mammiformis contabefcendo convexo-complanata, plica annulari. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 20. *t.* 9. *f.* 73.

confluens. 69. Sph. confluens atra papillata, volva fugaci. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 19. *t.* 10. *f.* 87.

inquinans. 70. Sph. aggregata obvelato-papillata atra, immerfa, feminum glebis efetis cylindricis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 17. *t.* 10. *f.* 85.

gregaria. 71. Sph. irregulariter aggregata miniata, crufta alba tenera. *Weig. obf. bot. p.* 43. *t.* 2. *f.* 10.

epiphylla. 72. Sph. cruſtacea alba, ſphærulis nigris cortice atro. *Wigg. prim. fl. holſ. p.* 84.

byſſacea. 73. Sph. ſolitaria minima atra, cruſta nivea pulverulenta. *Weigel obſ. bot. p.* 42. *t.* 2. *f.* 9.

hemiſphærica. 74. Sph. aggregata hemiſphærica nigra intus alba. *Schr. fl. bav.* 2. *p.* 66.

muſcoſa. 75. Sph. hemiſphærica ſpadicea rugoſa. *Weig. obſ. bot. p.* 42.

mucida. 76. Sph. conferto-aggregata globoſa tomentoſa, corticе papillaque atris, tomento mucido. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 15. *t.* 9. *f.* 75. *t.* 10. *f.* 82.

rugoſa. 77. Sph. aggregata globoſo-rugoſa nigerrima intus nigra. *Weig. obſ. bot. p.* 43. *t.* 2. *f.* 12.

ſphincterica. 78. Sph. pyriformis nigra villoſa, apice excavato plicato. *Bull. herb. Franc. t.* 444. *f.* 1.

hiſpida. 79. Sph. ſparſa pyriformis hiſpida atra. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 17. *t.* 10. *f.* 84.

calva. 80. Sph. ſparſa atra papillata, hemiſphærio ſuperiori glabro inferiori hiſpido. *Tode fung. meckl.* 2. *p.* 16. *t.* 10. *f.* 83.

mollis. 81. Sph. aggregata atra nitidiuſcula ſubpapillata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 8. *t.* 9. *f.* 66.

triſtis. 82. Sph. aggregata atra immerſa minima granulata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 9. *t.* 9. *f.* 67

cinnavarina. 83. Sph. ſparſo-aggregata rubra ovalis granulata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 9. *t.* 9. *f.* 68.

byſſiſeda. 84. Sph. ſparſa mammiformis bicorticata, cruſtæ filamentoſæ innaſcens. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 10. *t.* 9. *f.* 69. 70.

mobilis. 85. Sph. conferta globoſa mobilis, papilla decidua. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 71.

acuta. 86. Sph. ſolitaria minima atra. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 22. 23. *t.* 5. *f.* 2.

porphyrogona. 87. Sph. aggregata phialæformis atra, cruſtæ tenuiſſimæ violaceæ innata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 12. *t.* 9. *f.* 72.

macroſtoma. 88. Sph. aggregato-ſparſa globoſa, orificio largo labiato. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 12. 13. *t.* 9. *f.* 76-78.

roſtrata. 89. Sph. ſparſo-aggregata globoſa longiſſime roſtrata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 14. *t.* 10. *f.* 79. 80.

comata. 90. Sph. aggregata globoſa vertice capillata, capillis faſtigiatis conniventibus. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 15. *t.* 10. *f.* 81.

ciliaris. 91. Sph. gregaria ex albo nigricans, loculis cirrhiferis. *Bull. herb. Franc. t.* 488. *f.* 1.

phœnicea. 92. Sph. minima ſparſa globoſo-elliptica rubra glabra. *Bull. herb. Franc. t.* 487. *f.* 3. *Weigel obſ. bot. t.* 2. *f.* 10. Sph. mori.

miliacea. 93. Sph. uniloculáris gregaria ſubgloboſo-turbinata ex albo nigricans, ſuperficie granuloſa. *Bull. herb. Fr. t.* 444. *f.* 3.

HYSTERIUM. *Fungus* ſeſſilis cavus, ſupra rima transverſa, ſeminibus globoſis ecaudatis diſcum obducentibus.

candidum. 1. H. aggregatum fuſiforme papyraceum. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 4. *t.* 8. *f.* 62.

cæruleum. 2. H. ſparſum oblongo-ovale membranaceum cruſtaceum. *Tode fung. mekl. ſel* 2. *p.* 4. *t.* 8. *f.* 60.

VERMICULARIA. *Capſula* globoſa ſeſſilis, corporibus vermiformibus liberis ſeminiferis repleta.

Pſeudoſphæria. 1. V. aggregata, capſula granulata nigra, filamentis gemmiferis nudis albis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 31. *t.* 6. *f.* 46.

pubeſcens. 2. V. ſparſa, capſula pubeſcente bicolore, filamentis gemmiferis nudis canis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 31. *t.* 6. *f.* 47.

hiſpida. 3. V. pulvinata ſparſa, capſula nigra hiſpida, volva verticis fugaci, filamentis gemmiferis demerſis albidis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 32. *t.* 6. *f.* 48.

PYRENIUM. *Fungus* globoſus ſeſſilis integerrimus, ſemina nuda conglobata nuclei inſtar includens.

lignorum. 1. P. ſparſum candidum, cortice bombacino, nucleo æruginoſo fatiſcente. *Tode fung. mekl. ſel. p.* 33. *t.* 3. *f.* 29.

aureum. 2. P. ſparſum aureum, cortice tomentoſo, nucleo ſubaurantio fatiſcente. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 33.

metallorum. 3. P. compressum ascendens imbricatum hirsutum, nucleo duriori. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 34. *t.* 6. *f.* 49.

terrestre. 4. P. aggregatum, pulpa gelatinosa, nucleo cereo subrecedente. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 35. *t.* 6. *f.* 50.

TUBER. *Fungus* subglobosus carnosus, carne intus venis distincta.

gulosorum. 1. T. globosum solidum muricatum radice destitutum. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon Tuber. *Mich. nov. pl. gen. t.* 102. β) *Mich. nov. pl. gen. t.* 164. γ) *Bull. herb. Franc. t.* 356.

oleraceum. 2. T. subrotundum nigrum congestum sessile rugosum. *Weber suppl. flor. hols. p.* 14.

parasiticum. 3. T. rubrum elongatum squamosum. *Bull. herb. Franc. t.* 456.

album. 4. T. difforme subrotundum convexo-gibbosum rugosum solidum albidum. *Bull. herb. Franc. t.* 404.

SCLEROTIUM. *Fungus* simplicissimus globoso-oblongus tenax duriusculus centro demum subhians, cortice inseparabili nunquam supra dehiscente.

* *ovalia.*

purpureum. 1. Scl. perpendiculare glaberrimum minimum sparsum. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2. *Bolt. fung.* 3. *p.* 119. *t.* 119. *f.* 1.

immersum. 2. Scl. decumbens glabrum æquale. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Mucor. 3. Scl. decumbens aggregatum. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 7.

** *globosa.*

Semen. 4. Scl. nigrescens corrugandum sparsum. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 6.

radicatum. 5. Scl. sparsum radicatum, basi producta. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 8.

villosum. 6. Scl. villosum aggregatum. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 10, 11.

subterraneum. 7. Scl. globoso-difforme aggregatum subterraneum. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

*** *pyriforme.*

complanatum. 8. Scl. complanatum, stipite brevissimo. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 9.

TUBERCULARIA. *Fungus* gelatinosus pileatus, pileo tuberculato-papilloso, stipiti crassissimo farcto arcte appresso, in superficie superiori semina portante.

* *sparsae.*

vulgaris. 1. T. stipite ventricoso globoso, pileo convexo rugoso, margine subrepando. *Bulliard herb. Franc. t.* 284. *Bolt. fung.* III. *t.* 127. *f.* 1.

volvata. 2. T. stipite conico volvato, volva cyathiformi, pileo rugoso convexo, margine appresso repando. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 20. *t.* 3. *f.* 33.

sulcata. 3. T. sulcata integra, stipite crucibuliformi cum pileo depresso subtus connato. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 21. *t.* 4. *f.* 34.

nigricans. 4. T. primum coccinea, demum nigra. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 217. *t.* 455. *f.* 1.

** *fasciculata.*

fasciculata. 5. T. stipite tereti pileo complanato grenulato. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 20. *t.* 4. *f.* 32.

SPERMODERMIA. *Fungus* simplicissimus globosus sessilis spongiosus, seminibus confertis urticis vicem subeuntibus.

clandestina. 1. SPERMODERMIA. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

ACROSPERMUM. *Fungus* fimpliciffimus fuberectus in apice exterius femina emittens.

unguinofum. 1. A. cefpitofum perpendiculare unctuofum, (adultum) purpureum, apice tumidum. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 263. *t.* 12.

compreffum. 2. A. perpendiculare ovato élongatum compreffum rigidiffimum. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 13.

pyramidale. 3. A. perpendiculare ovato-acuminatum duriffimum folitarium. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 14.

arachnoides. 4. A. gelatinofum fibrofum fubtus tela araneola veftitum, capitulo aurantio demum atro. *Jacq. mifc. auftr.* 1. *p.* 144. *t.* 15. *An hujus generis?*

ficcum. 6. A. lacteum coriaceum intus cavum. *Schranck flor. bav.* 7. *p.* 676. *n.* 1634.

STILBUM. *Fungus* gelatinofus ftipitatus aggregatus, capitulo diaphano nitente folido perfiftente extrinfecus femina portante.

* *capitulo fphærico.*

vulgare. 1. St. ftipite cylindrico craffiufculo. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 16.

bulbofum. 2. St. ftipite attenuato bulbofo. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 7.

** *capitulo ovato.*

rubicundum. 3. St. capitulo compreffo, ftipite attenuato. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 18.

minimum. 4. St. capitulo compreffo, ftipite capillari. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 19.

pubens. 5. St. ftipite fubtus incraffato pubente. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 12. *t.* 3. *f.* 21.

*** *capitulo turbinato.*

turbinatum. 6. St. ftipite cylindrico ad capitulum contracto. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 20.

ASCOPHORA. *Fungus* erectus ftipitatus, ftipite fetaceo, capitulo globofo oblongo inflato opaco elaftico extrinfecus femina portante.

* *fparfæ.*

Mucedo. 1. A. aggregata, capitulo fphærico ad ftipitem longum rumpendo. *Wilden bot. Mag.* 4. *p.* 18. *f.* 17. Mucor roridus.

fragilis. 2. A. conferta, capitulo fphærico in medio diffiliente, ftipite breviufculo. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 14. *t.* 3. *f.* 23.

Stilbum. 3. A. capitulo ovato nitido, ftipite breviffimo. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 14. *t.* 3. *f.* 24.

ovalis. 4. A. capitulo ovali demum corrugando & multifariam dehifcente, ftipite longiufculo. *Tode Schr. berl. Naturf.* 3. *p.* 247. *t.* 4. *f.* 4-6. Afcidium ovatum.

cylindrica. 5. A. gregaria, capitulo cylindrico corrugando, ftipite breviufculo. *Tode Schr. berl. Naturf.* 3. *p.* 248. *t.* 4. *f.* 7-9.

** *in receptaculo communi convexo aggregatæ.*

limbiflora. 6. A. receptaculo communi demum depreffo, capitulis globofis nutantibus deciduis, ftipitibus capillaribus laxis. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 15. *t.* 3. *f.* 25.

difciflora. 7. A. capitulis ovato-elongatis deciduis. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 16. *t.* 3. *f.* 26. 27.

articulata. 8. A. nigro-fufcefcens, capitulis elongatis articulatis apice acuminatis. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 110. *t.* 504. *f.* 14.

CHORDOSTYLUM. *Fungus* tenaciffimus ftipitatus, ftipite longiffimo tenaciffimo fubramofo, capitulo globofo fubdeciduo femina includente.

* *erecta.*

Clavaria. 1. Ch. fimplex, ftipite capillari glabro flexuofo, capitulo pyriformi coriaceo. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 40. *t.* 7. *f.* 55.

capillare. 2. Ch. fparfum, ftipite capillari glabro indivifo, capitulo fphærico fatifcente. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 37. *t.* 6. *f.* 52.

byssoides. 3. Ch. aggregatum, stipite capillari debili ramoso. *Tode fung. mekl. sel. 1. p. 38. t. 7. f. 53.*

** *repens.*

hispidulum. 4. Ch. hispidulum, surculo capillari decumbente ramoso subradicante, capitulis obovatis immersis. *Tode fung. mekl. sel. 1. p. 39. t. 7. f. 54.*

filiforme. 5. Ch. luteum pubescens, stipite gracillimo, apicibus albis pilosis. *Bull. herb. Franc. 1. p. 205. t. 448. f. 1.*

penicillatum. 6. Ch. croceum glabrum, stipite tenui, apicibus multifidis. *Bull. herb. Franc. 1. p. 207. t. 448. f. 3. An hujus generis?*

RHIZOMORPHA. *Fungus* ramosissimus repens corneus, seminibus latentibus.

fragilis. 1. Rh. nigra glabra compressa reticulata intus solida alba. *Flor. dan. t. 713.*

cinchonæ. 2. Rh. fusca pubescens reticulata compressa intus cava nitidissima. *Willden. bot. Ann. 1. p. 8. t. 1. f. 2.*

capillaris. 3. Rh. crocea subcompressa capillaris pubescens. *Willd. bot. Ann. 1. p. 8. t. 1. f. 3.*

MESENTERICA. *Fungus* expansus gelatinosus venosus in margine gemmas ferens.

tremelloides. 1. MESENTERICA. *Tode fung. mekl. sel. 1. p. 7. t. 2. f. 12.*

MUCOR. *Fungus* fugax, capitula rorida primo diaphana demum opaca stipitibus simplicibus ramosisve affixa.

ovalis. 1. M. cespitosus niveus, capitulo ovali. *Hall. hist. stirp. Helv. n. 2149.*

minimus. 2. M. minimus albus, capitulo nutante. *Mich. n. pl. gen. t. 95. f. 1.*

paniceus. 3. M. capitulis globosis albis siccis. *Mich. n. pl. gen. t. 96. f. 6.*

albus. 4. M. albus, capitulo globoso. *Bull. herb. Fr. t. 407. f. 3.*

flavus. 5. M. luteus capitulo globoso. *Hall. hist. stirp. Helv. n.* 2151.

tremelloides. 6. M. aggregatus gelatinosus lentiformis confluens. *Schr. fl. bav.* 2. *p.* 637. *n.* 1793.

plumosus. 7. M. albus ramosus lanam referens. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1795.

araneosus. 8. M. canus telam aranearum referens. *Schranch fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1796.

purpureus. 9. M. purpureus guttam æmulans. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 639. *n.* 1799.

globosus. 10. M. gregarius ochroleucus. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1798.

infusorius. 11. M. gelatinosus, filamentis ad latera globuliferis. *Spallanzani phys. Abh. t.* 1. *f.* 11. *An hujus generis?*

Mucedo. 12. M. stipitatus, capsula globosa. *Mich. nov. pl. gen. t.* 95. *f.* 2. 4.

Erysiphe. 13. M. albus, capitulis fuscis sessilibus.

virens. 14. M. thalassinus, capitulo globoso. *Batsch el. fung. p.* 157. *n.* 2. *An hujus generis?*

HYDROPHORA. *Fungus* globosus aqueus, stipite capillari subrecto.

minima. 1. H. capitulo excolore, stipite lutescente. *Tode fung. mekl. sel.* 2. *p.* 5. *t.* 8. *f.* 68.

tenella. 2. H. capitulo excolore, stipite griseo. *Tode fung. mekl. sel.* 2. *p.* 6. *n.* 2.

stercorea. 3. H. capitulo stipiteque sordide lutescentibus. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 6. *n.* 3.

PERICONIA. *Fungus* globosus, seminibus sessilibus deciduis capitulum & stipitem ubique obducentibus.

lichenoides. 1. PERICONIA. *Tode fung. mekl. sel.* 2. *p.* 2. *t.* 8. *f.* 61.

GRANULARIA. *Fungus* ſubrotundus granis mucilagini immerſis farctus.

piſiformis. 1. GRANULARIA. *Willden. bot. Ann.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 1.

MEDUSULA. *Fungus* ſolidus globoſus ſtipitatus confertus, ſeminibus externis filiformibus flexilibus colliqueſcentibus.

labyrinthica. 1. MEDUSULA. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 17. *t.* 3. *f.* 28.

MONILIA. Fila moniliformia in capitulum congregata.

* *ſtipitatæ.*

cruſtacea. 1. M. ſpicis digitatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 727. Mucor cruſtaceus. *Flor. dan. t.* 897. *f.* 1.

ceſpitoſa. 2. M. ſtipite ramoſo, ſpicis ternatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 727. Mucor ceſpitoſus. *Mich. nov. pl. gen. t.* 91. *f.* 3. *β*) *Mich. nov. pl. gen. t.* 91. *f.* 4.

Aſpergillus. 3. M. ſtipite ſetaceo dichotomo procero, capitulis aqueis. *Scop. flor. carn. n.* 1642.

aurea. 4. M. ceſpitoſa flava, capitulo ſubrotundo. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2154.

alba. 5. M. alba, ſtipite articulato. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2155.

purpurea. 6. M. cruſta villoſa alba, ſtipitibus brevibus capitulisque rubris. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2153.

glauca. 7. M. cana villoſa, ſtipite ſetaceo brevi, capitulo globoſo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor glaucus. *Bull. herb. Fr. t.* 504. *f.* 10.

** *ſeſſiles.*

ochroleuca. 8. M. globoſa ochroleuca villis radiantibus farcta. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2152.

leproſa. 9. M. ſetacea capitulis radicalibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor leproſus.

MUCILAGO. *Fungus*, fila ſimpliciſſima fugacia.

plumoſa. 1. M. nivea plumoſa. *Hall. ſtirp. Helv. n.* 2130.

ceſpitoſa. 2. M. plumoſa lutea. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 112.

cinerea. 3. M. cinerea, filis ceſpitoſis ramoſis ſimplicibusque. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2131.

miniata. 4. M. villoſa ruberrima. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2132.

INDEX
TOMI II^{di}
DUPLEX.

INDEX I.

CONTINENS NOMINA GENERUM, CUM SPECIEBUS SUBJECTIS OMNIBUS.

ABROMA 1149, 1151
anguſtum 1151
Wheleri ib.
Abronia 996, 1008
californica 1008
ABRUS 1075, 1076, 1086
precatorius 1086
ACÆNA 218, 278
elongata 278
Acalypha 998, 1032-1034.
alopecuroides 1033
anguſtifolia ib.
auſtralis 1032
betulifolia 1034
caroliniana 1033
ciliata 1032
corenſis 1033
decidua 1032
elliptica 1033
fruticoſa 1032
hernandifolia 1033
indica 1032
lævigata 1033
reptans ib.
ſcabroſa ib.
ſpicata 1032
Acalypha
ſupera 1033
tomentoſa ib.
villoſa 1032
virgata 1033
virginica 1032
Acanthus 887, 964, 965
arboreus 964
capenſis 965
carduifolius 964
Dioſcoridis 965
edulis 964
furcatus 965
ilicifolius ib.
integrifolius ib.
mollis 964
procumbens 965
ſpinoſus 964
Acaroa 1076, 1085
violacea 1085
Acer 598, 615-617
campeſtre 616
carolinianum 617
creticum 616
diſſectum ib.
japonicum ib.
laciniatum ib.
monſpeſſulanum ib.
Acer
montanum 616
Negundo ib.
palmatum ib.
penſilvanicum ib.
pictum ib.
Platanoides ib.
Pſeudoplatanus ib.
rubrum ib.
ſaccharinum ib.
ſempervirens 615
ſeptemlobum 616
tataricum ib.
trifidum ib.
Achillea 1165, 1252-1254
abrotanifolia 1254
ægyptiaca 1253
Ageratum 1252
alpina ib.
atrata 1254
capitata 1253
Cerbarato 1252
Clavennæ 1253
coronopifolia ib.
cretica ib.
criſtata 1253
falcata ib.
Halleri 1253
impatiens ib.

Achillea
ligustica 1253
lobata 1252
macrophylla 1253
magna ib.
micrantha ib.
Millefolium 1254
moschata ib.
nana 1253
nobilis 1254
odorata ib.
pilosa 1253
Ptarmica 1252
pubescens 1254
Santolina 1253
serrata ib.
squarrosa ib.
tanacetifolia 1254
tomentosa ib.
Achras 523, 573, 574
Balata 574
dissecta 573
mammosa ib.
salicifolia ib.
Sapota ib.
Achyranthes 303, 423, 424
alternifolia 424
altissima ib.
aspera 423
capitata 424
corymbosa ib.
decumbens ib.
dichotoma ib.
lappacea 423
muricata 424
nivea ib.
polystachya ib.
prostrata ib.
Acidoton 772, 819
urens 819
Acioja 998, 1028
gujanensis 1028
Acnida 313, 509
cannabina 509
Aconitum 778, 838, 839
album 839
Anthorus 838
Cammarum ib.
cernuum ib.
japonicum ib.
lycoctonum ib.
Napellus ib.
neomontanum ib.
pyrenaicum ib.
septentrionale ib.
tauricum ib.
uncinatum 839
variegatum 838
volubile ib.
Acorus 526, 568
Calamus 568
gramineus ib.
Acrospermum 1286, 1483
arachnoideum 1483
compressum ib.
pyramidale ib.
siccum ib.
unguinosum ib.
Acrostichum 1283, 1294-1297.
aculeatum 1297
areolatum 1296
aureum 1295
australe ib.
barbatum 1296
calomelas 1297
citrifolium 1295
crinitum ib.
cruciatum 1296
dichotomum 1295
digitatum ib.
ebeneum 1296
Acrostichum
ferrugineum 1295
filare 1297
furcatum 1296
graminoides 1294
hastatum 1295
heterophyllum 1294
ilvense 1296
lanceolatum 1294
latifolium ib.
lingua 1295
longifolium 1294
Marantæ 1296
marginatum ib.
muscosum 1294
pectinatum 1295
petiolatum 1294
platyneuron 1295
polypodioides ib.
punctatum ib.
punctulatum ib.
rufum 1296
sanctum ib.
septentrionale 1295
serrulatum 1294
siliquosum 1296
simplex 1294
sorbifolium 1296
spicatum 1294
sulphureum 1296
thalictroides ib.
trifoliatum ib.
velleum 1297
villosum 1294
Actæa 774, 807, 808
dioica 808
japonica ib.
monogyna ib.
pentagyna ib.
racemosa ib.
spicata 807
Adambea 776, 821
capsulifera 821

Adansonia 1000, 1038
digitata 1038
Adelia 999, 1036
Acidoton 1036
Bernardia ib.
Ricinella ib.
Adenanthera 656, 678
falcata 678
pavonina ib.
scandens ib.
Adenia 523, 565
venenata 565
Adiantum 1283, 1314, 1317
aculeatum 1317
Æthiopicum ib.
borbonium ib.
caffrorum 1316
Capillus Veneris 1316
caudatum 1315
chryanum 1316
clavatum 1317
cristatum 1316
cuneatum 1315
decurrens ib.
deltoideum ib.
denticulatum 1316
flabellulatum ib.
fragile 1317
fragrans 1316
furcatum ib.
fuscum 1315
gujanense 1316
hastatum 1315
hexagonum 1317
Lancea 1315
macrophyllum ib.
microphyllum 1317
pedatum 1315
philippense ib.
Adiantum
pteroides 1317
pulverulentum 1316
pumilum 1315
radiatum ib.
reniforme 1314
repens 1315
sagittatum ib.
serratum 1316
serrulatum 1315
striatum 1317
strictum 1316
tenellum 1317
tenerum ib.
trapeziforme ib.
trifoliatum 1316
trilobum 1315
truncatum 1316
villosum ib.
Adonis 783, 876
æstivalis 876
apennina ib.
auctumnalis ib.
capensis ib.
flammea ib.
miniata ib.
vesicatoria ib.
vernalis ib.
Adoxa 603, 643
moschatellina 643
Æcidium 1472 *sq.*
anemones 1473
berberidis ib.
cancellatum 1472
candidum 1473
cornutum 1472
euonymi 1473
euphorbiæ ib.
flavum ib.
fuscum ib.
lineare ib.
nigrum ib.
penicillatum 1472
Æcidium
pini 1473
pyrolæ ib.
rhamni 1472
rubellum 1473
scutellatum ib.
tussilaginis ib.
Ægilops 87, 178
aromatica 178
caudata ib.
ovata ib.
saccharina ib.
squarrosa ib.
triuncialis ib.
ÆGIPHILA 211, 259
arborescens 259
elata ib.
fœtida ib.
lævis ib.
martinicensis ib.
trifida ib.
villosa ib.
Ægopodium 310, 493
Podagraria 493
Ægopricon 4, 18
betulinum 18
Ærva 998, 1026
ægyptiaca 1026
Æschynomene 1077, 1120, 1121
americana 1120
arborea ib.
aspera ib.
Burmanni 1121
cannabina 1120
coccinea ib.
grandiflora ib.
herbacea 112
indica ib.
pumila ib.

Æſchynomene
ſenſitiva 1120
Sesban 1121
Æſculus 593, 595
Hippaucaſtanum 595
lutea ib.
parva ib.
pavia ib.
Æthuſa 309, 486
Bunius 486
Cynapium ib.
fatua ib.
Meum ib.
Afzelia 889, 927
caſſioides 927
Agaricus 1285, 1397-1429
abietis 1420
abbreviatus 1417
acerrimus 1412
acicularis 1425
acris 1413
acuminatus 1426
adhærens 1403
aduſtus 1422
aggregatus 1411
alabaſtrinus 1410
aliiaceus 1420
alliatus ib.
alterabilis 1422
alutaceus 1410
americans 1416
amarus 1413
androſaceus 1423
angulatus 1421
applicatus 1429
aqueus 1427
araneoſus 1402
arcuatus 1400
ardeſiacus 1415
armeniacus 1402
atromentarius 1428

Agaricus
atro-cyaneus 1422
atro-rufus 1421
atro-ſquamoſus 1419
atro-tomentoſus 1410
auratus 1416
auricomus 1414
aurivenius 1418
badius 1398
Balanus 1427
Beryllus 1416
bicolor 1423
buccinalis 1411
bulboſus 1399
Bulliardi 1413
bullularis 1418
cæruleſcens 1404
cæſareus 1397
caliciformis 1410
Campanella 1421
campanulatus 1428
campeſtris 1399
candicans 1414
candido-bulboſus 1418
candidus 1423
cano-brunneus 1418
carbonarius 1426
caryophylleus 1413
caſtaneus 1414
ceraceus 1403
Cereolus 1413
cereus 1417
cervinus 1410
ceſpitoſus 1429
Chryſodon 1422
ciliaris 1426
cimicarius 1413
cineraſcens 1418
cinereus 1427
cinnamomeus 1404
circumſeptus 1417
Clavis 1421
clavularis 1425

Agaricus
Clavus 1420
clypeatus 1402
clypeiformis 1426
cochleariformis 1409
collinus 1414
conchatus 1411
confertus 1424
congregatus 1426
conicus 1424
contiguus 1405
contortilis 1419
contortus 1416
contractus 1421
corallinus 1406
coriaceus 1418
craſſipes 1405
craſſus 1410
crenulatus 1420
criſtatus 1414
croceus 1402, 1415
cruentatus 1408
cuſpidatus 1424
cyaneus 1416
cyanoxanthus 1401
cyathiformis 1409
decurrens 1414
defoſſus 1407
degener 1410
delicioſus 1412
denticulatus 1398
denudatus 1428
depluens 1429
dichrous 1408
diſcors 1419
diffuſus 1428
Digitalis 1411
dimidiatus 1427
domeſticus 1408
diſcors 1412
dulcis 1400
durus 1415
elaſticus

Agaricus
elatior. 1408
elephantinus 1404
emeticus 1401
equinus 1424
eſculentus 1420
excoriatus 1399
fagineus 1429
fallax 1411
farinaceus 1419
farinoſus 1414
faſciatus 1406
faſcicularis 1407
faſciculatus 1425
faſtigiatus 1404
ferruginaſcens 1400
ferruginatus 1421
ferrugineus 1403
fibrilloſus 1420
Fibula 1421
fimiputris 1428
fiſſus 1415
flabellatus 1410
flabelliformis 1411
flammeus 1409
flavidus 1406
flavo-floccoſus 1417
floccoſus 1399
Flurſtedienſis 1411
fragilimus ib.
fragilis 1402
fuliginarius 1421
fuliginatus 1419
fulveſcens 1429
fulvidus 1402
fulvus 1398
furcatus 1410
Fumus 1421
fuſceſcens 1414
fuſipes 1406
Fuſus 1408
gelatinoſus 1429
Georgii 1402

Agaricus
giganteus 1397
gilvus 1402
glandifer 1422
glanduloſus 1428
glaucus 1411
glutinoſus 1401
goſſypinus 1428
gracilis 1422
granuloſus 1419
griſeo-albus 1398
griſeus 1425
helvolus 1398
hepaticus 1406
hirtus 1423
hiſpidus 1419
holoſericeus 1409
horizontalis 1408
Hyacinthus 1416
hypni 1421
janthinus 1419
ichoratus 1413
imbricatus 1400
impreſſus 1409
impuber 1407
incertus ib.
infundibuliformis 1409
integer 1401
involutus 1405
irregularis 1414
laccatus 1420
laceratus 1399
lacrimabundus 1426
lacrimalis 1414
lactifluus 1412
laricinus 1406
laterinus 1403
latus 1404
leoninus 1405
libertatis 1405
Lingua 1429
livens 1412

Agaricus
liveſcens 1410
longipes 1406
lucens 1398
luridus 1422
luteo-albus 1424
luteus 1403
lycoperdioides 1405
maculatus 1397
madreporeus 1408
majalis 1420
mammillaris 1424
mammoſus 1420
Mappa 1397
margaritaceus 1427
margaritifer 1397
marginatus 1422
melleus 1413
membranaceus 1423
micaceus 1428
minor 1398
minutulus 1423
minutus 1421
mitratus 1403
mollis ib.
molliſſimus 1404
momentaneus 1425
moſchatus 1416
Mucor 1425
muſcarius 1397
muſcorum 1418
mutabilis 1400
nævius 1398
narcoticus 1426
nebularis 1403
necator 1412
neptuneus 1410
nigro-villoſus 1415
nimbatus 1405
nitens 1399
niveus 1429
nivoſus 1405

Agaricus
norwegicus 1424
nothus 1423
nuceus 1425
obconicus 1409
obesus 1411
obscurus 1399
obsolescens 1418
ochraceus 1404
oedematosus 1406
Olla 1404
olivaceus 1417
olivascens 1400
opacus 1413
orichalceus 1400
ostreatus 1411
ovatus 1427
pallidus 1407
palmatus 1411
papilionaceus 1427
papillatus 1424
papilliger 1426
papyraceus 1425
perennis 1428
perforans 1423
peronatus 1424
petalodes 1411
piceaceus 1428
pileatus 1405
pilosulus 1422
piliformis 1416
pineti 1420
piperatus 1413
pistillaris 1399
Placenta 1419
planus 1429
plicatus 1420
plumatus 1429
plumbeus 1398
plumosus 1415
politus 1404
pomposus ib.
porcellaneus 1427

Agaricus
præaltus 1398
pratensis 1399
procerus ib.
pullatus 1428
punctatus 1402
purpureus 1419
pusillus 1405
radians 1429
radiatus 1423
radicosus 1399
ramealis 1415
ramosus 1416
repens 1415
rigidus 1406
rimosus 1422
risigallinus 1407
rosellus 1417
rostratus 1428
Rotula 1424
rubens 1415
Rudolphi 1403
rufescens 1406
rufus 1412
Russula 1401
rutilus 1402
saccharinus 1425
sanguineus 1417
sanguinolentus 1409
scissus 1416
scrobiculatus 1412
semiglobatus 1418
semipetiolatus 1410
senescens 1408
sericeus 1402
setaceus 1421
soboliferus 1428
solitarius 1397
sordiolulus 1426
sordiolus 1417
spadiceo-griseus 1425
spadiceus 1403
squalidus 1427

Agaricus
squamosus 1399
squamulosus 1407
stellatus 1424
stercorarius 1428
striatellus 1421
striatulus 1429
striatus 1403
suaveolens 1409
subalutaceus ib.
subannulatus 1407
subantiquatus 1400
subatratus 1426
subcarneus 1417
subcoriaceus 1420
subcorneus 1417
subferrugineus 1408
subgracilis 1397
subgranulatus 1403
subpurpurascens 1407
subtestaceus 1408
succineus 1427
sulcatus 1425
sulphuratus 1422
sulphureus 1417
superstitiosus 1416
tenuis 1424
terreus 1403
testaceus 1409
tigrinus 1414
Tintinnabulum 1423
tomentosus 1418
torminosus 1412
tortus 1427
tremebundus 1418
tremulus 1410
trichopus 1423
tricolor 1426
trilobus 1398
truncatus 1402
tubæformis 1409
tuberculosus 1406
tuberosus 1405

Agaricus
turbinatus 1404
turfaceus 1424
umbellatus 1423
umbelliferus *ib.*
umbilicaris 1425
umbilicatus 1414
Umbraculum 1419
umbrinus 1407
undulatus 1403
vaccinus *ib.*
vaginatus 1398
Vaillantii 1427
variegatus 1424
varius 1402
velutipes 1415
ventricosus 1402
versicolor 1429
vernus 1397
villosus 1400
vinosus 1416
violaceo-fulvens 1429
violaceo-fulvus 1409
violaceus 1401
virescens *ib.*
virgineus *ib.*
visceralis 1422
viscosus 1407
vitellinus 1400
xerampelinus 1401
zonarius 1412

Agave 524, 563
americana 563
cubensis *ib.*
fœtida *ib.*
lurida *ib.*
tuberosa *ib.*
virginica *ib.*
vivipara *ib.*

Ageratum 1162, 1200, 1201
ciliare 1201

Ageratum
conyzoides 1200
gujanense 1201

Agrimonia 742, 757
Agrimonoides 757
decumbens *ib.*
Eupatoria *ib.*
parviflora *ib.*
repens *ib.*

Agrostemma 662, 735
Cæli rosa 735
Coronaria *ib.*
Flos jovis *ib.*
Githago *ib.*

Agrostis 86, 168-171
alba 170
alpina 169
aspera 171
australis 169
avenacea 171
bromoides 169
capillaris 170
ciliata 171
Cinna 170
Cornu copiæ *ib.*
coromandeliana *ib.*
diandra *ib.*
dubia 169
festucoides *ib.*
filiformis *ib.*
gigantea *ib.*
glomerata 171
hirsuta 169
indica 171
interrupta 169
lateralis 171
Leersii 169
lenta 171
linearis 170
Matrella 169
mexicana 171
miliacea 169

Agrostis
minima 170
ovata *ib.*
procera *ib.*
pumila *ib.*
pungens 171
purpurascens 170
rubra 169
serotina *ib.*
silvatica 170
Spica venti 168
spicata *ib.*
spiciformis 169
stolonifera 170
stricta *ib.*
tenacissima *ib.*
verticillata *ib.*
vinealis 169
virginica 171

AGYNEJA 84, 106
impuber 106
puber *ib.*

Ailanthus 662, 726
Pongelion 726

Ajovea 522, 574
gujanensis 574

Aira 87, 174, 175
ægilopsoides 174
alpina 175
antarctica *ib.*
aquatica 174
arundinacea *ib.*
bengalensis *ib.*
canescens 175
capensis 174
caryophyllea 175
cespitosa 174
festucoides 175
flexuosa *ib.*
juncea *ib.*
Koenigii 174
media 175
miliacea 174

Aira
minuta 174
montana 175
paludosa 174
præcox 175
purpurea ib.
setacea ib.
sinensis ib.
subspicata ib.
villosa ib.
Aitonia 997, 1013
capensis 1013
Ajuga 885, 892
alpina 892
decumbens ib.
genevensis ib.
orientalis ib.
pyramidalis ib.
reptans ib.
Aizoon 779, 848, 849
canariense 848
fruticosum ib.
glinoides ib.
hispanicum ib.
lanceolatum ib.
paniculatum ib.
perfoliatum ib.
rigidum ib.
secundum ib.
tomentosum 849
Alangium 656, 667
pungens 667
Albuca 525, 547, 548
abyssinica 547
altissima ib.
coarctata ib.
fastigiata 548
major 547
minor ib.
spiralis 548
viscosa ib.
Alcea 1002, 1052
acaulis 1052
coromandeliana ib.
ficifolia ib.
rosea ib.
sinensis ib.
Alchemilla 317, 281
alpina 281
aphanoides ib.
pentaphylla ib.
vulgaris ib.
Alchornea 997, 1013
latifolia 1013
Aldrovanda 313, 514
vesiculosa 514
Aletris 524, 561, 562
aurea 562
capensis 561
farinosa ib.
fragrans ib.
guineensis ib.
hyacinthoides ib.
japonica 562
pumila 561
Uvaria ib.
Aleurites 998, 1035
triloba 1035
Alisma 528, 591, 592
cordifolium 592
Damasonium. ib.
flavum 591
natans 592
parnassifolium ib.
Plantago 591
ranunculoides 592
repens ib.
subulatum ib.
ALLAMANDA 293, 435
cathartica 435
Allionia 210, 231
albida 231
incarnata ib.
violacea ib.
Allium 524, 541-544
altaicum 544
Ampeloprasum 541
Angulosum 543
arenarium 542
ascalonicum 543
cæruleum 541
canadense 543
carinatum 542
Cepa 543
Chamæmoly 544
desertorum 542
descendens ib.
fistulosum 543
flavum 542
gracile 544
illyricum ib.
inodorum ib.
lineare 541
magicum ib.
Moly 544
monspessulanum 543
moschatum 542
multibulbosum 543
narcissiflorum ib.
neapolitanum ib.
nigrum ib.
nutans ib.
obliquum 541
odorum 543
oleraceum 542
ornitogaloides 544
Pallasii 542
pallens ib.
paniculatum ib.
parviflorum 542
Pomum 541
ramosum ib.
roseum ib.

Allium
rotundum 541
sativum 542
Schœnoprasum 543
Scorodoprasum 542
senescens 543
sibiricum ib.
sphærocephalon 542
suaveolens 541
subhirsutum ib.
tataricum ib.
tenuissimum 543
tricoccum 544
triquetrum ib.
ursinum ib.
Victorialis 541
vineale 542
Allophylus 599, 611 612
racemosus 612
rigidus ib.
zeylanicus 611
Aloë 524, 562, 563
arachnoidea 563
dichotoma ib.
disticha 562
humilis ib.
linguæformis ib.
maculata ib.
pendens ib.
perfoliata ib.
picta ib.
pumila 563
retusa ib.
sinuata ib.
spicata ib.
spiralis ib.
variegata 562
viscosa 563
Alopecurus 86, 167
agrestis 167
bulbosus ib.

Alopecurus
carolinianus 167
caudatus ib.
ciliatus ib.
geniculatus ib.
hordeiformis ib.
indicus ib.
monspeliensis ib.
panicus ib.
pratensis ib.
typhoides ib.
Alpinia 1, 7, 8
jamaicensis 8
Langua 7
occidentalis ib.
racemosa ib.
spicata ib.
Alsine 311, 506, 507
media 506
mucronata 507
prostrata ib.
segetalis 506
Alstonia 771, 798
theæformis 798
Alstrœmeria 524, 564
Ligta 564
multiflora ib.
peregrina ib.
pulchella ib.
Salsilla ib.
Alternanthera 84, 106
repens 106
Althæa 1002, 1051, 1052
cannabina 1052
corymbosa 1051
grandiflora ib.
hirsuta ib.
Ludwigii ib.

Althæa
narbonensis 1051
officinalis. ib.
Alyssum 967, 976, 977
alpestre 976
calicinum ib.
clypeatum ib.
creticum 977
deltoideum ib.
gemonense ib.
halimifolium 976
hyperboreum ib.
minimum ib.
montanum ib.
saxatile ib.
sinuatum 977
spinosum 976
utriculatum 977
Vesicaria ib.
Amanoa 304, 427
gujanensis 427
Amarantus 89, 204-206
albus 205
Blitum ib.
caudatus ib.
cruentus ib.
deflexus ib.
flavus ib.
gangeticus ib.
græcizans 204
hybridus 205
hypochondriacus ib.
lividus ib.
mangostanus ib.
melancholicus 204
oleraceus 205
paniculatus ib.
polygamus 204
polygonoides 205
retroflexus 206

Amarantus
sanguineus 206
scandens 205
spinosus 206
tricolor 204
tristis 205
viridis *ib.*

Amaryllis 524, 538-540
alba 540
Atamasco 539
aurea *ib.*
Belladonna *ib.*
capensis 538
chilensis 539
ciliaris 540
cinnamomea *ib.*
clavata 539
disticha 540
formosissima 539
longifolia *ib.*
lutea 538
maculata 539
orientalis *ib.*
pumilio *ib.*
radiata 540
reginæ 539
reticulata *ib.*
revoluta *ib.*
samiensis 540
tartarica *ib.*
tubiflora 539
tubispatha 538
undulata 540
vittata 539

AMASONIA 894, 965
erecta 965

Ambrosia 291, 374, 375
artemisifolia 374
elatior *ib.*
maritima *ib.*

Ambrosia
simplicifolia 375
trifida 374

Ambrosinia 782, 866
Bassii 866

Ambulia 887, 945
monosperma 945

Amellus 1165, 1254 *sq.*
carolinianus 1255
lychnitis 1254
umbellatus 1255

Amerimnum 1076, 1087
Brownei 1087
Ebenus *ib.*

Amethystea 20, 43
cærulea 43

Ammannia 215, 264, 265
baccifera 264
debilis *ib.*
latifolia *ib.*
octandra *ib.*
pinnatifida 265
ramosior 264
sanguinolenta *ib.*

Ammi 308, 474, 475
copticum 475
daucifolium *ib.*
glaucifolium *ib.*
majus 474

Amomum 1, 5-7
angustifolium 6
Cardamomum 5
Curcuma *ib.*
Globba 6
Grana Paradisi 5
Kœnigei 6
Leonurus *ib.*
littorale *ib.*

Amomum
medium 7
minus *ib.*
Mioga 6
montanum *ib.*
repens *ib.*
scyphiferum *ib.*
silvestre *ib.*
spurium *ib.*
uliginosum *ib.*
Zerumbet 5
Zingiber *ib.*

Amorpha 1075, 1076, 1093
fruticosa 1093

Amsonia 294, 439
ciliata 439
Tabernæmontana *ib.*

Amygdalus 770, 793, 794
communis 793
dulcis 794
incana *ib.*
nana *ib.*
orientalis *ib.*
persica 793
pumila 794

Amyris 600, 614, 615
ambrosiaca 614
Balsamea *ib.*
balsamifera 615
Elemifera 614
gujanense 615
maritima 614
Opobalsamum *ib.*
protium *ib.*
silvatica *ib.*
toxifera 615
zeylanica *ib.*

Anabasis 307, 454
aphylla 454
foliosa *ib.*

Anabaſis
ſpinoſiſſima 454
tamariſcifolia *ib.*
Anacardium 647, 652
occidentale 652
Anacyclus 1163, 1250 *ſq.*
aureus 1251
creticus *ib.*
orientalis 1250
valentinus 1251
Anagallis 292, 332
arvenſis 332
cærulea *ib.*
latifolia *ib.*
linifolia *ib.*
Monelli *ib.*
pumila *ib.*
tenella *ib.*
verticillata *ib.*
Anagyris 655, 665
fœtida 665
Anaſſer 293, 333
Borboniæ 333
Anaſtatica 967, 970
hierichuntica 970
ſyriaca *ib.*
Anavinga 660, 702
exotica 702
Anchuſa 292, 317, 318
amœna 318
anguſtifolia 317
Barrelieri *ib.*
echinocarpos 318
flava *ib.*
hiſpida *ib.*
italica 317
lanata 318
officinalis 317
Anchuſa
paniculata 317
ſaxatilis 318
ſempervirens *ib.*
tinctoria 317
tuberculata 318
undulata 317
virginica *ib.*
ANCISTRUM 21, 50
latebroſum 50
Sanguiſorbæ *ib.*
Andira 1076, 1086
Piſonis 1086
Andrachne 312, 504
fruticoſa 504
telephioides *ib.*
Andromeda 659, 695, 696
anaſtomoſans 696
arborea *ib.*
cærulea 695
caliculata 696
Catesbæi 695
cerea *ib.*
faſciculata *ib.*
ferruginea *ib.*
ferruginoſa *ib.*
hypnoides *ib.*
jamaicenſis *ib.*
japonica 696
lucida *ib.*
mariana 695
nitida *ib.*
octandra *ib.*
paniculata 696
polifolia 695
racemoſa 696
reticulata *ib.*
rupeſtris *ib.*
tetragona 695
Andropogon 87, 163-166
aciculatus 165
afer 166
alopecuroides 165
annulatus 164
barbatus *ib.*
bicornis *ib.*
binatus *ib.*
Bladhii *ib.*
brevifolius *ib.*
caricoſus 163
ciliatus 165
contortus 163
cotuliferus 165
crinitus 163
cymbarius 165
diſtachyos 164
divaricatus *ib.*
faſtigiatus 165
glaucus *ib.*
Gryllus *ib.*
hirtus *ib.*
incurvatus 164
inſularis 166
Iſchæmum *ib.*
muricatus 165
muticus 164
Nardus 166
nutans 165
proſtratus 166
provincialis 164
ramoſus *ib.*
ſaccharoides 165
Schœnanthus 164
ſerratus *ib.*
ſerrulatus 165
ſquarroſus *ib.*
undatus 166
virginicus 164
Androſace 292, 325, 326
carnea 326

Androsace
brevifolia 326
elongata 325
filiformis 326
lactea *ib.*
maxima 325
obtusifolia *ib.*
odoratissima *ib.*
pauciflora *ib.*
septentrionalis *ib.*
villosa *ib.*

Andryala 1161, 1181
cheiranthifolia 1181
crithmifolia *ib.*
integrifolia *ib.*
lanata *ib.*
nigricans *ib.*
pinnatifida *ib.*
ragusina *ib.*
uniflora *ib.*

Anemone 782, 870-872
alpina 870
apennina 871
apiifolia 870
baldensis *ib.*
cernua *ib.*
coronaria *ib.*
decapetala 871
dichotoma *ib.*
fasciculata 872
fragifera 871
Halleri 870
Hepatica *ib.*
hortensis *ib.*
narcissiflora 871
nemorosa *ib.*
palmata *ib.*
patens 870
pensilvanica 871
pratensis 870
Pulsatilla *ib.*
quinquefolia 872

Anemone
ranunculoides 871
sibirica *ib.*
sylvestris *ib.*
sulpharea 870
thalictroides 871
trifolia *ib.*
vernalis 870
virginiana *ib.*

Anethum 310, 491
Foeniculum 491
graveolens *ib.*
segetum *ib.*

Angelica 309, 482
Archangelica 482
atro purpurea *ib.*
integrifolia *ib.*
lobata *ib.*
lucida *ib.*
Razulii *ib.*
sylvestris *ib.*
verticillaris *ib.*

Anguillaria 295, 430
bunamensis 430
zeylanica *ib.*

Anguria 21, 70
pedata 70
trifoliata *ib.*
trilobata *ib.*

Annona 782, 868, 869
aegyptiaca 868
africana 869
amara *ib.*
Ambotni *ib.*
Aperamoa *ib.*
asiatica *ib.*
glabra *ib.*
longifolia *ib.*
muricata 868
paludosa 869
palustris *ib.*

Annona
punctata 869
reticulata 868
rufescens 869
sinensis 868
squamosa 869
triloba *ib.*

Anoda 1001, 1040
Dilleniana 1040
hastata *ib.*
triloba *ib.*

Anredera 306, 454
spicata 454

Anthemis 1165, 1251 *sq.*
alpina 1251
altissima *ib.*
americana 1252
arabica *ib.*
arvensis 1251
austriaca 1252
chia 1251
corymbosa *ib.*
Cota 1251
Cotula *ib.*
maritima *ib.*
mixta 1251
nobilis *ib.*
odorata 1252
Pyrethrum 1251
repanda 1252
repens *ib.*
tinctoria *ib.*
tomentosa 1251
trinervia 1252
valentina *ib.*

Anthericum 525, 554-556
Adenanthera 554
alooides *ib.*
annuum 555
aphyllum 556

Anthericum
asphodeloides 554
caliculatum ib.
Cauda felis ib.
ciliatum ib.
cirratum 555
contortum 554
falcatum ib.
filiforme ib.
flexifolium 555
floribundum ib.
frutescens 554
græcum 555
hispidum ib.
japonicum 554
latifolium ib.
Liliago 555
Liliastrum ib.
muricatum ib.
ossifragum 554
planifolium 555
ramosum ib.
revolutum ib.
scabrum ib.
serotinum ib.
spirale 556
squameum 555
subtrigonum 554
triquetrum 555
ANTHISTIRIA 88, 194
ciliata 194
imberbis ib.
Anthoceros 1285, 1355
crispus 1355
lævis ib.
multifidus ib.
punctatus ib.
Antholyza 82, 112, 113
æthiopica 113
Antholyza
Cunonia 112
Lucidor 113
Meriana ib.
Merianella ib.
plicata 112
ringens ib.
Anthospermum 219, 285
æthiopicum 285
ciliare ib.
herbaceum ib.
Anthoxanthum 22, 75, 76
aculeatum 75
avenaceum 76
crinitum ib.
indicum ib.
odoratum 75
paniculatum 76
Anthyllis 1076, 1099, 1100
Barba jovis 1099
cornicina ib.
cytisoides 1100
Erinacea ib.
Gerardi 1099
Hermanniæ 1100
involucrata 1099
linifolia 1100
lotoides 1099
montana ib.
quinqueflora ib.
tetraphylla ib.
visciflora ib.
Vulneraria ib.
Antichorus 599, 609
depressus 609
Antidesma 304, 432
alexiterium 432
Antirhea 212, 244
borbonica 244
Antirrhinum 889, 930-934
ægyptiacum 931
æragineum 933
alpinum ib.
aphyllum ib.
arvense 932
Asarina 934
bellidifolium 933
bicorne 932
bipunctatum ib.
canadense 933
chalepense 931
cirrhosum ib.
Cymbalaria 933
dalmaticum ib.
Elatine 931
flavum 933
genistifolium 931
glaucum 933
Hælava 932
hexandrum ib.
hirtum 931
junceum ib.
lagopodioides 933
Linaria 931
linifolium ib.
macrocarpon 932
majus 934
minus 931
molle 934
monospessulanum 933
multicaule ib.
origanifolium 932
Orontium 934
papilionaceum ib.
pedunculatum 931
pelisserianum ib.
pilosum 930
pinifolium 933
pinnatum 932

Antirrhinum
purpureum 933
reflexum ib.
repens ib.
saxatile 932
spurium 933
supinum ib.
triornithophorum ib.
triphyllum 932
triste ib.
unilabiatum 934
versicolor 932
villosum 933
virgatum ib.
viscidum 932
viscosum ib.
Antura 295, 405
hadiensis 405
APACTIS 740, 747
japonica 747
Apama 1149, 1153
dubia 1153
Aphanes 3, 15
arvensis 15
Swartsii ib.
Aphyllanthes 524, 540
monspeliensis 540
APHYTEJA 995, 1005
Hydnora 1005
Apium 316, 493
bipinnatum 493
graveolens ib.
Petroselinum ib.
Apluda 85, 148
aristata 148
digitata ib.
mutica ib.
scirpoides ib.
Zeagites ib.
Apocynum 306, 442, 443
Acusi 443
androsæmifolium 442
cannabinum 443
filiforme ib.
frutescens ib.
lineare ib.
minutum ib.
reticulatum ib.
sibiricum 442
triflorum 443
umbellatum ib.
venetum ib.
APONOGETON 594, 597
angustifolium 597
distachyon ib.
monostachyon ib.
Aquartia 211, 247
aculeata 247
Aquilaria 660, 685
ovata 685
Aquilegia 779, 850, 851
alpina 851
canadensis ib.
viridiflora ib.
viscosa 850
vulgaris ib.
AQUILICIA 301, 421
sambucina 421
Arabis 968, 987
alpina 987
bellidifolia ib.
cærulea ib.
canadensis ib.
grandiflora ib.
Halleri ib.
hispida ib.
lucida ib.
lyrata ib.
Arabis
ovirensis 987
pendula ib.
thaliana ib.
turrita ib.
Arachis 1075, 1076, 1100
aprica 1100
hypogæa ib.
Aralia 312, 509, 510
arborea 509
capitata ib.
cordata 510
japonica ib.
nudicaulis ib.
pentaphylla 509
racemosa 510
Sciodaphyllum 509
sinensis 510
spinosa 509
Arbutus 659, 697
acadiensis 697
alpina ib.
Andrachne ib.
ferruginea ib.
laurifolia ib.
mucronata ib.
pumila ib.
Unedo ib.
Uva ursi ib.
Arctium 1162, 1184
Carduelis 1184
Lappa ib.
Personata ib.
Arctopus 308, 465
echinatus 465
Arctotis 1166, 1273 sq.
acaulis 1274
angustifolia 1273
anthemoides 1274
argentea 1273

Arctotis
aspera 1273
calendulacea ib.
caroliniana 1274
dentata ib.
grandiflora 1273
microphylla ib.
paleacea 1274
paradoxa ib.
plantaginea 1273
scariosa 1274
serrata 1273
tenuifolia ib.
Ardisia 295,394,395
coriacea 395
excelsa ib.
lateriflora ib.
parasitica ib.
serrulata ib.
tinifolia 394
ARDUINA 295,403
bispinosa 403
Areca 647,649
Catechu 649
oleracea ib.
Arenaria 661,719-721
austriaca 721
balearica 719
bavarica 721
biflora 719
calicina 720
capillacea 721
caroliniana ib.
cerastioides 719
ciliata ib.
cucubaloides 720
dianthoides ib.
dichotoma 719
fasciculata 721
filifolia ib.

Arenaria
geniculata 720
grandiflora 721
gypsophiloides 720
Halleri 719
hispida 721
juniperina ib.
lanceolata 719
laricifolia 721
lateriflora 719
liniflora 721
marina 720
media ib.
montana ib.
multicaulis 719
norwegica ib.
obtusa 720
peploides 719
polygonoides 720
recurva 721
rubra ib.
saxatilis 720
serpyllifolia 719
striata 720
tenuifolia 721
tetraquetra 719
triflora 720
trinervia 719
verna 720
Arethusa 21,61
biplumata 61
bulbosa ib.
capensis ib.
ciliaris ib.
divaricata ib.
foliosa ib.
ophioglossoides ib.
racemosa ib.
spicata ib.
villosa ib.
Aretia 292,325
alpina 325

Aretia
helvetica 325
Vitaliana ib.
Argemone 776,810
armeniaca 810
mexicana ib.
pyrenaica ib.
Argolasia 524,560
capensis 560
ARGOPHYLLUM 303,418
nitidum 418
Argythamnia 219,286
candicans 286
Aristea 119
cyanea 119
Aristida 86,195,196
ascensionis 195
americana ib.
arundinacea ib.
depressa 196
geniculata 195
gigantea ib.
Hystrix ib.
lanata 196
paniculata ib.
plumosa 195
setacea ib.
Aristolochia 528,590,591
anguicida 590
arborescens ib.
bætica ib.
barbata 591
bilabiata 590
bilobata ib.
bracteata 591
caudata 590
Clematitis 591
erecta 590

Ariſtolochia
grandiflora 591
hirſuta ib.
indica ib.
longa ib.
maurorum 590
maxima ib.
obtuſata 591
odoratiſſima ib.
peltata 590
pentandra ib.
Piſtolochia 591
rotunda ib.
ſempervirens 590
ſerpentaria ib.
Sipho 591
trilobata 590
Ariſtotela 741, 751
Macqui 751
Arnebia 292, 320
tinctoria 320
Arnica 1164, 1242 *ſq.*
ciliata 1242
coronopifolia 1243
crocea 1242
Doronicum ib.
Gerbera 1243
glacialis 1242
hirſuta ib.
japonica ib.
maritima 1242
montana ib.
oporina ib.
palmata 1243
piloſelloides 1242
ſcorpioides ib.
Artedia 308, 473
ſquamata 473
Artemiſia 1163, 1209-1212
Abrotanum 1209

Artemiſia
Abſinthium 1211
æthiopica 1210
anethifolia ib.
annua 1212
arboreſcens 1209
argentea 1210
auſtriaca 1211
borealis 1212
cæruleſcens ib.
campeſtris 1210
capillaris 1209
Contra 1210
crithmifolia ib.
Dracunculus 1212
filaginoidea 1211
glacialis ib.
Gmelini 1209
hiſpanica 1210
humilis ib.
Jacquini 1212
japonica ib.
inodora 1211
integrifolia 1212
italica 1210
judaica ib.
laricifolia 1209
Lerchii ib.
littoralis 1212
maderaſpatana ib.
maritima 1211
Meſſerſmidii 1210
minima 1212
nitroſa 1209
paluſtris 1211
pauciflora 1210
pectinata 1212
pontica 1211
rupeſtris ib.
Samtonica ib.
Semſek ib.
ſericea ib.
ſinenſis 1212
ſpicata 1211

Artemiſia
tanacetifolia 1212
tartarica 1210
tenella 1211
vermiculata 1209
vulgaris 1211
ARTOCARPUS 2, 14
inciſa 14
integrifolia ib.
Aruba 311, 504
gujanenſis 504
Arum 781, 764-866
arboreſcens 865
Ariſarum ib.
atro-rubens 864
auritum 866
bicolor 864
cannæfolium 865
Colocaſia 864
divaricatum 865
Dracontium 864
Dracunculus ib.
eſculentum ib.
flavum ib.
hederaceum 865
helleborifolium 864
lingulatum 866
macrorhizon 864
maculatum 865
muſcivorum ib.
ovatum ib.
pentaphyllum 864
peregrinum 865
pictum ib.
proboſcideum ib.
ſagittæfolium ib.
ſeguinum ib.
ſpirale ib.
tenuifolium ib.
ternatum 864
trilobatum 865
triphyllum 864

Arum
venosum 864
virginicum 865

Aruna 21, 50
gujanensis 50

Arundo 88, 194, 195
bifaria 195
Donax 194
gigantea ib.
mauritanica 195
phragmites ib.
Quila ib.
Rugi ib.
tecta ib.
Valdivia ib.

Asarum 740, 745
canadense 745
carolinianum ib.
europæum ib.
virginicum ib.

Ascarina 2, 12
polystachya 12

Ascium 775, 817
gujanense 817

Asclepias 306, 444-447.
acanthocarpos 446
alexicaca 445
amœna ib.
aphylla 447
arborescens 445
asthmatica 444
carnosa 446
cinerea ib.
citrifolia 445
cordata 444
crispa 445
curassavica 444
Dæmia ib.
decumbens ib.
filiformis 446
fruticosa 445

Asclepias
gigantea 445
glabra 444
gonocarpos 446
grandiflora ib.
humistrata ib.
incarnata 444
lactifera 445
lanceolata 446
laniflora 445
nigra 444
nivalis ib.
nivea ib.
parviflora ib.
pedicellata 447
perennis 446
polystachyos ib.
pubescens 445
purpurascens ib.
radians ib.
repanda ib.
rubra 446
setosa ib.
sibirica ib.
spiralis 445
stipitacea 447
syriaca 445
tuberosa 446
undulata 445
variegata 444
verticillata 446
viminalis 444
Vincetoxicum 445
viridis 447
volubilis 444

Ascobolus 1461
pezizoides ib.

Ascophora 1287, 1464
articulata 1484
cylindrica ib.
disciflora ib.
fragilis ib.

Ascophora
umbiliflora 1484
Mucedo ib.
ovalis ib.
Stilbum ib.

Ascyrum 1150, 1160
Crux Andreæ 1160
Hypericoides ib.
villosum ib.

Aspalathus 1076, 1091-1093
albescens 1092
anthylloides 1093
araneosa 1092
argentea 1093
asparagoides ib.
astroites 1092
callosa 1093
candicans ib.
canescens 1092
capitata 1091
carnosa 1092
chenopoda ib.
ciliaris ib.
cretica 1093
ericifolia 1091
galioides ib.
genistoides 1092
glomerata 1091
heterophylla 1092
Hystrix ib.
indica 1093
laxata ib.
mucronata ib.
nigra 1091
orientalis 1093
pedunculata 1092
pilosa 1093
pinnata 1092
quinquefolia ib.
retroflexa ib.
sericea ib.

Aspalathus
spinosa 1091
thymifolia 1092
tridentata 1093
uniflora 1091
verrucosa 1092

Asparagus 525, 557
acutifolius 557
æthiopicus ib.
albus ib.
aphyllus ib.
asiaticus ib.
capensis ib.
declinatus ib.
falcatus ib.
horridus ib.
officinalis ib.
retrofractus ib.
sarmentosus ib.
stipularis ib.
verticillaris ib.

Asperugo 292, 321
ægyptiaca 321
procumbens ib.

Asperula 214, 235
aristata 235
arvensis ib.
calabrica ib.
cynanchica ib.
hexaphylla ib.
lævigata ib.
odorata ib.
pyrenaica ib.
taurina ib.
tinctoria ib.

Asphodelus 525, 553
altaicus 553
fistulosus ib.
liburnicus ib.
luteus ib.
ramosus ib.

Asplenium 1283, 1301-1304
Adiantum nigrum 1304
alternifolium 1302
angustifolium 1301
anterifcifolium 1303
bifolium 1302
bulbiferum 1304
caudatum 1303
Ceterach 1301
cicutarium 1304
cultrifolium 1302
dentatum ib.
dimidiatum 1303
dissectum 1302
ebeneum ib.
erosum ib.
flaccidum 1303
fragrans 1304
germanicum ib.
grandifolium 1302
Hemionitis 1301
japonicum 1303
canceolatum ib.
lanceum 1301
leptophyllum 1304
lucidum 1303
marginatum 1302
marinum 1303
monanthemum 1302
Nidus 1301
nodosum 1302
obliquum 1303
obtusatum ib.
obtusifolium 1302
plantagineum 1301
poliodon 1302
præmorsum ib.
proliferum 1301
pumilum 1302
pygmæum 1303
rhizophorum ib.
rhizophyllum 1301
Ruta muraria 1304
Asplenium salicifolium 1302
Scolopendrium 1301
serratum ib.
sorbifolium 1303
squamosum ib.
striatum ib.
tenerum ib.
Trichomanes ramosum 1304
trichomanoides 1303
viride 1302

Assa 778, 839
exotica 839

Assonia 999, 1036
populnea 1036

Aster 1164, 1230-1234
acris 1231
æstivus 1232
alpinus ib.
Amellus 1232
annuus 1233
carolinianus 1230
ciliatus 1231
concolor 1232
cordifolius 1233
coriaceus 1232
corymbosus 1233
crinitus 1230
crispus 1234
Cymbalariæ 1230
diffusus 1234
divaricatus 1233
divergens 1234
dumosus 1231
ericæfolius 1234
ericoides 1231
foliolosus ib.
fruticulosus 1230
grandiflorus 1232

Aſter
hiſpidus 1234
holoſericeus ib.
hyſſopifolius 1231
indicus 1233
junceus ib.
lævis ib.
linariæfolius 1231
linifolius ib.
macrophyllus 1234
miſer 1233
multiflorus 1231
mutabilis 1234
nemoralis 1231
novæ Angliæ ib.
novi Belgii 1233
paludoſus 1232
paniculatus 1233
patens ib.
pendulus 1234
puniceus 1233
Radula 1234
reflexus 1230
rigidus 1231
ſalicifolius ib.
ſalicinus 1234
ſcaber 1233
ſibiricus 1232
ſinenſis 1234
ſpectabilis ib.
ſquarroſus 1232
tardiflorus 1234
tataricus ib.
taxifolius 1230
tenellus 1232
tenuifolius 1231
Tradeſcanti 1233
Tripolium 1232
umbellatus 1231
undulatus 1232
vernus ib.
Aſtragalus 1075, 1077, 1132-1137
alopecuroides 1132
alpinus 1134
alyſſoides 1136
Ammodytes 1135
ampullatus 1136
annularis 1133
arenarius ib.
aſper 1132
auſtriacus 1135
bæticus 1134
barbatus ib.
bicolor 1136
bohemicus 1132
campeſtris 1137
canadenſis 1133
capitatus ib.
caprinus 1136
carolinianus 1132
chriſtianus 1133
Cicer 1134
compactus 1135
contortuplicatus 1134
cornutus 1135
danicus 1134
daſyanthus 1137
deflexus 1133
denſifolius 1136
depreſſus 1137
Epiglottis 1134
emarginatus 1135
exſcapus 1136
falcatus 1133
galegiformis ib.
Glaux 1134
globoſus 1136
glycyphyllos 1135
hamoſus 1134
hians 1133
hirſutus 1136
hyſpidus 1134
Hypoglottis ib.
incanus 1137
lagopodioides 1135
laguroides 1137

Aſtragalus
lanatus 1137
latifolius ib.
Laxmanni 1134
leontinus 1135
leptophyllos 1137
lineatus 1135
lupulinus 1137
melilotoides 1132
microphyllus 1133
monſpeſſulanus 1137
montanus 1136
numularius ib.
Onobrychis 1133
pentaglottis 1134
peregrinus 1133
phyſodes 1137
piloſus 1132
Poterium 1135
pſoraloides 1136
Rauwolfii 1135
ſeſameus 1134
ſinenſis 1133
ſinicus 1135
ſpicatus 1137
Stella 1134
ſulcatus 1133
ſyriacus 1134
Tragacantha 1135
tragacanthoides ib.
trimeſtris ib.
uliginoſus 1133
uncatus 1136
uralenſis ib.
verticillaris ib.
veſicarius ib.
vireſcens 1132

Aſtrantia 388, 469
carniolica 469
Epipactis ib.
major ib.
minor ib.

Astronium 311, 499
graveolens 499

Athamanta 309, 476, 477
annua 477
Cervaria 476
condensata ib.
cretensis 477
daucoides ib.
Libanotis 476
Matthioli 477
Oreoselinum 476
sibirica ib.
sicula ib.
sinensis 477

Athanasia 1163, 1206 *sqq.*
annua 1206
capitata ib.
cinerea 1207
crenata 1206
crithmifolia ib.
decussata 1208
dentata 1207
filiformis ib.
genistifolia ib.
graminifolia 1206
hastata ib.
laxa 1207
linifolia ib.
maritima 1206
microphylla 1207
obovata 1206
paniculata ib.
parviflora 1207
passerinoides ib.
pectinata 1207
pinnata ib.
pubescens 1206
pumila 1207
pungens 1208
santolinoides ib.

Athanasia
serrata 1207
sessiliflora ib.
squarrosa 1207
trifurcata 1206
trinervia ib.
uniflora 1208
virgata ib.
viscosa 1207

Athenaea 601, 629
gujanensis 629

Atractobolus 1285, 1461
annularis 1461

Atractylis 1162, 1191, 1192
cancellata 1192
gummifera ib.
humilis ib.
Lancea ib.
mexicana ib.
oppositifolia ib.
ovata 1191
purpurea 1192

Atragene 782, 872
alpina 872
capensis ib.
japonica ib.
polygama ib.
tenuifolia ib.
zeylanica ib.

Atraphaxis 526, 580
spinosa 580
undulata ib.

Atriplex 306, 450, 451
alba 451
albicans 450
coriacea ib.

Atriplex
glauca 450
Halimus ib.
hastata ib.
hortensis 451
laciniata 450
littoralis 451
patula ib.
pedunculata ib.
portulacoides 450
rosea ib.
salicina 451
sibirica 450
tatarica ib.
virgata 451

Atropa 296, 380, 381
arborescens 381
Belladonna ib.
frutescens ib.
Mandragora 380
physaloides 381
solanacea ib.

Aubletia 776, 812
aspera 812
laevis ib.
Paturno ib.
Tiburua ib.

AUCUBA 216, 276
japonica 276

Avena 88, 192-194
aurata 193
brevis 192
bromoides 194
calicina 193
capensis ib.
caroliniana 194
distichophylla 193
dubia 192
fatua 193
flavescens ib.
fragilis ib.

Avena
hispida 193
Loeflingiana 192
lupulina 193
lutea 192
montana ib.
nuda 193
pensilvanica 192
pratensis 193
pubescens 192
purpurea ib.
rupestris 194
sativa 192
Scheuchzeri 193
sempervirens ib.
sesquitertia 192
setacea 193
sibirica 192
spicata 194
sterilis 193
stipiformis 192
strigosa ib.
versicolor 194
Averrhoa 663, 729
Bilimbi 729
Carambola ib.
Avicennia 888, 963
nitida 963
resinifera ib.
tomentosa ib.
Axyris 86, 151
amarantoides 151
ceratoides ib.
hybrida ib.
prostrata ib.
Ayenia 416
lævigata ib.
magna ib.
pusilla ib.
tomentosa ib.
Azalea 294, 336
indica 336
Azalea
lapponica 336
nudiflora ib.
pontica ib.
procumbens ib.
rosmarinifolia ib.
viscosa ib.
Azima 215, 262
nova 262
Baccharis 1163, 1219 *sq.*
arborea 1220
brasiliana ib.
Dioscoridis ib.
fœtida 1219
halimifolia 1220
indica ib.
ivæfolia 1219
neriifolia 1220
viscosa ib.
Bacopa 293, 329
aquatica 329
Bæa 38
indica 38
Bæckea 598, 635
frutescens 635
Bæobotrys 298, 370
nemoralis 370
Baillieria 1166, 1271
aspera 1271
Balanophora 2, 13
fungosa 13
Ballota 885, 908
alba 908
disticha ib.
lanata ib.
nigra ib.
suaveolens ib.
BALTIMORA 1166, 1259
recta 1269
Bambus 526, 579
Arundo 579
Banara 741, 747
gujanensis 747
Banisteria 662, 724, 725
angulata 724
benghalensis ib.
brachiata ib.
dichotoma ib.
fulgens ib.
laurifolia ib.
longifolia 725
purpurea 724
Quapara ib.
sinimariensis ib.
BANKSIA 215, 262
dactyloides 262
dentata ib.
ericæfolia ib.
integrifolia ib.
musculiformis ib.
pyriformis ib.
serrata ib.
Barbylus 600, 610
Brownii 610
Barnadesia 1162, 1192
spinosa 1192
Barreliera 959, 960
acanthoides 959
bispinosa 960
buxifolia 959
coccinea 960
cristata ib.
hirsuta ib.
Hystrix 959
longiflora 960

Barreliera
longifolia 959
nitida 960
noctiflora ib.
Prionitis 959
pungens 960
solanifolia 959
trispinosa 960
BARRINGTONIA 1000, 1039
speciosa 1039
Bartsia 887, 922
alpina 922
coccinea ib.
Gymnandra ib.
pallida ib.
viscosa ib.
Basella 311, 507
alba 507
japonica ib.
lucida ib.
rubra ib.
BASSIA 740, 746
longifolia 746
obovata ib.
Bassovia 296, 390
silvatica 390
Bastera 1165, 1271
Houttuyni 1271
BATIS 217, 272
maritima 272
Batschia 292, 315
caroliniensis 315
Bauhinia 655, 666, 667
aculeata 666
acuminata ib.
candida ib.
divaricata ib.
glabra ib.
inermis 667
Bauhinia
porrecta 666
purpurea ib.
scandens ib.
tomentosa ib.
ungulata ib.
variegata ib.
BEFARIA 743, 748
æstuans 748
resinosa ib.
Begonia 778, 835, 836
acutifolia 835
capensis 836
dichotoma 835
Erminea 836
ferruginea 835
glabra ib.
grandifolia ib.
hirsuta 836
humilis 835
malabarica ib.
minor ib.
nana 836
obliqua 835
octopetala 836
urticæ 835
Bellis 1164, 1245
annua 1245
arabica ib.
perennis ib.
BELLIUM 1164, 1245
bellidioides 1245
minutum ib.
Bellonia 297, 360
aspera 360
spinosa ib.
Berberis 523, 575
cretica 575
ilicifolia ib.
Berberis
sibirica 575
vulgaris ib.
BERGIA 662, 733
capensis 733
glomerata ib.
Bertiera 298, 362
gujanensis 362
Besleria 890, 935, 936
bivalvis 935
coccinea 936
cristata 935
incarnata 936
lutea 935
melittifolia ib.
violacea ib.
Beta 306, 451, 452
Cicla 452
maritima ib.
patula 451
vulgaris ib.
Betonica 885, 906
alopecuros 906
heraclea ib.
hirsuta ib.
incana ib.
officinalis ib.
orientalis ib.
stricta ib.
Betula 218, 282, 283
alba 282
Alnus ib.
crispa ib.
daurica 283
excelsa ib.
fruticosa ib.
incana 282
lenta 283
nana ib.
nigra ib.
oblongata 282

Betula
papyracea 283
pendula 282
populifolia ib.
pumila ib.
ferrulata ib.
Bidens 1163, 1194, 1195
bipinnata 1195
bulbata 1194
cernua ib.
frondofa ib.
hirfuta ib.
minima ib.
nivea ib.
nodiflora ib.
pilofa ib.
fcandens ib.
tenella ib.
tripartita ib.
verticillata ib.
Bignonia 889, 940-942
æquinoctialis 941
alba ib.
alliacea ib.
cærulea 942
capreolata 941
Catalpa 940
chelonoides 942
citrifolia 940
Copaja 942
crucigera 941
dichotoma ib.
echinata ib.
fluviatilis ib.
grandiflora 942
incarnata 941
indica 942
Kefera 941
Leucoxylon 942
longiffima 941
paniculata ib.
Bignonia
pentaphylla 942
peruviana ib.
pubefcens 941
radiata 942
radicans ib.
fempervirens 940
fpathacea 942
ftans ib.
tomentofa 940
triphylla 941
Unguis ib.
Binectaria 599, 615
peregrina 615
Bifcutella 967, 978
apetala 978
apula ib.
auriculata ib.
coronopifolia ib.
lævigata ib.
lyrata ib.
fempervirens ib.
Biferrula 1075, 1077, 1137
Pelecinus 1137
Bixa 774, 812
Orellana 812
Blackburnia 215, 258
pinnata 258
Blackea 741, 748
trinervia 748
triplinervia ib.
Blackwellia 743, 768
Juffiei 768
Bladhia 295, 404
crifpa 404
japonica ib.
villofa ib.
Blæria 212, 249, 250
articulata 249
Blæria
ciliaris 249
ericoides ib.
mufcofa 250
purpurea 249
pufilla ib.
Blafia 1285, 1354
pufilla 1354
Blechnum 1283, 1300
auftrale 1300
japonicum ib.
occidentale ib.
orientale ib.
radicans ib.
virginicum ib.
Blitum 3, 17
capitatum 17
chenopodioides ib.
virgatum ib.
Bobartia 86, 151
indica 151
Bocconia 740, 745
frutefcens 745
Boehmeria 217, 267
caudata 267
cylindrica ib.
hirta ib.
littoralis ib.
ramiflora ib.
Boerhaavia 2, 14, 15
anguftifolia 15
diffufa ib.
erecta 14
hirfuta 15
repens ib.
fcandens ib.
tetrandra ib.
Boletus 1285, 1432-1438
abietinus 1437

Boletus
adustus 1437
agaricoides 1435
aurantiacus 1433
Batschii 1435
betulinus 1436
biennis 1433
bovinus 1432
Bulliardi 1434
Calceolus 1436
carolinianus 1434
cereus 1433
cinnabarinus 1436
cinnamomeus 1433
citrinus 1435
cornutus 1437
cristatus 1435
decipiens 1437
dimidiatus 1432
elegans 1435
exasperatus 1433
fagineus 1435
fasciatus ib.
fasciculatus 1433
Favus 1436
ferruginatus 1432
ferruginosus 1437
fomentarius 1436
fragilis 1434
fraxineus 1436
frondosus 1433
fulvus 1437
fuscidulus 1433
fuscus 1437
globatus ib.
granulatus 1432
hepaticus 1438
hirsutulus 1437
hirsutus 1434
hispidus 1437
hydnoides 1435
hypocrateriformis 1434
igniarius 1436

Boletus
imbricatus 1437
infundibuliformis 1434
lacrymans 1435
lacteus 1433
lapidum 1434
leptocephalus 1432
lipsiensis 1436
lobatus 1435
lucidus 1434
luteus 1432
Medulla panis 1438
membranaceus 1436
microporus 1435
mutabilis 1432
nigrescens 1434
nitens 1436
numularius 1432
obliquatus 1435
obliquus 1438
odoratus 1437
pallescens 1433
papyraceus 1438
perennis 1432
procerus 1434
purgans 1436
pusillus 1433
ramosissimus ib.
ramosus 1436
ramulorum 1435
resupinatus 1437
rufus 1435
salicinus 1437
salignus 1436
sanguineus ib.
scaber 1435
scalaris 1437
sebaceus 1438
squamosus 1434
strobiliformis 1433
suaveolens 1437
suberosus 1436
subtomentosus 1434

Boletus
subvescus 1434
sulphureus 1436
supinus 1433
tuberculosus 1435
tuberosus 1433
umbilicatus 1434
versicolor 1437
villosus 1436
viscidus 1432

Boltonia 1164, 1244
asteroides 1244
glastifolia ib.

Bombax 1000, 1039, 1040
Ceiba 1040
Erianthos 1039
globiferum 1040
globosum ib.
Gossypium ib.
grandiflorum ib.
heptaphyllum ib.
pentandrum 1039
pyramidale 1040

Bonnetia 775, 814
palustris 814

Bontia 890, 963
daphnoides 963

Borago 291, 321
africana 321
indica ib.
longifolia ib.
officinalis ib.
orientalis ib.
verrucosa ib.
zeylanica ib.

Borassus 527, 583
flabelliformis 583

Borbonia 1076, 1088
cordata 1088
crenata ib.
ericifolia ib.
lævigata ib.
lanceolata ib.
trinervia ib.
Bosea 305, 455
Yervemora 455
Brabejum 212, 248
stellatifolium 248
Brasenia 780, 853
Schreberi 853
Brasilium 301, 417
glabrum 417
hirsutum ib.
Brassica 968, 988, 989
alpina 988
arvensis ib.
austriaca ib.
campestris ib.
crassifolia ib.
Eruca 989
Erucastrum ib.
muralis 988
Napus ib.
oleracea ib.
orientalis ib.
polymorpha ib.
Rapa ib.
sinensis ib.
vesicaria 989
violacea 988
BRATHYS 780, 852
juniperina 852
Breynia 304, 430
disticha 430
Briza 88, 183
caroliniana 183
cynosuroides ib.
Eragrostis ib.
Briza 183
maxima ib.
media ib.
minor ib.
virens ib.
Bromelia 522, 529
Acanga 529
Ananas ib.
bracteolata ib.
humilis ib.
Karates ib.
lingulata ib.
nudicaulis ib.
paniculata ib.
Pinguin ib.
Bromus 88, 188-191
alopecuros 189
ambiguus ib.
angustifolius ib.
aquaticus ib.
arvensis ib.
asper ib.
bifidus 188
ciliatus 189
cristatus 191
dilatatus 189
distachyos 191
erectus 189
geniculatus ib.
giganteus 190
gracilis ib.
grandiflorus 189
hirsutus 190
japonicus 188
incrassatus 189
jubatus 190
madritensis 188
massiliensis 191
mollis 189
montanus 190
multiflorus 188
pauper 191
phleoides 190
Bromus
Phœnix 190
pinnatus ib.
Pluckenetii 191
poiformis 190
polystachyos 188
purgans 189
racemosus 190
ramosus ib.
rigens ib.
rubens ib.
scoparius ib.
secalinus 188
silvaticus 190
squarrosus 189
sterilis 188
stipoides 189
strictus 188
tectorum 190
triflorus 188
triticeus 191
villosus 190
Brosimum 2, 12
Alicastrum 12
spurium ib.
Brossæa 294, 377
coccinea 377
Browallia 888, 952
alienata 952
demissa ib.
elata ib.
humifusa ib.
Brownea 998, 1028
coccinea 1028
grandiceps ib.
Brucea 220, 286
antidysenterica 286
Brünnichia 661, 722
cirrhosa 722
Brunnia 302, 410
abrotanoides 410
ciliata ib.

Brunnia
glutinoſa 410
lanuginoſa ib.
nodiflora ib.
paleacea ib.
radiata ib.
verticillata ib.

Brunsfelſia 887, 929
americana 929
undulata ib.

Bryonia 81, 103, 104
africana 104
alba ib.
cordifolia ib.
cretica ib.
dioica ib.
grandis ib.
japonica ib.
lacinioſa ib.
latebroſa ib.
palmata ib.
racemoſa ib.
ſcabra ib.
ſcabrella ib.
verrucoſa ib.

Bryum 1284, 1330-1338
acuminatum 1333
æſtivum 1336
affine 1335
agrarium 1333
albidum 1336
alpinum 1337
androgynum 1336
anguſtatum 1332
apocarpum 1334
aquaticum 1331
argenteum 1337
barbatum 1336
Bartramia 1335
baſiflorum 1332
bipartitum 1337
brevifolium 1338

Bryum
calcarium 1337
calicinum 1336
capillaceum 1331
carneum 1337
Celſii ib.
ciliare 1332
ciliatum 1331
cirrhatum ib.
convolutum 1336
cricetorum 1338
criſpum 1335
cubitale 1338
curviroſtrum 1334
cuſpidatum 1332
dealbatum 1338
dendroides 1337
diaphanum 1335
Dickſoni 1334
Didymodon 1333
elongatum 1335
ericoides 1332
exſtinctorium ib.
faſciculare ib.
flaveſcens 1338
flexuoſum 1336
fontinalioides 1333
Heimii ib.
hercynicum 1336
hypnoides 1332
imberbe 1336
inclinatum 1331
indicum 1332
lanceolatum ib.
lycopodioides 1336
marginatum 1338
microcarpon 1332
minutum 1335
mnioides 1330
murale 1333
nutans 1331
obtuſum 1334
Octoblepharis 1331
ovatum 1334

Bryum
pallidum 1332
paludoſum 1337
paraſiticum 1336
patens 1338
pennatum 1334
piloſum 1336
pomiforme 1330
pulvinatum 1331
puſillum 1333
pyriforme ib.
recurviroſtrum 1334
repens 1333
reticulatum 1337
rigidum 1336
rubrum 1331
rurale 1335
ſecundum 1333
ſeſſile 1334
ſetaceum ib.
ſilvaticum ib.
ſplachnoides 1337
ſquarroſum ib.
ſtelligerum 1334
ſtriatum 1335
ſubulatum 1333
tectorum 1335
tetragonum 1338
tortum 1332
tortuoſum 1333
trifarium 1331
truncatulum 1334
unguiculatum 1336
unilaterale 1335
ventricoſum 1337
verticillatum ib.
viridulum 1334
Zierii 1337

Bubon 309, 484
Galbanum 484
gummiferum ib.
lævigatum 484
macedonicum ib.

Bubon
rigidius 484
Buchnera 889, 951 952
æthiopica 952
americana 951
asiatica 952
capensis ib.
cernua 951
coccinea 952
cordifolia ib.
cuneifolia 951
elongata 952
grandiflora ib.
pinnatifida ib.
BUCIDA 660, 702
Buceras 702
Buddleja 212, 250
americana 250
capitata ib.
globosa ib.
incompta ib.
occidentalis ib.
virgata ib.
Buffonia 218, 281
tenuifolia 281
Buginvillea 602, 632
brasiliensis 632
Büttneria 301, 404
carthagenensis 404
cordata ib.
microphylla ib.
ovata ib.
scabra ib.
Bulbocodium 524
vernum ib.
BUMALDA 306, 463
trifolia 463
Bumelia 295, 397, 398
montana 397
nigra ib.
pallida ib.
pentagona 398
retusa 397
rotundifolia 398
salicifolia ib.
Bunara
gujanensis
Bunias 968, 991
ægyptiaca 991
aspera ib.
balearica ib.
Cakile ib.
cochlearioides ib.
cornuta ib.
Erucago ib.
myagroides ib.
orientalis ib.
spinosa ib.
Bunium 309, 475
aromaticum 475
Bulbocastanum ib.
Buphthalmum 1165, 1257 *sq.*
aquaticum 1257
arborescens ib.
durum ib.
frutescens ib.
grandiflorum 1258
graveolens 1257
helianthoides 1258
maritimum 1257
melitense ib.
pratense ib.
ramosum ib.
salicifolium 1258
sericeum 1257
speciosissimum 1258
spinosum 1257
Bupleurum 309, 469-471
angulosum 469
arborescens 471
baldense 470
difforme 471
falcatum 470
flavum ib.
fruticescens ib.
fruticosum ib.
Gerardi ib.
junceum ib.
longifolium ib.
nudum ib.
odontites 469
petræum 470
pyrenæum ib.
ranunculoides 469
rigidum 470
rotundifolium 469
semicompositum 470
spinosum ib.
stellatum 469
tenuissimum 470
Burcarda 313, 514
villosa 514
Burmannia 522, 531
biflora 531
disticha ib.
Bursera 522, 575
gummifera 575
Butomus 645, 654
umbellatus 654
Buxbaumia 1284, 1325
aphylla 1325
foliosa ib.
Buxus 219, 286
arctica 286
sempervirens ib.

Bissus 1283, 1395-1397
alutosa 1396
aquatica ib.
atra ib.
aurea ib.
barbata ib.
bombycina ib.
cancellata ib.
candida ib.
conoidea ib.
coriacea ib.
cryptarum ib.
Flos aquæ ib.
Flos cobalti 1397
fulva 1396
globosa ib.
nigra ib.
petræa ib.
phosphorea ib.
rudiciformis ib.
sanguinea ib.
septica 1395
tremelloides 1397
velutina 1396

Cacalia 1162, 1195-1197
acaulis 1197
albifrons ib.
alpina ib.
Anteuphorbium 1195
appendiculata 1196
asclepiadea ib.
atriplicifolia ib.
bipinnata 1197
carnosa 1195
cordifolia 1196
cuneifolia 1195
echinata 1196
Ficoides 1195
hastata 1196
incana ib.
Kleinia 1195
laciniata ib.
laurifolia ib.
odora ib.
ovata 1197
papillaris 1195
pendula ib.
Porophyllum 1196
radicans ib.
repens 1195
saracenica 1196
scandens ib.
sempervira 1195
sonchifolia 1196
suaveolens ib.
suffruticosa ib.
tomentosa ib.
villosa ib.

Cachrys 309, 478
Libanotis 478
odontalgica ib.
panacifolia ib.
sicula ib.

Cactus 770, 784, 785
alatus 785
cochenillifer ib.
coquimbanus 784
curassavicus 785
Ficus indica ib.
flagelliformis ib.
grandiflorus ib.
heptaginus 784
hexagonus ib.
lanuginosus ib.
mammillaris ib.
Melocactus ib.
moniliformis 785
nobilis 784
Opuntia 785
parasiticus ib.
pendulus ib.
pentagonus 784
Pereskia 785
peruvianus 784
Phyllanthus 785
Pitajaya 784
portulacifolius 785
repandus 784
Royeni ib.
spinosissimus 785
tetragonus 784
triangularis 785
Tuna ib.

Cacucia 656, 693
coccinea 693

Cadaba 300, 405
farinosa 405
glandulosa ib.
rotundifolia ib.

Cadamba 647, 649
jasminiflora 649

Cadia 656, 667
arabica 667

Cænopteris 1283, 1321 *sq.*
furcata 1321
rhizophylla ib.
rutæfolia ib.
vivipara 1322

Cæsalpinia 655, 672
Crista 672
Sappan ib.
vesicaria ib.

Calamagrostis 86, 171, 172
arenaria 172
arundinacea ib.
Arundo 171
bicolor 172
canescens ib.
conspicua ib.

Calamagrostis
epigeios 172
farcta ib.
Karka ib.
lanceolata ib.
Plinii ib.
villosa 171
Calamus 526, 570
Rotang 570
Calceolaria 20, 39
Fothergillii 39
integrifolia ib.
nana ib.
perfoliata ib.
pinnata ib.
plantaginea ib.
Calea 1163, 1205
Amellus 1205
aspera ib.
caroliniana ib.
jamaicensis ib.
leptophylla ib.
oppositifolia ib.
pinifolia ib.
scoparia ib.
Calendula 1166, 1271 *sq.*
arborescens 1272
arvensis ib.
fruticosa ib.
graminifolia ib.
hybrida ib.
nudicaulis ib.
officinalis ib.
oppositifolia ib.
pluvialis ib.
pumila ib.
rigida ib.
sancta 1271
tomentosa 1272
Tragus ib.
Calla 781, 863
æthiopica 863
palustris ib.
CALLICARPA 211, 246
americana 246
ferruginea ib.
japonica ib.
integrifolia ib.
reticulata ib.
tomentosa ib.
Callicocca 298, 370, 371
alba 370
glabra 371
gujanensis ib.
purpurea 370
tomentosa ib.
CALLIGONUM 777, 839
polygonoides 839
Callisia 83, 121
repens 121
Callitriche 3, 17
auctumnalis 17
brutia ib.
dubia ib.
verna ib.
Callixene 525, 556
magellanica 525, 556
CALODENDRUM 301, 417
capense 417
Calophyllum 774, 814
Akara 814
Calaba ib.
Inophyllum ib.
Scutatti ib.
Caltha 782, 883
palustris 883
Calycanthus 781, 862
fertilis 862
floridus ib.
præcox ib.
sterilis ib.
Camex 296, 403
gujanensis 403
Cambogia 774, 810
Gutta 810
Camellia 1000, 1069
japonica 1069
Sasangua ib.
Cameraria 294, 438
angustifolia 438
gujanensis ib.
latifolia ib.
Tamaquarina ib.
Campanula 297, 348-353
adpressa 353
alpestris 351
alpina ib.
altiflora 352
americana 349
aurea ib.
barbata 351
Bellardi 348
Bocconis ib.
bononiensis 350
capensis 351
capillacea 349
carpatica ib.
cenisia 348
Cervicaria 350
cespitosa 348
cinerea 350
crispa 352
dichotoma 350

Campanula
edulis 350
Elatines 351
erinoides 352
Erinus ib.
fasciculata 353
fragilis ib.
fruticosa 352
glauca 353
glomerata 350
gracilis 352
graminifolia 350
grandiflora 349
hederacea 351
heterophylla 352
hispidula 350
hybrida 352
interrupta ib.
laciniata 351
latifolia 350
lilifolia 349
limonifolia 351
linearis 349
lobelioides ib.
marginata 353
Medium 350
mollis 351
nitida 352
patula 348
pedunculata 352
pentagonia ib.
peregrina 351
perfoliata ib.
persicifolia 348
petræa 350
porosa 349
procumbens 352
pulla 348
pusilla ib.
pyramidalis 349
rapunculoides 350
Rapunculus 348
rhomboidea 349
rotundifolia 348

Campanula
saxatilis 351
Scheuchzeri 348
sessiliflora 352
sibirica 351
speculum 352
spicata 351
stricta ib.
tenella 349
tetraphylla 353
thyrsoidea 350
Trachelium ib.
tridentata 351
triphylla 353
undulata 349
unidentata ib.
uniflora 348
urticæfolia 350
valdensis 351
verticillata 353
vesula 348
zoysii 349
Camphorosma 217, 280, 281
acutum 281
glabrum ib.
monspeliense 280
paleaceum 281
Pteranthus ib.
Cananga 782, 868
Uregu 868
CANARINA 522, 577
Campanula 577
CANARIUM 300, 405
commune 405
CANELLA 741, 749
alba 749
Canephora 302, 372
madagascariensis 372

Canna 1, 5
angustifolia 5
glauca ib.
indica ib.
juncea ib.
Cannabis 305, 457
sativa 457
Canscora 216, 262
ventricosa 262
Cansiera 216, 280
Rheedii 280
Cantua 294, 347
peruviana 347
Cantuffa 656, 677
exotica 677
Capparis 774, 806, 807
Baducca 806
Breynia 807
Carandas 806
comosa 807
cynophallophora 806
Dahi 807
erythrocarpos 806
Eustachiana 807
exstipulata ib.
ferruginea 806
flexuosa ib.
frondosa ib.
grandis 807
hastata ib.
horrida 806
jamaicensis 807
linearis ib.
longifolia 806
mithridatica 807
nemorosa ib.
oblongifolia ib.
pulcherrima ib.
sepiaria 806
siliquosa ib.
spinosa ib.

Capparis
tenuifolia 807
torulosa 806
verrucosa 807
zeylanica 806
Capraria 889, 947
biflora 947
crustacea ib.
durantifolia ib.
humilis ib.
lanceolata ib.
lucida ib.
undulata ib.
uniflora ib.
Capsicum 296, 387
annuum 387
baccatum ib.
frutescens ib.
grossum ib.
sinense ib.
CAPURA 575
purpurata 575
Caquepiria 647, 651
Bergkia 651
Caraipa 773, 821
angustifolia 821
latifolia ib.
longifolia ib.
parvifolia ib.
Cardamine 968, 979
980
africana 980
amara ib.
asarifolia 979
bellidifolia ib.
chelidonia 980
græca ib.
hirsuta ib.
impatiens ib.
rivalis 979
nudicaulis ib.
parviflora 980

Cardamine
petræa 979
pratensis 980
resed folia ib.
trifolia ib.
virginica ib.
Cardiospermum 603, 642
Corindum 642
grandiflorum ib.
Halicacabum ib.
Carduus 1162, 1186-1189
acanthoides 1186
acaulis 1189
altissimus 1188
arabicus 1186
argentatus 1187
australis ib.
Boujarti 1188
canus 1187
carlinæfolius ib.
carlinoides ib.
carolinianus 1186
Casabonæ 1188
chius 1187
ciliatus 1188
crispus 1186
cyanoides ib.
defloratus 1187
dissectus ib.
eriophorus 1188
flavescens ib.
gnaphalioides 1189
helenioides ib.
heterophyllus ib.
lanceolatus 1186
leucographus ib.
linearis 1188
marianus 1189
mollis 1188
monspessulanus 1187
nutans ib.

Carduus
palustris 1186
paniculatus 1187
pannonicus ib.
parviflorus ib.
pectinatus ib.
peregrinus 1186
polyanthemus ib.
puniceus 1188
pycnocephalus 1186
rigens 1188
rivularis ib.
scaber 1189
serratuloides 1188
spinosissimus 1186
stellatus 1188
syriacus 1189
tataricus ib.
tuberosus 1187
virginianus 1188
Carex 84, 137-147
acuta 144
Agastachys 145
alpina 143
arenaria 139
argentea 143
aspera 141
atrata 146
baldensis 139
bifurca 145
brachystachys 146
brizoides 139
brunnea 140
canescens 141
capillaris 142
capitata 138
caryophyllea 142
cernua 146
cespitosa 142
chordorhiza 139
curvula 140
cyperoides 139
diandra 145

Carex
digitata 141
dioica 138
dissimilis 144
distans 143
disticha 140
echinata ib.
elegans 143
elongata 140
erecta 145
ericetorum 142
ferax 146
ferruginea 143
filiformis 141
flacca 145
Flagellum 138
flava 141
fœtida 140
folliculata 142
frigida 146
fusca ib.
glauca 145
globularis 142
glomerata 141
gracilis 144
gynobasis ib.
Haleonaster 139
Halleri 138
hermaphrodita 139
hirta 144
hirtella 138
hordeostichos 145
humilis 143
japonica ib.
inæqualis 146
indica 140
juncifolia 142
lævis 138
lasiocarpa 145
latifolia 138
leporina 139
leptostachys 143
Lecoglochin 139
limosa 142

Carex
lithosperma 137
lobata 140
loliacea ib.
marcida 146
microstachya 140
miliacea 144
mitis 138
mixta 146
montana 141
muricata 140
mutabilis 143
myosuroides 147
nemorosa 143
nutans 146
oblonga ib.
pallescens 142
palustris 145
panicea 142
paniculata 141
paradoxa 145
patula 144
pedata 141
pendula 143
pilulifera 141
poæformis 138
Poireti 140
polygama 145
præcox 140
prostrata 142
Pseudo-cyperus 146
pulicaris 138
pumila 144
quinata 146
remota 140
rhizantha 144
saxatilis 141
Scheuchzeri 144
sempervirens ib.
silvatica 143
sinensis 144
spadicea ib.
spicata 139
splendida 142

Carex
squarrosa 138
subulata ib.
tenuifolia 142
ternaria 145
tomentosa 141
torfacea 145
triceps 142
tristachya 141
uliginosa 139
uncinata 138
verna 143
vesicaria 144
vulpina 139

Carica 659, 701
Papaya 701
Pelopofa ib.
spinosa ib.

Carissa 295, 433
Carandes 433
edulis ib.
spinarum ib.

Carlina 1162, 1191
acaulis 1191
atractyloides ib.
corymbosa ib.
involucrata ib.
lanata ib.
pyrenaica ib.
racemosa ib.
vulgaris ib.
xeranthemoides ib.

CAROLINEA 1000, 1039
insignis 1039
princeps ib.

CAROXYLON 302, 422
Salsola 422

Carpesium 1163, 1219
abrotanoides 1219
cernuum ib.
Carphalæa 213, 264
madagascariensis 264
Carpinus 742, 754, 755
Betulus 754
caroliniana ib.
orientalis 755
Ostrya 754
virginiana 755
Carpodetus 300, 402
serratus 402
Carthamus 1162, 1192, 1193
arborescens 1192
cæruleus ib.
Carduncellus ib.
carolinianus ib.
corymbosus 1193
creticus ib.
dentatus 1192
lanatus 1193
mitissimus 1192
salicifolius ib.
tinctorius ib.
tingitanus 1193
tomentosus 1192
Carum 310, 491
Carvi 491
Caryocar 779, 839
nuciferum 839
Caryophyllus 770, 822
aromaticus 822
Caryota 773, 805
urens 805
Casearia 660, 700
aculeata 700
Casearia
nitida 700
parviflora ib.
Cassia 655, 667-671
Absus 668
alata 670
angustifolia ib.
Apucuita 668
Ashrek ib.
atomaria 669
auriculata 670
bacillaris 668
bicapsularis ib.
biflora 669
bracteata 670
caroliniana 668
Chamæcrista 671
Crista ib.
diphylla 667
emarginata 668
falcata ib.
Fistula 669
flexuosa 671
frondosa 670
glandulosa 671
grandis 670
hirsuta 669
javanica 670
lanceolata 669
ligustrina 670
lineata 669
longisiliqua 668
marilandica 670
mimosoides 671
multiglandulosa 669
multisiliqua 670
nictitans 671
nigricans 670
obtusifolia 668
occidentalis 669
patula ib.
pilosa ib.
planisiliqua ib.
Cassia
procumbens 671
ruscifolia 669
Senna ib.
sennoides 668
sensitiva 669
sericea 668
serpens 669
sinensis ib.
Sophera 670
stipularia ib.
Sunsub 668
surattensis 670
Tagera 668
tenuissima 670
tomentosa ib.
Tora 668
viminea ib.
virgata 670
Cassine 311, 497
capensis 497
Maurocenia ib.
Peragua ib.
Cassipurea 771, 796
gujanensis 796
Cassytha 647, 653
corniculata 653
filiformis ib.
zeylanica ib.
Castilleja 886, 921
fissifolia 921
integrifolia ib.
Casuarina 2, 13
equisetifolia 13
nodiflora ib.
stricta ib.
torulosa ib.
Catananche 1161, 1183, 1184
cærulea 1183

Catananche
græca 1184
lutea 1183
Catesbæa 213, 243
longiflora 243
parviflora ib.
Catha 301, 411
inermis 411
spinosa ib.
Catinga 770, 788
aromatica 788
moschata ib.
Caturus 89, 202
spiciflorus 202
Caucalis 308, 472, 473
angustifolia 473
Anthriscus ib.
daucoides 472
glabra 473
grandiflora 472
helvetica 473
latifolia 472
leptophylla 473
maritima ib.
mauritanica ib.
nodosa ib.
orientalis ib.
pumila ib.
scandicina ib.
virgata ib.
Caucanthus 651, 726
Forskåhlei 726
Cautschua 996, 1007
elastica 1007
Cavanilla 999, 1037, 1038
acutangula 1037
angulata ib.
decanthera ib.
ferruginea 1038
Cavanilla
ovata 1038
palmata 1037
phœnicea 1038
punctata 1037
tiliæfolia ib.
tomentosa ib.
umbellata ib.
Ceanothus 300, 402, 403
africanus 402
americanus ib.
asiaticus ib.
capsularis 403
reclinatus 402
Cecropia 22, 71
peltata 71
CEDRELA 301, 416
odorata 416
Cedrota 601, 629
guianensis 629
Celastrus 300, 405, 406
acuminatus 406
alatus ib.
bullatus ib.
buxifolius ib.
cassinoides ib.
crenatus ib.
edulis ib.
filiformis ib.
integrifolius ib.
linearis ib.
lucidus ib.
microphyllus ib.
myrtifolius ib.
octogonus ib.
orbiculatus ib.
parviflorus ib.
procumbens ib.
punctatus ib.
pyracanthus ib.
Celastrus
scandens 405
striatus 406
undulatus ib.
Celosia 304, 425, 426
argentea 425
baccata ib.
castrensis ib.
caudata ib.
coccinea ib.
corymbosa ib.
cristata ib.
gnaphaloides ib.
lanata ib.
margaritacea ib.
nodiflora ib.
paniculata ib.
procumbens ib.
pyramidalis 426
trigyna 425
virgata ib.
Celsia 889, 938
Arcturus 938
cretica ib.
linearis ib.
orientalis ib.
Celtis 305, 456
australis 456
Lima ib.
occidentalis ib.
orientalis ib.
Cenchrus 85, 150
capitatus 150
carolinianus ib.
ciliaris ib.
echinatus ib.
frutescens ib.
granularis ib.
lappaceus ib.
muricatus ib.
racemosus ib.
setosus ib.
tribuloides ib.

Centaurea 1165, 1263-1268
acaulis 1265
ægyptiaca 1268
alba 1266
alpina 1263
amara 1266
angustifolia ib.
argentea 1264
aspera 1268
aurea ib.
babylonica 1266
Behen ib.
benedicta 1268
bracteata 1264
Calcitrapa 1268
Calcitrapoides ib.
capillata 1265
Carduncułus 1266
caroliniana 1265
Centaureum 1263
Centauroides 1268
cespitosa ib.
cichoracea 1267
Cineraria 1264
collina 1268
conifera 1266
Crocodilium 1267
Crupina 1264
Cyanus ib.
diluta 1265
eriophora 1268
erucifolia 1264
galactites 1267
glastifolia 1266
humilis ib.
hyssopifolia 1265
Jacea ib.
Isnardi 1267
linifolia 1265
Lippii 1264
maxima ib.
melitensis 1268

Centaurea
montana 1264
moschata 1263
Moschus ib.
mucronata 1264
muricata 1267
napifolia ib.
nigra 1264
nudicaulis 1266
orientalis 1265
paniculata 1264
pectinata 1265
peregrina 1267
phrygia 1265
procumbens 1266
pullata 1264
pumila 1267
radiata ib.
ragusina 1265
repens 1266
Rhapontica ib.
romana 1267
rupestris 1268
salmantica 1267
Scabiosa 1265
sempervirens 1264
seridis 1267
sessilis ib.
sibirica 1265
sicula 1268
solstitialis ib.
sonchifolia 1267
sphærocephala ib.
spinosa 1264
splendens 1266
Stoebe 1264
strobilacea 1265
tatarica ib.
tingitana 1267
uniflora 1265
Venetum 1267

Centunculus 211, 255
minimus 255

Cephaëlis 298, 372
axillaris 372
elata ib.
muscosa ib.
violacea ib.

Cephalanthus 210, 227
occidentalis 227

Ceranthus 19, 26
Schreberi 26

Cerastium 663, 736-738
alpinum 737
aquaticum ib.
arvense ib.
dichotomum ib.
dioicum ib.
illyricum 738
latifolium 737
lineare ib.
manticum ib.
maximum ib.
pentandrum ib.
perfoliatum 736
procumbens 737
refractum 738
repens 737
rigidum 738
semidecandrum 737
strictum ib.
suffruticosum ib.
tomentosum ib.
viscosum 736
vulgatum 737

Ceratocarpus 3, 17
arenarius 17

Ceratonia 303, 431
chilensis 431
Siliqua ib.

Ceratophyllum 740, 746
demerſum 746
ſubmerſum ib.
Ceratoſanther 81, 102
tuberoſa 102
Ceratoſtema 659, 676
peruvianum 676
Cerbera 295, 433
Ahovai 433
Manghas ib.
parviflora ib.
Thevetia ib.
Cercis 655, 666
canadenſis 666
Siliquaſtrum ib.
Cerinthe 291, 320
major 320
minor ib.
Ceropegia 294, 439
biflora 439
Candelabrum ib.
ſagittata ib.
tenuifolia ib.
Ceſtrum 296, 388, 389
auriculatum 338
diurnum ib.
fœtidum 389
hirtum ib.
laurifolium 388
nocturnum ib.
Parqui ib.
tomentoſum ib.
toxicarium ib.
veſpertinum ib.
Chadara 775, 815
arborea 815
gelutina ib.
Chærophyllum 310, 487, 488
alpinum 487
arboreſcens 488
ariſtatum ib.
aromaticum ib.
aureum ib.
bulboſum 487
Cicutaria 488
coloratum ib.
hirſutum ib.
ſcabrum ib.
ſilveſtre 487
tremulum 488
Chætocarpus 211, 248
Ponteria 248
Chalcas 658, 678
paniculata 678
Chamærops 527, 584
humilis 584
Chamira 967, 984
cornuta 984
Chamitis 310, 491
integrifolia 491
trifurcata ib.
Chara 2, 14
flexilis 14
hiſpida ib.
tomentoſa ib.
vulgaris ib.
Cheiranthus 967, 984, 985
alpinus 985
annuus 984
calloſus ib.
canus 985
Cheiri ib.
chius ib.
eryſimoides 984
Cheiranthus
Farietia 985
feneſtralis 984
fruticuloſus ib.
helveticus ib.
incanus ib.
littoreus ib.
maritimus 985
montanus ib.
mutabilis ib.
ſalinus 984
ſcapiger ib.
ſinuatus ib.
ſtrictus 985
tenuifolius ib.
tricuſpidatus ib.
trilobus 984
triſtis 985
villoſus ib.
Chelidonium 774, 809
corniculatum 809
dodecandrum ib.
Glaucium ib.
hybridum ib.
japonicum ib.
majus ib.
Chelidurus 82, 105
ignotus 105
Chelone 890, 928
glabra 928
hirſuta ib.
obliqua ib.
Pentſtemon ib.
ruellioides ib.
Chendea 304, 426
diffuſa 426
Chenopodium 306, 448-450
album 449
ambroſioides ib.
anthelminticum ib.

Chenopodium
aristatum 449
atriplicis 448
Bonus Henricus ib.
Botrys 449
caudatum ib.
glaucum ib.
guineense ib.
hybridum ib.
laterale 450
maritimum ib.
multifidum 449
murale ib.
oppositifolium 450
polyspermum 449
punctulatum 448
rubrum ib.
Scoparia 449
sepium ib.
sericeum 450
serotinum 449
triangulare 448
urbicum ib.
viride 449
Vulvaria ib.

Cherleria 661, 721
sedoides 721

Chimarrhis 297, 370
cymosa 370

Chiococca 298, 366
barbata 366
paniculata ib.
racemosa ib.

Chionanthus 19, 26
caribæa 26
compacta ib.
Ghaeri ib.
incrassata ib.
virginiana ib.
zeylanica ib.

Chironia 294, 391 392
angularis 391
baccifera 392
campanulata 391
decandra 392
dichotoma 391
dodecandra 392
frutescens ib.
jasminoides 391
lanceolata ib.
linoides ib.
lychnoides ib.
nudicaulis ib.
tetragona 392
trinervia 391

CHLORA 600, 618
dodecandra 618
imperfoliata ib.
perfoliata ib.
quadrifolia ib.

Chloranthus 216, 280
inconspicuus 280

Chloris 86, 163
ciliata 163
cruciata ib.
petræa ib.
polydactyla ib.
radiata ib.

Chomelia 212, 245
spinosa 245

Chondrilla 1161, 1173
crepoides 1173
juncea ib.
nudicaulis ib.

Chordostylum 1286, 1484 *sq.*
byssoides 1485
capillare 1484
Clavaria ib.
filiforme 1485

Chordostylum
hispidulum 1485
penicillatum ib.

Chrysanthemum 1164, 1247 *sq.*
Achilliæ 1247
alpinum ib.
arcticum 1248
atratum 1247
Balsamita ib.
bipinnatum 1248
carolinianum 1247
coronarium 1248
corymbosum 1247
flosculosum 1248
frutescens 1247
graminifolium ib.
japonicum 1248
indicum ib.
inodorum 1247
italicum 1248
Leucanthemum 1247
millefoliatum 1248
monspeliense 1247
montanum ib.
Myconis 1248
paludosum ib.
pectinatum 1248
pinnatifidum ib.
segetum ib.
serotinum 1247

CHRYSITRIX 777, 828
capensis 828

Chrysobalanus 771, 796
Icaco 796

Chrysocoma 1162, 1203 *sq.*
acaulis 1204
biflora ib.
cernua 1205

Eee ee 5

Chrysocoma
ciliata 1203
Coma aurea ib.
dichotoma ib.
fruticosa ib.
gigantea 1204
graminifolia ib.
Linosyris 1203
montana ib.
odoratissima 1204
oppositifolia 1203
paniculata 1204
patula 1203
pilosa ib.
purpurea 1204
ramosa ib.
scabra 1203
sericea ib.
tomentosa ib.
uniflora 1204
villosa ib.
Chrysogonum 1166, 1270
virginianum 1270
Chrysophyllum 296, 395, 396
argenteum 396
Cainito 395
glabrum 396
Macucu ib.
microcarpum ib.
monopyrenum 395
Chrysosplenium 661, 704
alternifolium 704
oppositifolium ib.
Chuncoa 660, 702
amazonia 702
Chuquiraga 1163, 1205
Jussiei 1205
CICCA 220, 287
disticha 287
Cicer 1078, 1113
arietinum 1113
Cichorium 1161, 1184
Endivia 1184
Intybus ib.
spinosum ib.
Cicuta 310, 485
bulbifera 485
maculata ib.
perennans ib.
virosa ib.
Cienfuegosia 1000, 1060
digitata 1060
CIMICIFUGA 778, 839
fœtida 839
Cinchona 297, 361
angustifolia 361
brachycarpa ib.
caribæa ib.
corymbifera ib.
floribunda ib.
montana ib.
officinalis ib.
spinosa ib.
Cineraria 1164, 1237 - 1240
alata 1239
Amelloides ib.
americana ib.
aurea ib.
aurita 1238
cacalioides ib.
canadensis 1239
capillacea ib.
caroliniensis 1240
cordifolia 1238
Cineraria
crispa 1238
cruenta ib.
cymbalarifolia 1237
denticulata 1239
discolor ib.
elongata 1238
geifolia 1237
glabra 1238
glauca ib.
hastifolia 1239
humifusa 1237
japonica 1238
integrifolia ib.
lanata 1238
lineata 1239
linifolia 1238
lobata 1239
longifolia 1238
malvæfolia ib.
maritima 1239
multiflora 1240
palustris 1239
perfoliata 1240
purpurata 1239
repanda 1240
rotundifolia ib.
scapiflora ib.
senecionis 1239
sibirica 1238
sonchifolia 1239
tussilaginis 1238
viscosa 1239
Ciponima 773, 798
gujanensis 798
Circæa 21, 27
alpina 27
lutetiana ib.
Cissampelos 995, 1006
Caapeba 1006
capensis ib.
fruticosa ib.

Ciſſampelos
Pareira 1006
ſmilacina ib.

Ciſſus 216, 255, 256
acida 256
cordifolia 255
digitata 256
glanduloſa ib.
heptaphylla ib.
quadrangularis ib.
ſicyoides 255
ternata 256
trifoliata ib.
vitiginea 255

Ciſtus 775, 822-825
ægyptiacus 824
albidus 823
alternifolius
anglicus 824
anguſtifolius 825
apenninus ib.
arabicus ib.
calicinus 824
canadenſis ib.
canarienſis 825
canus 823
capenſis ib.
carolinianus 824
creticus 823
criſpus ib.
elongatus
fœtidus 825
Fumana 823
glutinoſus 825
guttatus 824
halimifolius 823
Helianthemum 825
hirtus ib.
hybridus
incanus 823
italicus 824
ladaniferus 822

Ciſtus
lævipes 823
laurifolius ib.
lavandulifolius
laxus 823
ledifolius 824
Libanotis 822
Lippii 824
marifolius 823
medius 822
monſpelienſis ib.
mutabilis 825
nizoticus 824
numularius 825
œlandicus 824
piloſus 825
polifolius ib.
populifolius 823
racemoſus 825
roſeus 823
ſalicifolius 824
ſalvifolius 823
ſcabroſus 824
ſericeus 825
ſerpyllifolius ib.
ſquamatus ib.
ſtipulatus ib.
ſurrejanus ib.
ſyriacus 824
thymifolius 825
Tuberaria 824
umbellatus 823
vaginatus ib.
villoſus ib.

Citharexylum 890, 942, 943
caudatum 943
cinereum 942
erectum 943
Melanocardium ib.
paniculatum ib.
quadrangulare ib.
ſubſerratum ib.

Citharexylum
villoſum 943

Citrus 1149, 1152, 1153
Aurantium 1153
chilenſis 1152
decumana 1153
japonica ib.
Medica 1152
ſpinoſa ib.

Clathrus 1286, 1449
cancellatus 1449

Claucena 600, 610
javenſis 610

Clavaria 1286, 1442-1445
aſcendens 1449
anthocephala 1444
atra 1443
atro-purpurea ib.
biſida 1444
brachiata ib.
capillaris 1445
ceſpitoſa 1443
corallioides 1444
cornea 1443
Cornu Alces 1444
Cornu Cervi ib.
cornuta ib.
corticalis ib.
criſpa ib.
cylindrica 1445
damæcornis 1444
delicatula 1445
elveloides 1443
farinoſa 1445
faſtigiata 1444
fiſtuloſa 1445
fuſca 1443
glabra 1442
gracilis 1445

Clavaria
granulata 1445
inaequalis 1443
lumbricalis 1445
media ib.
muscoides 1444
ophioglossoides 1443
parasitica 1445
pedunculata ib.
phalloides ib.
pistillaris 1442
placorhiza 1445
plebeja 1444
polymorpha 1445
purpurea 1443
resinosorum ib.
serpentina ib.
simplicissima ib.
subdivisa ib.
tubulosa ib.
vermicularis 1444
viridis 1443

Claytonia 423
Portulacaria 423
sibirica ib.
virginica ib.

Clematis 782, 872-874
cirrhosa 872
crispa ib.
dioica 873
erecta 874
Flammula 873
florida ib.
Forsteri ib.
hexapetala ib.
japonica 872
integrifolia 874
maritima ib.
ochroleuca ib.
orientalis 873
Pallasii ib.
paniculata ib.

Clematis
reticulata 873
sinensis ib.
Viorna ib.
virginiana 872
Vitalba 873
Viticella ib.

Cleome 968, 993, 994
aculeata 993
angustifolia ib.
arabica ib.
capensis ib.
Chelidonii 994
digitata 993
dodecandra 994
felina ib.
fruticosa ib.
gigantea 993
gujanensis 994
heptaphylla ib.
icosandra ib.
juncea ib.
monophylla 993
ornithopodioides ib.
pentaphylla 994
polygama ib.
procumbens 993
serrata ib.
spinosa ib.
tenella 994
triphylla ib.
violacea 993
viscosa 994

Cleonia 886, 921
lusitanica 921

Clerodendrum 890, 962
calamitosum 962
fortunatum ib.
infortunatum ib.
paniculatum ib.

Clerodendrum
Phlomidis 962
trichotomum ib.

Clethra 658, 698
alnifolia 658
arborea ib.
paniculata ib.

CLEYERA 775, 816
japonica 816

CLIBADIUM 298, 375
surinamense 375

Cliffortia 777, 831, 832
crenata 831
cuneata ib.
ericifolia ib.
falcata 832
ferruginea 831
filifolia ib.
graminea ib.
ilicifolia ib.
juniperina 832
obcordata ib.
odorata 831
polygonifolia ib.
pulchella ib.
ruscifolia ib.
sarmentosa ib.
strobilifera ib.
teretifolia ib.
ternata 832
trifoliata 831

Clinopodium 886, 912
incanum 912
martinicense ib.
rugosum ib.
vulgare ib.

Clitoria 1078, 1107
aquilupienfis 1107
brafiliana ib.
Gelactia ib.
mariana ib.
micrantha ib.
multiflora ib.
ternatea ib.
virginiana ib.
Clufia 776, 818
alba 818
flava ib.
rofea ib.
venofa ib.
Clutia 312, 504, 505
acuminata 505
alaternoides 504
Elateria 505
hirta ib.
lanceolata ib.
polygonoides ib.
pulchella ib.
retuta ib.
ftipularis ib.
tomentofa ib.
Clypeola 967, 977
caroliniana 977
Jonthlafpi ib.
maritima ib.
tomentofa ib.
Cneorum 83, 99
tricoccon 99
Cneftis 662, 729
fcandens 729
Cnicus 1162, 1189, 1190
Acarna 1190
centauroides 1189
cernuus 1190
dubius 1189
Eryfithales ib.
Cnicus
ferox 1190
oleraceus 1189
pygmæus 1190
fpinofiffimus 1189
uniflorus ib.
Coccoloba 603, 640, 641
auftralis 640
barbadenfis ib.
diverfifolia ib.
emarginata ib.
excoriata ib.
flavefcens ib.
leoganenfis ib.
nivea 641
obtufifolia 640
pubefcens ib.
punctata ib.
tenuifolia ib.
Uvifera ib.
Coccofipfilum 213, 245
repens 245
Cochlearia 967, 974, 975
anglica 975
Armoracia ib.
Coronopus ib.
danica 974
fœtida 975
glaftifolia ib.
groenlandica ib.
officinalis 974
Cocos 521, 569
aculeata 569
butyracea ib.
chilenfis ib.
guineenfis ib.
lapidea ib.
maldovica ib.
nucifera ib.
CODIA 602, 636
montana 636
CODON 658, 675
Royeni 675
Coffea 298, 365
arabica 365
gujanenfis ib.
occidentalis ib.
odorata ib.
opulina ib.
paniculata ib.
fambucina ib.
triflora ib.
Coix 85, 148
Lacryma 149
Colchicum 527, 588
auctumnale 588
montanum ib.
variegatum ib.
Coldenia 220, 288
procumbens 288
Colletia 304, 408
fpinofiffima 408
Colliguaja 603, 640
odorifera 640
Collinfonia 20, 48, 49
præcox 48
fcabriufcula 49
ferotina ib.
Columnea 889, 964
hirfuta 964
hifpida ib.
longifolia ib.
rutilans ib.
fcandens ib.
Colutea 1075, 1077, 1116, 1117
æfchynomenoides 1117
arborefcens 1116
fiftulofa 1117

Colutea
frutescens 1117
herbacea ib.
humilis ib.
orientalis 1116
perennans 1117

Comarum 781, 861
fragarioides 861
paluſtre ib.

Combretum 600, 609
decandrum 609
laxum ib.
ſecundum ib.

Cometes 217, 266
alterniflora 266

Commelina 82, 120, 121
africana 120
benghalenſis ib.
caroliniana 121
Commelinoides 120
communis ib.
diffuſa 121
erecta 120
hexandra 121
longicaulis 120
mollis ib.
nudicaulis 121
nudiflora ib.
papilionacea ib.
ſpirata ib.
tuberoſa ib.
vaginata ib.
virginica ib.
Zanonia ib.

COMMERSONIA 310, 510
echinata 510

Comocladia 83, 99
dentata 99

Comocladia
ilicifolia 99
integrifolia ib.

Conami 778, 834
braſilienſe 834

Conceveiba 772, 826
gujanenſis 826

Conferva 1285, 1392-1395
Ægogropila 1395
æruginoſa 1393
amphibia ib.
armillaris ib.
bulloſa ib.
burſata 1394
canalicularis 1393
cancellata 1394
capillaris 1393
catenata 1394
catenulata 1395
Chætophora 1392
corallina 1394
corallinoides 1395
decimina 1393
dichotoma 1394
elongata 1395
filiformis 1393
flexuoſa 1395
fluviatilis 1392
fœniculacea 1394
fontinalis 1392
fucoides 1395
fulva ib.
furcata 1393
fuſca 1395
gelatinoſa 1394
glomerata 1395
Helminthochorton 1394
infuſionum 1394
jugalis 1393
lanceolata 1392
littoralis 1393

Conferva
lobata 1392
moniliformis ib.
nigra 1394
paraſitica 1395
pectinalis 1392
pellucida 1394
pennata 1395
piſcium 1392
plana 1393
plicata 1395
polymorpha ib.
porticalis 1392
punctalis ib.
quinina 1393
reticulata 1394
rigida ib.
rivularis 1392
rupeſtris 1395
ſaccata 1394
ſcoparia ib.
ſericea 1395
ſerpentina 1393
ſeticuloſa ib.
ſpongioſa 1394
ſtellina 1393
thermalis 1394
tomentoſa ib.
tranſverſina 1393
trichoides 1395
tubuloſa ib.
vagabunda ib.
veſicata 1394

Conium 309, 475
africanum 475
maculatum ib.
rigens ib.
Royeni ib.
ſuffruticoſum ib.

Connarus 997, 1014
africanus 1014
monocarpos ib.

Connarus
pentagynus 1014
pinnatus ib.
Conobea 886, 936
aquatica 936
Conocarpus 303, 372, 373
erecta 372
procumbens ib.
racemosa 373
Conohoria 302, 396
flavescens 396
Convallaria 525, 559
biflora 559
japonica ib.
latifolia ib.
majalis ib.
multiflora ib.
Polygonatum ib.
racemosa ib.
spicata ib.
stellata ib.
trifolia ib.
verticillata ib.
Convolvulus 293, 339-344
althæoides 341
anceps ib.
angularis 340
aquaticus 344
arenarius
arvensis 339
Batatus 341
biflorus 340
brasiliensis 344
cœlestis 340
cairicus 342
canariensis 341
Cantabrica 344
carolinus 340
Cneorum 344

Convolvulus
copticus 342
corymbosus 343
crenatus 341
dianthus 343
dissectus 342
Dorycnium 343
edulis ib.
farinosus 340
floridus 343
formosus ib.
gemellus 340
glaber 342
grandiflorus 341
gujanensis 342
hastatus 341
havanensis ib.
hederaceus 340
Hermanniæ 339
hirtus 343
humistratus 344
Hystrix
Jalapa 342
japonicus 341
Jetiaucu 339
Imperati
lanatus
lineatus 344
littoralis ib.
macrocarpus 342
macrorhizos ib.
malabaricus 341
martinicensis 342
maximus 341
Medium ib.
minimus ib.
mucronatus 342
muricatus 341
nervosus 340
Nil ib.
obscurus ib.
œnotheroides 343
panduratus 340
paniculatus 342

Convolvulus
pelatus 342
pentapetaloides 344
persicus 343
Pes capræ 344
prostratus ib.
purpureus 340
quinquefolius 342
repens 343
reptans ib.
Scammonea 340
scoparius 343
sepium 339
sericeus 342
sibiricus 340
siculus 343
Soldanella ib.
speciosus 341
spinosus 343
spithamæus ib.
sublobatus 344
tomentosus 342
tricolor 344
trinervius 341
tuguriorum 340
Turpethum 341
umbellatus 340
uniflorus 341
verticillatus 340
vitifolius 342
Conyza 1163, 1220-1222
anthelmintica 1221
arborescens ib.
asteroides 1220
aurita 1222
balsamifera 1220
bifoliata 1222
bifrons 1221
candida ib.
canescens 1220
carolinensis 1221
cinerea ib.

Conyza
cryspata 1221
decurrens 1220
fruticosa 1221
hirsuta 1222
incisa 1221
linifolia 1220
lobata 1221
odorata ib.
patula 1222
pubigera 1221
purpurascens ib.
rigida 1222
rugosa ib.
rupestris ib.
saxatilis 1220
scabra 1221
sinensis ib.
sordida 1220
squarrosa ib.
tortuosa 1221
virgata 1220

Cookia 19, 24
Gnidia 24
pilosa ib.
prostrata ib.

Copaifera 660, 700
officinalis 700

COPROSMA 307, 471
fœtidissimum 471
lucidum ib.

Corchorus 775, 827
æstuans 827
capsularis ib.
hirsutus ib.
hirtus ib.
japonicus ib.
javanicus ib.
olitorius ib.
siliquosus ib.
tridens ib.
trilocularis ib.

Cordia 295, 392, 393
aspera 392
Callococca 393
dichotoma 392
elliptica 393
flavescens 392
Gerascanthes ib.
juglandifolia ib.
macrophylla 393
micrantha ib.
Myxa 392
Sebestena ib.
spinescens ib.
tetrandra 393
tetraphylla 392
Toqueve 393

Coreopsis 1165, 1260 *sq.*
alba 1260
alternifolia 1261
angustifolia ib.
aurea 1260
auriculata 1261
baccata 1260
Bidens ib.
chrysantha ib.
coronata ib.
crassifolia 1261
gladiata ib.
lanceolata ib.
leucantha 1260
limensis 1261
major ib.
perfoliata ib.
procera 1260
quadricornis ib.
reptans 1260
tripteris ib.
verticillata ib.

Coriandrum 309, 486
sativum 485
testiculatum ib.

Coriaria 663, 728
myrtifolia 728
ruscifolia ib.
sarmentosa ib.

Coris 292, 377
monspeliensis 377

Corispermum 3, 16, 17
hyssopifolium 16
squarrosum 17

Cornucopiæ 86, 151
alopecuroides 151
altissimum ib.
cucullatum ib.
hyemale ib.
perennans ib.

Cornus 216, 256, 257
alba 257
alternifolia ib.
chilensis ib.
circinata ib.
cyanocarpos 256
florida 257
japonica ib.
mascula ib.
paniculata ib.
sanguinea ib.
sericea ib.

Cornutia 890, 946
pyramidata 946

Coronilla 1075, 1077, 1118
argentea 1118
coronata ib.
cretica ib.
Emerus ib.
glauca ib.
juncea ib.
minima ib.
scandens ib.
Securidaca

Coronilla
valentina 1118
varia ib.
Corrigiola 311, 505
albella 505
littoralis ib.
repens ib.
Cortusa 292, 328
Gmelini 328
Matthioli ib.
Corylus 602, 637
americana 637
Avellana ib.
Colurna ib.
rostrata ib.
Corymbium 299, 373, 374
filiforme 374
glabrum ib.
scabrum 373
villosum 374
CORYNOCARPUS 301, 418
lævigata 418
Corypha 521, 569
minor 569
Palmetto ib.
Scribus ib.
umbraculifera ib.
Cosaria 22, 71
Forskahlii 71
Cossignia 522, 577
Commersoni 577
Costus 1, 7
arabicus 7
glabratus ib.
Cotula 1163, 1249 *sq.*
anthelmoides 1250
aurea ib.
capensis ib.

Cotula
coronopifolia 1250
minuta ib.
pilulifera ib.
pyrethraria ib.
quinqueloba ib.
sericea ib.
stricta ib.
tanacetifolia ib.
turbinata 1249
umbellata 1250
Verbesina ib.
viscosa ib.
Cotyledon 662, 729, 730
cacalioides 730
deficiens 729
fascicularis 730
hemisphærica 729
hispanica 730
laciniata ib.
lanceolata ib.
malacophylla ib.
mammillaris ib.
nudicaulis 729
orbiculata ib.
paniculata 730
papillaris ib.
reticulata ib.
serrata ib.
spinosa ib.
spuria ib.
triflora ib.
Umbilicus ib.
Crambe 968, 992
caspica 992
fruticosa ib.
hispanica ib.
maritima ib.
orientalis ib.
Tataria ib.
Crameria 216, 278
Ixina 278

Cranichis 61
aphylla 61
diphylla 62
muscosa ib.
oligantha ib.
stachyoides ib.
Craniolaria 890, 934, 935
annua 935
fruticosa 934
Cranzia 219, 286
lævigata 286
Craspedia 1167, 1281
uniflora 1281
Crassula 312, 515-519
alba 516
alooides 518
alpestris ib.
alternifolia 517
argentea 518
barbata ib.
cærulata ib.
capitella ib.
centauroides 516
cephalophora 518
ciliata 517
coccinea 515
columnaris 517
corallina 519
cordata ib.
Cotyledon 516
cotyledonoides 518
crenulata 519
cultrata 516
cymosa ib.
deltoidea 519
dichotoma 517
diffusa 519
expansa 518
flava 516

Crassula
fruticulosa 516
glomerata 517
imbricata ib.
lactea 516
lineolata 517
marginalis 516
mollis 519
montana 518
muscosa 517
nudicaulis ib.
obliqua 516
obvallata 518
orbicularis 517
pellucida ib.
perfoliata 516
perforata 519
pinnata 516
pruinosa ib.
pubescens 518
pulchella 517
punctata ib.
pyramidalis 518
ramosa 516
retroflexa 518
rubens 517
rupestris 518
scabra 516
sparsa 519
spicata 518
strigosa 517
subulata ib.
tecta 518
tetragona 516
thyrsiflora 519
tomentosa ib.
turrita 518
verticillaris 517
vestita 519

Cratægus 777, 829, 830
alpina 829
Aria ib.

Cratægus
Azarolus 830
coccinea ib.
Crus galli 829
edulis ib.
elliptica ib.
glabra ib.
glandulosa ib.
indica 830
lævis 829
leucophleos ib.
lucida 830
maura ib.
monogyna ib.
Oxyacantha ib.
populifolia ib.
punctata 829
rotundifolia ib.
tomentosa ib.
torminalis 830
triloba ib.
uniflora 829
viridis ib.

Cratæva 741, 749
gynandra 749
Marmelos ib.
religiosa ib.
Tapia ib.

Crænea 740, 747
maritima 747

Crepis 1161, 1179-1181
albida 1180
alpina 1179
arenosa 1180
aspera ib.
barbata 1179
biennis 1180
bursifolia ib.
Dioscoridis ib.
filiformis ib.
fœtida ib.
hieracioides ib.

Crepis
neglecta 1180
patula 1181
pulchra 1179
pygmæa ib.
radicata 1180
rhagadioloides 1179
rigens 1180
rubra ib.
sibirica 1179
succulenta 1180
tectorum ib.
vesicaria 1179
virens 1180

Crescentia 887, 943, 944
cucurbitina 944
Cujete 943
pinnata 944

Cressa 307, 454
arabica 454
cretica ib.

Cribraria 1471
pallida ib.

Crinita 210, 231
capensis 231

Crinodendron 997, 1026
Patagua 1026

Crinum 524, 537, 538
africanum 537
americanum 538
asiaticum 537
caspicum 538
falcatum ib.
latifolium 537
lineare 538
nervosum ib.
obliquum 537
speciosum 538

Crinum
tenellum 538
zeylanicum ib.
Cristaria 656, 675
coccinea 675
Crithmum 309, 478
latifolium. 478
maritimum ib.
pyrenaicum ib.
Crocus 81, 107
sativus 107
Crossostylis 999, 1036
biflora 1036
Crotalaria 1077, 1094-1096
amplexicaulis 1094
axillaris 1095
bifaria ib.
biflora 1094
cærulea 1095
capensis ib.
cordifolia 1096
floribunda 1095
gujanensis 1096
heterophylla 1095
imbricata ib.
incana 1096
juncea 1094
laburnifolia 1096
latifolia 1095
linifolia ib.
lunaris 1096
microphylla 1095
oppoſita 1094
pallida 1095
perfoliata 1094
perforata ib.
quinquefolia 1096
retuſa 1094
rotundifolia 1095

Crotalaria
ſagittalis 1094
ſericea ib.
ſeſſiliflora ib.
ſinenſis 1095
triflora ib.
verrucoſa ib.
Croton 998, 1029-1032
acutum 1030
argenteum 1031
aromaticum ib.
aſtroites ib.
balſamiferum 1029
capenſe 1031
cardioſpermum 1029
Caſcarilla ib.
caſtaneifolium ib.
cyanoſpermum ib.
divaricatum 1031
flavens ib.
glabellum 1030
glanduloſum 1031
globoſum 1030
gujanenſe ib.
hirtum ib.
humile 1031
japonicum 1032
Inophyllum 1030
lacciferum ib.
laurinum 1031
lobatum 1032
lucidum 1030
macrophyllum 1031
maritimum 1030
maturenſe ib.
moluccanum 1031
nitens ib.
nutans ib.
obliquum 1029
pallens 1030
paluſtre 1029
plicatum ib.

Croton
populifolium 1030
punctatum ib.
Ricinocarpos 1031
ſebiferum 1030
ſeſſiliflorum 1029
ſpinoſum 1032
Tiglium 1030
variegatum 1029
Crucianella 214, 241
ægyptiaca 240
anguſtifolia ib.
herbacea ib.
latifolia ib.
maritima ib.
monſpeliaca ib.
patula ib.
Crudia 660, 674
Schreberi 674
Cruzita 219, 281
hiſpanica 281
Cryptoſtomum 296, 390
gujanenſe 390
Cubaea 655, 671
paniculata 671
trigona ib.
Cuſlandia 773, 797
fruteſcens 797
Cucubalus 661, 712, 713
ægyptiacus 713
bacciferus 712
Behen ib.
catholicus 713
fabarius ib.
fruticuloſus ib.
glutinoſus 712
italicus ib.
molliſſimus ib.
Otites 713

Cucubalus
polypetalus 713
procumbens 712
pumilio 713
reflexus ib.
saxifragus 712
sibiricus 713
stellatus ib.
tartaricus ib.
viscosus ib.

Cucullaria 3, 10
Vochy 10

Cucumis 81, 100
acutangulus 100
africanus ib.
anguinus ib.
Anguria ib.
Chate ib.
Colocynthis ib.
Conomon ib.
Dudaim ib.
flexuosus ib.
glaber ib.
maderaspatanus ib.
Melo ib.
prophetarum ib.
sativus ib.

Curcubita 81, 101
Citrullus 101
hispida ib.
lagenaria ib.
mammosa ib.
Melopepo ib.
ovifera ib.
Pepo ib.
siceraria ib.
verrucosa ib.

Cuepia 771, 820
gujanensis 820

Calhamia 740, 754
hadiensis 754

Cumaruna 1075, 1084
odorata 1084

Cuminum 309, 484
Cyminum 484

Cunila 20, 43
capitata 43
mariana ib.
pulegioides ib.
thymioides ib.

CUNONIA 661, 703
capensis 703

Cupania 598, 610
americana 610
glabra ib.
saponarioides ib.
tomentosa ib.

Cupressus 996, 1007
columnaris 1007
disticha ib.
japonica ib.
juniperoides ib.
lusitanica ib.
pendula ib.
sempervirens ib.
thyoides ib.

Curatari 1001, 1039
gujanensis 1039

CURATELLA 777, 839
americana 839

Curcuma 1, 8
longa 8
rotunda ib.

Curtisia 311, 498
Schreberi 498

Curupita 1000, 1068
gujanensis 1068

Cuscuta 219, 285
americana 285

Cuscuta
Epithymum 285
europæa ib.

Cussarea 213, 279
violacea 279

CUSSONIA 310, 492
spicata 492
thyrsiflora ib.

Cyanella 525, 553
alba 553
capensis ib.
lutea ib.

Cyathus 1285, 1461
coronarius 1461
crucibuliformis ib.
Cupula ib.
cylindricus ib.
deformis ib.
fructifer ib.
lævis ib.
striatus ib.

CYCAS 781, 862
circinalis 862
revoluta ib.

Cyclamen 292, 328, 329
coum 328
europæum ib.
hederæfolium 329
indicum ib.
persicum ib.

Cyclas 660, 674
aromatica 674
spicata ib.

Cylista 1078, 1107
villosa 1107

Cymbaria 890, 934
dauurica 934

Cynanchum 306, 441, 442
acutum 442
altissi...

Cynanchum
altissimum 442
arboreum 441
capense ib.
carolinense ib.
clausum 442
cordifolium 441
crispiflorum ib.
erectum 442
extensum ib.
filiforme ib.
hirtum 441
lanceolatum 442
longiflorum ib.
maritimum 441
monspeliacum 442
obliquum 441
obtusifolium 442
parviflorum 441
planifolium 442
pyrotechnicum ib.
racemosum 441
reticulatum ib.
suberosum ib.
tenellum 442
undulatum 441
viminale 442

Cynara 1162, 1190, 1191
acaulis 1191
Carduncuclus 1190
horrida ib.
humilis ib.
integrifolia 1191
Scolymus 1190

Cynoctonum 307, 443
petiolatum 443
sessilifolium ib.

Cynoglossum 292, 318, 319
apenninum 319
cheirifolium ib.

Cynoglossum
creticum 318
Dioscoridis ib.
japonicum 319
lævigatum ib.
lanceolatum 318
linifolium 319
lusitanicum ib.
officinale 318
omphalodes 319
pictum ib.
scorpioides ib.
sylvaticum 318
virginicum 319

Cynometra 656, 674
cauliflora 674
ramiflora ib.

Cynomorium 2, 13
cayanense 13
coccineum ib.
jamaicense ib.

Cynosurus 88, 184, 185
ægyptius 185
aureus ib.
cæruleus 184
coracanus 185
cristatus 184
domingensis 185
echinatus 184
flocciflolius 185
indicus ib.
lagopodoides ib.
Lima 184
multibracteatus ib.
siculus 185
sphærocephalus 184
ternatus 185
uniflorus ib.
Uniolæ ib.
virgatus ib.

Cyperus 84, 129-135
ægyptius 129
alopecurus 131
alternifolius ib.
arenarius 130
articulatus 129
capitatus 130
cinnamomeus ib.
compactus ib.
complanatus 131
compressus 133
confertus 134
conglomeratus ib.
corymbosus 135
cruentus 132
denudatus ib.
difformis 133
diphyllus 130
distans 133
dubius 134
effusus 130
elatus 133
elegans ib.
esculentus 132
exaltatus ib.
fastigiatus 131
fastigiosus 134
ferrugineus 131
filiformis 134
flabelliformis 135
flavescens 133
flavidus 132
fuscus 133
glaber ib.
globosus 131
globulosus 135
glomeratus 133
gradatus 130
Haspan ib.
hirsutus ib.
Jaminicus 132
imbricatus 134
Iria 132

Cyperus
lævigatus 132
lateralis 129
leucocephalus 134
ligularis 132
longus 130
minimus 129
minutus 130
monostachyos 132
Monti 130
mucronatus 129
niloticus ib.
nitens 131
niveus 134
odoratus 133
Pangorei 131
paniculatus ib.
pannonicus 132
Papyrus 133
polystachyos 131
pumilus 133
pygmæus 130
rotundus 132
Santonici 131
setaceus 129
spathaceus 132
sphacelatus 134
squarrosus 132
stoloniferus 134
strigosus 133
surinamensis 134
tenellus 129
tenuiflorus 131
tenuis 134
triflorus 133
tuberosus 131
umbellatus 135
viscosus 134
Cyphium 303, 370
capense 370
Cypripedium 21, 62
acaule 62
album ib.
Cypripedium
bulbosum 62
Calceolus ib.
japonicum ib.
Cyrilla 303, 411
racemiflora 411
CYTINUS 740, 745
Hypocistis 745
Cytisus 1075, 1078, 1114, 1115
argenteus 1114
austriacus ib.
Cajan ib.
capitatus ib.
foliolosus ib.
glaber ib.
græcus 1115
hirsutus 1114
Laburnum 1115
nigricans 1114
prolifer ib.
purpureus ib.
sessilifolius ib.
supinus ib.
tener 1115
violaceus ib.
Wolgaricus 1114

Dactylis 87, 184
capitata 184
ciliaris ib.
cynosuroides ib.
geniculata ib.
glomerata ib.
lagopoides ib.
patens ib.
Dais 659, 686, 687
cotinifolia 686
dispermā 687
laurifolia ib.
octandra ib.
DALBERGIA 1075, 1084
Lanceolaria 1084
Monetaria ib.
Dalechampia 1000, 1070
colorata 1070
scandens ib.
Daphne 602, 631, 632
alpina 631
altaica 632
buxifolia ib.
calycina 631
caucasica 632
Cneorum ib.
dioica 631
fœtida 632
Gnidium ib.
indica ib.
Lagetto ib.
Laureola 631
Mezereum ib.
occidentalis ib.
odora 632
oleoides ib.
pontica 631
pubescens ib.
rotundifolia 632
sericea ib.
squarrosa ib.
Tartonraira 631
Thymelæa ib.
trifolia 632
vermiculata ib.
villosa 631
Datisca 743, 757
cannabina 757
hirta ib.
Datura 293, 378, 379
arborea 379

Datura
fastuosa 379
ferox 378
lævis 379
Metel ib.
Stramonium ib.
Tatula ib.

Daucus 308, 474
alatus 474
Carota ib.
divaricatus ib.
Gingidium ib.
gummifer ib.
lucidus ib.
mauritanicus ib.
muricatus ib.
polygamus ib.
Visnaga ib.

Decodon 656, 677
aquaticus 677

DECUMARIA 742, 749
barbara 749

Deguelia 1076, 1085
scandens 1085

DELIMA 772, 819
sarmentosa 819

Delphinium 778, 837
aconiti 837
Ajacis ib.
ambiguum ib.
carolinianum ib.
Consolida ib.
elatum ib.
exaltatum ib.
grandiflorum ib.
hybridum ib.
intermedium ib.
peregrinum ib.
puniceum ib.

Delphinium
urceolatum 837

Demidofia 307, 458
repens 458

Dentaria 968, 979
bulbifera 979
enneaphylla ib.
pentaphylla ib.

Dentella 297, 370
repens 370

Detarium 660, 700
senegalense 700

DEUTZIA 661, 722
scabra 722

Dialium 21, 27
indum 27

Dianthera 20, 35-37
americana 36
cærulea ib.
clavata ib.
comata ib.
debilis ib.
ensiformis 37
eustachiana 36
flava ib.
hirsuta 35
humifusa 36
hyssopifolia 37
japonica 36
malabarica ib.
martinicensis ib.
nitida 35
odora 36
ovata 37
paniculata 36
pectoralis ib.
punctata ib.
reptans ib.
sessilis 35
sulcata 36

Dianthera
trisulca 36
verticillata ib.
violacea ib.

Dianthus 661, 710-712
albens 711
alpinus 712
arboreus ib.
arenarius 711
Armeria 710
atro-rubens ib.
barbatus ib.
carolinianus ib.
Carthusianorum ib.
Caryophyllus 711
deltoideus ib.
diminutus ib.
ferrugineus 710
fruticosus 712
glacialis 711
glaucus ib.
japonicus 710
monspeliacus 711
moschatus ib.
plumarius ib.
pomeridianus ib.
prolifer 710
pumilus 711
pungens 712
rupestris 711
silvestris ib.
sinensis ib.
superbus ib.
virgineus 712

Diapensia 294, 325
japonica 325

Dichondra 307, 457, 458
repens 457
sericea 458
Staphilagria 837

Dickſonia 1283, 1314
arboreſcens 1314
Culcita ib.

Dictamnus 655, 676
albus 676
capenſis ib.

Didelta 1165, 1263
tetragoniæfolia 1263

Digera 300, 408
arvenſis 408

Digitalis 889, 939, 940
ambigua 940
canarienſis ib.
ferruginea 939
lutea ib.
minor ib.
obſcura ib.
purpurea ib.
Sceptrum 940
Thapſi 939

Dilatris 82, 119
paniculata 119
umbellata ib.
viſcoſa ib.

Dillenia 783, 866
indica 866

Diodia 214, 235, 236
proſtrata 236
ſarmentoſa ib.
ſcandens ib.
ſimplex 235
teres 236
tetragona ib.
virginica 235

DIONÆA 658, 685
Muſcipula 685

Dioſcorea 527, 581, 582
aculeata 582

Dioſcorea
alata 582
bulbifera ib.
japonica 581
oppoſitifolia 582
pentaphylla 581
quaternata ib.
quinata ib.
quinqueloba ib.
ſativa ib.
ſeptemloba ib.
trifida ib.
triphylla ib.
villoſa ib.

Dioſma 301, 408-410
barbigerum 410
bifidum 409
capenſe ib.
ciliatum ib.
corymboſum ib.
crenatum ib.
cupreſſinum ib.
ericoides ib.
hirſutum ib.
imbricatum ib.
lanceolatum ib.
latifolium ib.
marginatum 410
odoratiſſimum 409
oppoſitifolium ib.
pulchellum ib.
rubrum ib.
ſucculentum 408
tetragonum 410
unicapſulare 409
uniflorum ib.
villoſum 410

Dioſpyros 601, 617
Ebenum 617
glaberrima ib.
hirſuta ib.
Kaki ib.

Dioſpyros
Lotus 617
tetraſperma ib.
virginiana ib.

Diphyſa 1077, 1117
carthagenenſis 1117

Dipſacus 210, 227
fullonum 227
laciniatus ib.
piloſus ib.
ſilveſtris ib.

Dirca 602, 632
paluſtris 632

DISA 21, 62
grandiflora 62
longicornis ib.
maculata ib.
racemoſa ib.

DISANDRA 593, 595
proſtrata 595

Diſperma 885, 892
repens 892

Dodartia 889, 955
indica 955
orientalis ib.

DODECAS 741, 751
ſurinamenſis 751

Dodecatheon 292, 328
Meadia 328

DODONÆA 601, 618
anguſtifolia 618
viſcoſa ib.

Dolichos 1075, 1077, 1102-1105
acinaciformis 1103
altiſſimus 1104
ariſtatus 1103

Dolichos
benghalensis 1102
biflorus 1105
bulbosus 1104
capensis 1103
Catjang 1105
cultratus 1104
Didice ib.
ensiformis 1103
Faba indica 1104
Faba nigrita 1102
filiformis 1104
funarius ib.
gladiatus 1103
incurvus ib.
Lablab ib.
lignosus ib.
lineatus 1104
Lubia 1105
luteolus 1103
luteus ib.
minimus 1104
polystachyos 1103
pruriens 1104
pugioniformis 1105
purpureus 1104
repens 1105
reticulatus 1104
roseus ib.
scarabæoides ib.
sesquipedalis 1103
sinensis ib.
Soja 1105
tetragonolobus 1103
tranquebaricus ib.
trilobus 1104
unguiculatus 1103
urens 1104
Doliocarpus 774, 805
Calinea 805
major ib.
Rolandri ib.
Dombeya 887, 956
lapponica 956
DORÆNA 293, 329
japonica 329
Doronicum 1164, 1243
acaule 1243
altaicum ib.
Bellidiastrum ib.
lævifolium ib.
Pardalianches ib.
plantagineum ib.
ramosum ib.
Dorstenia 217, 265
caulescens 265
Contragenea ib.
cordifolia ib.
Drakena ib.
Houstoni ib.
lucida ib.
pubescens ib.
Draba 967, 970, 971
alpina 971
caroliniana ib.
ciliaris ib.
fladnizensis ib.
hirta ib.
incana ib.
muralis ib.
pyrenaica ib.
verna 970
Dracæna 525, 558
australis 558
borealis ib.
Draco ib.
ensifolia ib.
erecta ib.
ferrea ib.
graminifolia ib.
indivisa ib.
marginata ib.
medeoloides ib.
Dracæna
striata 558
terminalis ib.
undulata ib.
volubilis ib.
Dracocephalum 886, 915
austriacum 915
canariense ib.
canescens ib.
denticulatum ib.
grandiflorum ib.
Moldavica ib.
nutans ib.
peltatum ib.
peregrinum ib.
pinnatum ib.
Ruyschiana ib.
sibiricum ib.
thymiflorum ib.
virginianum ib.
Dracontium 593, 596, 597
camtschaticum 596
cordatum ib.
fœtidum ib.
pentaphyllum 597
pertusum ib.
polyphyllum 596
Quebitea ib.
scandens 597
spinosum 596
Drosera 313, 514, 515
acaulis 514
anglica 515
capensis ib.
cistiflora ib.
cuneifolia 514
indica 515
longifolia 514

Drosera
lusitanica 515
rotundifolia 514
DRYANDRA 997, 1014
cordata 1014
Dryas 781, 861
anemonoides 861
geoides ib.
octopetala ib.
Drypis 311, 507
spinosa 507
Dugortia 775, 816
nucamentosa 816
Duranta 960
Ellisia ib.
Mutisia ib.
Plumieri ib.
DURIO 1149, 1154
Zibethinus 1154
DUROIA 523, 574
Eriopila 574

Ebenus 1076, 1100
cretica 1100
Echinophora 308, 471
spinosa 471
tenuifolia ib.
Echinops 1167, 1280
Ritro 1280
sphærocephalus ib.
spinosus ib.
strigosus ib.
Echites 294, 436-437
agglutinata 436
annularis 437

Echites
asperuginis 437
biflora ib.
bispinosa ib.
caudata ib.
circinalis 436
corymbosa ib.
costata 437
difformis 436
domingensis ib.
floribunda ib.
heterophylla 437
quinquangularis 438
repens ib.
scholaris 437
semidigyna 436
siphylitica 437
spicata ib.
suberecta 436
succulenta 437
torulosa 436
trifida ib.
umbellata 437
Echium 291, 322, 323
argenteum 323
candicans 322
capitatum 323
creticum ib.
fruticosum 322
giganteum ib.
glaucophyllum 323
italicum ib.
lævigatum ib.
lusitanicum ib.
orientale ib.
plantagineum ib.
rubrum ib.
rusticum ib.
spicatum ib.
strictum 322
violaceum 323
vulgare ib.

ECKEBERGIA 656, 680
capensis 680
ECLIPTA 1165, 1255
erecta 1255
latifolia ib.
prostrata ib.
punctata ib.
sessilis ib.
Ehretia 295, 393, 394
Beurreria 394
dubia ib.
exsucca ib.
halimifolia 393
internodis 394
linifolia ib.
spinosa 393
virgata ib.
EHRHARTA 524, 549
Banksii 549
capensis ib.
punicea ib.
Elæagnus 218, 275, 276
angustifolia 275
crispa ib.
glabra ib.
latifolia ib.
macrophylla 276
multiflora 275
orientalis ib.
pungens 276
spinosa ib.
umbellata ib.
ELÆIS 521, 568
guineensis 568
Elæocarpus 775, 816, 817
copallifera 817
Dicera 816

Elæocarpus
oblonga 817
ferrata 816
Elæodendrum 301, 417
orientale 417
Elate 83, 94
silvestris 94
Elaterium 2, 11
carthaginense 11
trifoliatum ib.
Elatine 603, 643
Alsinastrum 643
Hydropiper ib.
Elephantopus 1167, 1279
angustifolius 1279
scaber ib.
spicatus ib.
tomentosus ib.
ELLISIA 296, 330
Nyctelæa 330
Elymus 88, 197, 198
arenarius 197
canadensis ib.
caninus 198
Caput Medusæ ib.
carolinianus ib.
europæus ib.
Hystrix ib.
philadelphicus 197
sibiricus ib.
subulatus 198
tener ib.
virginicus ib.
Embelia 217, 280
indica 280
EMBOTHRIUM 216, 279
coccineum 279
umbellatum ib.
Empetrum 90, 209
album 209
nigrum ib.
pinnatum ib.
Empleurum 217, 268
Aitoni 268
Enargea 524, 547
marginata 547
Encelia 1166, 1261
alternifolia 1261
Endrachium 293, 339
madagascariense 339
Enurea 741, 748
capreolata 748
EPACRIS 294, 336, 337
fasciculata 337
juniperina ib.
longifolia 336
pumila 337
rosmarinifolia ib.
Eperua 659, 672
falcata 672
Ephedra 997, 1013
aphylla 1013
distachya ib.
monostachya ib.
Ephielis 598, 611
gujanensis 611
Epichysium 1460
argenteum ib.
Epidendrum 21, 63-69
alvifolium 68
alpestre 69
altissimum 67
amabile 68
anceps 65
angustifolium 66
Epidendrum
aucumnale 64
bifidum 68
biflorum 64
capense 68
carinatum ib.
caudatum 63
ciliare 65
claviculatum 63
Clypeolus 66
cochlearifolium 69
cochleatum 68
coccineum 63
corniculatum 67
crispatum 64
cucullatum 65
diffusum ib.
echinocarpon 66
elongatum ib.
equitans 64
Fasciola 66
filiforme 69
flabelliforme 67
Flos aëris 63
fragrans 66
funale 69
furvum 63
glaucum 64
globosum 65
graminifolium 69
graminoides 64
guttatum 68
juncifolium ib.
labiatum 67
Lanceola ib.
laxum 69
lineare 63
maculatum 68
micranthum 69
minimum 68
minutum ib.
moniliforme ib.
montanum 65
Myosuros 64

Epidendrum
nocturnum 65
nodosum 66
nutans 64
ophioglossoides 69
ovale ib.
ovatum 63
palmifolium 66
polybulbon ib.
proliferum 64
pulchellum 69
punctatum 63
pusillum 68
racemiflorum 69
ramosum 63
resupinatum 64
retusum 68
rigidum 65
ruscifolium 69
sanguineum 66
satyrioides 67
scriptum 68
secundum 63
serrulatum 65
sertularioides ib.
sessile 67
spatulatum 63
subulatum 67
tenuifolium 63
teretifolium 65
teres ib.
testaefolium 66
tetrapetalum 67
tribuloides ib.
trichocarpon 66
tridentatum 69
triquetrum 67
triste 64
tuberosum 68
umbellatum 66
umbelliferum 65
undulatum 67
utricularioides ib.
Vanilla 63

Epidendrum
variegatum 67
vestitum 64
vomeriforme ib.

Epigæa 659, 696
cordifolia 696
repens ib.

Epilobium 599,607, 608
alpinum 608
angustifolium 607
Dodonæi 608
glabellum ib.
hirsutum ib.
latifolium ib.
montanum ib.
obscurum ib.
palustre ib.
rotundifolium ib.
roseum ib.
tetragonum ib.

Epimedium 215,256
alpinum 256

Equisetum 1283, 1288
arvense 1288
fluviatile ib.
giganteum ib.
hiemale ib.
limosum ib.
palustre ib.
pratense ib.
silvaticum ib.

Eraclissa 313, 520
hexagyna 520

Eranthemum 19, 27
angustifolium 27
capense ib.
parvifolium ib.
salsoloides ib.

Erica 601, 622-629
abietina 627
arborea ib.
articularis 626
australis 628
axillaris 623
baccans 628
Bergiana ib.
bicolor 626
bracteata 622
bryantha 623
calicina 628
capitata 623
cephalotes 625
cerinthoides 624
cernua 629
ciliaris 623
cinerea 628
coccinea 625
comosa ib.
concinna ib.
conspicua 624
corifolia 628
cruenta 626
cubica 625
curviflora 624
cylindrica ib.
Deboecia 622
dentata 625
depressa 626
empetrifolia 627
fastigiata 624
florida 627
formosa 628
fucata 622
glandulosa 624
glutinosa 626
gnaphalodes 628
grandiflora 624
halicacaba 626
herbacea 624
hirta 626
hispida 623

Erica
imbricata 624
incarnata 628
inflata 627
leucanthera 623
lutea 626
mammosa 627
margaritacea 629
marifolia 626
Massoni 624
mediterranea ib.
melanthera 623
Monsoniana 626
mucosa 628
multiflora 625
nigrita 626
nudicaulis 625
obliqua 627
octophylla ib.
passerinæ 623
persoluta 627
petiolata 622
Petiverii 623
physodes 628
pilulifera 627
pinea 625
planifolia 626
Plukenetii 623
pubescens 627
pulchella 625
purpurascens ib.
pyramidalis 624
racemosa ib.
ramentacea 629
regerminans 626
retorta 629
rubens 628
scoparia ib.
Sparrmanni 624
spicata 627
spumosa 623
strigosa 627
tenuifolia 622
tetragona 623

Erica
Tetralix 627
Thunbergii 623
Totta ib.
tubiflora 624
umbellata 623
urceolaris 626
vagans 625
ventricosa 624
verticillata 625
vestita ib.
virescens 626
virgata 623
viscaria 625
vulgaris 628

Erigeron 1164, 1222-1224
acre 1224
ægyptiacum 1223
alpinum ib.
bahamense ib.
bonariense 1224
camphoratum 1223
canadense ib.
carolinianum 1222
cymosum 1224
decurrens 1222
Droebachiense 1224
fœtidum 1222
glandulosum 1223
glutinosum ib.
Gouani ib.
gramineum 1222
graveolens ib.
jamaicense 1224
japonicum 1223
incanum 1222
obliquum 1223
philadelphicum ib.
pilosum 1224
pinnatum ib.
purpureum 1223

Erigeron
rivulare 1224
scandens 1223
sericeum ib.
siculum 1224
squarrosum ib.
sumatrense 1223
tricuneatum 1224
tuberosum 1222
uniflorum 1224
viscosum 1223

Erinus 889, 951
africanus 951
alpinus ib.
capensis ib.
Lychnidea ib.
maritimus ib.
peruvianus ib.
tristis ib.

Eriocaulon 89, 206
amplexicaule 206
anceps ib.
decangulare ib.
fasciculatum ib.
quinquangulare ib.
serotinum ib.
setaceum ib.
sexangulare ib.
triangulare ib.

Eriocephalus 1166, 1277
africanus 1277
racemosus ib.

Eriophorum 84, 124
alpinum 124
cyperinum ib.
polystachyon ib.
vaginatum ib.
virginicum ib.

Erithalis 299, 376
fruticosa 376

Erithalis
inodora 376
polygama ib.

Ernodea 212, 244
littoralis 244

Eroteum 775
theoides
undulatum

Ervum 1075, 1078, 1112, 1113
erectum 1113
Ervilia ib.
hirsutum ib.
Lens ib.
monanthon 1112
soloniense 1113
tetraspermum ib.
volubile ib.

Eryngium 308, 466, 467
alpinum 467
americanum ib.
amethystinum ib.
aquaticum 466
Bourgati 467
campestre ib.
fœtidum 466
maritimum 467
planum 466
pusillum ib.
tricuspidatum ib.

Erysimum 967, 983
Alliaria 983
Barbarea ib.
bicorne ib.
cheiranthoides ib.
hieracifolium ib.
hybridum ib.
officinale ib.
pinnatum ib.
polyceratum ib.
repandum ib.

Erythrina 1075, 1076, 1087
carnea 1087
Corallodendrum ib.
Crista galli ib.
herbacea ib.
picta ib.
planisiliqua ib.

Erythronium 525, 546
carolinianum 546
Dens canis ib.

Erythroxylum 662, 725, 726
areolatum 725
buxifolium 726
ferrugineum ib.
havanense 725
hypericifolium 726
laurifolium ib.
longifolium ib.
macrophyllum ib.
rufum 725
sideroxyloides 726
squamatum 725

Escallonia 302, 418
myrtilloides 418

Ethulia 1162, 1197
bidentis 1197
conyzoides ib.
divaricata ib.
Sparganophora ib.
Struchium ib.
tomentosa ib.
uniflora ib.

Eucalyptus 770, 790
obliqua 790

Euclea 742, 756
racemosa 756

Eugenia 770, 787, 788
acutangula 788
aquea 787
baruensis 788
carthagenensis 787
cotinifolia 788
gujanensis ib.
Jambos 787
latifolia ib.
malaccensis ib.
Mini ib.
montana ib.
paniculata ib.
perplocifolia ib.
Pseudopsidium ib.
racemosa 788
sinemariensis ib.
undulata ib.
uniflora ib.

Euonymus 300, 407
americanus 407
atro-purpureus ib.
europæus ib.
japonicus ib.
inermis ib.
latifolius ib.
Tobira ib.
verrucosus ib.

Euparea 303, 332
amœna 332

Eupatorium 1162, 1197-1200
ageratoides 1200
album 1198
altissimum 1199
aromaticum 1200

Eupatorium
cælestinum 1200
cannabinum 1199
chilense 1198
cinereum 1200
compositifolium 1199
cordifolium 1200
Dalea 1198
fœniculoides 1199
fusco rubrum 1198
hastatum *ib.*
Houstoni *ib.*
hyssopifolium *ib.*
japonicum 1199
incarnatum 1200
ivæfolium *ib.*
lineartifolium 1198
maculatum 1199
Marrubium 1198
micranthon *ib.*
microphyllum 1199
molle 1200
montanum *ib.*
myosotifolium *ib.*
nervosum 1199
odoratum 1200
parviflorum 1197
perfoliatum 1199
pilosum 1198
purpureum 1199
rigidum *ib.*
rotundifolium 1198
scabrum 1199
scandens 1198
sessilifolium *ib.*
sinense 1198
stœchadifolium 1200
syriacum 1199
triflorum 1198
trifoliatum 1199
urticæfolium 1200
villosum 1199
zeylanicum 1198

Euphorbia 743, 759-766
abyssinica 759
aculeata *ib.*
aleppica 765
amygdaloides 766
anacantha 760
angulata 765
antiquorum 759
Apios 763
articulata 761
Atota 762
balsamifera 760
belgradica 761
biumbellata 766
bombensis 761
canariensis 759
canescens 761
Capus Medusæ 759
carniolica 764
cereiformis 759
Chamæsyce 761
Characias 766
Clava 760
corallioides 765
cordata 764
corollata 765
cotinifolia 760
cuneiformis 763
cyathophora *ib.*
Cyparissias 766
dendroides *ib.*
dichotoma 761
diffusa 763
divaricata *ib.*
dulcis 764
emarginata 766
epithymoides 764
Esula 766
exigua 763
falcata *ib.*
fimbriata 754
fruticosa *ib.*

Euphorbia
genistoides 764
Gerardiana 766
glabrata 760
glauca 764
graminea 762
granulata 761
helioscopia 765
heptagona 759
heterophylla 760
hiberna 766
hirta 762
hypericifolia *ib.*
hyssopifolia *ib.*
Ipecacuanha 761
juncea 765
læta 763
Lathyris *ib.*
linearis 761
linifolia 760
litterata 765
maculata 761
mammillaris 759
mauritanica 760
mellifera *ib.*
meloformis *ib.*
myrsinites 766
myrtifolia 761
nereifolia 759
nicaensis 763
nudiflora 760
obliquata 762
oblitterata *ib.*
ocymoides 760
officinalis 759
orientalis 765
origanoides 762
palustris 766
Paralias 764
parviflora 761
Peplis *ib.*
peploides 762
Peplus 763
picta 760

Euphorbia
pilosa 765
pilulifera 762
pinea 765
piscatoria 760
Pithyusa 764
platyphyllos 765
polygonifolia 761
portlandica 764
portulacoides 761
prostrata 762
punctata 761
punicea 765
retusa 763
rosea 762
saxatilis 764
segetalis ib.
Sequieri 766
serrata 765
seticornis 764
silvatica ib.
spinosa ib.
taurinensis ib.
terracina 763
thymifolia 762
Tiraculli 760
tithymaloides ib.
triaculeata 759
tuberosa 763
verrucosa 765
Euphoria 598, 611
sinensis 611
Euphrasia 888, 923, 924
cuneata 924
latifolia 923
linifolia 924
lutea 923
Odontites ib.
officinalis ib.
rubra ib.
tricuspidata ib.
Euphrasia
viscosa 924
EURYA 741, 750
japonica 750
Euryandra 778, 835
scandens 835
Evea 210, 231
gujunensis 231
Evolvulus 312, 508
alsinoides 508
emarginatus ib.
gangeticus ib.
hederaceus ib.
linifolius ib.
numularius ib.
sericeus ib.
tridentatus ib.
Exacum 212, 250, 251
albens 250
aureum ib.
cordatum 251
gujanense ib.
punctatum ib.
ramosum ib.
spicatum ib.
tenuifolium ib.
Excæcaria 89, 203
Agallocha 203
Fabricia 770, 789
myrtifolia 789
Fagara 215, 258
acuminata 258
emarginata ib.
Euodia ib.
octandra ib.
pentandra ib.
Piperita ib.
Pterota ib.
Fagara
spinosa 258
tragodes ib.
trifoliata ib.
zeylanica ib.
Fagelia 20, 40
flavicans 40
Fagonia 683
arabica ib.
cretica ib.
hispanica ib.
indica ib.
scabra ib.
FAGRÆA 296, 336
zeylanica 336
Fagus 743, 757, 758
Castanea 757
ferruginea 758
pumila ib.
silvatica ib.
Falcata 1078, 1131
caroliniana 1131
FALCKIA 526, 580
repens 580
Faramea 212, 279
corymbosa 279
sessiliflora ib.
Fernelia 213, 244
mauritiana 244
Ferraria 81, 119
pavonia 119
undulata ib.
Ferula 309, 478, 479
Asa fœtida 479
canadensis ib.
communis 478
Ferulago ib.
glauca ib.
meoides ib.
nodiflora 479
orientalis 478

Ferula
perfica 479
tingitana 478
villofa 479

Feftuca 88, 185-188
amethyftina 186
arundinacea 187
bromoides 185
calicina 187
cinerea 186
criftata 187
dichotoma ib.
dumetorum 186
duriufcula ib.
elatior ib.
fafciculata ib.
fluitans 187
fufca ib.
heterophylla ib.
Halleri 186
indica 187
lanceolata 188
mifera 187
monoftachya 188
mucronata 187
multiflora 188
myuros 186
nemorum ib.
octoflora 188
ovina 185
pauciflora 187
phœnicoides 186
picta 187
pumila 186
quadriflora 188
reptatrix 186
rubra 187
fciuroides 186
filvatica 187
fpadicea 186
fpeciofa 187
fpinofa 188

Feftuca
triflora 187
varia ib.

Feuillea 310, 500
cordifolia 500
trilobata ib.

Ficus 83, 96-99
americana 98
afpera ib.
bengalenfis 96
benjamina ib.
capenfis 99
Carica 96
Chanas 97
cordata 98
coriacea 97
coftata 96
drupacea 99
falcata 98
Granatum ib.
heterophylla 97
hifpida ib.
indica 96
lucida ib.
maculata 97
microcarpa ibi
moriforia 97
nymphæifolia 96
obliqua 98
palmata 97
pedunculata 96
pertufa 97
prolixa 98
pumila 97
punctata 98
racemofa 97
religiofa 96
reticulata 99
retufa 97
fcabra 98
feptica ib.
ferrata 97

Ficus
finuata 99
ftipulata 98
Sur 97
Sycomorus 96
Taab 98
Toka ib.
toxicaria 97
trigona ib.
vafta ib.
venofa 96
virens ib.

Filago 1166, 1278
acaulis ib.
arvenfis ib.
gallica ib.
germanica ib.
Leontopodium ib.
montana ib.
pyramidata ib.

Fiffilia 82, 93
pfittacorum 93

Fiwa 740, 745
japonica 745

Flacourtia 780, 852
Ramontchi 852

Flagellaria 527, 586
indica 586

Flaveria 1166, 1269
chilenfis 1269
peruviana ib.

Fœtidia 771, 793
borbonica 793

Fontinalis 1284, 1324
albicans 1324
alpina ib.
antipyretica ib.
capillacea ib.
crifpa ib.

Fontinalis
diſticha 1324
minor ib.
ſquamoſa ib.
Forgeſia 297, 353
racemoſa 353
Forskahlea 663, 738
anguſtifolia 738
candida ib.
tenaciſſima ib.
FORSTERA 21, 70
ſedifolia 70
Forſythia 776, 808
ſcandens 808
FOTHERGILLIA 777, 839
alnifolia 839
Fragaria 781, 857
monophylla 857
veſca ib.
Frankenia 522, 577
hirſuta 577
lævis ib.
pulverulenta ib.
revoluta 578
Franklinia 775, 810
americana 810
Fraſera 215, 256
caroliniensis 256
Fraxinus 22, 75
americana 75
excelſior ib.
integrifolia ib.
novæ Angliæ ib.
Ornus ib.
pubeſcens ib.
rotundifolia ib.
Fritillaria 525, 545, 546
imperialis 545
Meleagris ib.

Fritillaria
nana 546
perſica 545
punctata ib.
pyrenaica ib.
regia 546
Fuchſia 601, 617
coccinea 617
excorticata ib.
involucrata ib.
multiflora ib.
triphylla ib.
Fucus 1285, 1380-1390
abrotanifolius 1385
abrotanoides 1382
aceroſus 1389
acinarius 1380
aculeatus 1384
Agarum 1390
alatus 1387
albus 1384
angulatus 1383
anguſtifolius 1389
aphyllanthos 1385
articulatus 1381
baccatus 1382
Bailloviana 1386
Baſiera ib.
bicornis 1388
bifidus 1389
bracteatus 1390
buccinalis 1389
Burſa paſtoris 1383
canaliculatus 1381
capillaceus 1384
capitatus 1383
cartilagineus 1385
ceranoides 1380
ceſpitoſus 1386
ciliatus ib.
Clathrus 1390
concatenatus 1382

Fucus
conſervoides 1384
contortus 1387
corallioides 1384
corneus ib.
corymbiferus 1383
crenatus 1388
crinitus 1386
criſpatus 1387
criſpus ib.
cuneiformis 1389
debilis ib.
dentatus 1383
denticulatus 1381
digitatus 1388
diſcors 1384
diſtichus 1381
divaricatus 1380
edulis 1382
elongatus 1381
ericoides 1384
eſculentus 1389
faſtigiatus 1383
filicinus 1388
Filum 1384
Flagellum 1389
flavus 1390
fœniculaceus 1382
foliifer 1388
fragilis 1389
fruticuloſus ib.
furcellatus 1383
Gærtnera 1386
geniculatus 1381
gigartinus 1386
glacialis 1388
granulatus 1382
hirſutus 1384
holoſetaceus 1387
hypnoides 1390
inflatus 1380
Kœlreuteri 1388
laceratus 1387

Fucus
laciniatus 1388
laminosus ib.
lanosus 1383
lendigerus 1380
lichenoides 1383
ligulatus 1387
linearis 1388
longissimus 1384
loreus 1382
lycopodioides 1384
marginalis ib.
musciformis ib.
Myrica 1382
natans 1380
nodosus 1381
Osmunda 1385
ovarius 1380
palmatus 1389
Palmetta 1388
papillosus 1386
peniciliformis 1382
peucedanifolius 1381
Pilularia 1383
pinnatifidus 1385
pinnatus 1390
pistillatus 1386
plicatus 1385
plumaris 1388
plumosus 1385
polyphyllus 1389
polypodioides 1388
prolifer 1390
pseudoceranoides 1383
purpureus 1384
pyriferus 1381
racemosus 1382
ramentaceus 1387
Rosa marina 1381
rotundus 1383
rubens 1387
rudis 1385
saccharinus 1389

Fucus
salicifolius 1380
sanguineus 1387
scorpioides 1384
selaginoides 1382
sericeus 1385
Serra ib.
serratus 1380
serrulatus 1388
sertularioides 1385
seticulosus 1382
siliculosus 1381
siliquosus ib.
spermophorus 1386
spinosus ib.
spinulosus ib.
spiralis 1380
subrepandus 1381
Tendo 1384
triangularis 1383
trinodis 1382
triqueter ib.
truncatus 1388
turbinatus 1380
undulatus 1381
uvifer 1386
venosus 1387
vermicularis 1386
vesiculosus 1380
viridis 1383
viscidus 1389
vittatus 1387
volubilis ib.
FUIRENA 84, 123
paniculata 123
Fuligo 1287, 1466
capitata 1466
Lycoperdon ib.
punicea ib.
septica ib.
Fumaria 1075, 1079, 1080
acaulis 1080

Fumaria
bulbosa 1080
capnoides ib.
capreolata ib.
claviculata ib.
Cucullaria 1079
enneaphylla 1080
fungosa 1079
intermedia ib.
lutea 1080
minor ib.
nobilis 1079
officinalis 1080
Schangini ib.
sempervirens ib.
spectabilis 1079
spicata 1080
vesicaria ib.

Gaertnera 656, 685
indica 685
GAHNIA 526, 578
procera 578
schoenoides ib.
Galanthus 523, 534
nivalis 534
Galardia 1165, 1259
alternifolia 1259
Galax 415
aphylla ib.
GALAXIA 995, 1005
graminea 1005
obscura ib.
ovata ib.
Galedupa 1076, 1086
pungam 1086
Galega 1075, 1078, 1129-1131
caerulea 1130
capensis ib.

Galega
canibæa 1129
cinerea ib.
daurica 1130
filiformis 1131
littoralis 1130
longifolia 1131
maxima 1130
ochroleuca ib.
officinalis 1129
pallens ib.
piscatoria 1130
pulchella ib.
purpurea ib.
fruticosa ib.
spicata 1131
spinosa 1130
stricta ib.
tinctoria 1129
villosa 1130
virginica ib.
Galenia 602, 636
africana 636
procumbens ib.
Galeopsis 885, 905
cannabina 905
grandiflora ib.
Ladanum ib.
Tetrahit ib.
Galipea 887, 944
trifoliata 944
Galium 214, 237-240
anisophyllum 238
Aparine 240
aparinoides ib.
aristatum 239
asperum 238
austriacum ib.
bermudianum 240
Bocconi 238
boreale 239
cinereum 238
Galium
corrudæfolium 237
elatum 238
glaucum 239
græcum 240
hercynicum 238
hierosolymitanum 239
Jussieui 237
Linckii 240
linifolium 235
lucidum ib.
maritimum 240
megalospermum 238
minutum 239
Mollugo ib.
montanum 237
montium ib.
obliquum 238
palustre 237
parisiense 240
paschale 237
pilosum 250
purpureum 239
pusillum ib.
pyrenaicum 238
rigidum 239
rubioides 237
rubrum 239
saxatile 237
scabrum 239
silvaticum ib.
silvestre ib.
spurium ib.
tenue 238
tenuifolium ib.
tinctorium 237
trifidum ib.
tunetanum 240
uliginosum 237
verum 239
Walteri 237
GALOPINA 219, 281
circæoides 281
Galvesia 888, 937
fruticosa 937
Garcinia 740, 748
celebica 748
cornea ib.
Mangostana ib.
Gardenia 298, 433-434
dumetorum 434
florida 433
gummifera ib.
jasminoides 434
latifolia 433
micranthos 434
Mussænda 433
Pandacaki 434
radicans 433
Rothmannia 434
scandens ib.
spinosa ib.
Thunbergia 433
uliginosa 434
Garidella 661, 722
Nigellastrum 722
Gastonia 744, 769
spongiosa 769
Gaura 599, 607
biennis 607
Geniostoma 377
rupestre ib.
Genipa 298, 388
americana 388
Genista 1075, 1076, 1090, 1091
anglica 1091
aspalathoides ib.
canariensis 1090
candicans ib.
florida ib.
germanica 1091
hirsuta ib.
hispanica ib.
humi-

Genista
humifusa 1090
linifolia ib.
lusitanica 1091
pendulina 1090
pilosa ib.
sagittalis ib.
sericea ib.
sibirica ib.
tinctoria ib.
tridentata ib.

Gentiana 307, 460-462
acaulis 460
Amarella 462
aphylla ib.
aquatica 461
asclepiadea 460
aurea 461
bavarica ib.
Cachanlahuan 462
campanulata 460
campestris ib.
Catesbæi 461
Centaurium ib.
ciliata 462
Cruciata ib.
decumbens 461
elongata 462
exacoides ib.
exaltata 461
filiformis 462
frigida 461
heterodita 462
lutea 460
maritima 462
montana 461
nana ib.
nivalis ib.
pannonica 460
Pneumonanthe ib.
Porphyrio 462
prostrata ib.

Gentiana
pulchella 461
pumila ib.
punctata 460
purpurea ib.
pyrenaica ib.
quinquefolia 462
Saponaria 460
saxosa 461
scilloides 462
sessilis ib.
spicata ib.
tetragona ib.
utriculosa ib.
verna 461
verticillaris 462
verticillata ib.
villosa 460
viscosa 462

Geoffroya 1078, 1115
inermis 1115
spinosa ib.

Geranium 997, 1015-1026
abrotanifolium 1024
acerifolium 1022
acetosum 1021
aculeatum 1024
africanum 1022
alceoides 1024
alchimilloides 1021
alpinum 1020
althæoides 1022
appendiculatum 1025
arabicum 1015
arduinum 1019
arenarium 1024
argenteum 1016
articulatum 1023
asphodeloides 1017
astragalifolium 1025

Geranium
auritum 1021
betrachioides 1017
betonicum 1024
betulinum 1021
bicolor 1023
biflorum 1022
bifolium ib.
bipinnatum 1018
bohemicum 1016
Botrys 1018
capillare 1025
capitatum 1023
carnosum 1024
carolinianum 1016
chærophyllum 1019
chium ib.
ciconium ib.
cicutarium 1020
ciliatum 1021
cinereum 1016
columbinum ib.
cordifolium 1021
coriandrifolium 1025
cotyledonis 1022
crassifolium 1018
crassum 1025
crispum 1023
cucullatum 1022
daucifolium 1025
dissectum 1016
elongatum 1020
emarginatum 1015
exstipulatum 1023
ferulaceum 1025
flavum 1026
fruticosum 1025
fulgidum 1024
fuscum 1017
gibbosum 1024
glandulosum 1020
glaucophyllum 1017

Geranium
glaucum 1021
grossularioides 1022
gruinum 1018
heliotropioides ib.
hermannifolium 1022
hirsutum 1023
hirtum 1020
hispidum 1023
humile 1016
hibridum 1021
ibericum 1017
incanum 1016
incarnatum 1019
inquinans 1022
lacerum 1018
laciniatum 1019
lævigatum 1024
lanceolatum 1021
littoreum 1019
lobatum 1024
longifolium 1021
lucidum 1018
lupinoides 1016
macrorhizon 1017
maculatum ib.
malacoides 1018
marginatum 1020
maritimum 1018
minimum 1025
molle ib.
montanum 1016
moschatum 1019
murcicum ib.
myrrhifolium 1025
nodosum 1017
odoratissimum 1022
œnotheræ 1021
ovatum ib.
oxaloides ib.
palmatum 1018
palustre 1017

Geranium
papilionaceum 1022
parvulum 1015
peltatum 1020
petræum ib.
phæum 1017
pilosum 1022
pinnatifidum 1024
pinnatum 1025
præcox 1018
pratense 1017
proliferum 1025
prostratum 1015
pulverulentum 1019
pusillum 1016
pyrenaicum ib.
quercifolium 1023
ramosissimum 1025
ranunculoides 1015
reflexum 1017
revolutum 1024
Richardi 1015
robertianum 1018
romanum 1020
rotundifolium 1018
rupestre 1020
sanguineum 1015
scabrum 1023
sessiliflorum 1015
sibiricum ib.
silvaticum 1017
spinosum 1015
stipulaceum 1022
striatum 1017
tubulare 1020
terebinthinaceum 1023
ternatum 1024
tetragonum 1020
triangulare 1019
trifidum 1023
trifolium 1019
triste 1025

Geranium
tuberosum 1015
variegatum 1023
villosum 1025
viscosum 1023
vitifolium ib.
zonale 1020
Gerardia 889, 927, 928
delphinifolia 928
erecta ib.
flava 927
glutinosa ib.
japonica ib.
nigrina ib.
pedicularia ib.
purpurea 928
scabra ib.
setacea ib.
tuberosa 927
tubulosa 928
Gerbera 647, 652
recentior 652
Geropogon 1161, 1168
caliculatus 1168
glaber ib.
hirsutus ib.
Geruma 301, 411
alba 411
Gesneria 888, 929, 930
acaulis 930
calicina ib.
corymbosa 929
exserta ib.
grandis 930
humilis ib.
pulchella 929
pumila ib.
scabra ib.

Gesneria
tomentosa 929
ventricosa ib.
GETHYLLIS 524, 564
ciliaris 564
lanceolata ib.
spiralis ib.
villosa ib.
Geum 781, 860, 861
album 861
aleppicum 860
canadense ib.
carolinianum 861
hybridum ib.
japonicum 860
montanum 861
reptans ib.
rivale ib.
urbanum 860
virginianum ib.
Gevuina 891, 966
Avellana 966
Ghinia 20, 37
Tamonea 37
Gilibertia 656, 682
decandra 682
heterophylla ib.
oppositifolia ib.
ovata ib.
Ginannia 647, 653
gujanensis 653
GINORA 741, 754
americana 754
GISECKIA 312, 515
pharnacioides 515
GLABRARIA 1149, 1153
tersa 1153
Gladiolus 82, 110-112
alatus 110
alopecuroides 111
anceps ib.
angustus ib.
blandus ib.
capitatus 112
carinatus 111
carneus ib.
communis 110
crispus 112
falcatus ib.
flavus 111
flexuosus ib.
gramineus 112
imbricatus 110
junceus 112
latifolius ib.
Lomenia ib.
longiflorus 111
marginatus 112
montanus 111
plicatus 110
ramosus 111
recurvus 110
securiger 111
spathaceus 112
spicatus 111
strictus 112
sulphureus 111
tenellus 112
tristis 111
tubiflorus 112
undulatus 110
viridis ib.
Watsonius 111
Glandularia 886, 920
caroliniensis 920
Glaux 304, 428
maritima 428
Glecoma 885, 904
hederaceum 904
Gleditschia 521, 566
inermis 566
triacantha ib.
Glinus 744, 768
crystallinus 768
dictamnoides ib.
lotoides ib.
setiflorus ib.
GLOBBA 21, 49
marantina 49
nutans ib.
uviformis ib.
Globifera 19, 32
Umbrosa 32
Globularia 210, 226
Alypum 226
bisnagarica ib.
cordifolia ib.
longifolia ib.
nudicaulis ib.
orientalis ib.
spinosa ib.
vulgaris ib.
Glochidion 82, 104
uniflorum 104
Gloriosa 525, 546
simplex 546
superba ib.
Glossopetalum 312, 510
glabrum 510
tomentosum ib.
GLUTA 301, 417
Benghas 417
Glycina 1075, 1078, 1105, 1106
Apios 1106
bituminosa ib.

Glycina
caribæa 1106
comosa ib.
debilis 1105
frutescens 1106
javanica ib.
labialis ib.
lucida ib.
monoica 1105
monophylla ib.
numularia 1106
phaseloides 1105
reticulata ib.
rosea 1106
striata ib.
suaveolens ib.
subterranea 1105
tomentosa 1106
triloba ib.
villosa 1105

Glycyrrhiza 1075, 1077, 1117
asperrima 1117
echinata ib.
glabra ib.
hirsuta ib.

Gmelina 888, 944
asiatica 944
coromandeliana ib.
indica ib.

Gnaphalium 1163, 1213-1218
albescens 1215
alpinum 1216
americanum ib.
appendiculatum 1213
arabicum 1216
arboreum 1213
arenarium 1215
cinereum 1216
coronatum 1213

Gnaphalium
crassifolium 1214
crispum 1215
cuneifolium 1216
cylindricum 1215
cymosum ib.
declinatum 1217
dentatum 1214
denudatum 1216
dioicum ib.
discolorum 1213
ericoides ib.
eximium ib.
fœtidum 1215
Forskahlii 1214
fruticans 1213
glomeratum 1217
grandiflorum 1213
helianthemifolium 1216
hiemale 1218
hispidum 1214
japonicum 1218
ignescens 1214
imbricatum* 1215
indicum 1216
involucratum 1217
lanatum ib.
luteo-album 1215
margaritaceum 1216
maritimum 1214
milleflorum ib.
mucronatum ib.
muricatum 1213
norwegicum 1217
nudifolium 1215
nudum 1217
obtusifolium 1216
Oculus cati 1217
odoratissimum 1215
orientale 1214
patulum ib.
pedunculare 1215
petiolatum 1214

Gnaphalium
pilosellum 1217
plantagineum 1216
purpureum ib.
radiatum 1217
repens 1214
rutilans 1215
sanguineum ib.
serratum 1214
silvaticum 1217
spicatum ib.
squarrosum 1216
stellatum ib.
Stoechas 1214
supinum 1217
tegetifolium 1213
tomentosum 1217
trinerve 1213
uliginosum 1217
umbellatum 1214
undatum 1213
undulatum 1215
uniflorum ib.
verticillatum 1217
Vira vira 1215

Gnetum 995, 1003
Gnemon 1003

Gnidia 600, 633
acerosa 633
capitata ib.
daphnæfolia ib.
filamentosa ib.
imbricata ib.
oppositifolia ib.
pinifolia ib.
polystachya ib.
radiata ib.
sericea ib.
simplex ib.
tomentosa ib.

GOMOZIA 219, 286
granadensis 286

Gomphrena 305, 455
arborescens 455
brasiliensis ib.
flava ib.
globosa ib.
hispida ib.
interrupta ib.
perennis ib.
serrata ib.
GONOCARPUS 218, 276
micranthus 276
GORDONIA 999, 1069
Lasianthus 1069
pubescens ib.
Gorteria 1165, 1262
Asteroides 1262
barbata ib.
cernua ib.
ciliaris ib.
echinata ib.
herbacea ib.
hispida ib.
personata ib.
ringens ib.
setosa ib.
spinosa ib.
squarrosa ib.
uniflora ib.
Gossypium 1000, 1059, 1060
arboreum 1059
barbadense ib.
eglandulosum ib.
herbaceum ib.
hirsutum ib.
indicum ib.
latifolium 1060
micranthum 1059
Gossypium
peruvianum 1059
religiosum ib.
rubrum ib.
vitifolium ib.
Gouania 304, 432
domingensis 432
Grangeria 771, 796
borbonica 796
Granularia 1487,
pisiformis ib.
Gratiola 19, 37, 38
acuminata 38
betonicifolia ib.
grandiflora ib.
hyssopioides 37
inæqualis 38
lobelioides ib.
Monnieria 37
officinalis ib.
oppositifolia 38
peruviana ib.
ramosa ib.
repens ib.
rotundifolia 37
virginiana 38
Greggia 774
aromatica ib.
Grewia 775, 817, 818
asiatica 818
Microcos ib.
occidentalis 817
orientalis 818
Grias 774, 814
cauliflora 814
Grielum 663, 733
tenuifolium 733
Griselinia 310, 493
lucida 493
Grislea 600, 612
secunda 612
Gronovia 303, 421
scandens 421
Grubbia 599, 629
capensis 629
Guajacum 656, 673, 674
dubium 674
officinale 673
sanctum ib.
Gualtheria 659, 697
antipoda 697
procumbens ib.
Guapira 522, 574
gujanensis 574
Guapurum 771, 793
peruvianum 793
GUAREA 600, 614
trichilioides 614
Guettarda 521, 566
elliptica 566
membranacea ib.
rugosa ib.
speciosa ib.
Gujera 656, 675
senegalensis 675
Guilandina 655, 672, 673
Bonduc 672
Bonducella 673
Nuga ib.
Gundelia 1167, 1281
Tournefortii 1281
Gunnera 22, 76
perpensa 76
GUSTAVIA 999, 1038
augusta 1038

Gymnanthes 995, 1005
elliptica 1005
lucida ib.
Gymnocarpos 304, 429
decandrus 429
Gynopogon 295, 430
Alyxia 430
scandens ib.
stellatus ib.
Gypsophila 661, 708, 709
ascendens 709
alpina ib.
altissima ib.
fastigiata ib.
muralis ib.
paniculata ib.
perfoliata 708
prostrata ib.
repens 709
rigida ib.
saxifraga ib.
Struthium ib.
viscosa ib.

Hæmanthus 523, 534
carinatus 534
coccineus ib.
pubescens ib.
puniceus ib.
Hæmatoxylon 656, 677
campechianum 677
Hagenia 598, 613
abyssinica 613
Halesia 740, 749
diptera 749
tetraptera ib.
Halleria 887, 943
lucida 943
Haloragis 603, 643
alata 643
prostrata ib.
Hamadryas 783, 876
magellanica 876
Hamamelis 218, 281, 282
androgyna 281
dioica 282
monoica ib.
Hamellia 299, 366
axillaris 366
chrysantha ib.
grandiflora ib.
patens ib.
ventricosa ib.
Hartogia 215, 278
capensis 278
Hasselquistia 309, 471
ægyptiaca 471
cordata ib.
Hebe 19, 27
magellanica 27
Hebenstreitia 887, 950, 951
ciliata 950
cordata ib.
dentata ib.
erinoides 951
fruticosa ib.
integrifolia 950
Hedera 302, 420, 421
Helix 420
nutans 421
pendula ib.
quinquefolia 420
Hedwigia 601, 614
balsamifera 614
HEDYCARIA 781, 862
dentata 862
Hedycrea 304, 428
incana 428
Hedychium 1, 9
coronarium 9
Hedyosmum 772, 826
arborescens 826
nutans ib.
Hedyotis 213, 232
americana 232
Auricularia ib.
fruticosa ib.
graminifolia ib.
herbacea ib.
hispida ib.
maritima ib.
pumila ib.
rupestris ib.
umbellata ib.
Hedysarum 1075, 1077, 1121-1127
ascendens 1124
Alhagi 1122
alpinum 1126
argenteum 1125
axillare 1124
barbatum 1123
biarticulatum ib.
bupleurifolium 1122
canadense 1123
canescens 1125
canum 1124
Caput galli 1126
caudatum 1123
cornutum 1126
coronarium ib.

Hedysarum
crinitum 1126
Crista galli ib.
diphyllum 1122
distortum 1125
flexuosum 1126
frutescens 1124
gangeticum 1122
glumaceum 1121
gramineum ib.
grandiflorum 1125
gujanense ib.
gyrans ib.
heterocarpon 1123
hirsutum 1122
hirtum 1124
humile 1126
imbricatum 1122
immaculatum 1127
incanum 1126
junceum 1125
lagopodioides 1123
lappaceum 1125
latebrosum 1122
lineatum 1123
maculatum 1122
marilandicum 1124
microphyllum ib.
moniliferum 1122
nudiflorum 1123
numularifolium 1122
obscurum 1127
Onobrychis 1126
paniculatum 1125
pictum 1127
pilosum 1124
pulchellum 1123
pumilum 1126
racemiferum 1125
racemosum 1123
reniforme 1122
repens 1125
retroflexum 1123
saxatile 1126

Hedysarum
Scorpiurus 1123
sericeum 1125
serotinum 1122
spartium 1126
spinosissimum ib.
spirale 1124
striatum 1123
strobiliferum 1122
styracifolium ib.
supinum 1124
tomentosum 1125
tortuosum 1124
triangulare ib.
triflorum 1125
trigonum 1126
triquetrum 1122
umbellatum 1123
vaginale 1126
vespertilionis 1122
violaceum 1124
virgatum 1125
virginicum 1126
viridiflorum 1125
viscidum 1123
volubile 1124

Heinzia 599, 609
peregrina 609

Heisteria 658, 686
coccinea 686

Helenium 1164, 1244
aestivale 1244
auctumnale ib.
pubescens ib.
serotinum ib.
vernale ib.

Helianthus 1165, 1258 sq.
altissimus 1258

Helianthus
angustifolius 1259
annuus 1258
atro-rubens ib.
decapetalus ib.
divaricatus ib.
frondosus ib.
giganteus 1259
indicus 1258
laevis 1259
multiflorus 1258
strumosus 1259
thurifer ib.
tuberosus 1258

Heliconia 303, 423
alba 423
Bihai ib.
hirsuta ib.
psittacorum ib.
Strelizia ib.

Helicteras 662, 727
angustifolia 727
apetala ib.
baruensis ib.
carthagenensis ib.
Isora ib.
pentandra ib.

Heliocarpus 742, 755
americana 755

Heliophila 968, 985, 986
amplexicaulis 985
circaeoides ib.
coronopifolia 986
digitata ib.
filiformis ib.
flava ib.
integrifolia 985

Heliophila
pinnata 986
pusilla ib.

Heliotropium 291, 314, 315
bacciferum 314
coromandelianum ib.
curassavicum ib.
europæum ib.
fruticosum ib.
gnaphalodes 315
hispidum 314
indicum ib.
inundatum ib.
lineatum ib.
malabaricum ib.
marifolium ib.
orientale 315
ovalifolium 314
parviflorum ib.
peruvianum ib.
scabrum ib.
supinum ib.

Helleborus 782, 882
fœtidus 882
hiemalis ib.
niger ib.
trifolius ib.
viridis ib.

Helonias 527, 589
asphodeloides 589
bullata ib.
pumila ib.

Helotium 1287, 1442
agaricoides 1442
aureum ib.
cucullatum ib.
glabrum ib.
hirsutum ib.
unciuosum ib.

Helvella 1285, 1249-1251
æruginosa 1450
atra ib.
atrata 1451
brunnea 1450
caliciformis ib.
cerasina ib.
ciliaris ib.
clavata ib.
cochleata ib.
coccinea 1451
fuliginosa 1449
gelatinosa ib.
hispida 1450
horizontalis ib.
lilacea 1450
mesenterica 1451
Mitra 1450
pallida 1451
pezizoides 1449
revoluta ib.
sulcata 1450
tremellina 1451
versicolor 1450

Hemerocallis 525, 565
cordata 565
flava ib.
fulva ib.
japonica ib.

HEMIMERIS 889, 939
diffusa 939
montana ib.
sabulosa ib.

Hemionitis 1283, 1300
japonica 1300
lanceolata ib.
lineata ib.
palmata ib.

Hemionitis
parasitica 1300
reticulata ib.

Hepetis 522, 531
angustifolia 531

Heracleum 308, 480
alpinum 480
angustifolium ib.
austriacum ib.
longifolium ib.
Panaces ib.
pumilum ib.
sibiricum ib.
Sphondylium ib.
tuberosum ib.

Heritiera 81, 113
tinctorum 113

Hermannia 996, 1009-1011
alnifolia 1011
althæifolia 1009
biserrata 1010
candicans ib.
capensis 1011
ciliaris 1010
denudata ib.
diffusa 1011
filifolia ib.
glabrata 1010
grossularifolia ib.
hyssopifolia ib.
incana ib.
involucrata ib.
lavandulifolia ib.
linifolia 1011
odorata 1010
plicata ib.
procumbens 1011
pulchella ib.
salvifolia 1010
scabra ib.
trifoliata 1011

Hermannia
trifurca 1010
triphylla 1011
vesicaria ib.
HERMAS 308, 465
capitata 465
ciliata ib.
depauperata ib.
gigantea ib.
quinquedentata ib.
Hernandia 83, 95
gujanensis 95
ovigera ib.
sonora ib.
Herniaria 306, 448
fruticosa 448
glabra ib.
hirsuta ib.
lenticulata ib.
Payco ib.
Hesperis 967, 986
acris 985
africana ib.
inodora ib.
lacera ib.
matronalis ib.
tatarica ib.
tristis ib.
verna ib.
Heuchera 307, 459
americana 459
dichotoma ib.
Heymassoli 599, 629
inermis 629
spinosa ib.
Hibiscus 1000, 1062-1067
Abelmoschus 1066
aculeatus 1067
acuminatus 1062
æthiopicus 1064

Hibiscus
arenarius 1067
bifurcatus 1063
brasiliensis 1066
calyphyllus 1067
cannabinus 1063
clypeatus 1066
columnaris ib.
cordifolius 1065
digitatus 1063
diversifolius ib.
domingensis ib.
elatus 1066
esculentus ib.
ferrugineus 1065
ficulneus 1063
flavescens 1066
fraternus 1067
gujanensis ib.
hastatus 1062
hirtus 1064
hispidulus 1067
lævis 1062
Lampas 1064
lasiocarpus 1065
liliflorus 1064
Manihot 1067
membranaceus 1065
micans 1066
micranthus 1064
microphyllus ib.
militaris 1071
Moscheutos 1065
mutabilis 1066
ovalifolius 1064
ovatus 1062
palmatus 1066
palustris 1065
pedunculatus 1066
pentacarpos 1062
phœniceus 1065
populneus 1064
præcox 1067
purpureus ib.

Hibiscus
radiatus 1063
rhombifolius 1064
rigidus ib.
Rosa sinensis 1065
Sabdariffa 1066
senegalensis 1065
sinuatus 1063
sororius 1065
speciosus 1063
spicatus 1066
striatus 1062
surattensis 1063
syriacus 1066
ternatus 1067
tiliaceus 1063
tricuspis 1064
trilobatus 1067
trilobus 1063
Trionum 1067
tripartitus ib.
tubulosus 1065
unilateralis ib.
urens ib.
vesicarius 1067
virginicus 1062
vitifolius ib.
Hieracium 1161, 1176-1179
alpestre 1175
alpinum ib.
amplexicaule 1178
aurantiacum 1177
Auricula 1176
aurimontanum 1178
austriacum ib.
blattarioides ib.
capense 1176
cerinthoides 1178
chondrilloides ib.
cymosum 1177
dichotomum 1179
dubium 1176

Hieracium
echioides 1177
flexuosum 1179
glutinosum ib.
Gmelini 1177
Gronovii ib.
helveticum 1178
hispidum 1177
humile ib.
incanum 1176
incarnatum 1177
Kalmii ib.
lactucaceum ib.
lyratum 1178
molle 1179
murorum 1178
paludosum ib.
paniculatum ib.
Pilosella 1176
pilosum 1178
pontanum 1177
porrifolium 1178
præmorsum 1176
pumilum ib.
pyrenaicum 1178
rhomboidale 1179
sabaudum 1177
sanctum ib.
Sprengerianum 1178
squamosum 1179
staticefolium 1177
stipitatum ib.
taraxaconis 1176
umbellatum 1179
undulatum 1178
venosum 1176
villosum 1178
virosum 1179
Hillia 522, 576
longiflora 576
tetrandra ib.
HIPPIA 1166, 1277
frutescens 1277
HIPPIA
integrifolia 1277
minuta ib.
Hippocratea 82, 107
comosa 107
volubilis ib.
Hippocrepis 1075, 1078, 1119
baleurica 1119
comosa ib.
multisiliquosa ib.
unisiliquosa ib.
Hippomane 995, 1003
biglandulosa 1003
Mancinella ib.
spinosa ib.
Hippomanica 656, 674
sessilifolia 674
Hippophae 218, 274
canadensis 274
rhemnoides ib.
Hippuris 2, 16
lanceolata 16
tetraphylla ib.
vulgaris ib.
Hiræa 662, 725
reclinata 725
Hirtella 301, 418, 419
americana 418
paniculata 419
Hoffmannia 213, 245
pedunculata 245
Hoitzia 294, 347
mexicana 347
Holcus 87, 172-174
Arduini 174
avenaceus 173
biaristatus 172
bicolor 173
Holcus
cafer 174
Dochna 173
Durra ib.
exiguus ib.
halepensis ib.
lanatus ib.
latifolius 172
laxus 173
mollis ib.
niger 174
odoratus 172
pertusus 173
racemosus ib.
saccharatus ib.
serratus ib.
Sorghum ib.
spicatus ib.
striatus ib.
Taff 174
Holosteum 90, 207
cordatum 207
diandrum ib.
hirsutum ib.
succulentum ib.
umbellatum ib.
Homalium 778, 836
racemosum 836
Rocoubea ib.
Honkenya 599, 609
Willdenovii 609
Hopea 1149, 1155
tinctoria 1155
Hordeum 88, 198, 199
bulbosum 199
distichon 198
geniculatum 199
hexastichon 198
imrinum 199
jubatum ib.
maritimum ib.

Hordeum
montanum 199
murinum *ib.*
nodosum *ib.*
perversum *ib.*
pratense *ib.*
secalinum *ib.*
vulgare 198
Zeocrithon 199
Horminum 886, 916
pyrenaicum 916
HORTENSIA 662, 722
japonica 722
Hottonia 293, 329
indica 329
palustris *ib.*
Houstonia 214, 236
cærulea 236
longifolia *ib.*
purpurea *ib.*
pusilla *ib.*
Houttuynia 782, 883
cordata 883
HOVENIA 301, 410
dulcis 410
Hudsonia 740, 751
ericoides 751
Hugonia 998, 1014
Mystax 1014
tomentosa *ib.*
Humulus 305, 451
Lupulus 451
Hura 999, 1035
crepitans 1035
Hyacinthus 525, 560, 561
amethystinus 560
botryoides *ib.*
Hyacinthus
cernuus 560
comosus 561
convallarioides 560
corymbosus *ib.*
lanatus 561
monstruosus 560
Muscari *ib.*
non scriptus *ib.*
orientalis *ib.*
racemosus *ib.*
revolutus *ib.*
romanus *ib.*
Hydnum 1285, 1438-1440
agaricoides 1439
Auriscalpium *ib.*
Barba Jovis 1440
candidum 1439
carnosum 1438
carolinianum 1440
clandestinum 1439
clathroides 1440
coralloides 1438
cyathiforme 1439
Erinaceus *ib.*
floriforme *ib.*
gelatinosum *ib.*
hybridum *ib.*
hystricinum 1440
imbricatum 1438
mucidum 1440
Occarium 1439
ochraceum 1440
papyraceum *ib.*
parasiticum 1439
pectiniforme *ib.*
repandum 1438
resupinatum 1439
rubicundum *ib.*
sericeum *ib.*
stalacticum 1440
suberosum 1439
Hydnum
subiamellosum 1438
tomentosum *ib.*
zonatum *ib.*
Hydrangea 661, 703
arborescens 703
Hydrastis 782, 888
canadensis 883
Hydrocharis 648, 654
Morsus ranæ 654
Hydrocotyle 308, 467, 468
americana 467
asiatica *ib.*
bidentata 468
cordata *ib.*
erecta *ib.*
glabrata *ib.*
hirsuta 467
moschata *ib.*
natans *ib.*
ranunculoides 468
reniformis *ib.*
sinensis *ib.*
Solandra *ib.*
umbellata 467
villosa 468
virgata *ib.*
vulgaris 467
Hydrolea 307, 458
quadrivalvis 458
spinosa *ib.*
trigyna *ib.*
Hydrophora 1486
minima *ib.*
stercorea *ib.*
tenella *ib.*
HYDROPHYLAX 213, 260
maritima 260

Hydrophyllum 292, 330
canadenſe 330
virginicum ib.
Hymenæa 655, 667
Courbarit 667
HYOBANCHE 891, 955
ſanguinea 955
Hyoſcyamus 293, 379, 380
albus 379
aureus ib.
Datora ib.
muticus ib.
niger ib.
phyſaloides ib.
puſillus ib.
reticulatus ib.
Scopolia 380
Hyoſeris 1162, 1181-1182
caliculata 1182
caroliniana ib.
cretica ib.
fœtida 1181
Hedypnois 1182
lucida ib.
major ib.
minima ib.
minor ib.
pygmæa ib.
radiata 1185
rhagadioloides 1182
ſcabra ib.
virginica ib.
Hypecoum 218, 285
erectum 285
littorale ib.
pendulum ib.
procumbens ib.
Hypelate 598, 613
trifoliata 613
Hyperanthera 301, 408
arborea 408
Hypericon 1130, 1156-1170
ægyptium 1158
Androſæmum 1157
arboreum 1156
Aſcyron ib.
bacciferum ib.
balearicum ib.
barbatum 1160
Brathys 1156
calicinum ib.
campanulatum 1160
canadenſe 1158
canarienſe 1157
cayanenſe 1156
Coris 1160
criſpum 1158
denticulatum 1160
elatum 1157
elodes 1159
erectum ib.
ericoides 1158
floribundum 1157
folioſum ib.
glanduloſum ib.
gramineum 1158
gujanenſe 1156
guineenſe ib.
hircinum 1157
hirſutum 1160
humifuſum 1158
japonicum ib.
Kalmianum 1156
lævigatum 1158
latifolium 1156
linarifolium 1158
maculatum 1160
mexicanum 1158
Hypericon
monogynum 1160
montanum 1158
mutilum 1160
nudicaule ib.
numularium ib.
olympicum 1157
orientale ib.
patulum 1156
perfoliatum 1158
perforatum ib.
petiolatum 1157
piloſum 1160
prolificum 1157
pulchrum 1160
pyramidatum 1157
quadrangulare 1158
quinquenervium 1160
reflexum 1157
repens ib.
revolutum 1160
ſcabrum 1158
ſeſſilifolium 1156
ſetoſum 1160
ſinenſe 1157
tomentoſum 1160
tubuloſum ib.
virginicum 1158
Walteri 1160
Hypnum 1284, 1338-1347
abietinum 1343
acacioides 1339
adiantoides ib.
aduncum 1340
albens 1343
albicans 1341
alopecurum 1344
aſplenioides 1339
atrovirens 1346
attenuatum 1341
bryoides 1339
capillare 1345

Hypnum
cespitosum 1345
chrysocomum 1347
cirrhosum 1346
clavellatum *ib.*
complanatum 1341
compositum 1345
compressum 1343
congestum 1346
crispatum 1340
crispum *ib.*
Crista castrensis 1343
cupressiforme *ib.*
curtipendulum 1340
cuspidatum 1345
cylindricum 1347
delicatulum 1343
dendroides 1340
densum 1344
denticulatum 1339
depressum 1345
diaphanum 1342
Dicksoni *ib.*
fasciculatum 1344
filamentosum 1347
filicinum 1343
filicoides 1340
filifolium 1341
filiforme 1340
flagellare 1341
flagellatum 1346
flexile 1344
fluitans 1342
fulgens *ib.*
gracellum 1343
gracile 1346
Halleri *ib.*
heteromallum 1340
jamaicense 1341
illecebrum 1345
intricatum 1343
julaceum 1346
loreum 1344
lucens 1342

Hypnum
lutescens 1342
medium 1347
microphyllum 1345
molle 1347
myosuroides 1341
myosuron 1346
nigrescens 1344
nitens 1346
ornithopodioides 1339
palmatum *ib.*
palustre 1341
parietinum 1343
patulum 1344
pennatum 1340
piliferum 1342
plumosum 1343
polycarpon 1339
polypodioides *ib.*
polytrichoides 1345
prælongum 1343
proliferum *ib.*
prolixum 1347
pulchellum *ib.*
pumilum 1341
pungens 1346
purum 1345
reptans 1344
riparium 1345
rotundifolium 1346
rugosum 1342
ruscifolium *ib.*
Rutabulum 1347
Schreberi 1344
sciuroides 1339
scorpioides 1344
semicompletum 1339
sericeum 1340
serpens 1341
setaceum *ib.*
silvaticum 1342
Smithii 1347
spiniforme 1338

Hypnum
squamosum 1344
stramineum 1342
striatum *ib.*
strumosum 1339
tamarisci 1344
taxifolium 1339
tetragonum 1345
tomentosum 1345
torquatum 1346
trichomanoides 1341
trichophyllum 1345
triquetrum 1342
undulatum *ib.*
velutinum 1345
viticulosum 1340

Hypochœris 1161, 1183
glabra 1183
helvetica *ib.*
maculata *ib.*
minima *ib.*
radicata *ib.*

Hypoxis 324, 548, 549
alba 548
aquatica *ib.*
decumbens *ib.*
erecta *ib.*
fascicularis *ib.*
minuta *ib.*
ovata *ib.*
plicata *ib.*
serrata *ib.*
sessilis *ib.*
spicata *ib.*
stellata *ib.*
villosa 549
violacea *ib.*

Hyptis 886, 898
capitata 898

Hyssopus 885, 898
Lophantus 898
nepetoides ib.
officinalis ib.
Hysterium 1287, 1480
coeruleum 1480
candidum ib.

Jaborosa 295, 380
bonariensis 380
Jacquinia 295, 390
armillaris 390
linearis ib.
ruscifolia ib.
venosa ib.
Jambolifera 600, 613
pedunculata 613
Jasione 303, 373
capensis 373
montana ib.
Jasminum 19, 24
azoricum 24
didymum ib.
fruticans ib.
grandiflorum ib.
humile ib.
oblongum ib.
odoratissimum ib.
officinale ib.
simplicifolium ib.
Jatropha 998, 1026, 1027
Curcas 1027
glandulosa ib.
glauca ib.
gossypifolia ib.
herbacea ib.
Janipha ib.
Jatropha
Manihot 1027
moluccana 1026
multifida 1027
spinosa ib.
urens ib.
variegata ib.
Iberis 967, 975, 976
amara 975
arabica ib.
capnifolia ib.
gibraltarica ib.
linifolia 976
nudicaulis ib.
odorata ib.
pinnata ib.
rotundifolia 975
saxatilis ib.
semperflorens ib.
sempervirens ib.
umbellata 976
Icica 600, 619
Acuchini 619
altissima ib.
decandra ib.
gujanensis ib.
heptaphylla ib.
IGNATIA 294, 388
amara 388
Ilex 220, 287, 288
Aquifolium 287
asiatica ib.
Cassine ib.
cuneifolia ib.
Dahoon ib.
decidua 288
emarginata 287
japonica ib.
integra ib.
latifolia ib.
myrtifolia 288
opaca 287
Perado ib.
Ilex
rotunda 287
serrata ib.
Illecebrum 304, 426, 427
Achyrantha 427
alsinefolium ib.
arabicum ib.
aristatum 426
benghalense 427
brachiatum 426
canariense ib.
capitatum 427
cymosum 426
echinatum 427
ficoideum ib.
frutescens 426
javanicum ib.
lanatum ib.
Monsoniae ib.
Paronychia 427
polygonifolium ib.
polygonoides ib.
sanguinolentum 426
sessile 427
suffruticosum 426
vermiculatum 427
verticillatum ib.
Illicium 783, 867
anisatum 867
floridanum ib.
Imbricaria 600, 612
borbonica 612
Impatiens 301, 415
Balsamina 415
biflora ib.
cornuta ib.
latifolia ib.
Noli tangere ib.
oppositifolia ib.
rosmarinifolia ib.

Impatiens
sinensis 415
triflora ib.
Imperatoria 309, 488
Ostrutium 488
Indigofera 1075, 1078, 1127-1129
amœna 1127
angustifolia 1129
Anil ib.
argenteum ib.
candicans 1127
caroliniana 1129
cytisoides 1128
dendroides 1129
denudata 1128
digitata ib.
disperma 1129
enneaphylla 1128
filiformis ib.
fragrans ib.
frutescens ib.
glabra ib.
hendecaphylla 1129
hirsuta ib.
linifolia 1127
mexicana ib.
oblongifolia ib.
ovata ib.
pentaphylla 1128
procumbens ib.
psoraloides 1127
sarmentosa ib.
semitrijuga 1128
sericea 1127
spicata 1128
spinosa 1127
stricta 1129
tinctoria 1128
trifoliata 1127
trita 1128
INOCARPUS 659, 698
edulis 698
Inula 1164, 1240-42
æstuans 1242
arabica 1240
aromatica 1242
bifrons 1241
Britannica ib.
Budonium ib.
cærulea 1240
chrysocomoides 1241
crithmifolia 1242
dubia 1240
dysenterica 1241
ensifolia 1242
fœtida 1241
germanica ib.
Helenium 1240
hirta 1241
japonica ib.
indica ib.
mariana ib.
montana ib.
Oculus Christi 1240
odora ib.
pinifolia 1242
provincialis 1240
Pulicaria 1241
salicina ib.
spiralifolia 1240
squarrosa ib.
suaveolens 1241
undulata ib.
Ioncquetia 663, 728
gujanensis 728
Ipomœa 294, 345-347
angustifolia 346
aquatica 345
biloba ib.
Bona nox 346
Ipomœa
campanulata 346
carnea ib.
carolina 345
coccinea 346
digitata 345
filiformis 346
glaucifolia ib.
hastata ib.
hederacea ib.
hederifolia 345
hepaticifolia 346
lacunosa ib.
leucantha 345
luteola 346
palmata 345
paniculata 346
pentaphylla 347
Pes tigridis ib.
Quamoclit 345
repanda 346
rubra 345
scabra ib.
solanifolia 346
stolonifera 345
tamnifolia 347
triflora 345
triloba ib.
tuberosa ib.
umbellata ib.
verticillata 346
violacea ib.
Iresine 307, 463
Celosia 463
Iris 81, 113-116
alata 115
angusta ib.
aphylla 114
biflora 113
bituminosa 116
ciliata 113
compressa 114
crispa 116

Iris
cristata 113
dichotoma 114
edulis 116
flavissima 114
flexuosa ib.
florentina 113
fœtida 115
germanica 114
graminea 116
Güldenstædti 115
halophila ib.
hexagona 114
juncea 116
lurida 114
martinicensis 116
minuta 113
ochroleuca 115
papilionacea 116
pavonia ib.
persica 115
plumaria 114
polystachia 116
Pseudacorus 115
pumila 113
ramosa 115
sambucina 114
setacea 115
sibirica 116
Sisyrinchium 115
spathacea ib.
spuria 116
squalens 114
susiana 113
tenuifolia 116
tricuspis 114
tripetala ib.
tristis 116
tuberosa ib.
unguicularis 115
variegata 114
ventricosa 115
versicolor ib.
verna ib.

Iris
viscaria 116
Xiphium 114
Isatis 968, 992
ægyptia 992
aleppica ib.
armena ib.
lusitanica ib.
pinnata ib.
tinctoria ib.
Ischæmum 87, 177
aristatum 177
glabrum ib.
involutum ib.
murinum ib.
muticum ib.
scariosum ib.
secundatum ib.
Isertia 521, 567
coccinea 567
Isnardia 218, 265
palustris 265
Isoetes 1284, 1322
coromandeliana 1322
lacustris ib.
Isopyrum 782, 881, 882
aquilegioides 882
fumarioides 881
thalictroides 882
Itea 302, 411
virginica 411
Juglans 742, 755
alba 755
angustifolia ib.
baccata ib.
cinerea ib.
glabra ib.
nigra ib.

Juglans
Pacan 755
regia ib.
Juncus 526, 571-573
acutus 571
alpinus 572
aquaticus 571
biglumis 572
bufonius ib.
bulbosus ib.
campestris 573
conglomeratus 571
effusus ib.
filiformis ib.
gracilis ib.
grandiflorus 572
Jacquini ib.
inflexus 571
luteus 573
luzulinus 572
maximus ib.
niveus 573
nodosus 571
pediformis 572
pilosus ib.
punctorius 571
serratus 573
silvativus 571
spadiceus 572
spicatus 573
spinosus ib.
squarrosus 571
stygius 572
subulatus 573
subverticillatus 572
supinus ib.
Tenageia ib.
trifidus 571
triglumis ib.
uliginosus ib.
Jungermannia 1285, 1347-1353
adiantoides 1348
albi-

Jungermannia
albicans 1350
alpina 1352
angulosa 1348
aquatica 1349
asplenioides 1347
atrata 1351
barbata 1350
bicornis 1348
bicuspidata 1349
bidentata 1348
bifaria 1352
bipinnata 1353
brachiata 1351
capillaris 1350
ciliaris 1351
cinerea 1352
cochleariformis 1350
complanata 1351
connata 1349
cristata 1348
cupressina 1350
curvifolia 1352
dichotoma 1353
diffusa 1351
dilatata ib.
emarginata 1348
epiphylla 1353
filicina 1351
filiformis ib.
flava ib.
fucoidea 1353
furcata ib.
globulifera 1348
javanica ib.
julacea 1352
juniperina 1350
lanceolata 1348
linearis 1353
macrorhiza 1349, 1353
minuta 1349
multifida 1353
multiflora 1350
nemorosa ib.

Jungermannia
pallens 1349
pauciflora ib.
perfoliata 1348
pinguis 1353
platyphylla 1351
polyanthos 1348
polyphylla 1353
prostrata 1348
pulcherrima 1352
pusilla ib.
pygmæa ib.
quadridentata 1349
quinquedentata ib.
reptans 1350
resupinata ib.
rupestris 1352
scalaris 1348
serrulata 1350
sertularioides 1352
setiformis 1349
simplex 1350
sinuata 1353
sphærocephala 1349
sphagni 1348
spinulosa 1349
stolonifera 1351
tamariscifolia ib.
tenera 1349
tomentosa 1352
transversalis 1351
trichophylla 1352
trilobata 1350
undulata ib.
vaginata 1352
varia ib.
ventricosa 1349
viticulosa 1348

Junghansia 212, 259
saginea 259

JUNGIA 1167-1281
ferruginea 1281

Juniperus 995, 1005
barbadensis 1005
bermudiana ib.
caroliniana ib.
communis ib.
lycia ib.
Oxycedrus ib.
phœnicea ib.
Sabina ib.
sinensis ib.
thurifera ib.
virginiana ib.

Jussieua 658, 686
diffusa 686
edulis ib.
erecta ib.
inclinata ib.
peruviana ib.
pubescens ib.
repens ib.
suffruticosa ib.
tenella ib.

Justicia 20, 32-35
acaulis 34
acicularis 33
Adhatoda 32
armata 33
assurgens 34
Betonica 32
bivalvis 35
bracteolata 33
cærulea ib.
carthaginensis 34
ciliaris ib.
coccinea 35
Ecbolium 32
echioides 34
fastuosa 33
fœtida ib.
Grandarussa ib.
gangetica 35
hyssopifolia 33

Justicia
japonica 35
infundibuliformis 32
lanceata 33
longifolia ib.
madurensis 34
moretiana 35
nasuta 34
nemorosa 35
nitida 33
nutans 35
orchioides 33
paniculata 34
parviflora 35
pectinata 34
picta 32
procumbens 34
pulcherrima 32
purpurea 35
repanda 33
repens 34
scorpioides 32
sexangularis 34
sinensis ib.
spinosa 32
tranquebarensis 33
triflora 34
trispinosa 32
variegata 33
verticillaris ib.
viridis 34

Iva 305, 463
annua 463
frutescens ib.
imbricata ib.
monophylla ib.

Ixia 82, 108-110
aristata 109
aulica ib.
bulbifera 109
Bulbocodium 108
capillaris 109

Ixia
cinnamomea 109
corymbosa ib.
crispa ib.
crocata 110
deusta 109
erecta ib.
excisa 110
falcata ib.
fenestrata ib.
fruticosa 108
hirta ib.
humilis ib.
Lancea 110
Lapeironsia 108
linearis 109
maculata ib.
minuta 108
patens 109
pendula ib.
pentandra 110
pilosa 108
polystachya 110
purpurea ib.
rubra cyanea 108
scyllaris 109
secunda 108
setacea 109
squalida ib.
villosa 108
villosula 110

Ixora 212, 243
alba 243
alternifolia ib.
americana ib.
coccinea ib.
fasciculata ib.
multiflora ib.

Kæmpferia 1, 8, 9
Galanga 8
purpurea 9
rotunda 8

Kalmia 659, 693
angustifolia 693
glauca ib.
hirsuta ib.
latifolia ib.
polifolia ib.

Kiggelaria 663, 727
africana 727
integrifolia ib.

Kirganella 996, 1008
virginea 1008

Kleinhovia 656, 683
Hospita 683

Knautia 210, 231
orientalis 231
palæstina ib.
plumosa ib.
propontica ib.

Knoxia 214, 236
stricta 236
zeylanica ib.

Kœnigia 89, 207
islandica 207

Krameria 278
Ixina ib.

Kraschenninikofia 218, 274
latens 274

Kuhnia 292, 375
eupatorioides 375
pinnata ib.

KYLLINGA 84, 122
filiformis 122
monocephala ib.
punicea ib.
sumatrensis ib.
triceps ib.
umbellata ib.

Kyrtandra 20, 37
ciflora 37
cymosa ib.
Kyrtanthus 298, 362
longiflorus 362

Labatia 212, 250
sessiliflora 250
Lachenalia 522, 532
contaminata 532
mediana ib.
orchioides ib.
orthopetala ib.
pallida ib.
pendula ib.
pustulata ib.
tricolor ib.
Lachnæa 602, 635
conglomerata 635
eriocephala ib.
Lacis 777, 834
fluviatilis 834
Lacistema 3, 16
myricoides 16
Lactuca 1161, 1172
canadensis 1172
caroliniana ib.
decorticata ib.
flava ib.
indica ib.
inermis ib.
intybacea ib.
perennis ib.
quercina ib.
sativa ib.
Scariola ib.
sinuata ib.
tuberosa ib.
virosa ib.
Laëtia 772, 816
apetala 816
Laëtia
completa 816
Guidonia ib.
Thamnia ib.
Lagerstrœmia 776, 821
indica 821
Lagœcia 303, 422
cuminoides 422
Laguna 1000, 1039
aculeata 1039
Lagurus 87, 194
cylindricus 194
ovatus ib.
Lamium 885, 904, 905
album 904
bifidum ib.
garganicum ib.
lævigatum ib.
maculatum ib.
molle 905
multifidum ib.
Orvala 904
purpureum 905
rugosum 904
Lantana 888, 945, 946
aculeata 945
africana 946
annua 945
Camara ib.
involucrata 946
melissæfolia 945
mista ib.
odorata 946
Radula 945
salvifolia ib.
scabrida ib.
stricta ib.
trifolia 946
viburnoides ib.
Lapsana 1162, 1183
communis 1183
Kœlpinia ib.
Rhagadiolus ib.
stellata ib.
taraxaconoides ib.
Zacintha ib.
Laserpitium 308, 479, 480
Aciphylla 480
angustifolium 479
aquilegifolium ib.
Chironium 480
dauricum 479
ferulaceum 480
gallicum 479
Halleri ib.
latifolium ib.
peucedanoides ib.
prutenicum ib.
silaifolium ib.
Siler ib.
simplex 480
trilobum 479
Lasiostoma 211, 248
Rouhamon 248
Latania 999, 1035
Commersoni 1035
Lathræa 887, 924, 925
Anblatum 924
Clandestina ib.
Phelypæa ib.
quinquefida ib.
Squamaria 925
Lathyrus 1075, 1077, 1109, 1110
amphicarpos 1109
angulatus ib.
annuus ib.
Aphaca ib.

Lathyrus
articulatus 1109
Cicer ib.
Clymenum 1110
heterophyllus ib.
hirsutus ib.
inconspicuus 1109
latifolius 1110
Nissolii 1109
odoratus ib.
palustris 1110
pisiformis ib.
pratensis ib.
sativus 1109
setifolius ib.
silvestris 1110
sphæricus 1109
tingitanus 1110
tomentosus 1109
tuberosus 1110

Laugeria 295, 395
lucida 395
odorata ib.
tomentosa ib.

Laurembergia 219, 284
capensis 284

Laurus 647, 649-651
æstivalis 650
Benzoin ib.
Borbonia 651
Camphora 650
Cassia 649
caustica 651
Chloroxylon 649
Cinnamomum ib.
coriacea 650
Culilaban 649
exaltata 650
floribunda 651
fœtens ib.

Laurus
geniculata 650
glauca ib.
indica 651
Leucoxylon ib.
lucida ib.
martinicensis 650
melissæfolia ib.
membranacea ib.
montana ib.
nobilis ib.
patens 651
pedunculata 650
pendula ib.
Persea ib.
Sassafras 651
sumatrensis 650
triandra 651
umbellata ib.

Lavandula 885, 900, 901
carnosa 901
dentata 900
multifida ib.
pinnata ib.
Spica ib.
Stœchas ib.
viridis ib.

Lavatera 1002, 1057, 1058
africana 1057
americana ib.
arborea ib.
cretica ib.
lusitanica ib.
maritima ib.
micans ib.
olbia ib.
thuringiaca ib.
triloba ib.
trimestris 1058

Lawsonia 599, 619
Acronychia 619

Lawsonia
inermis 619
spinosa ib.

Leæba 521, 567
dubia 567

Lechea 89, 209
juncifolia 209
major ib.
minor ib.

Lecythis 776, 818, 819
amara 818
grandiflora ib.
Idatimon 819
lutea ib.
minor ib.
Ollaria 818
parviflora ib.
Zabucajo 819

Ledum 658, 693, 694
groenlandicum 694
latifolium ib.
palustre 693

Leea 299, 405
æquata 405
crispa ib.

Leersia 526, 578
hexandra 578
monandra ib.

Legnotis 775, 817
Cassipurea 817
elliptica ib.

Lemna 22, 70
arhiza 70
gibba ib.
minor ib.
polyrhiza ib.
trisulca ib.

Lemniscia 775, 817
gujanensis 817

Leontice 523, 556
altaica 556
Chrysogonum ib.
leontopetaloides ib.
Leontopetalum ib.
thalictroides ib.
vesicaria ib.

Leontodon 1161, 1174-1176
alpinus 1175
asper ib.
aureus ib.
autumnalis ib.
bulbosus ib.
carolinianus ib.
croceus ib.
danubialis 1176
Hastile 1175
hirtus ib.
hispidus ib.
megalorhizos ib.
mucronatus ib.
officinalis ib.
Taraxacon 1175
tomentosus ib.
tuberosus ib.

Leonurus 885, 909
Cardiaca 909
crispus ib.
Marrubiastrum ib.
sibiricus ib.
tataricus ib.

Lepidium 967, 972, 973
alpinum 973
bonariense ib.
cardamines 972
chalepense ib.
didymum 973
divaricatum ib.
Draba 972

Lepidium
graminifolium 972
Iberis 973
latifolium 972
lyratum ib.
nudicaule 973
oleraceum ib.
perfoliatum 972
petræum ib.
Piscidium ib.
procumbens ib.
ruderale 973
sativum 972
spinosum ib.
subulatum ib.
suffruticosum ib.
vesicarium ib.
virginicum 973

LERCHEA 996, 1008
longicauda 1008

Leucojum 523, 534
æstivum 534
auctumnale ib.
vernum ib.

Leysera 1164, 1245 *sq.*
Callicarnia 1245
caroliniana 1246
gnaphalodes 1245
paleacea 1246

Lichen 1285, 1356-1379
Acetabulum 1365
aculeatus 1377
æruginosus 1362
aggregatus 1377
albescens 1364
albidus 1378
albo-ater 1359

Lichen
albo - cærulescens 1358
albo - flavescens 1368
albo - incarnatus 1362
albus 1356
ampullaceus 1370
androgynus 1361
angulosus ib.
angustatus 1368
antarcticus 1373
anthracinus 1375
antiquitatis 1356
aphthosus 1373
aquaticus ib.
arcticus ib.
articulatus 1379
ater 1363
atratus 1368
atro-albus 1360
atro-virens 1357
aurantiaco-ater 1379
aurantiacus 1364
badius 1362
barbatus 1378
betulinus 1360
bicolor 1379
botryoides 1356
botrytis 1376
Burgessii 1369
byssinus 1364
byssoides 1357
cæruleo - nigricans 1359
cærulescens 1363
cæsius 1365
calcareus 1359
calicaris 1370
candelaris 1361
candidus 1358, 1365
calvus 1360
canescens ib.
caninus 1373
canus 1364

Lichen

capensis 1379
caperatus 1371
capitatus 1357
carbonarius 1361
carnosus 1366
carpineus 1361
centrifugus 1366
ceratophyllus 1372
cerinus 1368
cespitosus 1377
chalybeiformis 1379
chrysophthalmos 1369
ciliaris ib.
ciliatus 1367
cinchonæ 1378
cinerascens 1359
cinereo-fuscus 1360, 1364
cinereus 1356
cinnabarinus 1365
circumscriptus 1360
citricolorus 1378
citrinus 1369
clausus 1362
cocciferus 1375
coccineus 1358
cochleatus 1371
Cocoës 1367
colliculosus 1359
concentricus ib.
confluens ib.
corallinus 1364
corniculatus 1373
coriiformis 1369
cornucopioides 1375
cornutus 1376
crassus 1365
crispus 1368
cristatus ib.
crocatus 1371
croceus 1374
cruentus 1363
cupularis ib.

Lichen

curcumatus 1256
damæcornis 1372
decipiens 1378
deformis 1375
deustus 1374
diaphanus 1372
Dicksoni 1363
diffusus 1367
digitatus 1375
dissectus 1372
divaricatus 1379
elegans 1361
elveliformis 1362
elveloides 1356
Endocarpon 1370
ericetorum 1357
erosus 1374
esculentus 1359
exasperatus 1374
excavatus 1362
fagineus 1360
Fahlunensis 1367
fallax 1371
farinaceus 1370
farinosus 1357
fascicularis 1369
ferrugineus 1357
ferruginosus 1360
filiformis 1375
Filix 1370
fimbriatus 1375
flammeus 1376
flavens 1372
flaveolus 1362
flavescens 1363
flavicans 1364
flavidus 1379
flavo-fuscus 1359
flavo-rubescens 1360
flavo-virescens 1360
flavus 1356
flocculosus 1375
floridus 1378

Lichen

fluviatilis 1373
foliaceus 1375
fragilis 1377
fraudulentus 1371
fraxineus 1370
fuciformis ib.
fucinus 1378
fucoides 1371
fugax 1369
fulgens 1364
fuliginosus 1374
fulvus 1362
fungiformis 1357
fungoides ib.
furcatus 1376
furfuraceus 1370
fusco-ater 1359
fusco-luteus 1363
fusco-rubens 1368
fuscus 1357
gelidus 13[illegible]1
geographicus 1357
gibbosus 13[illegible]3
glaucus 1371
globifer 1377
gossypinus 1362
gracilis 1375
gramineus 1356
graniformis 1359
granosus 1365
granulatus 1369
griseus 1361
guyanensis 1379
Hæmatomma 1361
hemisphæricus 1358
herbaceus 1368
hippotrichioides 1378
hirtus 1379
hispidus 1376
horizontalis 1373
jacobæifolius 1368
Jacquini 1374
japonicus 1371

Lichen
Icmadophila 1358
incanus 1356
Jolithus *ib.*
islandicus 1369
jubatus 1379
juniperinus 1371
lacerus 1372
laciniatus 1367
lacinioſus 1372
lacteus 1358
lanatus 1379
lanuginoſus 1367
laqueatus 1368
lentiger 1361
leucomelas 1370
leucophæus 1366
Linckii 1361
linearis 1370
lobatus 1372
lucidus 1365
luteolus 1368
lutereus 1359
luteſcens 1356
luteus 1363
madreporæformis 1373
marginellus 1372
marmoratus 1365
marmoreus 1363
melanocarpos 1377
melanoleucos 1365
melanoſtictos 1364
membranaceus 1371
meſentericus 1375
miniatus 1374
minutiſſimus 1364
muralis 1365
muſcicola 1378
muſcorum 1358
niger 1360
nigreſcens 1369
nivalis 1370

Lichen
abſcurus 1365
oculatus 1357
ocellatus 1361
ochrochlorus 1360
odoratus 1356
Œderi 1360
olivaceus 1367
omphalodes *ib.*
opuntioides 1369
orbicularis 1365
ornatus 1371
palleſcens 1363
pallidus *ib.*
pannoſus 1362
Papillaria 1377
paraſiticus 1357
Parellus 1364
parietinus 1368
paſcalis 1377
patellatus 1366
perforatus 1374
perlatus *ib.*
pertuſus 1358
petræus *ib.*
petroſus 1360
pezizoides 1364
phyſodes 1368
pictus 1366
pinaſtri 1371
plicatus 1378
plumbeus 1370
polydactylos 1373
polyphyllus 1374
polyrhizos *ib.*
proboſcideus *ib.*
prunaſtri 1371
pubeſcens 1379
pulchellus 1367
pulcher 1368
pullus 1367
pulmonarius 1370
pulpoſus 1372

Lichen
pulverulentus 1367
punctiformis 1358
puſtulatus 1374
putredinis 1356
pyxidatus 1375
quercifolius 1366
quercinus 1367
querneus 1358
quiſquiliaris 1377
radiatus 1376
radiciformis 1378
radioſus 1365
ramuloſus 1377
rangiferinus 1376
reſupinatus 1373
reticulatus 1379
rigidus 1366
rimoſus 1363
Roccella 1377
roridus 1372
roſaceus 1360
roſetus 1362
roſeus 1356
rubens *ib.*
ruſeſcens 1363
rufus 1357, 1373
rugoſus 1357
rupeſtris 1369
rupicola 1358
rutilus 1360
ſabuletorum 1358
ſaccatus 1374
ſalicinus 1363
ſanguinarius 1359
ſanguineo-ater 1362
ſarcoides 1374
ſaturninus 1371
ſaxatilis 1367
ſaxicola 1366
ſaxoſus 1378
ſcopulorum 1373
ſcriptus 1357

Lichen
ſcrupoſus 1362
ſemipinnatus 1372
ſepincola 1370
ſerratus 1372
Sertularia 1377
ſetoſus 1378
ſiliquoſus 1377
ſilvaticus 1373
ſimplex 1375
ſpadiceus 1377
ſpecioſus 1366
ſphæroides 1359
ſpinoſus 1376
ſquamatus 1366
ſquamoſus 1368
ſtellariformis 1367
ſtellaris ib.
ſtygius ib.
ſubfuſcus 1363
ſubimbricatus 1364
ſabulatus 1376
ſubuliformis ib.
ſubvireſcens 1378
ſulphureus 1359
tartareus 1362
tenax 1368
tenellus 1369
tenuiſſimus 1371
tiliaceus 1365
tinctorius 1370
tomentoſus 1372
Tremella 1369
tremelloides 1371
triſtis 1376
tuberculoſus 1357
uncialis 1376
upſalienſis 1364
urceolaris ib.
Uſnea 1379
variegatus 1356
velleus 1374
venoſus 1373

Lichen
ventoſus 1360
ventricoſus 1375
vermicellaris 1377
vernalis 1359
verniciformis ib.
verrucarius 1366
verrucifer 1373
verruciger 1377
verrucoſus 1364
veſiculoſus 1372
villoſus 1356
viridatus 1358
virideſcens 1361
viridi-ater 1361
viridis 1375
viridulus 1359
vitellinus 1361
vulpinus 1379

LICUALA 522, 529
ſpinoſa 529

Lidbeckia 210, 227
capenſis 227

Lightfootia 772, 826
oxycoccoides 826
ſerrata ib.
ſubulata ib.

Lignonia 303, 373
monodynama 373

Liguſticum 309, 481
auſtriacum 481
balearicum ib.
candicans ib.
cornubienſe ib.
Gingidium ib.
Gmelini ib.
Leviſticum ib.
luteum ib.
nodiflorum ib.
peloponnenſe ib.

Liguſticum
peregrinum 481
pyrenæum ib.

Liguſtrum 18, 25
japonicum 25
vulgare ib.

Lilium 525, 544, 545
bulbiferum 544
camtſchatcenſe 545
canadenſe ib.
candidum 544
Catesbæi 545
chalcedonium 544
japonicum 545
Martagon ib.
philadelphcium ib.
pomponicum 544
ſuperbum 545

Limeum 593, 597
africanum 597
aphyllum ib.
humile ib.

Limodorum 21, 60
altum 60
autumnale 61
enſatum 60
gentianoides ib.
grandiflorum ib.
pendulum ib.
præcox 61
ſtriatum 60
Tancarvillea ib.
tuberoſum ib.
utriculatum ib.

Limonia 658, 684
acidiſſima 684
dulcis ib.
lucida ib.
minuta ib.
monophylla ib.
pentaphylla ib.
trifoliata ib.

Limosella 888, 953
aquatica 953
calicina ib.
diandra ib.
LINCONIA 307, 448
alopecuroidea 448
LINDERA 525, 565
umbellata 565
LINDERNIA 888, 947
dianthera 947
japonica ib.
pyxidaria ib.
Linnæa 890, 952
borealis 952
Linum 313, 512-514
africanum 513
alpinum ib.
aquilinum 512
arboreum 513
austriacum ib.
campanulatum ib.
catharticum ib.
flavum ib.
gallicum ib.
hirsutum 512
maritimum 513
monogynum ib.
narbonense 512
nodiflorum 513
perenne 512
quadrifolium 513
striatum 514
strictum 512
suffruticosum 513
usitatissimum 512
verticillatum 513
virginianum ib.
viscosum ib.
LIPARIA 1078, 1113
graminifolia 1113
sericea ib.
sphærica ib.
umbellata ib.
villosa ib.
Lippia 887, 955, 956
americana 955
cymosa 956
hemisphærica 955
hirsuta 956
ovata ib.
Liquidambar 777, 832
imberbe 832
peregrinum ib.
styraciflüum ib.
Liriodendron 782, 867
Liliifera 867
Tulipifera ib.
Lisianthus 293, 334 335
alatus 335
cærulescens 334
chelonoides 335
cordifolius ib.
exsertus ib.
frigidus ib.
glaber ib.
glaucifolius ib.
grandiflorus ib.
latifolius ib.
longifolius 334
purpurascens 335
umbellatus ib.
Litchi 603, 635
sinense 635
Lithophila 20, 49
japonica 49
muscoides ib.
Lithospermum 291, 316, 317
angustifolium 317
arvense 316
ciliatum 317
digynum ib.
dispermum 316
fruticosum ib.
heliotropoides 317
hispidum ib.
incanum ib.
officinale 316
orientale ib.
purpuro-cæruleum ib.
retortum 317
tenuiflorum 316
virginicum ib.
LITTORELLA 211, 251
lacustris 251
Lobelia 294, 355-358
acuminata 355
anceps ib.
angulata 357
arborea 355
assurgens 356
bellidiflora ib.
bulbosa ib.
Cardinalis ib.
cliffortiana 357
Columnæe 356
comosa 357
cornuta 355
coronopifolia 357
Cyphia ib.
debilis ib.
depressa 355
Dortmanna ib.
erinoides 357
Erinus ib.

Lobelia
ferruginea 356
fruticosa 358
glandulosa 356
grandis 355
hirsuta 357
inflata *ib.*
Kalmii 355
lævigata 356
Laurentia 357
longiflora 356
lutea 357
minuta *ib.*
paniculata 355
patula 356
Phyteuma *ib.*
pinifolia 355
pubescens 358
secunda 356
simplex 355
siphylitica 357
stricta 356
subulata 368
surinamensis 356
tenella 368
tomentosa 356
triquetra *ib.*
Tupa 355
urens 357
volubilis 355
zeylanica 357

Loeflingia 82, 105
caspica 105
hispanica *ib.*
indica *ib.*

Loeselia 888, 946
ciliata 946

Logania 302, 422
pentacrina 422

Lolium 83, 196
distachyum 196
perenne *ib.*
remotum 196
temulentum *ib.*
tenue *ib.*

Lonchitis 1283, 1300 *sq.*
aurita 1301
bipinnata *ib.*
hirsuta 1300
pedata *ib.*
repens 1301
tenuifolia *ib.*

Lonicera 298, 368-369
alpigena 369
bubalina *ib.*
cærulea *ib.*
Caprifolium 368
caucasica 369
corymbosa *ib.*
Diervilla *ib.*
dioica 368
grata *ib.*
japonica *ib.*
implexa *ib.*
media *ib.*
mongolica 369
nigra 368
Periclymenum *ib.*
pyrenaica 369
sempervirens 368
symphoricarpos 369
tatarica *ib.*
Xylosteum *ib.*

LOOSA 774, 819
hispida 819

Loranthus 522, 575, 576
americanus 575
emarginatus *ib.*
europæus 575
falcatus 576
loniceroides 576
occidentalis *ib.*
parvifolius *ib.*
pauciflorus *ib.*
pentandrus *ib.*
Scurrula 575
spicatus 576
Stelis *ib.*
tetrapetalus 575
uniflorus *ib.*

Lotus 1075, 1078, 1144, 1145
angustissima 1144
arabica *ib.*
arborea 1145
conjugata 1144
corniculata 1145
cretica 1144
cytisoides 1145
Dorycnium *ib.*
edulis 1144
glauca 1145
græca *ib.*
hirsuta *ib.*
jacobæa 1144
maritima *ib.*
medicaginoides 1145
oligoceratos 1144
ornithopodioides *ib.*
peregrina *ib.*
recta 1145
siliquosa 1144
tetragonoloba *ib.*
tetraphylla *ib.*

Lucuma 777, 830, 831
biflora 830
Keula *ib.*
spinosa 831
turbinata 830
valparadisea *ib.*

Ludiæ 779, 839
mauritanica 839

Ludwigia 216, 261
alternifolia 261
apetala ib.
arcuata ib.
decurrens ib.
glandulosa ib.
irrigata ib.
linearis ib.
oppositifolia ib.
pilosa ib.
ramosissima ib.
repens ib.
rudis ib.
suffruticosa ib.
trifolia ib.

Lunaria 967, 978
annua 978
rediviva ib.

Lupinus 1076, 1100, 1101
albus 1100
angustifolius ib.
hirsutus ib.
integrifolius 1101
luteus ib.
perennis 1100
pilosus 1101
Termis 1100
varius 1101

Luziola 602, 637
peruviana 637

Lychnis 662, 736
alpestris 736
alpina ib.
apetala ib.
chalcedonica ib.
coronata ib.
dioica 736
Flos cuculi ib.
grandiflora ib.
læta ib.
quadridentata ib.
sibirica ib.
Viscaria ib.

Lycium 296, 389
afrum 389
barbarum ib.
barbatum ib.
capsulare ib.
europæum ib.
fœtidum ib.
heterophyllum ib.
japonicum ib.
ruthenicum ib.
tetrandrum ib.

Lycoperdon 1286, 1462-1466
admorsum 1463
æstivum ib.
ardesiacum 1464
arhizon 1465
aurantium 1463
Bovista 1464
capitatum 1463
carcinomale 1465
cervinum 1462
circumscissum 1463
coliforme 1465
corollinum ib.
corticale 1466
dispar 1463
Epidendron 1466
equinum 1464
fenestratum 1465
furfuraceum 1464
Geaster 1465
gemmatum 1463
giganteum 1464

Lycoperdon
gossypinum 1464
gregarium 1466
herculeum 1465
Hypoxylon ib.
Infundibulum 1464
lacerum ib.
lanatum ib.
multifidum 1465
muricatum 1464
nitidulum 1466
pedicellatum 1465
phalloides 1464
piliforme 1465
pistillare ib.
polyrhizon 1464
Proteus 1463
pruinatum 1465
pusillum 1464
radians 1465
ramosum 1466
rufum 1464
scabridum 1466
scabrum 1463
spadiceum ib.
squamosum ib.
stellatum 1465
subalpinum 1464
utriforme 1465
verrucosum 1463

Lycopodium 1283, 1288-1291
alopecuroides 1288
alpinum 1290
annotinum 1289
apus 1290
Bryopteris 1289
canaliculatum 1290
carolinianum ib.
cernuum 1289
ciliare 1290
circinale ib.
clavatum 1289

Lycopodium
complanatum 1289
denticulatum 1290
dichotomum 1289
flabellatum 1290
gnidioides 1289
helveticum 1290
japonicum ib.
inundatum 1289
linifolium ib.
myrtifolium 1290
nudum 1288
obſcurum 1289
ornithopodioides 1290
Phlegmaria 1289
plumoſum 1290
radicans 1291
rigidum 1289
rupeſtre ib.
ſanguinolentum 1290
ſcarioſum 1289
ſelaginoides 1288
Selago 1289
ſerratum ib.
ſquarroſum 1288
ſtoloniferum 1290
taxifolium 1288
verticillatum 1290

Lycopſis 292, 322
ægyptia 322
arvenſis ib.
bullata ib.
orientalis ib.
pulla ib.
variegata ib.
veſicaria ib.
virginica ib.

Lycopus 20, 42
europæus 42
exaltatus ib.
virginicus ib.

Lygeum 84, 123
Spartum 123

Lyſimachia 202, 331, 332
atro-purpurea 331
ciliata ib.
decurrens ib.
Ephemerum ib.
japonica 332
lanceolata 331
Linum ſtellatum ib.
nemorum 332
Numularia ib.
punctata 331
quadrifolia ib.
ſtricta ib.
thyrſiflora ib.
vulgaris ib.

Lythrum 741, 752, 753
carthagenenſe 753
ciliatum ib.
cordifolium 752
Cuphæa 753
dipetalum ib.
fruticoſum ib.
Hyſſopifolia ib.
lineare ib.
Melanium ib.
Parſonſia ib.
Pemphis ib.
petiolatum ib.
racemoſum ib.
Salicaria 752
Thymifolia 753
triflorum ib.
verticillatum ib.
virgatum 752

MABA 83, 95
elliptica 95

Mabea 740, 746
Piriri 746

Macrocnemum 297, 360
jamaicenſe 360

Macrolobium 83, 93
Smira 93
Utea ib.
Vuapa ib.

Macucua 210, 262
gujanenſis 262

Madhuca 773, 799
indica 799

Madia 1164, 1249
mellita 1249
ſativa ib.

Mærua 772, 827
arabica 827

Mæſa 298, 403
arabica 403

Magnolia 782, 867
acuminata 867
Fraſeri ib.
glauca ib.
grandiflora ib.
Plumieri ib.
tripetala ib.

Mahernia 313, 519, 520
heterophylla 520
pinnata 519
verticillata ib.

Majanthemum 217, 266
Convallaria 266

Malachodendron 1001, 1069
corchoroides 1069
ovatum ib.

Malachra 1002, 1051
alceæfolia 1051
bracteata ib.
capitata ib.
fasciata ib.
radiata ib.
Malanea 213, 279
sarmentosa 279
Malaxis 21, 58
spicata 58
umbelliflora ib.
Mallococca 775, 811
crenata 811
Malope 1002, 1058
malacoides 1058
multiflora ib.
trifida ib.
Malpighia 662, 722-724
altissima 723
angustifolia 724
aquifolia ib.
armeniaca 723
canescens 724
coccigera 723
coriacea ib.
crassifolia ib.
diphylla ib.
dubia 724
faginea 723
glabra 722
glandulosa 723
grandifolia 724
lucida 723
martinicensis 722
Mureila 723
nitida ib.
odorata ib.
punicifolia ib.
spicata ib.
urens ib.
verbascifolia ib.
Malva 1002, 1052-1056
abulensis 1055
abutiloides 1053
acaulis 1056
ægyptia 1053
Alcea 1055
americana ib.
angustifolia 1053
bonariensis 1054
bryonifolia ib.
calicina 1056
capensis ib.
capitata 1053
caroliniana 1052
ceromandeliana 1054
cretica ib.
crispa 1055
cuneifolia 1053
elegans 1052
fastigiata 1055
fragrans ib.
gangetica 1056
grossularifolia 1054
hispanica 1053
lactea 1054
limensis ib.
lobata 1055
mauritiana 1056
moschata 1055
nicæensis 1056
operculata 1053
ovata 1056
Papaver 1053
parviflora 1054
peruviana ib.
polystachya 1056
prostrata 1052
pumila 1056
retusa 1055
rotundifolia ib.
scabra 1053
scoparia 1054
Sperardiana ib.
Malva
silvestris 1056
sinensis ib.
spicata ib.
spithamæa 1053
stipulacea ib.
subhastata 1055
tomentosa 1056
Tourneforriana 1055
tridactylites 1054
trifida 1053
verticillata 1054
virgata ib.
Malvaviscus 1000, 1060
arboreus 1060
mollis ib.
pilosus ib.
Mammea 774, 813
americana 813
MANETTIA 213, 277
Lygistum 277
reclinata ib.
Mangifera 301, 418
Amba 418
glauca ib.
indica ib.
pinnata ib.
Manglilla 296, 398
peruviana 398
MANISURIS 85, 149
myuros 149
Mansana 526, 580
arborea 580
Manulea 889, 949, 950
altissima 950
antirrhinoides 949
argentea 950
cærulea ib.
capillaris ib.

Manulea
capitata 949
Cheiranthus ib.
corymbosa 950
cuneifolia 949
heterophylla 950
integrifolia 949
microphylla ib.
pinnatifida ib.
plantaginis ib.
thyrsiflora 950
tomentosa 949
Maprunea 217, 272
gujanensis 272
Mapuria 299, 371
gujanensis 371
Maranta 1, 8
Allovia 8
Arcuma ib.
arundinacea ib.
comosa ib.
Galanga ib.
humilis ib.
lutea ib.
malaccensis ib.
spicata ib.
Tonkat ib.
Marattia 1283, 1293 *sq.*
alata 1293
fraxinea 1294
lævis ib.
Marcgravia 773, 797
umbellata 797
Marchantia 1284, 1353 *sq.*
androgyna 1354
chenopoda ib.
conica ib.
cruciata ib.
hemisphærica ib.
hirsuta ib.
Marchantia
polymorpha 1353
quadrata 1354
tenella ib.
triloba ib.
trilocularis ib.
umbellata 1353
Margaritaria 604, 645
nobilis 645
Marica 82, 118
Cipura 118
Marila 775, 816
racemosa 816
Maripa 296, 393
scandens 393
Marrubium 885, 908, 909
acetabulosum 909
africanum ib.
Alysson 908
candidissimum ib.
crispum 909
hispanicum ib.
peregrinum 908
plicatum ib.
Pseudodictamus 909
supinum ib.
vulgare ib.
Marsana 656, 675
buxifolia 675
Marshallia 778, 836
Lagunæ 836
Marschallia 1162, 1208
Schreberi 1208
Marsilea 1284, 1322
minuta 1322
natans ib.
quadrifolia ib.
Martynia 890, 935
annua 935
longiflora ib.
perennis ib.
proboscidea ib.
MASSONIA 525, 537
angustifolia 537
echinata ib.
latifolia ib.
undulata ib.
Matelea 306, 443
palustris 443
Matricaria 1164, 1249
argentea 1249
Chamomilla ib.
maritima ib.
Parthenium ib.
prostrata ib.
suaveolens ib.
Matthiola 298, 376
scabra 376
Mattuschkia 528, 589
aquatica 589
Maturea 887, 939
pratensis 939
MAURITIA 521, 568
flexuosa 568
Mayepea 215, 259
gujanensis 259
Mayna 776, 808
odorata 808
Maytenus 19, 25
Boaria ib.
Meborea 207
gujanensis ib.
Medeola 527, 588
angustifolia 588
asparagoides ib.
virginica ib.

Medicago 1075, 1078, 1146-1148
arabica 1147
arborea 1146
ciliaris 1147
circinata *ib.*
coronata *ib.*
Falcata 1146
hirsuta 1147
intertexta *ib.*
Karstiensis *ib.*
laciniata 1148
lupulina 1147
marginata *ib.*
marina 1148
minima 1147
muricata *ib.*
nigra *ib.*
obscura 1146
orbicularis 1147
polymorpha *ib.*
prostrata 1148
radiata 1147
rigidula *ib.*
sativa 1146
scutellaris 1147
tornata 1148
tuberculata 1147
turbinata 1148
virginica 1146
Medusula 1286, 1487
labyrinthica 1487
Meesia 300, 417
serrata 417
Meisteria 297, 391
anonima 391
Melaleuca 1149, 1154, 1155
æstuosa 1154
angustifolia *ib.*
ciliata 1155
diffusa 1154
florida 1155
Melaleuca
latifolia 1154
Leucadendron *ib.*
lucens 1155
lucida 1154
perforata 1155
scoparia 1154
suaveolens 1155
trinervia 1154
villosa *ib.*
virgata 1155
viridiflora *ib.*
Melampodium 1166, 1271
americanum 1271
australe *ib.*
humile *ib.*
Melampyrum 883, 924
arvense 924
cristatum *ib.*
nemorosum *ib.*
pratense *ib.*
silvaticum *ib.*
Melanthium 527, 587, 588
capense 587
ciliatum *ib.*
dioicum 588
hybridum 587
indicum 588
monoicum 587
monopetalum 588
myoclonum 587
racemosum 588
sibiricum 587
spicatum *ib.*
triquetrum *ib.*
virginicum *ib.*
viride 588
Melastoma 658, 687-692
Acinodendron 688
Melastoma
agreste 690
alatum 689
albicans *ib.*
alpinum 691
angustifolium *ib.*
aquaticum 692
arborescens 689
argenteum *ib.*
asperum 687
bivalve 688
Caccatin *ib.*
capillare 692
cinnamomifolium 688
coriaceum 690
crispatum 688
discolor 692
elæagroides 691
elatum 690
elegans 691
fasciculare *ib.*
flavescens 689
fragile 691
glabratum *ib.*
glabrum 687
grandiflorum 690
grossularioides 688
grossum *ib.*
hirsutum 691
hirtellum *ib.*
hirtum 690
hispidum 692
holosericeum 687
impetiolare 690
lævigatum 689
longifolium 687
Majeta 691
Malabathrum 689
micranthum 692
microphyllum 691
montanum 688
octandrum 691
ornatum 687
parviflorum 691

Malaſtoma
patens 687
piloſum 692
praſinum 688
procerum ib.
purpuraſcens 691
quadrangulare 687
racemoſum 690
ramiflorum 688
rigidum ib.
rubens 692
rubeſcens 689
rubrum 690
rufeſcens ib.
ſcabroſum ib.
ſcandens ib.
ſeſſilifolium 688
ſpicatum 690
ſplendens 689
ſtrigiloſum ib.
ſtrigoſum 687
ſuccoſum 689
Tamonea ib.
Taniboa ib.
tetrandrum 692
Tibuchina 691
Tococa 690
trinervium 687
trivalve 688
umbroſum 692
villoſum 689
virgatum 692
Melhania 301, 416
velutina 416
Melia 656, 680, 681
Azadirachta 681
Azederach 680
dubia 681
Koetjape ib.
ſempervirens 680
Melianthus 891, 966
major 966
minor ib.
Melica 87, 176
altiſſima 176
arundinacea ib.
cærulea ib.
ciliata ib.
Falx ib.
Lobelii ib.
minuta ib.
mutica ib.
nodoſa ib.
nutans ib.
papilionacea ib.
pyramidalis ib.
ramoſa ib.
uniflora ib.
Melicocca 599, 613
bijuga 613
Melicope 599, 620
ternata 620
Melicytus 302, 421
ramiflorus 421
Meliſſa 886, 914
Calamintha 914
cretica ib.
fruticoſa ib.
grandiflora ib.
Nepeta ib.
officinalis ib.
Melittis 886, 916
Meliſſophyllum 916
Melochia 996, 1011, 1012
borbonica 1012
caracaſſana ib.
concatenata 1011
corchorifolia 1012
depreſſa 1011
hirſuta 1012
lupulina ib.
nodiflora ib.
Melochia
odorata 1011
pyramidata 1012
tupina ib.
tomentoſa ib.
venoſa 1011
Melodinus 307, 440
ſcandens 440
Melothria 81, 99
pendula 99
Memecylon 600, 619
capitellatum 619
grande ib.
Menais 296, 376
topiaria 376
Menichea 770, 799
roſata 799
Meniſpermum 742, 756
acutum 756
canadenſe ib.
carolinum ib.
Cocculus ib.
criſpum ib.
edule ib.
feneſtratum ib.
hirſutum ib.
japonicum ib.
myoſotoides ib.
orbiculatum ib.
trilobum ib.
virginicum ib.
Mentha 885, 902-904
aquatica 903
arvenſis ib.
Auricularia 902
auſtriaca 903
cahirina ib.
cana-

Mentha
canadensis 903
canariensis ib.
cervina 904
crispa 903
dubia ib.
exigua ib.
gentilis ib.
hirsuta ib.
niliaca 902
origanifolia ib.
perilloides ib.
piperita 903
plumosa 902
Pulegium 903
punctata ib.
rotundifolia 902
sativa 903
silvestris 902
viridis ib.
Mentzelia 774, 819
aspera 819
Menyanthes 293, 329
indica 329
nymphoides ib.
ovata ib.
trifoliata ib.
Mercurialis 648, 653
ambigua 653
annua ib.
perennis ib.
tomentosa ib.
Merorea 89
gujanensis 89
Merulius 1285, 1429-1432
agaricoides 1430
alectorolophoides ib.
alneus 1431
alutaceus ib.
Merulius
aurantiacus 1430
betulinus 1431
canthareiloides 1430
Canthareilus ib.
cornucopioides 1429
Crispus 1430
Cyathus ib.
dimidiatus 1431
fissus ib.
helvelloides 1430
inflexus ib.
hydropipes ib.
infundibuliformis ib.
labyrinthiformis 1431
lichenoides ib.
muscigenus ib.
niveus ib.
pezizoides ib.
pruinatus 1430
quercinus 1431
reticulatus ib.
serpens 1432
squamosus 1431
Squamula 1430
umbonatus ib.
vestator 1432
Mesembryanthemum 779, 843-848
albidum 848
apetalum 844
australe 845
barbatum 846
bellidiflorum 844
bicolorum 847
brachiatum ib.
bracteatum 846
brevifolium 845
caducum 844
calamiforme ib.
capillare 848
ciliatum 843
Mesembryanthemum
compactum 848
copticum 844
cordifolium ib.
corniculatum 846
crassifolium 845
criniflorum 844
crystallinum 843
cuneifolium 846
deflexum 845
deltoides 844
difforme 847
digitatum 843
dolabriforme 847
echinatum 846
edule ib.
emarginatum 845
expansum 844
falcatum 846
filamentosum 845
forficatum 846
geniculiflorum 844
glabrum 847
glaucum 846
glomeratum 845
grossum 847
helianthoides ib.
hispidum 845
humifusum 844
læve 845
linguiforme 848
loreum 845
micans 847
molle 846
noctiflorum 844
nodiflorum 843
pallens ib.
papulosum 847
pinnatifidum ib.
pomeridianum ib.
pugioniforme 846
reptans 845
ringens 847

Mesembryanthemum
rostratum 847
scabrum 845
serratum 846
sessiliflorum 847
spinosum 845
splendens 844
stipulaceum 845
tenuifolium 846
testiculare 844
tortuosum 847
Tripolium 843
tuberosum 845
umbellatum 844
uncinatum 846
verruculatum 847
villosum 846
viridiflorum 848
Mesenterica 1285, 1485.
tremelloides 1485
Mespilus 779, 840, 841
æstivalis 840
Amelanchier 841
arbutifolia ib.
canadensis ib.
Chamæmespilus ib.
Cotoneaster ib.
germanica ib.
hiemalis 840
japonica 841
laciniata 840
phœnopyrum 841
Pyracanta 840
Xanthocarpos 841
Messerschmidia 291, 324
Argusia 324
fruticosa ib.
Mesua 999, 1069
ferrea 1069
glabra ib.
Metrosideros 771, 788, 789
albiflora 789
arachnoidea ib.
armillaris ib.
costata ib.
excelsa ib.
fulgens ib.
gummifera 788
myrtifolia 789
salicifolia ib.
scandens ib.
spectabilis ib.
squarrosa ib.
umbellata ib.
viminalis ib.
Metroxylon 521, 570
Sagu 570
Michauxia 600, 618
nova 618
Michelia 782, 868
Champaca 868
Tsjampaca ib.
Microcarpon 1470
nigrum ib.
Micropus 1166, 1278
erectus 1278
supinus ib.
Microtea 305, 452
debilis 452
Milium 86, 168
capense 168
compressum ib.
confertum ib.
digitatum ib.
effusum ib.
globosum ib.
Milium
lendigerum 168
paradoxon ib.
punctatum ib.
Milleria 1166, 1269
biflora 1269
quinqueflora ib.
MILLINGTONIA 890, 961.
hortensis 961
Mimosa 773, 800-805
alba 801
arborea 802
Asak 803
asperata 804
balsamica 802
bigemina 800
bipinnata 803
Burgoni 801
cæsia 804
casta 800
Catechu 804
Cavenia 803
Ceratonia 805
cineraria 800
cinerea 803
circinalis 800
comosa 802
corniger 804
cornuta ib.
eburnea ib.
Entada 801
fagifolia ib.
farnesiana 804
flava 803
glauca 802
glomerata 803
grandiflora 802
gujanensis 803
horrida 804
Juga 801

Mimosa
Intsia 804
juliflora 803
latifolia 800
latisiliqua 802
latronum 804
laurina 801
Lebbek 802
mangensis 803
muricata ib.
natans 801
nilotica 803
nodosa 801
odoratissima 802
pennata 804
Orfota 803
peregrina 802
pernambucana ib.
pigra 804
plena 801
polystachya 802
pudica 801
punctata ib.
purpurea 800
quadrivalvis 804
reticulata 800
sanguinea 803
scandens 801
Sejal 802
semispinosa 804
Senegal 803
sensitiva 801
simplicifolia 800
speciosa 802
stellata 801
tamarindifolia 803
tenuifolia 804
tergemina 800
tortilis 803
tortuosa 804
Unguis cati 800
vaga 802
verticillata 800
villosa 802

Mimosa
virgata 801
viva 800
Mimulus 889, 956 957
alatus 957
luteus ib.
ringens 956
Mimusops 598, 612
Elengi 612
Kanki ib.
Mindium 601, 618
spicatum 618
Minuartia 89, 208
campestris 208
dichotoma ib.
montana ib.
Mirabilis 291, 377
dichotoma 377
Jalapa ib.
longiflora ib.
Misandra 22, 76
magellanica 76
Michella 213, 245
repens 245
Mitella 961, 708
diphylla 708
nuda ib.
Mitraria 771, 799
Commersoni 799
Mnasium 524, 533
paludosum 533
Mnemosilla 967
ægyptiaca ib.
MNIARUM 3, 17
biflorum 17
Mnium 1284, 1327 1330
aciculare 1328

Mnium
annotinum 1329
capillare ib.
cespititium 1330
crudum 1329
cuspidatum 1330
fontanum 1329
glaucum 1328
heteromallon 1328
hornum 1329
hygrometricum 1327
latifolium 1328
marchicum 1329
megapolitanum 1327
nutans 1330
palustre 1329
pellucens 1328
pellucdium 1327
proliferum 1330
punctatum ib.
purpureum 1328
pusillum ib.
ramosum 1329
rostratum 1330
scoparium 1328
serratum 1330
simplex ib.
sphærocarpon 1329
spurium 1328
strictum ib.
tomentosum 1329
tortile 1328
triquetrum 1329
uliginosum ib.
undulatum 1330
Mœhringia 602, 636
muscosa 636
Mœnchia 967, 971
aizoides 971
campestris ib.
incana ib.
sativa ib.

Molinæa 598, 611
arborea 611
Mollia 303, 420
imbricata 420
Mollugo 89, 208
oppositifolia 208
paniculata ib.
pentaphylla ib.
stricta ib.
triphylla ib.
verticillata ib.
Moluccella 885, 911
frutescens 911
lævis ib.
spinosa ib.
tuberosa ib.
Momordica 81, 101, 102
Balsamina 101
Charantia ib.
cylindrica ib.
Elaterium 102
Luffa 101
operculata ib.
pedata 102
trifoliata ib.
Monarda 20, 44
ciliata 44
clinopodia ib.
didyma ib.
fistulosa ib.
oblongata ib.
punctata ib.
rugosa ib.
Monetia 215, 254
barlerioides 254
Monilia 1287, 1487
alba 1487
Aspergillus ib.
aurea ib.
cespitosa ib.
crustacea ib.
Monilia
glauca 1487
leprosa ib.
ochroleuca ib.
purpurea ib.
Monnieria 1075, 1079
trifolia 1079
Monodynamis 3, 10
Iserti 10
Monotropa 658, 685
Hypopithys 685
uniflora ib.
Monsonia 1149, 1152
filia 1152
lobata ib.
speciosa ib.
Montia 89, 206
fontana 206
MONTINIA 216, 277
acris 277
Montira 889, 936
gujanensis 936
Moquilea 771, 820
gujanensis 820
Moræa 81, 116-118
africana 117
aphylla ib.
collina 118
crispa ib.
filiformis 117
flexuosa ib.
fugax ib.
gladiata ib.
iridioides ib
ixioides 118
lugens 117
polyanthos 116
sinensis 117
spathacea ib.
Moræa
spiralis 117
umbellata 118
virgata 117
Morina 21, 49
persica 49
Morinda 298, 371
citrifolia 371
muscosa ib.
Royeni ib.
umbellata ib.
Morisonia 999, 1070
americana 1070
Moronobea 1149, 1160
coccinea 1160
Morus 219, 283
alba 283
indica ib.
mauritanica ib.
nigra ib.
papyrifera ib.
rubra ib.
tatarica ib.
tinctoria ib.
Xanthoxylum ib.
Moscharia 219, 275
Forskahlii 275
Mucilago 1287, 1488
cespitosa 1488
cinerea ib.
miniata ib.
plumosa ib.
Mucor 1287, 1485 *sq.*
albus 1485
araneosus 1486
Erysiphe ib.
flavus ib.
globosus ib.

Mucor
infusorius 1486
minimus 1485
Mucedo 1486
ovalis 1485
paniceus ib.
plumosus 1486
purpureus ib.
tremelloides ib.
virens ib.
Muhlenbergia 87, 171
Schreberi 171
Mullera 1075, 1078, 1115
monilifera 1115
MUNCHHAUSIA 1150, 1153
speciosa 1153
Muntingia 775, 811
Calabara 811
Muriri 656, 693
gujanensis 693
MURRAYA 658, 678
exotica 678
Murucoa 294, 344
violacea 344
Musa 523, 567
Ensete 567
humilis ib.
paradisiaca ib.
sapientum ib.
Troglodytarum ib.
Mussænda 299, 376
frondosa 376
spinosa ib.
Mutabea 996, 1009
gujanensis 1009
MUTISIA 1164, 1244
Clematis 1244
Mutuchi 1076, 1085
suberosa 1085
Myagrum 967, 969
ægyptium 969
austriacum ib.
hispanicum ib.
orientale ib.
paniculatum ib.
perenne ib.
perfoliatum ib.
rigidum ib.
rugosum ib.
saxatile ib.
Myginda 220, 290
latifolia ib.
uragoga ib.
Myonima 211, 246
Burbonæ 246
Myoporum 890, 936
crassifolium 936
lætum ib.
pubescens ib.
tenuifolium ib.
Myosotis 292, 315, 316
apula 315
arvensis ib.
echinophora 316
fruticosa 315
Lappula ib.
nana 316
palustris 315
pectinata 316
rupestris 315
spatulata ib.
squarrosa 316
terglovienſis 315
virginiana ib.
Myosurus 313, 520
minimus 520
Myrica 219, 284
æthiopica 284
Myrica
cerifera 284
cordifolia ib.
Faya ib.
Gale ib.
Nagi ib.
quercifolia ib.
segregata ib.
trifoliata ib.
Myriophyllum 603, 646
spicatum 646
verticillatum ib.
MYRISTICA 2, 10, 11
dactiloides 11
fatua ib.
moschata ib.
sebifera ib.
tomentosa 10
Myrmecia 211, 247
Tachia 247
Myrobalanifera 660, 702
fertilis 702
Myrodendrum 775, 817
balsamiferum 817
Myrodia 999, 1070
turbinata 1070
MYROSMA 1, 7
cannæfolium 7
Myrospermum 655, 665
frutescens 665
Myrothecium 1285, 1460
dubium 1460
hispidum ib.
inundatum ib.
roridum ib.
stercoreum ib.

MYROXYLON 655, 672
peruiferum 672
Myrsine 295, 404
africana 404
retusa ib.
scabra ib.
Myrtus 770, 790-793
acris 792
alpina 790
androsæmoides 792
angustifolia 791
axillaris ib.
biflora 790
brasiliana ib.
buxifolia 791
caryophyllata 792
Chytraculia ib.
communis 790
cordata 791
cotinifolia 792
crenulata 790
cumini 791
dioica ib.
disticha ib.
fragrans 792
glabrata 791
Gregii ib.
lævis ib.
laurina ib.
ligustrina 790
linearis 793
lineata 791
lucida 790
Luma ib.
Mekul 792
maxima 791
monticola ib.
nitida 792
paniculata ib.
Pimenta ib.
procera 790
rigida 792
Myrtus
saligna 793
splendens 792
tomentosa 790
triflora 792
Ugni 790
virgultosa 791
zeylanica 792
Zuzygium ib.

Nacibea 213, 279
alba 279
coccinea ib.
Najas 4, 18
marina 18
Nama 307, 457
jamaicensis 457
zeylanica ib.
Napæa 1002, 1050
lævis 1050
scabra ib.
Napimoga 743, 767
gujanensis 767
Narcissus 523, 535, 536
bicolor 535
Bulbocodium ib.
calatinus 536
dubius ib.
hispanicus ib.
jonquilla ib.
minor 535
moschatus ib.
odorus ib.
orientalis 536
poëticus 535
Pseudonarcissus ib.
serotinus ib.
Tazetta 536
triandrus 535
trilobus 536
NARDINA 523, 577
domestica 577
Nardus 114, 123
aristata 123
ciliaris ib.
gangitis ib.
indica ib.
stricta ib.
Thomæa ib.
Nassauia 1167, 1281
magellanica 1281
Nastus 526, 580
borbonicus 580
Nauclea 302, 358
orientalis 358
Neckeria 3, 16
campestris 16
Nectandra 773, 799
bijuga 799
sanguinea ib.
Nectris 522, 580
aquatica 580
Nemia 888, 936
capensis 936
Nepenthes 275
distillatoria 275
Nepeta 885, 898, 900
amboinica 899
americana ib.
angustifolia 900
cærulea 899
canescens 900
Cataria 899
hirsuta ib.
incana 900
indica ib.
italica 899
lanata ib.
lavandulifolia ib.
malabarica ib.
multifida ib.

Nepeta
Nepetella 900
nuda 899
pannonica 900
pectinata 898
scordotis 899
sidæfolia 898
tomentosa 899
tuberosa ib.
ucranica 900
violacea 899
virginica 900
Nephelium 305, 464
lappaceum 464
Nephrandra 888, 946
dubia 946
Nerium 294, 435
antidysentericum 435
coronarium ib.
divaricatum ib.
Oleander ib.
zeylanicum ib.
Nertera 218, 282
depressa 282
Neurada 663, 739
procumbens 739
Nicandra 658, 677
amara 677
Nicotiana 293, 380
fruticosa 380
glutinosa ib.
minima ib.
paniculata ib.
pusilla ib.
rustica ib.
Tabacum ib.
urens ib.
Nigella 779, 851
arvensis 851
damascena ib.
hispanica ib.
Nigella
orientalis 851
sativa ib.
Nigrina 216, 275, 293
spicata 275
NIPA 2, 12
fruticans 12
Nissolia 1075, 1084
arborea 1084
fruticosa ib.
Nitraria 741, 751
Schoberi 751
Nolana 292, 325
prostrata 325
Nothria 997, 1012
capensis 1012
Nyctanthes 19, 23
acuminata 23
angustifolia ib.
Arbor tristis ib.
elongata ib.
glauca ib.
hirsuta ib.
multiflora ib.
pubescens ib.
Sambac ib.
scandens ib.
triflora ib.
undulata ib.
viminea ib.
Nymphæa 776, 811, 812
advena 812
alba ib.
Lotus ib.
lutea 811
Nuccheli ib.
Nelumbo 812
pentapetala ib.
reniformis ib.
sagittifolia ib.
Nissa 304, 431, 432
aquatica 431
biflora ib.
capitata 432
multiflora 431
Obolaria 887, 954
virginica 954
Ochna 657, 682, 683
Jabotapita 682
nitida 683
parvifolia 682
squarrosa ib.
Ochroma 996, 1008
Lagopus 1008
Ochrosia 295, 439
borbonica 439
Ocotea 1149, 1153
gujanensis 1153
Ocymum 886, 916-918
acutum 916
album 917
americanum ib.
Basilicum 918
capitatum ib.
crispum 916
filamentosum 917
fruticosum ib.
gratissimum ib.
hadiense ib.
holosericeum 918
inflexum 916
inodorum ib.
menthoides 918
minimum ib.
molle ib.
monachorum ib.
Plectranthus 917
polystachyon ib.
prostratum ib.

Ocymum
punctatum 917
punctulatum ib.
rugosum 916
salinum 918
sanctum ib.
scutellarioides 917
serpyllifolium 916
tenuiflorum 917
thyrsiflorum 916
verticillatum 917
virgatum ib.
Vaalæ 918
Zaturhendi 917
zeylanicum 918

OEDERA 1167, 1279
aliena 1279
prolifera ib.

Oenanthe 308, 484 485
croceta 485
filiformis ib.
fistulosa 484
globulosa 485
peucedanifolia ib.
pimpinelloides ib.
prolifera ib.

Oenothera 599, 606-607
biennis 606
fruticosa 607
hirta ib.
longiflora ib.
mollissima ib.
muricata ib.
nocturna ib.
octovalvis ib.
parviflora ib.
pumila ib.
sinuata ib.

Olax 83, 93
zeylanica 93

Oldenlandia 213, 263, 264
biflora 263
capensis ib.
corymbosa 264
debilis 263
digyna 264
fœtida 263
hirsuta ib.
paniculata 264
pentandra 263
repens ib.
stricta 264
tenuifolia 263
trinervia ib.
umbellata ib.
uniflora ib.

Olea 19, 25
americana 25
cajetana ib.
capensis ib.
europæa ib.
excelsa ib.
fragrans ib.

Olyra 85, 148
latifolia 148
pauciflora ib.

Omphalea 22, 71, 72
axillaris 71
cauliflora ib.
cordata ib.
nucifera 72

Omphalobium 1149, 1152
indicum 1152

Oncoba 776, 828
spinosa 828

Onoclea 1283, 1291
polypodioides 1291
sensibilis ib.

Ononis 1075, 1077, 1096-1099
alba 1097
alopecuroides ib.
antiquorum 1096
argentea 1098
arvensis 1096
capensis 1097
cenisia ib.
cernua 1098
Cherleri 1099
crispa 1098
filiformis ib.
flava 1097
fruticosa 1098
geminata 1097
hircina ib.
hispanica 1098
involucrata ib.
mauritanica ib.
microphylla ib.
minutissima 1097
mitissima ib.
Natrix 1098
ornithopodioides 1099
pinguis 1098
prostrata 1097
pubescens 1098
reclinata 1097
repens ib.
rotundifolia 1098
serrata 1097
spinosa 1096
tridentata 1098
umbellata ib.
vaginalis 1099
variegata 1097
viscosa 1099

Onoperdon 1162, 1190
Acanthium 1190
acaule ib.
arabicum ib.
deltoides ib.
græcum ib.
illyricum ib.
Onoſma 291, 321
echioides 321
micranthon ib.
orientale ib.
ſimpliciſſimum ib.
Opercularia 214, 232, 233
aſpera 233
diphylla ib.
umbellata 232
Ophiogloſſum 1283, 1291
crotalophoroides 1291
flexuoſum ib.
japonicum ib.
luſitanicum ib.
nudicaule ib.
palmatum ib.
pendulum ib.
reticulatum ib.
ſcandens ib.
vulgatum ib.
Ophiorhiza 293, 333
lanceolata 333
Mitreola ib.
Mungos ib.
ſubumbellata ib.
Ophioxylum 299, 334
ſerpentinum 334
OPHIRA 599, 629
ſtricta 629
Ophrys 21, 56-58
alaris 58
alata 57
alpina 58
anthropophora 57
arachnites ib.
atrata 58
barbata ib.
bivalvata ib.
bracteata ib.
caffra ib.
camtſchatica 58
catholica 57
cernua 56
circumflexa 58
Corallorhiza 56
cordata ib.
crucigera 57
fimbriata ib.
gujanenſis ib.
lilifolia ib.
Loeſelii ib.
monophyllos ib.
monorchis ib.
myodes ib.
nervoſa 58
Nidus avis 56
ovata ib.
paludoſa 57
patens 58
peruviana 57
ſpiralis 56
ſquamata ib.
trifolia 57
unifolia 58
volucris 57
Orchis 21, 50, 55
abortiva 54
aphylla ib.
barbata 51
batrachites 55
bicornis 50
biflora ib.
Orchis
bifolia 51
calcarata ib.
carnea 50
ciliaris 51
conopſea 53
coriophora 52
cornuta 51
cruenta 53
cubitalis 52
cucullata ib.
draconis 51
elata 53
falcata 54
filicornis ib.
fimbriata ib.
flava 53
flexicaulis 51
flexuoſa ib.
fuſca 52
fuſceſcens 54
globoſa 52
habenaria 53
hiſpidula 52
hyperborea 54
japonica ib.
incarnata 53
lata 51
latifolia 53
longicornis ib.
maculata ib.
maſcula 52
militaris ib.
monorhiza 54
moravica 52
Morio ib.
nigra 51
odoratiſſima 53
ophiogloſſoides 51
Ornithis ib.
pallens 52
paluſtris ib.
papilionacea ib.

Orchis
ptycodes 54
pyramidalis 52
rubra ib.
ſagittalis 51
ſambucina 53
ſancta 54
ſpatulata 51
ſpecioſa 53
ſpectabilis 54
ſtrateumatica ib.
ſuaveolens 53
Suſannæ 51
tenella ib.
tipuloides 54
tripetaloides 51
uſtulata 52
varia 53
variegata 52
viridis 54

Oribaſia 299, 367
longiflora 367
lutea ib.
officinalis ib.
paniculata ib.
racemoſa ib.
violacea ib.

Origanum 886, 912, 913
ægyptiacum 912
bengalenſe ib.
clinopodioides 913
creticum 912
Dictamnus ib.
flexuoſum 913
heracleoticum 912
Majorana 913
Maru ib.
Onites 912
ſipyleum ib.
ſmyrnæum ib.
ſyriacum ib.

Origanum
Tournefortii 912
vulgare ib.

ORIXA 215, 255
japonica 255

Ornithogalum 525 549-551
altiſſimum 551
arabicum ib.
bohemicum 550
bulbiferum 551
capenſe ib.
caudatum 550
ciliatum 551
circinatum ib.
comoſum 550
conicum ib.
crenulatum 551
flaveſcens 550
flavum 551
japonicum ib.
latifolium 550
longibracteatum ib.
luteum 549
maculatum 550
Maſſonii 551
miniatum 550
minimum 549
narbonenſe 550
niveum ib.
nutans 551
piloſum ib.
pyramidale 550
pyrenaicum 549
reticulatum ib.
rupeſtre 551
ſuaveolens 550
tenellum ib.
thyrſoides 551
uniflorum 549
unifolium 551

Ornithopus 1075, 1077, 1119
compreſſus 1119
intermedium ib.
perpuſillus ib.
repandus ib.
ſcorpioides ib.
tetraphyllus ib.

Ornithrophe 603, 613
borbonica 613

Orobanche 887, 954, 955
Æginetia 955
americana 954
cernua ib.
crenata 955
fœtida 954
lævis ib.
major ib.
purpuraſcens ib.
purpurea 955
ramoſa ib.
tinctoria 954
uniflora 955
virginiana ib.

Orobus 1075, 1077, 1108
albus 1108
anguſtifolius ib.
caneſcens ib.
hirſutus ib.
lathyroides ib.
luteus ib.
niger ib.
pyrenaicus ib.
ſilvaticus ib.
tenuifolius ib.
tuberoſus ib.
vernus ib.
verſicolor ib.

Orontium 526, 568
aquaticum 568
• japonicum ib.
Ortegia 83, 105
dichotoma 105
hispanica ib.
Orygia 775, 815
decumbens 815
portulacifolia ib.
Oriza 526, 578
sativa 578
Osbeckia 599, 605
sinensis 605
zeylanica ib.
Osmites 1166, 1261
asteriscoides 1261
Bellidiastrum ib.
calicina ib.
camphorata ib.
Osmunda 1283, 1292 *sq.*
adianthifolia 1292
bifurcata ib.
bipinnata ib.
capensis 1293
caroliniana ib.
cervina 1292
cinnamomea 1293
Clytoniana ib.
crispa ib.
discolor ib.
filiculifolia 1292
hirsuta ib.
hirta ib.
japonica 1293
Lancea ib.
Lunaria 1292
matricariæ ib.
phyllitidis ib.
procera 1293
ramosa ib.
regalis 1292
Osmunda
scandens 1293
Spicanthus ib.
Struthiopteris ib.
ternata 1292
trifida ib.
verticillata ib.
virginica ib.
zeylanica ib.
Osteospermum 1166, 1274 *sq.*
aritotoides 1275
cæruleum ib.
calendaceum 1274
ciliatum 1275
corimbosum 1274
herbaceum 1275
ilicifolium 1274
imbricatum 1275
junceum 1274
moniliferum 1275
niveum ib.
perfoliatum ib.
pinnatifidum ib.
pisiferum 1274
polygaloides ib.
rigidum 1275
spinosum 1274
triquetrum ib.
Osyris 83, 95
alba 95
japonica ib.
OTHERA 215, 255
japonica 255
Othonna 1166, 1275-1277
abrotanifolia 1277
arborescens 1276
Athanasia 1277
bulbosa 1276
cacalioides ib.
Othonna
capillaris 1276
cheirifolia 1275
ciliata 1276
coronopifolia ib.
crassifolia 1275
denticulata 1276
digitata ib.
ericoides 1275
frutescens 1276
heterophylla ib.
lateriflora ib.
Lingua ib.
linifolia 1275
munita 1277
parviflora 1276
pectinata ib.
pinnata 1277
Tagetes ib.
tenuissima 1275
trifida 1276
trifurcata ib.
virginea ib.
Ovieda 890, 961
mitis 961
spinosa ib.
Oxalis 662, 733-735
Acetosella 734
Barichieri ib.
bifida 735
caprina 734
cernua ib.
compressa ib.
corniculata ib.
flava 735
frutescens ib.
glabra ib.
hirta ib.
incarnata 734
lanata ib.
longiflora ib.
minuta ib.

Oxalis
monophylla 733
natans 734
punctata ib.
purpurea ib.
repens ib.
sensitiva 735
sericea 734
stricta 735
tomentosa ib.
tuberosa 734
versicolor 735
violacea 734
virgosa ib.

Pacurina 1162, 1201
edulis 1201
Pæderia 295, 432
fœtida 432
Pæderota 19, 31
Ageria 31
bonæ spei ib.
Bonarota ib.
cærulea ib.
lutea ib.
minima ib.
Pæonia 777, 839
anomala 839
humilis ib.
integra ib.
officinalis ib.
tenuifolia ib.
Pagamea 219, 285
gujanensis 285
Palava 1001, 1040, 1041
malvifolia 1040
moschata 1041
PALLASIA 743, 767
caspica 767

Panax 308, 466
arborea 466
attenuata ib.
fruticosa ib.
Morototoni ib.
quinquefolia ib.
simplex ib.
spinosa ib.
trifolia ib.
Pancratium 523, 536, 537
amboinense 537
caribæum 536
carolinianum ib.
declinatum ib.
illyricum 537
litterale ib.
maritimum 536
maximum ib.
mexicanum ib.
verecundum 537
zeylanicum 536
PANDANUS 2, 12
odoratissimus 12
Panicum 86, 156-163
acuminatum 159
adhærens 156
ægyptium 159
alopecuroides 156
anomalum 157
antidoton 161
arborescens 162
aristatum 160
arundinaceum 162
brevifolium ib.
brizoides 158
Burmanni ib.
caffrorum 162
capillare 161
carthaginense 159
ciliare 158

Panicum
cimicinum 160
clandestinum 161
colonum 157
coloratum 160
compositum 157
compressum 159
conglomeratum 157
Crus corvi ib.
Crus galli ib.
curvatum 161
dactilon 159
dichotomum 160
diffusum ib.
distachyon 158
divaricatum 161
divisum 156
elatius 157
falcatum 163
fasciculatum 159
filiforme ib.
flavescens 160
flavidum 156
flexuosum 161
fluitans 158
fugax 162
fuscum 160
geminatum 158
germanicum 156
glaucum ib.
glutinosum 162
grossarium 160
helvolum 156
hirtellum 157
hispidulum 158
hispidum 157
indicum 156
ischæmoides 161
italicum 157
lanatum 162
lanceolatum 158
latifolium 160
laxum ib.

Panicum
lineare 159
longiflorum 158
maculatum 163
maximum 162
miliaceum 161
molle 159
muricatum 161
muticum 157
nemorosum 159
notatum 161
nudum 162
oryzinum 157
oryzoides 160
pallens 161
palmæfolium 162
patens 161
piliferum 157
pilosum 159
polygamum 162
polystachyon 156
radicans 162
ramosum 160
remotum 161
repens ib.
rigens 160
sanguinale 159
sericeum 156
setigerum ib.
setosum 157
speciosum 162
squarrosum 158
stagninum 157
tetrastichon 158
trigonum 161
tumidum 157
turgidum 160
umbrosum 158
verticillatum 156
virgatum 161
viride 156

Panke 647, 652
acaulis 652
caulescens ib.

Panzeria 211, 247
caroliniana 247

Papaver 774, 809, 810
alpinum 809
Argemone ib.
cambricum 810
dubium ib.
hybridum 809
nudicaule ib.
orientale 810
Rhoeas 809
somniferum 810

Papuleria 304, 429
crystallina 429

Paralea 773, 798
gujanensis 798

Pariana 773, 828
campestris 828

Parietaria 217, 266
cretica 266
debilis ib.
indica ib.
judaica ib.
lusitanica ib.
officinalis ib.
urticæfolia ib.

Paris 603, 643
quadrifolia 643

Parivoa 1076, 1085
grandiflora 1085
tomentosa ib.

Parkinsonia 655, 667
aculeata 667

Parnassia 312, 507, 508
palustris 508
polynectaria 507

Parthenium 291, 375
Hysterophorus 375
integrifolium ib.

Paspalum 87, 155
conjugatum ib.
decumbens ib.
dissectum ib.
distichon ib.
filiforme ib.
hirsutum ib.
longiflorum ib.
membranaceum ib.
orbiculare ib.
paniculatum ib.
præcox ib.
scrobiculatum ib.
vaginatum ib.
villosum ib.
virgatum ib.

Passerina 601, 634
anthylloides 634
capitata ib.
ciliata ib.
ericoides ib.
filiformis ib.
grandiflora ib.
hirsuta ib.
laxa ib.
Matnak ib.
spicata ib.
uniflora ib.

Passiflora 311, 500-503
adulterina 501
alata ib.
angustifolia ib.
aurantia 502
cærulea 503
capsularis 501
ciliata 502
coccinea 501
cuprea ib.
fœtida 502

Passiflora
glauca 502
heterophylla ib.
hirsuta ib.
holosericea ib.
incarnata ib.
laurifolia 500
lutea 502
maliformis 501
minima 502
mixta ib.
multiflora 501
Muracuja ib.
normalis ib.
oblongata ib.
pallida 500
parviflora 502
pedata 503
perfoliata 501
punctata 502
quadrangularis 501
rotundifolia 502
rubra 501
serrata 503
serratifolia 500
stipulata 502
suberosa ib.
tiliæfolia 501
Vespertilio ib.

Pastinaca 310, 490
lucida 490
opopanax ib.
sativa ib.

Patabea 213, 280
coccinea 280

Patagonula 293, 393
americana 393

Patima 299, 366
gujanensis 366

Pattersonia 888, 925
caroliniana 925

Paullinia 603, 641, 642
asiatica 641
barbadensis ib.
caribæa ib.
carthaginensis ib.
curassavica ib.
Cururu ib.
divaricata ib.
diversifolia 642
japonica 641
mexicana ib.
nodosa ib.
pinnata 642
polyphylla 641
Seriana ib.
tetragona 642
tomentosa ib.
triternata 641
Vespertilia 642

Pavetta 212, 243
caffra 244
fœtidissima 243
indica 244

Pavonia 1000, 1060, 1061
aristata 1060
cancellata ib.
coccinea 1061
Columella ib.
cuneifolia ib.
hastata ib.
paniculata 1060
papilionacea 1061
præmorsa ib.
Spicata 1060
spinifex ib.
urens 1061
zeylanica 1060

Paypayrola 303, 419
gujanensis 419

Pectis 1164, 1246
ciliaris 1246
humifusa ib.
linifolia ib.
punctata ib.

PEDALIUM 890, 965
Murex 965

Pedicularis 889, 925-927
acaulis 927
canadensis 926
comosa ib.
cristata ib.
flammea ib.
flava ib.
foliosa ib.
hirsuta ib.
incarnata ib.
lapponica ib.
myriophylla 925
palustris ib.
recutita 926
resupinata ib.
rosea ib.
rostrata 925
Sceptrum carolinum 926
silvatica 925
spicata 927
striata ib.
tristis 926
tuberosa ib.
verticillata ib.

Peganum 741, 750
dauricum 750
Harmala ib.
retusum ib.

Peltaria 967, 977
alliacea 977
capensis ib.

Penæa 212, 249
fruticulosa 249
furcata ib.
lateriflora ib.
marginata ib.
mucronata ib.
myrtoides ib.
Sarcocolla ib.
squamosa ib.
tetragona ib.
Pennantia 304, 430
corymbosa 430
Pentaglossum 20, 50
linifolium 50
Pentapetes 998, 1028
acerifolia 1028
Erythroxylon ib.
suberosa ib.
velutina ib.
Penthorum 662, 733
sedoides 733
Peplis 526, 578
Portula 578
tetrandra ib.
Pera 778, 840
arborea 840
Perama 210, 232
hirsuta 232
Perdicium 1163, 1243 *sq.*
brasiliense 1243
lævigatum 1244
magellanicum ib.
radiale 1243
semifloscularе 1243
tomentosum 1244
PERGULARIA 306, 440
glabra 440
PERGULARIA
japonica 440
tomentosa ib.
Periconia 1486
lichenoides ib.
Perilla 885, 904
ocymoides 904
Periploca 306, 440, 441
africana 440
capsularis ib.
emetica 441
esculenta 440
græca ib.
indica ib.
lævigata ib.
Secamone ib.
silvestris 441
tunicata ib.
Petagnana 1078, 1119
sensitiva 1119
Petaloma 658, 678
Mouriri 678
myrtilloides ib.
Petesia 212, 244
carnea 244
stipularis ib.
tomentosa ib.
Petitia 211, 245
domingensis 245
Petiveria 528, 589
alliacea 589
octandra ib.
Petrea 889, 944
volubilis 944
Petrocarya 593, 596
campestris 596
montana ib.
Peucedanum 308, 477
alpestre 477
altaticum ib.
aureum ib.
geniculatum ib.
japonicum ib.
minus ib.
nodosum ib.
officinale ib.
redivivum ib.
Silaus ib.
Peumus 523, 565, 566
alba 565
Boldus 566
mammosa 565
rubra ib.
Peziza 1286, 1451-1459
aceris 1458
Acetabulum 1459
albidula 1454
applanata 1458
aquifolia 1457
araneosa 1456
atra ib.
Auricula 1459
bicolor ib.
bolaris 1453
bulbosa 1451
cærulea 1457
caliciformis 1452
Caliculus ib.
callosa 1456
candidissima 1454
carnea 1458
cartilaginea 1457
carpini 1451
cerea 1459
chrysocoma 1457
ciliaris 1453

Peziza
ciliata 1456
cinerea 1457
citrina 1454
clandestina 1453
comitialis 1458
convivalis 1453
coriacea 1451
coronata 1455
Crater 1452
Craterella ib.
crenata 1455
crinita 1458
crispa ib.
crocea 1457
Crucibulum 1454
cupressi ib.
cupularis 1454
cyatoides ib.
Diadema 1455
discolor 1454
dubia 1452
echinophile 1451
elastica 1459
epiphylla 1455
eruciformis 1453
exilis 1459
expallescens 1457
fimetaria 1456
flava 1455, 1457
floccosa 1456
fulva 1458
Fungoidaster 1452
gelatinosa 1459
granulata 1456
grisea 1458
Hæmastigma 1455
Halleri 1452
hemisphærica 1455.
hepatica 1458
hians 1453
hirsuta 1456
hirta 1455

Peziza
hirtella 1456
Hirundo 1452
hispida 1455
hispidula 1456
hypocrateriformis 1456
jenensis 1457
immarginata ib.
infundibuliformis 1454
Infundibulum 1452
Labellum 1455
lacera ib.
lactea 1453
lanuginosa 1455
leporina 1456
limbata 1459
livida 1457
leucoloma 1458
lutescens 1454
marchica 1456
membranacea ib.
miniata 1453
minima 1454
minuta 1459
minutissima 1453
nana 1458
nigra 1456
nigrescens 1455
nivea 1457
nutans 1452
olivacea 1458
palacea 1453
palpebralis 1457
papyracea 1458
pedunculata 1453
Pileolus 1458
pineti ib.
pinguis 1455
polymorpha 1459
porphyrea ib.
porphyrospermos ib.

Peziza
pulla 1456
pulvinata 1457
punicea 1458
purpurea 1453
pusilla 1456
pustulata 1455
pyriformis 1453
quercina 1452
rhizophora 1455
rugosa 1457
saniosa 1459
sarcoides 1454
Sceptrum 1451
Schenkii 1457
scutellata ib.
Seminulum 1458
sepulcralis 1454
sigillatoria 1453
spadicea 1454
stercorea 1457
stipitata 1453
sulphurea 1452
tenella 1451
tomentosa 1456
tremelloides 1454
Tuba 1451
tuberosa ib.
umbrina 1453
urceolata ib.
urtica ib.
varia 1452
villosa ib.
violacea ib.
virescens 1457
virginea 1453
viridans 1456
viridis 1458
Phaca 1075, 1077, 1131, 1132
alpina 1131
arenaria ib.
australis ib.
bætica

Phaca
bætica 1131
incana 1132
microphylla ib.
muricata ib.
oxyphylla 1131
prostrata 1132
salsula 1131
sibirica ib.
silvatica ib.
trifoliata ib.
vesicaria 1132

Phacelia 293, 330
secunda 330

Phalaris 86, 153, 154
alpina 153
aquatica ib.
arundinacea ib.
aspera ib.
bulbosa ib.
canariensis ib.
caroliniana 154
cristata ib.
dentata ib.
disticha ib.
erucæformis 153
hispida 154
muricata ib.
nodosa 153
oryzoides ib.
paradoxa ib.
phleoides ib.
semiverticillata 154
setacea ib.
utriculata 153
vaginiflora 154
velutina ib.
zizanioides 153

Phallus 1285, 1448 *sq.*
Anastomosis 1449
c[illegible]dus ib.
esculentus 1449
fungoides 1448
Gigas ib.
impudicus 1449
Mokusin ib.
patulus ib.
Rete ib.
undosus 1448

Pharnaceum 311, 505, 506
albens 506
Cerviana 505
cordifolium 506
depressum ib.
dichotomum ib.
distichum ib.
glomeratum ib.
incanum ib.
lineare 505
maritimum 506
microphyllum 505
Mollugo 506
occultum ib.
quadrangulare ib.
serpyllifolium ib.
suffruticosum ib.
umbellatum ib.

Pharus 526, 579
aristatus 579
ciliatus ib.
lappulaceus ib.
latifolius ib.

Phascum 1284, 1323 *sq.*
alternifolium 1324
caulescens ib.
cernuum 1323
crispum ib.
cuspidatum ib.
muticum ib.
nitidum 1324
patens 1323
pedunculatum ib.
piliferum ib.
repens 1324
serratum 1323
subulatum ib.

Phaseolus 1075, 1077, 1101, 1102
aconitifolius 1102
alatus 1101
Asellus 1102
bipunctatus 1101
Caracalla 1102
farinosus 1101
helvolus ib.
hirtus 1102
inamœnus 1101
lathyroides 1102
lunatus 1101
Max 1102
Mungo ib.
nanus ib.
Palla 1101
perennis ib.
radiatus 1102
semierectus ib.
sphærospermos ib.
vexillatus 1101
vulgaris ib.

Phellandrium 309, 485
aquaticum 485
Mutellina ib.

Philadelphus 770, 786
aromaticus 786
coronarius ib.
floribundus ib.

Philadelphus
inodorus 786
laniger ib.

Philesia 996, 1012
magellanica 1012

Phillyrea 19, 25
angustifolia 25
latifolia ib.
media ib.

Philydrum 1, 9
lanuginosum 9

Phleum 86, 166, 167
alopecuroides 166
alpinum ib.
arenarium ib.
asperum 167
Bellardi 166
Gerardi ib.
Micheli ib.
nodosum ib.
paniculatum 167
pratense 166
schœnoides ib.
viride ib.

Phlomis 885, 910, 911
alba 910
alpina 911
caribæa 910
fruticosa 911
glabrata 910
Herba venti 911
indica 910
laciniata ib.
Leonotis ib.
Leonurus ib.
Lychnitis ib.
martinicensis 911
moluccoides 910

Phlomis
nepetifolia 911
Nissolii 910
purpurea 911
samia ib.
sinensis 910
tuberosa 911
zeylanica 910

Phlox 294, 338, 339
carolina 338
divaricata ib.
glaberrima ib.
maculata ib.
ovata ib.
paniculata ib.
pilosa ib.
setacea 339
sibirica 338
suaveolens ib.
subulata ib.
undulata ib.

Phœnix 83, 95
dactylifera 95
pusilla ib.

PHORMIUM 525, 561
bulbiferum 561
tenax ib.

Phryma 886, 921
carolinense 921
Leptostachyon ib.

Phylica 302, 401, 402
bicolor 401
buxifolia 402
callosa ib.
cordata ib.
dioica ib.
ericoides 401
eriophoros ib.
imberbis ib.
parviflora 402
pinifolia ib.

Phylica
plumosa 402
pubescens 401
spicata 402
stipularis 401
strigosa ib.

Phyllachne 2, 11
uliginosa 11

Phyllanthus 89, 203, 204
Arbuscula 204
bacciformis 203
carolinianus 204
Conami 203
Emblica ib.
falcatus 204
grandifolius 203
Hamrur 204
maderaspatensis 203
mimosoides ib.
Niruri ib.
nutans ib.
racemosus ib.
rhamnoides 204
simplex ib.
speciosus 203
stellatus 204
Urinaria ib.
virgatus ib.

Phyllis 307, 464
nobla 464

Physalis 296, 381, 382
Alkekengi 381
angulata 382
arborescens 381
aristata ib.
barbadensis 382
curassavica 381
dubia 382
flexuosa 38[illegible]

Physalis
limensis 382
lutea ib.
minima ib.
nutans ib.
pensilvanica 381
peruviana ib.
prostrata ib.
pruinosa 382
pubescens ib.
ramosa ib.
somnifera 381
tomentosa 382
viscosa 381

Phyteuma 297, 354, 355
americanum 355
betonicæfolium 354
Charmelii ib.
comosum ib.
hemisphæricum ib.
orbiculare ib.
pauciflorum ib.
pinnatum 355
scorzonerifolium 354
spicatum ib.

Phytolacca 663, 739
decandra 739
dioica ib.
icosandra ib.
octandra ib.

Picris 1161, 1170
asplenioides 1170
echioides ib.
hieracioides ib.
japonica ib.
scabra ib.

Pilobolus 1462
conglomeratus ib.
crystallinus ib.
roridus ib.

Pilularia 1284, 1322
globulifera 1322

Pimpinella 310, 491, 492
Anisum 492
dichotoma ib.
dioica ib.
glauca ib.
hircina ib.
magna ib.
nigra ib.
peregrina ib
saxifraga 491
Tragium 492

Pinguicula 20, 39
alpina 39
cærulea ib.
lusitanica ib.
lutea ib.
villosa ib.
vulgaris ib.

Pinus 1001, 1071-1074
Abies 1073
alba ib.
americana ib.
araucana ib.
balsamea ib.
canadensis ib.
Cedrus ib.
Cembra 1072
cupressoides 1074
glabra 1072
halepensis ib.
laricina 1073
Larix 1072
lutea ib.
mariana 1073
maritima 1072
occidentalis ib.
palustris ib.
pendula 1073

Pinus
Picea 1073
Pinaster 1071
Pinea 1072
resinosa ib.
rigida ib.
silvestris 1071
squarrosa 1072
Strobus ib.
Tæda ib.
virginiana 1071

Piper 22, 76-79
acuminatum 77
aduncum ib.
alpinum 78
Amalago 76
amplexicaule 79
Betel 76
blandum 77
capense ib.
clusiæfolium ib.
cordifolium 79
Cubeba 77
decumanum ib.
discolor 78
distachyon ib.
excelsum 79
filiforme ib.
geniculatum 78
glabellum 79
hispidulum ib.
hispidum 78
latifolium 77
longum ib.
macrophyllum 78
maculatum 77
magnoliæfolium ib.
Malamiri 76
medium 77
methysticum 78
nigrum 76
nitidum 78
numularifolium 79

Piper
obtusifolium 77
pallidum 79
pellucidum 77
peltatum 78
pulchellum ib.
quadrifolium ib.
reflexum ib.
reticulatum 77
retusum ib.
rotundifolium ib.
scandens 79
serpens ib.
Siriboa 76
stellatum 79
tenellum ib.
tetraphyllum ib.
trifolium 78
umbellatum ib.
verrucosum ib.
verticillatum ib.

Piriqara 770, 787
hexapetala 787
tetrapetala ib.

Piripea 888

Piscidia 1075, 1076, 1088
carthagenensis 1088
Erithrina ib.

Pisonia 303, 431
aculeata 431
buxifolia ib.
coccinea ib.
inermis ib.
subcordata ib.

Pistacia 305, 457
Lentiscus 457
narbonensis ib.
Terebinthus ib.
trifolia ib.
vera ib.

Pistia 525, 565
Stratiotes 565

Pisum 1075, 1077, 1107, 1108
arvense 1107
maritimum 1108
Ochrus ib.
sativum 1107

Pitcarnia 522, 530
angustifolia 530
bromeliæfolia ib.
latifolia ib.

Pittosporum 311, 411, 412
coriaceum 412
tenuifolium 411
umbellatum ib.

Placoma 390
pendulum ib.

Plagianthus 998, 1026
divaricatus 1026

Planera 86, 150
aquatica 150

Plantago 212, 251-254
ægyptiaca 253
afra 254
albicans 252
alpina 253
altissima 252
argentea ib.
asiatica ib.
Bellardi ib.
caroliniana 254
Columnæ 253
Cornuti ib.
coronopifolia ib.
crassifolia ib.
cretica ib.
cylindrica ib.

Plantago
Cynops 254
decumbens 253
dentata 252
exigua 254
Gouani 251
gracilis 252
incurvata 253
indica 254
Lagopus 252
lanata ib.
lanceolata ib.
Loeflingii 253
lusitanica 252
macrorhiza 251
major ib.
maritima 253
media 252
minuta ib.
ovata 253
Psyllium 254
serpentina 253
Serraria 252
subulata 253
virginica 252

Platanus 777, 821
occidentalis 821
orientalis ib.

Plectronia 302, 419
ventosa 419

Plegorhiza 647, 652
Guaicuru 652

Plinia 771, 796
crocea 796
pedunculata ib.

Plocama 296, 428
pendulum 428

Plotea 295, 404
Adansoni 404

Pluckenetia 997, 1013
volubilis 1013

Plumbago 291, 337, 338
europæa 337
rosea 42
scandens 338
zeylanica 337
Plumieria 294, 437
alba 437
obtusa *ib.*
pudica *ib.*
rubra *ib.*
Poa 88, 179-183
abissinica 180
alpina 179
amabilis 180
amboinensis 182
anceps 180
angustifolia 179
annua *ib.*
aquatica *ib.*
aspera 181
barbata 180
bohemica 181
brizoides *ib.*
bulbosa *ib.*
capillaris 180
ciliunensis 181
ciliaris 182
cinerea 183
compressa 182
contracta *ib.*
cristata *ib.*
cynosuroides *ib.*
decumbens *ib.*
distans 181
disticha 183
divaricata 181
dura *ib.*
Eragrostis 180
expensa 181
ferruginea 180
flava 179
Gerardi *ib.*
Poa
glomerata 182
glutinosa 180
hirta *ib.*
japonica *ib.*
malabarica 181
maritima *ib.*
montana *ib.*
multiflora 182
nemoralis 181
nitens 179
nutans 182
palustris 179
peruviana 182
Phœnix 180
pilosa 179
planiculmis 182
plumosa 180
pratensis 179
prolifera 180
punctata *ib.*
rigida 181
salina 179
sicuta 183
silvatica 180
simplex 179
sinensis 181
spicata 182
subnuda 179
tenella 181
trivialis 179
unioloides 182
Villarsii *ib.*
viscosa 180
Podophyllum 776, 808
diphyllum 808
peltatum *ib.*
Poinciana 655, 671
bijuga 671
elata *ib.*
pulcherrima *ib.*
Poiretia 213, 263
erecta 263
procumbens *ib.*
Polemonium 294, 347
cæruleum 347
campanuloides *ib.*
dubium *ib.*
reptans *ib.*
rœlloides *ib.*
POLLIA 525, 556
japonica 556
Pollichia 885, 905
amplexicaulis 905
Galeobdolon *ib.*
Polyanthes 524, 559
tuberosa 559
Polycardia 301, 407
madagascariensis 407
Polycarpon 89, 207, 208
magellanicum 207
tetraphyllum 208
uniflorum *ib.*
Polycnemum 84, 106
arvense 106
monandrum *ib.*
oppositifolium *ib.*
sclerospermum *ib.*
Polygala 1075, 1081, 1083
æstuans 1082
alopecuroides *ib.*
amara *ib.*
aspalatha *ib.*
bracteolata *ib.*
brasiliensis *ib.*
Chamæbuxus 1082

Polygala
ciliata 1083
cruciata ib.
cymosa ib.
diversifolia 1082
Fimutu ib.
glaucoides 1083
grandiflora ib.
Heisteria 1082
incarnata 1081
lutea 1083
major 1081
microphylla 1082
mixtus ib.
monspeliaca 1081
myrtifolia 1082
oppositifolia ib.
paniculata 1081
penæa 1082
polygama 1083
sanguinea ib.
Senega ib.
sibirica 1081
sinensis 1082
spinosa 1081
squarrosa 1082
stipulacea 1083
teretifolia 1081
theezans 1082
trichosperma 1081
triflora 1083
trinervia 1082
umbellata 1081
verticillata 1083
violacea 1082
viridescens 1083
vulgaris 1081

Polygonum 603
637-639
amphibium 637
arifolium 638

Polygonum
articulatum 639
aviculare ib.
barbatum 638
Bellardi 639
Bistorta 638
Convolvulus 639
crassifolium ib.
divaricatum ib.
dumetorum ib.
erectum ib.
Fagopyrum ib.
filiforme 638
frutescens 637
Hydropiper 638
lapatifolium 637
maritimum 639
minus 638
multiflorum 639
ocreatum 638
orientale ib.
pensilvanicum ib.
perfoliatum ib.
Persicaria ib.
sagittatum ib.
scandens 639
serratum ib.
sinense ib.
tataricum ib.
tinctorium 638
undulatum 639
virginianum 637
viviparum 639

Polymnia 1166, 1270
abissinica 1270
canadensis ib.
carnosa ib.
spinosa ib.
Tetragonotheca ib.
Uvedelia ib.
Wedelia ib.

Polypodium 1283;
1304-1314
acrostichoides 1305
aculeatum 1312
adiantiforme 1311
adiantoides 1310
æmulum 1308
affine 1313
alatum 1306
alpinum 1313
angustifolium 1305
arboreum 1313
aristatum 1311
armatum 1314
asperum ib.
asplenifolium 1306
aureum ib.
auriculatum 1309
axillare 1314
Barometis 1312
bulbiferum ib.
Callipteris 1311
cambricum 1307
capense 1313
cicutarium 1308
comosum 1305
cordifolium 1309
coriaceum 1308
crassifolium 1305
crenatum 1309
crenulatum 1313
crispatum 1306
cristatum 1311
dealbatum 1313
decussatum 1312
deltoideum 1307
dentatum 1308
denticulatum 1314
dichotomum 1313
dissectum 1308
dissimile 1309
Dryopteris 1313
echinatum 1309

Polypodium
effusum 1308
ellipticum 1306
elongatum 1313
erectum 1310
exaltatum 1309
exosum 1311
extensum 1312
falcatum 1309
Filix femina 1312
Filix mas ib.
fontanum 1308
fragile 1312
fragrans 1310
fraxinifolium ib.
glaucum 1313
gramineum 1304
gujanense 1310
hastatum 1306
heterophyllum 1305
Hippocrepis 1310
hirsutulum ib.
hirtum 1308
horridum 1314
incisum 1307
invisum ib.
lacerum 1313
laciniatum 1311
lanceolatum 1304
latifolium 1311
lineare 1305
Lonchitis 1309
loriceum 1306
lunulatum 1313
lycopodioides 1304
marginale 1309
marginatum 1313
marginellum 1305
medullare 1312
minimum 1304
molle 1310
mollissimum ib.
montanum ib.

Polypodium
montium 1314
multifidum ib.
muricatum 1306
myosuroides 1306
noveboracense 1312
nudum ib.
nymphale 1311
obliteratum 1307
orientale 1312
Otites 1307
parasiticum 1310
patens 1308
pectinatum 1307
pendulum 1306
pennigerum 1311
Phegopteris 1310
phylliridis 1305
phymatodes 1306
Pica ib.
pilosselloides 1305
plantagineum ib.
pubescens 1212
punctatum 1308
pustulatum 1306
pyramidale 1313
quadripinnatum 1314
quercifolium 1307
regium 1313
repens 1305
reptans 1309
reticulatum 1310
retroflexum ib.
rhæticum 1312
rhizophyllum 1309
rigidum 1304
sagittatum 1309
scandens 1306
scolopendroides 1307
semicordatum 1309
serpens 1305
Serra 1307
serratum 1310

Polypodium
setiferum 1312
setigerum ib.
setosum 1311
simile 1309
speluncæ 1313
spinosum ib.
squamatum 1306
stoloniferum 1305
struthionis 1307
surinamense 1305
suspensum 1306
taxifolium 1307
temellum 1310
tetragonum 1307
Thelypteris 1311
triangulare 1309
trichomanoides 1306
trifoliatum 1308
trifurcatum 1305
triphyllum 1308
umbrosum 1314
unitum 1309
varium 1311
vestitum ib.
villosum 1312
virginianum 1307
vulgare ib.
Polypremum 212, 248
procumbens
Polytrichum 1284, 1326 *sq.*
aloides 1326
alpinum 1327
commune 1326
convolutum 1327
hercynicum ib.
juniperinum 1326
magellanicum ib.
nanum ib.
piliferum ib.

Polytrichum
pulverulentum 1326
ferratum ib.
undulatum ib.
urnigerum 1327
Pometia 593, 595, 596
pinnata 595
ternata 596
POMMEREULLA 83, 123
cornucopiæ 123
monoica ib.
Ponæa 603, 640
gujanenfis 640
Pontederia 524, 533, 534
azurea 533
cordata 534
haftata ib.
limofa ib.
ovata 533
rotundifolia ib.
vaginalis 534
Populus 601, 630-631
alba 630
angulata ib.
balfamifera ib.
canadenfis 631
candicans 630
carolinenfis 631
dilatata 630
græca ib.
heterophylla ib.
lævigata ib.
monilifera ib.
nigra ib.
tremula ib.
PORANA 307, 339
volubilis 339
Poraqueiba 299, 331
gujanenfis 331
Porella 1284, 1322
pinnata 1322
Portefia 600, 609, 610
mucronata 610
ovata 609
Portlandia 297, 360
coccinea 360
grandiflora ib.
hexandra ib.
tetrandra ib.
Portulaca 741, 751, 752
Anacampferos 752
arabica ib.
craffifolia ib.
fruticofa ib.
halimoides 751
imbricata 752
meridiana ib.
oleracea 751
patens 752
pilofa 751
quadrifida 752
triangularis ib.
Poffira 773, 797
fimplex 797
triphylla ib.
Potamogeton, 220, 288, 289
compreffum 288
crifpum ib.
denfum ib.
fluitans ib.
gramineum ib.
lucens ib.
marinum 289
natans 288
nitens ib.
pectinatum ib.
Potamogeton
perfoliatum 288
pinnatum 289
pufillum ib.
ferratum 288
fetaceum ib.
verticillatum 289
Potentilla 781, 857-860
alba 859
alchimiloides ib.
Anferina 858
argentea ib.
aftracanica 859
aurea ib.
bifurca 858
canadenfis ib.
caulefcens 859
Clufiana ib.
fragarioides 858
fruticofa ib.
grandiflora 860
hirta 858
intermedia 859
monfpelienfis ib.
multifida 858
nitida 859
nivalis 858
nivea 860
norwegica ib.
opaca 859
penfilvanica 858
pimpinelloides ib.
recta ib.
reptans 859
rupeftris 858
falisburgenfis 859
fericea 857
ftipularis 858
fubacaulis 860
fupina 858
tridentata 860

Potentilla
valderia 858
verna 859
Poterium 777, 832
caudatum 832
hybridum *ib.*
Sanguiforba *ib.*
fpinofum *ib.*
Pothos 218, 274, 275
acaulis 274
cordata 275
crenata 274
cufcuaria *ib.*
lanceolata *ib.*
macrophylla 275
ovata 274
palmata 275
pinnata *ib.*
fcandens 274
violacea *ib.*
Poupartia 663, 728
gujanenfis 728
Prafium 886, 921
coccineum 921
incarnatum *ib.*
majus *ib.*
minus *ib.*
purpureum *ib.*
PREMNA 887, 944
integrifolia 944
ferratifolia *ib.*
Prenanthes 1161, 1173, 1174
alba 1174
altiffima *ib.*
chondrilloides 1173
debilis *ib.*
dentata *ib.*
haftata 1174
hifpida 1173
humilis 1174
Prenanthes
japonica 1174
integra 1173
lyrata 1174
multiflora *ib.*
muralis *ib.*
pinnata *ib.*
purpurea *ib.*
repens *ib.*
finenfis 1173
fpinofa *ib.*
fquarrofa 1174
tenuifolia 1173
viminea *ib.*
Primula 291, 326, 327
acaulis 326
Auricula 327
calycantha 326
carniolica 327
cortufoides *ib.*
elatior 326
farinofa 327
glutinofa *ib.*
hirfuta *ib.*
integrifolia *ib.*
longiflora *ib.*
lutea *ib.*
minima *ib.*
nivalis *ib.*
officinalis 326
Palinuri 327
verticillata *ib.*
villofa *ib.*
vifcofa *ib.*
Prinos 523, 574
glaber 574
lucidus *ib.*
montanus *ib.*
fideroxyloides *ib.*
verticillatus *ib.*
Prockia 772
Crucis *ib.*
Procris 217, 267
axillaris 267
Proferpiniaca 89, 207
paluftris 207
Profopis 657, 678
fpicigera 678
Protea 215, 221-225
acaulis 224
alba 223
argentea 224
aulacea 223
bracteata 222
bruniades 223
caudata 222
cinerea 224
comofa 222
conifera 224
conocarpa 222
cordata 225
corymbofa 223
crinita 222
cucullata *ib.*
cyanoides 221
cynaroides 225
decumbens 221
divaricata 225
elliptica 222
florida 221
Gaguedi 225
glabra *ib.*
glomerata 221
grandiflora 224
heterophylla 221
hirta 225
hypophylla 222
imbricata 224
incurva 222
Lagopus 221
lanata 223
Levifanus 224
linearis 223
mellifera *ib.*

Protea
myrtifolia 224
nana 223
obliqua *ib.*
pallens 224
parviflora *ib.*
patula 221
phylicoides *ib.*
pinifolia 222
plumosa 224
prolifera 223
puber 225
purpurea 223
racemosa 222
repens 223
saligna 224
Sceptrum 222
Scolimus 223
sericea 224
Serraria 221
spatulata 225
speciosa *ib.*
sphærocephala 221
spicata *ib.*
strobilina 224
tomentosa 222
torta 223
totta 225
triternata 221
umbellata 223

Prunella 886, 920
grandiflora 920
hyssopifolia *ib.*
indica *ib.*
intermedia *ib.*
laciniata *ib.*
parviflora *ib.*
vulgaris *ib.*

Prunus 771, 794-796
americana 795
aspera 796
avium 795

Prunus
canadensis 794
carolina *ib.*
Cerasus 795
Chamæcerasus *ib.*
domestica *ib.*
elliptica *ib.*
glandulosa *ib.*
japonica *ib.*
incisa 796
insititia 795
latifolia *ib.*
Lauro-cerasus 794
lusitanica *ib.*
Mahaleb 795
nana 794
nigra 795
occidentalis 794
Padus *ib.*
paniculata 795
pensilvanica *ib.*
pumila *ib.*
rubra 794
sibirica 795
sphærocarpa 794
spinosa 795
tomentosa 796
virginiana 794

Psathura 523, 577
borbonica 577

Psidium 770, 786, 787
aromaticum 786
Cujavillus *ib.*
decaspermum *ib.*
grandiflorum *ib.*
guineense *ib.*
montanum 787
pomiferum 786
pyriferum *ib.*

Psoralea 1077, 1138, 1139
aculeata 1138
americana 1139
aphylla 1138
axillaris 1139
bituminosa *ib.*
bracteata 1138
capitata *ib.*
corylifolia *ib.*
Dalea 1139
decumbens 1138
enneaphylla 1139
foliolosa *ib.*
glandulosa *ib.*
hirta 1138
lævigata 1139
leporina *ib.*
lutea 1138
palæstina *ib.*
pentaphylla 1139
pinnata *ib.*
prostrata *ib.*
repens 1138
rotundifolia *ib.*
spicata *ib.*
stachydis *ib.*
tenuifolia *ib.*
tetragonoloba 1139

Psychotria 298, 362, 364
alpina 364
asiatica 363
brachiata 364
citrifolia 363
corymbosa 362
crocea 363
emetica 364
fœtens 363
glabrata *ib.*
grandis 364
herbacea *ib.*

Pſychotria
hirſuta 363
horizontalis ib.
laurifolia ib.
marginata ib.
Myrſtiphyllum ib.
nervoſa ib.
nutans ib.
paraſitica 364
Pavetta ib.
pedunculata 362
pubeſcens 363
ſerpens 364
ſpecioſa 362
tenuifolia 364
uliginoſa ib.
violacea ib.
Ptelea 215, 260
trifoliata 260
Pteris 1283, 1297-1299
aculeata 1299
anguſtifolia 1297
aquilina 1299
arborea 1298
arguta ib.
atro-purpurea 1299
biaurita 1298
caudata 1299
comans 1298
cretica ib.
decurſiva 1299
dentata ib.
denticulata 1298
eſculenta 1299
farinoſa ib.
furcata 1297
grandifolia ib.
heterophylla 1299
humilis 1298
lanceolata 1297
lineata ib.
longifolia 1298
Pteris
lunulata 1298
mutilata 1299
nervoſa 1298
pedata ib.
piloſelloides 1297
quadrifoliata ib.
quadripinnata 1299
regularis ib.
rotundifolia 1298
ſemipinnata 1299
ſerrata ib.
ſerrulata 1298
ſinuata ib.
ſtipularis ib.
ſubciliata ib.
trichomanoides ib.
tricuſpidata 1297
viridis 1299
vittata 1298
Pterocarpus 1076, 1086, 1087
anterus 1087
buxifolius ib.
Draco 1086
Ecaſtaphyllum ib.
hemipterus 1087
lunatus 1086
ſantalinus ib.
Pteronia 1163, 1201, 1202
camphorata 1201
caroliniana 1202
cephalotes 1201
cinerea ib.
faciculata 1202
flexicaulis 1201
glabrata ib.
glomerata ib.
hirſuta ib.
inflexa 1202
membranacea ib.
Pteronia
minuta 1201
oppoſitifolia ib.
pallens ib.
retorta 1202
ſcarioſa ib.
ſpinoſa 1201
ſtricta ib.
villoſa ib.
Puccinia 1286, 1462
biſſoides 1462
ſimplex ib.
Pulmonaria 291, 319, 320
anguſtifolia 319
maritima 320
officinalis 319
ſibirica 320
ſuffruticoſa 319
virginica ib.
Punica 770, 793
Granatum 793
nana ib.
Puya 525, 553
chilenſis 553
Pyrenium 1286, 1480 *ſq.*
aureum 1480
lignorum ib.
metallorum 1481
terreſtre ib.
Pyrola 658, 698
maculata 698
minor ib.
rotundifolia ib.
ſecunda ib.
umbellata ib.
uniflora ib.
Pyroſtria 211, 246
Commerſoni 246

Pyrus 779, 841, 842
angustifolia 842
baccata ib.
communis 841
coronaria 842
Cydonia ib.
dioica ib.
hadiensis ib.
hybrida ib.
japonica ib.
Malus ib.
nivalis ib.
Pollveria 841
præcox ib.
salicifolia 842
spectabilis ib.
spinosa ib.

Qualea 3, 10
cærulea 10
rosea ib.
Quapoya 313, 514
scandens 514
Quararibea 997, 1014
gujanensis 1014
QUASSIA 657, 682
amara 682
excelsa ib.
Simaruba ib.
Quercus 603, 643-645
acuta 644
Ægilops ib.
alba 645
aquatica ib.
Cerris 644
coccifera ib.
cuspidata ib.
dentata ib.
Esculus 645
femina 644

Quercus
glabra 644
glauca ib.
humilis ib.
Ilex ib.
lævis 645
lyrata ib.
molucca 644
nigra 645
palustris ib.
Phellos 643
Prinus 644
pumila ib.
Robur ib.
rubra 645
sempervirens 643
serrata 644
sinuata 645
Suber 644
villosa 645
Queria 89, 208
canadensis 208
hispanica ib.
Quillaja 743, 767
saponaria 767
Quinchenamelium 311, 493
chilense 493
Quisqualis 658, 686
indica 686
Quivisia 600, 633
fruticosa 633

Racua 213, 245
torrida 245
Radiola 220, 289
linoides 289
Rajania 527, 580, 581
angustifolia 580
caroliniana 581

Rajania
cordata 581
hastata ib.
hexaphylla ib.
ovata 580
quinata 581
quinquefolia ib.
Randia 296, 335
aculeata 335
mitis ib.
Ranunculus 783, 877-881
abortivus 878
aconitifolius 881
acris 878
alpestris ib.
amplexicaulis 877
aquatilis 879
arvensis 881
asiaticus 879
auricomus 878
Breynii 880
bulbosus ib.
bullatus 877
cassubicus 878
chærophyllos 880
Columnæ ib.
creticus 878
falcatus 880
Ficaria 877
Flammula ib.
fluviatilis 880
glacialis 879
gramineus 877
grandiflorus 879
hederaceus ib.
heterophyllus ib.
hirsutus 880
illyricus 881
lanuginosus 879
lapponicus 880
Lingua 877
monspeliensis 880

Ranunculus
multifidus 879
muricatus ib.
nitidus 878
nivalis ib.
nodiflorus 877
orientalis 879
paludosus 880
parnassifolius 877
parviflorus 879
parvulus ib.
pensilvanicus 881
plantaginifolius 877
platanifolius 880
polyanthemos ib.
polymorphus 878
pyrenæus 877
repens 880
reptans 877
rutæfolius 881
sceleratus 878
ternatus 881
Thora 878
Rapanea 298, 330
gujanensis 330
Raphanus 967, 990, 991
caudatus 990
Erucaria 991
erucoides ib.
lyratus ib.
Raphanistrum 990
sativus ib.
sibiricus ib.
tenellus 991
Rauwolfia 295, 432
canescens 432
nitida ib.
tomentosa ib.
Ravenala 523, 567
madagascariensis 567
Ravensara 742, 754
aromatica 754
Reaumuria 779, 851
vermiculata 851
Reichelia 311, 449
angustifolia 449
palustris ib.
Relhamia 211, 247
vaginea 247
RENEALMIA 1, 5
exaltata 5
Reseda 743, 758, 759
alba 758
canescens ib.
dipetala ib.
fruticulosa 759
glauca 758
hexagyna ib.
lutea ib.
Luteola ib.
mediterranea ib.
odorata ib.
Phyteuma ib.
purpurascens ib.
sesamoides ib.
tetragyna ib.
undata ib.
RESTIO 89, 201, 202
acuminatus 202
argenteus ib.
aristatus 201
cernuus ib.
dichotomus ib.
digitatus 202
Elegia 201
erectus 202
fruticosus ib.
imbricatus 201
incurvatus 202
paniculatus 201
parviflorus 202
scariosus ib.
RESTIO
Scopa 202
simplex 201
spiciger ib.
tectorum ib.
tetragonus 202
thamnochortus ib.
triflorus 201
triticeus 202
umbellatus 201
vaginatus ib.
verticillaris ib.
vimineus ib.
virgatus 202
Reticularia 1287, 1471 sq.
alba 1472
angulata ib.
cæsia 1471
cinerea ib.
complanata ib.
Epixylon ib.
fragilis ib.
hemisphærica ib.
Lycogala ib.
Lycoperdon ib.
nigra 1472
ramosa 1471
sinuosa 1472
sphæroidalis ib.
Ustilago ib.
utricularis 1471
Reynoutria 660, 702
japonica 702
Retzia 293, 333
spicata 333
Rhacoma 215, 255
Crossopetalum 255
Rhamnus 300, 398-401
Alaternus 400
alnifolius ib.

Rhamnus
alpinus 399
buxifolius 398
carolinus 399
catharticus 398
circumscissus 401
colubrinus 399
crenulatus 398
cubensis 399
dauricus 400
ellipticus 399
erythroxylon 400
Frangula 399
glandulosus ib.
heterogeneus 400
hybridus ib.
hydriensis 399
ignaneus 400
infectorius 398
Jusuba 401
latifolius 400
lineatus ib.
Lotus ib.
lycioides 398
micranthus 399
myrtinus ib.
mystacinus ib.
Napeca 401
Numularia ib.
Œnoplia ib.
oleoides 398
Paliurus 400
pentaphyllus 398
prinoides 400
pumilus 399
rupestris 400
Sarcomphalus 398
saxatilis ib.
scandens 399
sphærospermos ib.
Spina Christi 400
surinamensis ib.
tetragonus 399
theezans 398
Rhamnus
volubilis 399
Xylopyrus 401
Zizyphus 400
Rhepis 521, 568
arundinacea 568
flabelliformis ib.
Rheedia 774, 805
lateriflora 805
Rheum 648, 654
compactum 654
hybridum ib.
palmatum ib.
Rhabarbarum ib.
Rhaponticum ib.
Ribes ib.
tataricum ib.
Rhexia 599, 605, 606
Acisanthera 605
Alifanus 606
bicornis ib.
glutinosa ib.
jussieuoides ib.
lanceolata ib.
latifolia ib.
leucantha ib.
lutea ib.
mariana 605
petiolata 606
purpurea ib.
septemnervia ib.
trichotoma ib.
villosa ib.
virginica 605
Rhinanthus 888, 922, 923
Alectorolophus 923
capensis ib.
Crista galli 922
Elephas ib.
indicus 923
Rhinanthus
maximus 923
orientalis 922
trifidus 923
Trixago ib.
versicolor ib.
virginicus ib.
Rhizobolus 779, 841
butyrosus 841
tuberculosus ib.
Rhizomorpha 1485
capillaris ib.
cinchonæ ib.
fragilis ib.
Rhizophora 740, 746, 747
Agueras 747
Candel ib.
caseolaris ib.
conjugata 746
corniculata 747
cylindrica ib.
gymnorhiza ib.
Mangle ib.
Rhodiola 603, 645
rosea 645
Rhododendrum 659, 694
camtschaticum 694
caucasium ib.
Chamæcistus ib.
chrysanthum ib.
dauricum ib.
ferrugineum ib.
hirsutum ib.
maximum ib.
ponticum ib.
Rhodora ib.
Rhus 311, 494-496
angustifolium 495
aromaticum ib.

Rhus
atrum 495
cirrhifolium *ib.*
Cobbe *ib.*
Cominia *ib.*
corallinum 494
Coriaria *ib.*
Cotinus 495
cuneifolium *ib.*
digitatum 494
elegans 495
glabrum 494
Hypſelodendrum *ib.*
javanicum *ib.*
incifum 495
lævigatum *ib.*
lanceum *ib.*
lucidum *ib.*
Metopium 494
pauciflorum *ib.*
radicans *ib.*
Sænab 496
femialatum 494
fuaveolens 495
fuccedaneum 494
tomentofum 495
Toxicodendron 494
tridentatum 495
typhinum 494
Vernix *ib.*
villofum 495
viminale *ib.*
Riana 396
gujanenfis *ib.*
Ribes 302, 419, 420
alpinum 419
cynorbati 420
diacanthum 419
floridum *ib.*
Groffularia 420
nigrum 419
oxyacanthoides 420
petræum 419

Ribes
polycarpon 419
proſtratum *ib.*
reclinatum 420
rubrum 419
Uva crifpa 420
Riccia 1285, 1354 *ſq.*
arachnoidea 1355
cryftallina 1354
fluitans 1355
fruticulofa *ib.*
glauca *ib.*
minima *ib.*
natans 1354
pyramidata 1355
reticulata *ib.*
finuata *ib.*
Richardia 522, 573
fcabra 573
Ricinus 1001, 1074
communis 1074
dioicus *ib.*
inermis *ib.*
Mappa *ib.*
medius *ib.*
Tanarius *ib.*
Ricotia 968, 979
ægyptiaca 979
Rinorea 303, 396
gujanenfis 396
Rivina 216, 278
humilis 278
lævis *ib.*
octandra *ib.*
paniculata *ib.*
Robergia 663, 729
frutefcens 729
Robinia 1078, 1115, 1116
Caragena 1116
frutefcens *ib.*
Halodendrum *ib.*

Robinia
hifpida 1116
mitis *ib.*
Nicu *ib.*
Panacoco *ib.*
Pfeudacacia 1115
pygmea 1116
fepium 1115
fpinofa 1116
veficaria *ib.*
violacea 1115
Robinfonia 771, 796
gujanenfis 796
Rocama 305, 455
arabica 455
Rochefortia 307, 458
cuneata 458
ovata *ib.*
Roella 297, 353, 354
ciliata 353
decurrens 354
mufcofa *ib.*
reticulata *ib.*
fpicata *ib.*
fquarrofa *ib.*
Rohria 83, 93
Sckreberi 93
Tapura *ib.*
Rokejena 661, 703
deferti 703
Rotandra 1167, 1280
argentea 1280
Ronabea 298, 365
latifolia 365
Rondeletia 297, 359
americana 359
afiatica *ib.*
biflora *ib.*
difperma *ib.*
hirfuta *ib.*

Rondeletia
hirta 359
incana ib.
obovata ib.
pilosa ib.
thyrsoidea ib.
tomentosa ib.
trifoliata ib.
umbellata ib.
virgata ib.
Ropala 215, 225
montana 225
Rorida 213, 260
arabica 260
Roridula 302, 422
dentata 422
Rosa 780, 853-855
alba 855
alpina ib.
arvensis 853
blanda 854
canina 855
carolina 854
centifolia ib.
cinnamomea 853
collina 855
corymbosa ib.
Eglanteria 853
gallica 854
indica 855
moschata 854
multiflora 855
pendulina ib.
persica ib.
pimpinellifolia 853
pumila 854
rubiginosa ib.
rugosa ib.
sempervirens ib.
sinica 855
spinosissima 853
sulphurea 854
turbinata ib.
Rosa
villosa 854
virginiana ib.
Rosmarinus 20, 44
chilensis 44
officinalis ib.
ROTALA 83, 105
verticillaris 105
ROTTBŒLLIA 88, 196, 197
altissima 197
cœlorhachis ib.
compressa 196
corymbosa 197
dimidiata 196
exaltata 197
hirsuta ib.
incurvata 196
lævis 197
muricata ib.
punctata ib.
repens ib.
sanguinea ib.
Tranchelli ib.
Royena 661, 702
glabra 702
hirsuta ib.
lucida ib.
polyandra ib.
villosa ib.
Rubentia 301, 408
olivina 408
Rubia 214, 242
angustifolia 242
Bocconi ib.
chilensis ib.
cordifolia ib.
fruticosa ib.
lævis ib.
lucida ib.
peregrina ib.
tinctorium ib.
Rubus 781, 855-857
arcticus 857
australis 856
cæsius ib.
canadensis 855
Chamæmorus 857
Dalibarda ib.
erectus 856
fruticosus ib.
geoides 857
hispidus 856
jamaicensis ib.
japonicus ib.
idæus ib.
incisus ib.
moluccanus ib.
occidentalis ib.
odoratus ib.
palmatus ib.
parvifolius ib.
sanctus 857
saxatilis ib.
trifidus 856
triphyllus ib.
villosus 857
Rudbeckia 1165, 1259 *sq.*
angustifolia 1260
digitata 1259
fulgida 1260
hirta 1259
laciniata ib.
oppositifolia 1260
purpurea ib.
triloba 1259
Ruellia 889, 957-959
acaulis 959
adhærens 957
alternata ib.
Anagalis ib.
angustifolia ib.
antipoda 959
balta-

Ruellia
balsamica 958
biflora 959
blechioides 957
Blechum *ib.*
clandestina 958
crispa 957
depressa 958
distormis 959
erecta 958
fasciculata *ib.*
fragrans *ib.*
guttata 957
japonica 958
imbricata 959
intrusa *ib.*
littoralis *ib.*
longiflora 958
paniculata *ib.*
patula *ib.*
pilosa *ib.*
repanda 957
repens *ib.*
reptans 958
ringens *ib.*
rubra 957
strepens 958
tentaculata *ib.*
tuberosa *ib.*
uliginosa *ib.*
violacea 957
Ruitzia 1001, 1068
cordata 1068
laciniata *ib.*
lobata *ib.*
palmata *ib.*
Rumex 527, 584-586
Acetosa 586
Acetosella *ib.*
aculeatus *ib.*
acutus 585
ægyptius 584
alpinus 585
Rumex
aquaticus 585
arifolius *ib.*
aureus *ib.*
bipinnatus 586
Britannica 584
bucephalophorus 585
conglomeratus 584
crispus *ib.*
dentatus 585
digynus *ib.*
divaricatus *ib.*
glaber 586
glaucus 585
Hydrolapathum 584
lachenus *ib.*
Lunaria 585
luxurians 586
maritimus 585
multifidus 586
obtusifolius 585
paludosus 584
Patientia *ib.*
persicarioides 585
pictus 586
pulcher 584
roseus 585
sanguineus 584
scutatus 585
spinosus 586
tingitanus 585
tuberosus 586
verticillatus 584
vesicarius 585
Rumpfia 83, 99
amboinensis 99
Ruppia 220, 289
maritima 289
Ruscus 81, 104, 105
aculeatus 104
androgynus 105
Hypoglossum *ib.*
Ruscus
Hypophyllum 104
racemosus 105
Russea 214, 237
simplex 237
RUSSELIA 463
capensis *ib.*
Ruta 657, 676
chalepensis 676
graveolens *ib.*
legitima *ib.*
linifolia *ib.*
patavina *ib.*
pinnata *ib.*
tuberculata *ib.*
RUYSCHIA 300, 407
clusiæfolia 407
Surubea *ib.*

Sabicea 299, 367
aspera 367
cinerea *ib.*
hirta *ib.*
Saccharum 86, 152, 153
arundinaceum 152
benghalense *ib.*
biflorum *ib.*
hirsutum 153
Kœnigii 152
officinarum *ib.*
polystachyon *ib.*
Ravennæ *ib.*
spicatum *ib.*
spontaneum *ib.*
Teneriffæ *ib.*
Thunbergii *ib.*
Sagina 220, 289
apetala 289
erecta *ib.*

Sagina
procumbens 289
virginica *ib.*

Sagittaria 782, 884
acutifolia 884
natans *ib.*
obtusifolia *ib.*
sagittifolia *ib.*
trifolia *ib.*

SALACIA 82, 107
sinensis 107

Salicornia 2, 15, 16
arabica 15
caspica *ib.*
cruciata *ib.*
falcata *ib.*
fruticosa *ib.*
herbacea *ib.*
perfoliata 16
strobilacea 15
virginica *ib.*

Salix 22, 72-74
acuminata 74
ægyptiaca 72
alba 74
amygdalina 72
antifebrilis *ib.*
Arbuscula 73
arenaria *ib.*
aurita *ib.*
babylonica *ib.*
berberifolia 74
Caprea *ib.*
chilensis 73
cinerea 74
depressa 73
excelsa 74
fissa 73
flava 74
fragilis 72
fusca 74
glauca 73
hastata 72

Salix
herbacea 73
hermaphrodita 72
japonica *ib.*
incubacea 73
integra *ib.*
lanata *ib.*
lapponum *ib.*
mollissima 74
monandra 72
Myrsinites 73
myrtilloides *ib.*
nitida 74
pentandra 72
phylicifolia *ib.*
reticulata 73
retusa *ib.*
rosmarinifolia 74
serotina *ib.*
triandra 72
tristis 74
viminalis *ib.*
vitellina 72

Salmasia 311, 500
gujanensis 500

Salsola 306, 452-454
altissima 452
aphylla 453
arborescens *ib.*
Arbuscula *ib.*
articulata *ib.*
caroliniana 452
coquimbana 454
fruticosa 453
hirsuta 452
hyssopifolia *ib.*
imbricata 453
inermis *ib.*
Kali 452
laniflora 453
longiflora *ib.*
monandra 452
monobracteata 453

Salsola
mucronata 453
muricata *ib.*
orientalis *ib.*
polyclonos 452
prostrata 453
rosacea 452
salsa *ib.*
sativa *ib.*
Soda *ib.*
tetrandra 453
Tragus 452
vermiculata 453

Salvadora 217, 280
persica 280

Salvia 20, 44-48
abyssinica 48
acetabulosa 47
ægyptiaca 44
Æthiopis 47
africana *ib.*
argentea *ib.*
aurea *ib.*
aurita 48
austriaca 45
canariensis 47
ceratophylla *ib.*
ceratophylloides *ib.*
clandestina 46
coccinea 47
colorata *ib.*
cretica 44
dentata *ib.*
disermas 46
dominica *ib.*
Forskahlii 47
glutinosa *ib.*
hæmatodes 45
hispanica 46
Horminum 45
japonica 48
indica 46
leonuroides *ib.*

Salvia
lyrata 45
Merjamia 48
mexicana 46
napifolia ib.
nemorosa 45
nilotica 46
nubia ib.
nutans 48
occidentalis ib.
officinalis 45
paniculata 47
phlomoides 45
pinnata 47
pomifera 45
pratensis ib.
pseudococcinea 48
pyrenaica 46
rosæfolia 48
rugosa 46
runcinata 48
scabra ib.
Sclarea 47
serotina 45
silvestris ib.
Spielmanni 48
spinosa 47
syriaca 45
tenella 48
triloba ib.
urticifolia 45
verbenaca 46
verticillata ib.
virgata 47
viridis 45
viscosa ib.
SAMARA 215, 257
coriacea 257
læta ib.
pentandra ib.
Sambucus 310, 497, 498
canadensis 497

Sambucus
Ebulus 497
japonica ib.
laciniata 498
nigra ib.
racemosa ib.
Samolus 297, 358
Valerandi 358
Samyda 660, 699, 700
glabrata 699
pubescens 700
serrulata ib.
spinescens 699
tomentosa ib.
villosa ib.
viridiflora ib.
Sandoricum 656, 680
indicum 680
Sanguinaria 776, 808
canadensis 808
Sanguisorba 213, 255
canadensis 255
media ib.
officinalis ib.
Sanicula 308, 468
canadensis 468
europæa ib.
marilandica ib.
Santalum 216, 276
album 276
Santolina 1162, 1205 *sq.*
alpina 1206
anthemoides ib.
Chamæcyparissus 1205
fragrantissima 1206

Santolina
rosmarinifolia 1205
tinctoria ib.
Sapindus 603, 642
rigidus 642
Saponaria ib.
sinensis ib.
spinosus ib.
trifoliatus ib.
Saponaria 661, 709, 710
cretica 710
illyrica ib.
lutea ib.
ocymoides 709
officinalis ib.
orientalis 710
porrigens 709
Vaccaria 710
Sapota 742, 750
nigra 750
Saraca 1075, 1079
indica 1079
Sarothra 311, 507
gentianoides 507
Sarracenia 775, 811
flava 811
minor ib.
purpurea ib.
rubra ib.
Sassa 999, 1038
gummifera 1038
Sassia 599, 615
tinctoria 615
Satureja 885, 897, 898
capitata 897
græca ib.

Satureja
hortensis 898
juliana 897
montana ib.
rupestris ib.
spinosa 898
Thymbra 897
thymifolia 898
viminea 897

Satyrium 21, 55, 56
aculeatum 55
adnatum 56
albidum 55
capense ib.
elatum 56
Epipogium 55
giganteum ib.
hians ib.
hircinum ib.
hirtellum ib.
nigrum ib.
orchioides 56
orobanchoides 55
pedicellatum 56
plantagineum 55
repens ib.
spirale 56
tabulare 55
triste ib.
viride ib.

Saururus 594, 597
cernuus 597

Sauvagesia 302, 422
Adima 422
erecta ib.

Savastana 88, 177
hirta 177

Saxifraga 661, 704-707
adscendens 707
ajugifolia 706
aizoides ib.

Saxifraga
Aizoon 704
androsacea 705
aspera 706
autumnalis ib.
Bellardi 707
biflora 705
bronchialis 704
bryoides 705
bulbifera 706
burseriana 704
cæsia ib.
cernua ib.
cespitosa 707
Clusii 706
Cotyledon 704
crassifolia 705
cuneifolia ib.
cymbalaria 707
exarata 706
geranioides 707
Geum 705
granulata 706
groenlandica ib.
hederacea 707
Hirculus 706
hirsuta 705
hypnoides 707
media 704
moschata 707
muscoides 705
mutata 704
nivalis 705
oppositifolia ib.
orientalis 707
pedemontana ib.
pensilvanica 705
petræa 707
punctata 705
retusa 706
rivularis ib.
rotundifolia ib.
sarmentosa 705
sedoides 704

Saxifraga
sibirica 706
stellaris 705
tenella 704
trichodes 705
tridactylites 707
umbrosa 706

Scabiosa 210, 228-230
africana 230
alba ib.
alpina 228
amplexicaulis ib.
argentea 230
arvensis 229
atropurpurea 230
attenuata 228
columbaria 229
crenata ib.
cretica ib.
dubia 230
graminifolia ib.
gramuntia 229
grandiflora 230
heterophyllos 229
indurata 230
integrifolia 228
isetensis 230
leucantha 228
lyrata 230
maritima 229
monspeliensis 230
ochroleuca ib.
palæstina ib.
papposa 229
prolifera ib.
pterocephala ib.
pumila 230
rigida 228
scabra ib.
sicula 230
silvarica 229
stellata ib.

Scabiosa
Succisa 228
syriaca ib.
tatarica ib.
tenuifolia 229
tomentosa ib.
transilvanica 228
Trenta 229
ucranica 230
uralensis 228
Scabrita 214, 233
scabra 233
SCÆVOLA 297, 361
Lobelia 361
Scandix 309, 486 487
australis 487
Cerefolium ib.
chilensis ib.
gilanica 486
grandiflora 487
infesta ib.
nodosa ib.
odorata 486
Pecten 487
procumbens ib.
trichosperma ib.
Sceura 210, 260
marina 260
Schæfferia 219, 284
completa 284
lateriflora ib.
Schefflera 313, 520
digitata 520
Scheuchzeria 527, 586
palustris 586
Schinus 658, 683
Arcira 683
Huygan ib.
Molle ib.
Schmidelia 602, 635
racemosa 635
Schœnus 84, 133-137
albus 136
Bobartiæ ib.
bulbosus ib.
capillaris 137
Cladium ib.
compar 135
compressus 136
cuspidatus 135
cyperinus 136
cyperoides 137
densus 135
effusus 137
Fribri 136
fasciatus ib.
ferrugineus 134
fuscus ib.
glomeratus 136
gracilis 137
incanus 136
Mariscus 135
mucronatus ib.
nigricans ib.
odoratus 137
paniculatus ib.
pusillus ib.
radiatus 136
restioides ib.
setaceus 137
stellatus 136
surinamensis 137
thermalis 136
tuberosus 137
umbellatus ib.
ustulatus 135
Schæpfia 299, 376
Schreberi 376
Schollera 599, 622
Oxycoccos 622
Schotia 657, 673
speciosa 673
Schranckia 313, 515
quinquefaria 515
Schrebera 307, 458
schinoides 458
Schwalbea 888, 925
americana 925
Schwenkia 20, 38
americana 38
Scilla 523, 552, 553
amœna 552
anthericoides ib.
autumnalis ib.
bifolia ib.
hyacinthoides ib.
Jacquini ib.
japonica ib.
italica ib.
Lilio-Hyacinthus ib.
lingulata ib.
lusitanica ib.
maritima ib.
numidica ib.
obtusifolia ib.
peruviana ib.
tetraphylla ib.
unifolia ib.
verna 553
Scirpus 84, 124-129
acicularis 125
æstivalis 128
annuus 124
anomalus 128
antarcticus 129
argenteus ib.
articulatus 124
arvensis 127
atropurpureus 125
auctumnalis 126
australis 125
Bæothryon ib.

Scirpus
barbatus 129
capillaris 126
capitatus 124
caribæus 125
cephalotes 129
cespitosus 125
ciliaris 128
complanatus 126
corymbosus 128
cyperoides ib.
dichotomus ib.
dipyllos 127
dipsaceus 126
echinatus 127
ellychniarius 126
ferrugineus 127
fistulosus 125
fluitans ib.
geniculatus 124
globiferus 126
glomeratus ib.
grossus 128
Halleri 126
Holoschœnus 125
hottentottus 129
intricatus 128
junceus 125
Kali 127
lacustris 125
lateralis 127
lateriflorus ib.
Luzulæ 128
maritimus ib.
Michelianus 129
miliaceus 128
monander 126
mucronatus 127
mutatus 124
niloticus 126
nodosus 127
nutans 125
palustris 124

Scirpus
plantagineus 124
polytrichoides 125
prolifer 126
retrofractus 127
Schœnoides 125
romanus 126
setaceus ib.
silvaticus 128
spadiceus 127
squarrosus 128
supinus 126
triginus 124
triquater 127
trispicatus ib.
Sciuris 21, 49
aromatica 49
Scleranthus 660, 708
annuus 708
perennis ib.
polycarpos ib.
Sclerocarpus 1165, 1262
africanus 1262
Sclerotium 1287; 1481 *sq.*
complanatum 1482
immersum 1481
Mucor ib.
purpureum ib.
radicatum ib.
Semen ib.
subterraneum 1482
villosum ib.
Scolopia 770, 793
Schreberi 793
Scolymus 1184
angiospermus 1184
hispanicus ib.
maculatus ib.
Scoparia 211, 254
arborea 254

Scoparia
dulcis 254
procumbens ib.
ternata ib.
SCOPOLIA 601, 630
composita 630
Scorpiurus 1075, 1077, 1120
muricata 1120
subvillosa ib.
sulcata ib.
vermiculata ib.
Scorzonera 1161, 1169, 1170
angustifolia 1170
carinifolia 1169
ciliata ib.
graminifolia 1170
hirsuta 1169
hispanica 1170
hispida 1169
humilis ib.
laciniata ib.
lanata ib.
parviflora ib.
picroides 1170
purpurea ib.
pusilla 1169
resedifolia 1170
taraxacifolia ib.
tingitana ib.
tomentosa 1169
tuberosa 1170
Scrophularia 888, 937, 938
altaica 937
aquatica ib.
arguta ib.
auriculata ib.
betonicifolia ib.
canina 938
coccinea ib.

Scrophularia
frutescens 938
glabrata 937
lucida 938
marilandica 937
meridionalis 938
nodosa 937
orientalis 938
peregrina ib.
sambucifolia ib.
Scorodonia 937
sinensis 938
trifoliata ib.
vernalis 937
viridiflora 938

Scutellaria 886, 919, 920.
albida 919
alpina ib.
altissima ib.
caroliniana ib.
Columnæ ib.
cretica ib.
galericulata ib.
hastifolia 920
havanensis 919
hyssopifolia ib.
indica 920
integrifolia ib.
lateriflora 919
lupulina ib.
minor ib.
orientalis ib.
ovata 920
peregrina 919
purpurascens ib.

Scytalia 598, 612
sinensis 612

Secale 88, 198
cereale 198
creticum ib.
orientale ib.

Secale
prostratum 198
villosum ib.

Securidaca 1075, 1083, 1084
erecta 1083
scandens 1084
virgata ib.

Securinega 996, 1008
durissima 1008

Sedum 662, 730-732
acre 732
æstivum ib.
Aizoon 731
album 732
alsinefolium 731
Anacampseros ib.
anglicum 732
annuum ib.
atratum ib.
cæruleum 731
Cepæa ib.
dasyphyllum 732
divaricatum 731
heptapetalum ib.
hirsutum 732
hispanicum ib.
hybridum 731
libanoticum ib.
lineare ib.
nicæense 732
nudum ib.
populifolium 731
procumbens 732
quadrifolium ib.
reflexum ib.
rupestre ib.
saxatile 731
sexangulare 732
stellatum 731
stoloniferum ib.
Telephium ib.
verticillatum 730

Sedum
villosum 731
virens 732

Seguieria 772, 827
americana 827

Sehima 87, 178
ischæmoides 178

Selago 887, 948, 949
canescens 949
capitata ib.
ciliata ib.
cinerea 948
coccinea ib.
corymbosa ib.
divaricata 949
fasciculata 948
fruticosa 949
geniculata 948
hirta ib.
hispida ib.
polygaloides ib.
polystachya ib.
rapunculoides ib.
rotundifolia ib.
serrata ib.
spuria ib.
stricta ib.
triquetra ib.
verbenacea ib.

Selinum 309, 475, 476
austriacum 476
Carvifolia ib.
Chabræi ib.
Monnieri ib.
palustre ib.
Seguieri ib.
sibiricum ib.
silvestre 475

SEMECARPUS 311, 493
Anacardium 493

Sempervivum 744, 768, 769
aracnoideum 769
arboreum 768
canarienfe ib.
glandulofum ib.
globiferum 769
glutinofum 768
monanthes 769
montanum ib.
fedoides ib.
tectorum ib.
tortuofum ib.
villofum ib.

Senecio 1164, 1226-1230
abrotanifolius 1228
ægyptius 1227
alpinus 1228
angulatus 1229
arabicus 1226
afper 1229
aureus 1228
auriculatus ib.
biflorus 1226
byzantinus 1229
canadenfis 1228
cernuus 1226
ciliatus 1230
cinerafcens 1227
cordifolius 1230
cruciatus 1229
diffufus 1228
divaricatus 1226
Doria 1229
Doronicum 1230
elegans 1228
erofus 1229
erubefcens 1226
erucifolius 1228
glaftifolius 1229
glaucus 1227

Senecio
hadienfis 1227
halimifolius 1230
haftatus 1228
hieracifolius 1226
Jacobæa 1228
japonicus 1226
ilicifolius 1229
incanus 1228
junceus 1229
juniperinus ib.
lanatus ib.
laniger 1227
leucanthemifolius ib.
linifolius 1228
lividus 1227
longifolius 1229
lyratus 1228
marginatus 1229
maritimus ib.
nebrodenfis 1227
nemorenfis 1229
paludofus ib.
perficifolius 1226
peucedanifolius ib.
populifolius 1230
Pfeudochina 1227
pubigerus ib.
purpureus 1226
reclinatus ib.
rigidus 1230
rofmarinifolius 1229
farracenicus ib.
fibiricus 1230
filvaticus 1227
fqualidus 1228
tenuifolius ib.
triflorus 1227
trilobus ib.
tuffilaginoides ib.
umbellatus 1228

Senecio
varicofus 1227
venuftus 1228
virgatus 1226
vifcofus 1227
vulgaris 1226

Septus 594, 597
capenfis 597

Serapias 21, 59, 60
capenfis 60
Caravata 59
cordigera 60
enfifolia 59
erecta 60
falcata ib.
flava 59
lancifolia ib.
latifolia ib.
Lingua ib.
longifolia ib.
Neottia ib.
polyftachya ib.
regularis ib.
rubra ib.
fpeciofa ib.

Seriola 1161, 1182
æthmenfis 1182
cretenfis ib.
lævigata ib.
urens ib.

Seriphium 297, 374
ambiguum 374
cinereum ib.
fufcum ib.
plumofum ib.

Serpicula 216, 276
repens 276
verticillata ib.

Serra 997, 1026
incana 1026

Serratula 1162, 1184-1186
alpina 1185
amara ib.
arvensis 1186
caspia 1185
centauroides ib.
ciliata ib.
coronata ib.
glauca ib.
japonica ib.
multiflora ib.
noveboracensis ib.
pilosa ib.
præalta ib.
salicifolia ib.
scariosa ib.
spicata ib.
spinosa ib.
squarrosa ib.
tinctoria 1184
Sesamum 890, 956
javanicum 956
indicum ib.
orientale ib.
prostratum ib.
Seseli 310, 488, 489
ammoides 489
annuum ib.
aristatum ib.
carvifolium ib.
elatum ib.
fragile ib.
glaucum ib.
Hippomarathrum ib.
montanum 488
multicaule 489
pimpinelloides 488
pyrenæum 489
saxifragum ib.
tortuosum ib.
Turbith ib.
Sesuvium 778, 834
Portulacastrum 834
Shawia 299
SHEFFIELDIA 293, 336
repens 336
Sherardia 214, 234
arvensis 234
fruticosa ib.
muralis ib.
Sibbaldia 313, 520
altaica 520
erecta ib.
procumbens ib.
Sibthorpia 889, 953
africana 953
europæa ib.
Sicyos 81, 104
angulata 104
edulis ib.
Garcini ib.
laciniata ib.
Sida 1001, 1041-1050
Abutilon 1048
acuta 1044
alba 1045
alnifolia 1043
althæifolia 1049
americana ib.
angustifolia 1044
arabica 1049
arborea ib.
asiatica 1048
atro-sanguinea 1042
bicuspidata 1050
biflora 1049
bivalvis 1043
borbonica 1042
brasiliensis 1049
calicina 1042
Sida
calyptrata 1046
canescens 1045
capensis ib.
carpinifolia 1044
ciliaris ib.
cordifolia 1045
coronata 1046
crassifolia 1048
crispa 1047
dumosa 1049
excelsior 1046
exstipularis 1048
exstipulata 1046
flavescens 1043
fœtida 1041
fragrans 1042
frutescens ib.
glomerata 1043
glutinosa ib.
hederæfolia 1041
herbacea 1045
hernandioides 1046
hirta 1048
humilis 1041
jamaicensis 1043
jatrophoides 1044
javensis 1042
indica 1047
lanceolata 1049
lignosa 1047
linifolia 1044
maculata 1045
mauritiana 1049
micans 1045
microphylla 1044
microsperma 1047
mollissima ib.
morifolia 1042
multicaulis ib.
multifida 1046
multiflora 1045
obtusa 1048

Sida
occidentalis 1046
orientalis 1045
ovata 1041
palmata 1044
paniculata 1049
periplocifolia 1045
persica 1049
peruviana ib.
Phyllanthus 1050
pilosa 1042
planicaulis 1045
pauciflora 1048
plumosa 1041
populifolia 1048
procumbens 1049
prostrata 1043
pubescens 1047
pusilla 1041
pyramidata 1042
radicans 1041
ramosa 1047
reflexa 1048
repens 1041
retusa 1045
Retzii 1042
rhombifolia 1045
ricinoides 1044
rotundifolia 1045
silvatica 1046
sinensis 1048
Sonnerati 1047
spicata 1046
spinosa 1042
stellata 1046
stipulata 1044
suberosa 1045
supina 1042
terminalis 1047
ternata 1050
tricuspidata 1047
triloba 1044
triquetra 1046

Sida
truncata 1043
truncatula 1049
ulmifolia 1043
umbellata 1047
urens 1043
veronicæfolia 1041
verticillata 1043
vesicaria 1048
virgata 1049
viscosa 1043

Sideritis 885, 901 902
canariensis 901
candicans ib.
ciliata 902
cretica 901
elegans ib.
hirsuta 902
hyssopifolia 901
incana ib.
lanata 902
montana 901
perfoliata ib.
romana ib.
scordioides ib.
spinosa 902
syriaca 901

Siderodendrum 214, 242
ferreum 242

Sideroxylum 296, 396, 397
cymosum 397
decumbens ib.
fœtidissimum ib.
inerme ib.
læve ib.
lycioides ib.
Mastichodendrum ib.
melanophleum ib.
mite 396

Sideroxylum
sericeum 397
spinosum ib.
tenax ib.

Siegesbekia 1165, 1255
flosculosa 1255
occidentalis ib.
orientalis ib.

Silene 661, 713-717
acaulis 716
ægyptiaca 714
alpestris 716
amœna 714
anglica 713
angustifolia 717
antirrhina 716
Armeria 715
Atocion 716
Behen ib.
bellidifolia 715
bupleuroides ib.
caroliniana 717
Catesbæi ib.
cerastoides 713
chloræfolia 717
colorata 714
conica 715
conoidea ib.
cordifolia 717
crassifolia 715
cretica 716
cuneifolia 714
elongata 716
exscapa ib.
fruticosa 715
gallica 714
gigantea 715
hirsuta 717
inaperta 716
involuta 714
latifolia ib.
lusitanica 713

Silene
Muscipula 716
mutabilis 714
nicæensis 717
noctiflora 715
nocturna 714
nutans ib.
oppositifolia 717
orchidea 716
ornata 715
paradoxa ib.
pendula 716
polyphylla 717
portensis 715
procumbens 717
pumilio 714
quinquevulnera ib.
rubella 716
rupestris ib.
Saxifraga ib.
sedoides 714
sericea 717
Smithii 714
stricta 716
succulenta 714
undulata 715
vallesia 716
vespertina 715
villosa 714
virginica 717
viridiflora 715
Siliquaria 523, 566
glandulosa 566
Silphium 1166, 1269 *sq.*
Astericus 1270
connatum ib.
laciniatum 1269
perfoliatum ib.
scabrum ib.
solidaginoides ib.
terebinthinaceum ib.

Silphium
trifoliatum 1270
trilobatum ib.
Simaba 657, 700
gujanensis 700
Simbuleta 214, 242
Forskahlii 242
Simira 296, 371
tinctoria 371
Sinapis 968, 989, 990
alba 989
Allioni ib.
arvensis ib.
brassicata 990
cernua ib.
erucoides 989
frutescens 990
Harra ib.
hispanica ib.
japonica ib.
incana 989
juncea 990
lævigata 989
millefolia 990
nigra 989
orientalis ib.
pubescens ib.
pyrenaica ib.
sinensis ib.
Siparuna 659, 701
gujanensis 701
Siphonanthus 214, 243
indica 243
SIRIUM 218, 260
myrtifolium 260
Sison 309, 483, 484
Ammi 483
Amomum ib.
canadense ib.
crinitum 484
inundatum ib.

Sison
falsum 484
segetum 483
verticillatum 484
Sisymbrium 968, 980-983
album 982
altissimum ib.
amphibium 980
arenosum 982
asperum ib.
Barbareæ 983
Barrelieri 981
bursifolium ib.
catholicum 982
Columnæ ib.
heterophyllum ib.
hispanicum 981
indicum 983
integrifolium ib.
Irio 982
islandicum 980
lippizense 981
Lœselii 982
molle 981
monense ib.
murale ib.
Nasturtium 980
orientale 982
palustre 981
pannonicum 982
Parra ib.
pinnatifidum ib.
polyceration 981
pyrenaicum ib.
sagittatum ib.
salsugineum ib.
silvestre 980
simplicissimum 982
sinapios ib.
Sophia ib.
stricissimum 983
supinum 981

Sisymbrium
tanacetifolium 981
tenuifolium ib.
valentinum 982
vimineum 981
Sisyrinchium 81, 118, 119
anceps 118
Bermudiana ib.
grandiflorum ib.
ixioides 119
latifolium 118
micranthum ib.
narcissoides ib.
palmifolium ib.
Sium 309, 482, 483
angustifolium 483
Berula 482
cicutæfolium ib.
decumbens 483
Falcaria ib.
græcum ib.
japonicum ib.
lancifolium 482
latifolium ib.
Ninsi 483
modiflorum ib.
repens ib.
rigidius ib.
siculum ib.
Sisarum ib.
suave ib.
SKIMMIA 215, 254
japonica 254
Sloanea 772, 813
dentata 813
emarginata ib.
Massoni ib.
sinemariensis ib.
Smilax 527, 582, 583
aspera 582
auriculata ib.

Smilax
bona nox 583
caduca ib.
China 582
excelsa ib.
glauca ib.
herbacea 583
inermis ib.
lanceolata ib.
laurifolia ib.
mauritanica 582
oblongata ib.
Pseudo-China 583
pumila ib.
purpurata ib.
Ripogonum ib.
rotundifolia ib.
Sassaparilla 582
tamnoides 583
tetragona ib.
variegata 582
zeylanica ib.
Smithia 295, 388
Touinia 388
Smyrnium 310, 490
ægyptiacum 490
aureum ib.
integerrimum ib.
nodiflorum ib.
Olus atrum ib.
perfoliatum ib.
Sodada 599, 615
decidua 615
SOLANDRA 1000, 1050
lobata 1050
ternata ib.
Solanum 296, 382-387
aculeatissimum 386
ægypticum 385
æthiopicum 384

Solanum
armatum 385
aviculare 383
bahamense 386
bombense 383
bonariense ib.
campechiense 385
capense 387
Cari 384
carolinense 385
coagulans ib.
coccineum 386
cordatum ib.
corymbiferum 384
corymbosum 383
diphyllum ib.
Dulcamara ib.
ferox 385
fuscatum 386
havanense 383
hybridum 386
igneum ib.
incanum 385
indicum 386
insanum 385
lanceæfolium ib.
laurifolium 382
lycioides 387
Lycopersicon 384
lyratum ib.
macrocarpon 383
mammosum 385
marginatum 386
mauritianum 383
Melongena 384
memphiticum 385
montanum 384
nigrum ib.
nodiflorum 383
paniculatum 385
peruvianum 384
pimpinellifolium ib.
Pseudo-capsicum 383

Solanum
quadrangulare 384
quercifolium ib.
racemosum 383
radicans 384
repandum ib.
rubrum ib.
sanctum 386
scandens 385
sodomeum 386
spurium 384
stellatum 387
subinerme 383
Tagore ib.
terminale ib.
trifoliatum 386
trilobatum ib.
triste 383
tuberosum 384
verbascifolium 382
villosum 385
virginianum ib.
zeylanicum 387

Soldanella 292, 328
alpina 328

Solidago 1164, 1235-1237
altissima 1236
ambigua 1237
arborescens ib.
arguta 1235
aspera 1237
bicolor 1236
cæsia ib.
cambrica 1237
canadensis 1236
dubia 1235
elliptica ib.
flexicaulis 1237
gigantea 1235
juncea ib.
lævigata 1236

Solidago
lateriflora 1236
latifolia 1237
mexicana 1235
minuta 1236
multiradiata 1237
nemoralis 1236
noveboracensis 1237
petiolaris 1236
pilosa 1235
procera 1236
reflexa ib.
rigida 1237
sempervirens 1235
sera 1236
serotina 1235
stricta 1236
suaveolens 1235
viminea ib.
Virga aurea 1237

Sonchus 1161, 1171
agrestis 1171
alpinus ib.
arvensis ib.
canadensis ib.
floridanus ib.
fruticosus ib.
maritimus ib.
oleraceus ib.
palustris ib.
pinnatus ib.
Plumieri ib.
radicatus ib.
sibiricus ib.
tataricus ib.
tenerrimus ib.
tuberosus ib.

SONNERATIA 656, 675
punctata 675

Sophora 655, 664, 665
alba 665

Sophora
alopecuroides 664
australis ib.
buxifolia 665
calyptrata ib.
capensis 664
flavescens ib.
genistoides ib.
havanensis ib.
heptaphylla ib.
hirsuta 665
japonica 664
lanceolata 665
lupinoides ib.
microphylla 664
monosperma ib.
occidentalis ib.
Retzii 665
rotundifolia ib.
tetraptera 664
tinctoria ib.
tomentosa ib.
villosa 665

Soramia 775, 821
gujanensis 821

Sorbus 778, 834
aucuparia 834
domestica ib.
hybrida ib.

Spananthe 309, 478
paniculata 478

Sparganium 85, 147
erectum 147
natans ib.
simplex ib.

SPARRMANNIA 774, 814
africana 814

Spartina 84, 123
Schreberi 123

Spartium 1076, 1088, 1089
angulatum 1089
aphyllon 1088
complicatum 1089
contaminatum 1088
cytisoides 1089
ferox ib.
horridum ib.
junceum ib.
monospermum ib.
purgans ib.
radiatum ib.
scoparium ib.
Scorpius ib.
sepiarium 1088
sericeum 1089
sphærocarpon ib.
spinosum ib.
supranubium ib.
villosum ib.

Spathelea 311, 498
simplex 498

Spergula 663, 738
arvensis 738
laricina ib.
nodosa ib.
pentandra ib.
saginoides ib.

Spermacoce 214, 233, 234
alata 234
articularis 233
aspera 234
cærulescens ib.
havanensis ib.
hirta 233
hispida ib.
latifolia 234
longifolia ib.

Spermacoce
ocymoides 234
procumbens 233
prostrata 234
radicans ib.
scandens ib.
sexangularis ib.
spinosa 233
stricta ib.
sumatrensis ib.
tenuis ib.
verticillata ib.
villosa ib.

Spermodermia 1286, 1482
clandestina 1482

Sphæranthus 1167, 1279 *sq.*
africanus 1280
indicus 1279
sinensis 1280

Sphæria 1286, 1473-1480
minosa 1477
Acrospermum 1478
acuta 1479
æruginosa 1474
agariciformis 1473
Artocreas 1478
atro-purpurea 1474
Bombarda 1477
bulbosa 1474
bullata 1476
byssacea 1479
byssina 1477
byssiseda 1479
calva ib.
cancellata 1477
Carcharias 1474
carpini 1476
castorea 1474

Sphæria
Ceratospermum 1476
cespitosa ib.
ciliaris 1480
cinnabarina 1479
cirrata 1477
comata 1480
complanata 1478
confluens ib.
conica 1478
convergens 1476
coronata 1477
Cucurbitula 1475
cylindrica 1478
decidua 1474
deusta 1475
digitata 1474
disciformis 1476
dubia 1478
entomorhiza 1474
epiphylla 1479
episphæria 1478
fissivela 1476
flexuosa 1474
fragifera 1475
fragiformis 1477
gelatinosa 1475
globularis 1477
Gnomon ib.
granulosa 1477
gregaria 1478
hemisphærica 1479
hispida ib.
Hypoxylon 1474
Hystrix 1476
inquinans 1478
insitiva 1475
lenta ib.
Lingua 1477
macrostoma 1479
Macula 1475
melanogramma 1477
miliacea 1480
militaris 1474

Sphæria
mobilis 1479
mollis ib.
moriformis 1478
mucida 1479
mucosa ib.
natans 1475
nivea 1477
ophioglossoides 1474
papillata 1476
parabolica 1478
penetrans ib.
Peziza ib.
phœnicea 1480
Placenta 1475
porphyrogona 1479
pulvinata 1476
pustulata 1477
radians 1475
ribis 1474
rostrata 1479
rugosa ib.
sanguinaria 1475
sphincterica 1479
Stigma 1476
subulata 1478
succenturiata 1476
Talus 1475
tristis 1479
truncata 1474
tubæformis 1477
tunicata 1475
virescens 1476
Sphærobolus 1462
rosaceus ib.
stellatus ib.
Sphærocarpus 1, 9
Hura 9
Sphagnum 1284, 1323
alpinum 1323
palustre ib.
Spigelia 293, 333
Anthelmia 333
marilandica ib.
Spilanthus 1163, 1193
Acmella 1193
atriplicifolia ib.
insipida ib.
oleracea ib.
Pseudo-acmella ib.
salivaria ib.
uliginosa ib.
urens ib.
Spinacia 312, 508
fera 508
oleracea ib.
SPINIFEX 87, 177
squarrosus 177
Spiræa 779, 849, 850
alba 849
alpina ib.
altaica ib.
argentea ib.
Aruncus 850
betulifolia 849
callosa ib.
camtschatica ib.
chamædryfolia ib.
crenata ib.
Filipendula 850
hypericifolia 849
japonica ib.
incisa 850
lævigata 849
lobata 850
opulifolia ib.
palmata ib.
salicifolia 849
sorbifolia 850
thalictroides ib.
tomentosa 849
trifoliata 850
Spiræa
triloba 850
Ulmaria ib.
Splachnum 1284, 1325 *sq.*
ampullaceum 1325
angustatum ib.
Breweri ib.
longisetum ib.
luteum 1325
ovatum 1326
rubrum 1325
sphæricum ib.
tenue ib.
urceolatum ib.
vasculosum ib.
Spondia 663, 729
dulcis 729
Mombin ib.
Myrobalanus ib.
Spumaria 1466
Mucilago ib.
Stachys 885, 906-908
æthiopica 907
alpina 908
annua 907
arvensis ib.
canariensis ib.
circinata ib.
cretica ib.
germanica 908
glutinosa 906
heraclea 907
hirta ib.
intermedia ib.
lanata ib.
latifolia 908
lavandulifolia 907
maritima 906
orientalis 907
palæstina 906

Stachys 907
palustris 906
patens 907
recta ib.
rugosa ib.
silvatica 906
spinosa
Stæhelina 1163, 1202
arborescens 1202
Chamæpeuce ib.
corymbosa ib.
dubia ib.
elegans ib.
fruticosa ib.
gnaphalioides ib.
hastata ib.
ilicifolia ib.
imbricata ib.
spinosa ib.
Stalagmitis 774, 810
cambogioides 810
Stapelia 306, 447
articulata 447
hirsuta ib.
incarnata ib.
mammillaris ib.
pilifera ib.
pulla ib.
quadrangula ib.
variegata ib.
Staphylea 311, 498
occidentalis 498
pinnata ib.
trifolia ib.
Statice 313, 510-512
aphylla 511
Armeria 510
aurea 512
axillaris ib.
caroliniana 511
Statice
cordata 511
cylindrifolia 512
echinus 511
echioides ib.
ferulacea 512
flexuosa 511
graminifolia ib.
incana ib.
Limonium ib.
linifolia 512
lobata 511
minuta 512
monopetala ib.
mucronata ib.
pruinosa 511
Pseudarmeria 510
purpurata 511
ramosissima ib.
reticulata ib.
rubella 512
sinuata 511
speciosa ib.
tatarica ib.
Steerbeckia 774, 820
gujanensis 820
Stellaria 661, 717 *sq.*
arenaria 718
biflora ib.
bulbosa ib.
cerastoides ib.
ciliata 719
crassifolia 718
dichotoma ib.
Dilleniana ib.
graminea ib.
Holostea ib.
hypericifolia ib.
lateriflora ib.
nemorum 717
radians 718
rupestris 719
Stellaria
uliginosa 718
undulata ib.
uniflora ib.
Stellera 600, 634
Chamæjasme 634
Passerina ib.
Stemodia 889, 954
maritima 954
ruderalis ib.
Stemonitis 1286, 1467-1470
alba 1469
antiades ib.
argillacea ib.
aurantia ib.
bicolor ib.
bombacina 1470
botrytis 1468
cancellata ib.
cinerea 1467
cinnabarina 1469
coccinea 1468
crocea 1467
Embolus ib.
fasciculata 1468
favaginea 1470
ficoides 1469
flava 1468
floriformis 1469
fulva 1468
furfuracea ib.
fusca 1467
globularis 1470
globulifera 1469
graniformis 1468
incarnata 1467
leucocephala ib.
leucopus 1470
lichenoides 1468
lumbricalis 1470
nigra 1467
nivea ib.

Stemonitis
nutans 1467
olivacea 1468
pomiformis 1469
pyriformis ib.
recutita 1467
rufa 1468
semitrichoides ib.
sphærocephala ib.
sulphurea 1470
Trichia ib.
turbinata 1469
typhina 1467
varia 1470
vesparia ib.
vesiculosa ib.
violacea 1469
viridis ib.
vitellina 1470
Stephanium 299, 368
gujanense 368
Sterculia 998, 1034
Balenghas 1034
cordifolia ib.
Firmiana ib.
fœtida ib.
Ivira ib.
lanceolata ib.
platanifolia ib.
Steris 307, 454
javana 454
Stewartia 1001, 1068
virginica 1068
Stilago 82, 107
Bunius 107
STILBE 210, 226, 227
cernua 227
ericoides ib.
pinastra 226
Stilbum 1287, 1483
bulbosum 1483
minimum ib.
pubens ib.
rubicundum ib.
turbinatum ib.
vulgare ib.
Stillingia 995, 1003
silvatica 1003
Stilosanthes 1077, 1121
elatior 1121
gujanensis ib.
procumbens ib.
viscosa ib.
Stipa 87, 191
arguens 191
Aristella ib.
avenacea ib.
capillata ib.
juncea ib.
membranacea ib.
paleacea ib.
pennata ib.
spicata ib.
tenacissima ib.
Stockesia 1192
cyanea 1192
Stoebe 1167, 1281 *sq.*
æthiopica 1281
disticha ib.
ericoides ib.
gnaphaloides 1282
gomphrenoides ib.
prostrata ib.
reflexa ib.
rhinocerotis ib.
scabra ib.
Stratiotes 780, 852
acoroides 852
Stratiotes
alismorides 852
alooides ib.
Strigilia 659, 698
racemosa 698
Strumpfia 302, 373
maritima 373
Struthiola 216, 277
erecta 277
juniperina ib.
lanceolata ib.
nana ib.
virgata ib.
Strychnos 296, 387
colubrina 387
Nux vomica ib.
potatorum ib.
Telancotta ib.
Styrax 659, 699
Benzoin 699
glabrum ib.
grandiflorum ib.
officinale ib.
Suæda 311, 503
anonyma 503
baccata ib.
fruticosa ib.
hortensis ib.
monoica ib.
vera ib.
vermiculata ib.
Subularia 967, 970
aquatica 970
purpurea ib.
Suriana 733
maritima ib.
Sutherlandia 998, 1027
littoralis 1027
Swartsia 296, 360
grandiflora 360

Swertia 306, 459
carinthiaca 459
corniculata ib.
decumbens ib.
dichotoma ib.
difformis ib.
perennis ib.
rotata ib.
Swietenia 657, 680
Mahagoni 680
Syena 83, 121
Majaca 121
SYMPHONIA 996, 1009
globulifera 1009
Symphytum 291, 320
officinale 320
orientale ib.
regium ib.
secundum ib.
tuberosum ib.
Symplocos 1150, 1155
martinicensis 1155
octopetala ib.
Syntherisma 86, 154
præcox 154
serotinum ib.
villosum ib.
Syringa 19, 26
capitata 26
persica ib.
suspensa ib.
vulgaris ib.

Tabernæmontana 294, 438, 439
alternifolia 439
Amsonia ib.
Tabernæmontana
amygdalifolia 438
angustifolia ib.
citrifolia ib.
cymosa ib.
discolor ib.
echinata ib.
elliptica ib.
grandiflora ib.
laurifolia ib.
TACCA 743, 767
pinnatifolia 767
Tagetes 1164, 1245
erecta 1245
minuta ib.
patula ib.
Taligalea 887, 922
campestris 922
Talisia 598, 620
gujanensis 620
Tamarindes 82, 94
indica 94
Tamarix 311, 498, 499
africana 499
gallica 498
germanica 499
orientalis ib.
Tamburissa 3, 16
quadrifida 16
Tamonea 890, 965
mutica 965
Tamus 525, 570
communis 570
cretica ib.
elephantipes ib.
Tanacetum 1163, 1208 *sq.*
angulatum 1209
annuum 1208
Tanacetum
argenteum 1208
Balsamita 1209
cotuloides ib.
flabelliforme ib.
incanum 1208
monanthon ib.
myriophyllon ib.
sibiricum ib.
suffruticosum 1209
vulgare 1208
Tanæcium 886, 943
Jaroba 943
parasiticum ib.
Tanibuca 660
Tapeinia 81, 108
magellanica 108
Tapura 300, 332
gujanensis 332
Taralea 1075, 1084
oppositifolia 1084
Tarchonanthus 1163, 1204
camphoratus 1204
ericoides ib.
glaber ib.
Targionia 1285, 1353
hypophylla 1353
sphærocarpos ib.
Tattia 778, 836
ignota 836
Taxus 1000, 1071
baccata 1071
elongata ib.
macrophylla ib.
nucifera ib.
verticillata ib.

TECTONA 337
grandis ib.
Telephium 312, 504
Imperati 504
oppositifolium ib.
Temus 777, 831
moschata 831
Terminalia 660, 701
angustifolia 701
arbuscula ib.
Catappa ib.
Chebula ib.
latifolia ib.
TERNSTRŒMIA 773, 797, 798
dentata 798
elliptica 797
meridionalis 798
punctata ib.
Tetracera 779, 839
volubilis 839
Tetragonia 779, 842, 843
crystallina 843
echinata ib.
expansa ib.
fruticosa 842
herbacea 843
hirsuta ib.
japonica ib.
spicata ib.
Tetramnus 1076, 1094
uncinatus 1094
volubilis ib.
Tetranthus 1167, 1280
littoralis 1280
Teucrium 885, 892-897
abutiloides 896
Achæmenis 897
angustissimum 893
Arduini 894
arenarium 896
asiaticum ib.
aureum 895
betonicæfolium ib.
betonicum 896
Botrys 893
brevifolium 894
buxifolium 896
cæleste 893
campanulatum 892
canadense 895
capitatum 896
chamædrys 895
Chamæpitys 893
chium ib.
creticum ib.
cubense 895
flavescens 897
flavum 895
fruticans 894
gnaphalodes 897
heterophyllum 895
hircanicum 896
japonicum 894
inflatum 896
Iva 893
lævigatum ib.
latifolium 894
Laxmanni ib.
Libanitis 893
lucidum 894
lusitanicum 897
Marum 894
massiliense ib.
mauritanum 893
montanum 894
Teucrium
moschatum 893
multiflorum 894
nissolianum 893
nitidum 895
orientale 892
parviflorum ib.
Polium 896
Pseudhyssopus ib.
Pseudo-chamæpitys 893
pumilum ib.
pycnophyllum 897
pyrenaicum 895
quadratulum ib.
regium ib.
rotundifolium ib.
salicifolium 894
Salviastrum 895
scordioides 896
Scordium ib.
Scorodonia ib.
sibiricum 894
spinosum 897
supinum 893
thymifolium 894
trifidum 896
trifoliatum 894
valentinum 897
villosum 895
virginicum 894
Thelephora 1285, 1440-1441
alutacea 1441
applanata ib.
carnea ib.
crocea ib.
ferruginosa ib.
fusca ib.
glabra ib.
hirsuta 1440
lilacea ib.
mesenterica ib.

Thælæphora
mesenteriformis 1440
papyracea 1441
phylacteris ib.
rubiginosa ib.
sericea ib.
stricta ib.
undulata ib.
variegata ib.
Thalia 1, 9
cannæformis 9
geniculata ib.
Thalictrum 782, 874, 875
alpinum 874
angustifolium ib.
aquilegifolium ib.
atro-purpureum ib.
carolinianum 875
contortum 874
Cornuti 875
dioicum ib.
elatum ib.
flavum 874
fœtidum ib.
longifolium ib.
lucidum ib.
majus 875
medium ib.
minus ib.
nigricans 874
purpurascens 875
rugosum ib.
sibiricum ib.
simplex 874
stamineum 875
tuberosum ib.
Thapsia 310, 489, 490
Asclepium 489
fœtida ib.
Thapsia
garganica 490
trifoliata ib.
villosa 489
Thea 776, 821
Bohea 821
viridis ib.
Theleobolus 1286, 1461
stercorarius 1461
Theligonum 740, 745
Cynocrambe 745
Themeda 85, 149
polygama 149
Theobroma 1149, 1151
Cacao 1151
Guacuma ib.
gujanense ib.
Theophrasta 293, 333
americana 333
Thesium 304, 428, 429
alpinum 428
amplexicaule ib.
bavarum ib.
capitatum ib.
Colpoda 429
euphorbioides ib.
fragile ib.
Frisea 428
lunare ib.
lineatum 429
Linophyllum 428
paniculatum ib
scabrum 429
spicatum 428
spinosum 429
squarrosum ib.
Thesium
strictum 429
triflorum ib.
umbellatum ib.
Thlaspi 967, 973, 974
alliaceum 973
alpestre 974
alpinum ib.
arvense 973
Bursa pastoris 974
campestre ib.
ceratocarpon ib.
hirtum ib.
montanum ib.
peregrinum 973
perfoliatum 974
præcox ib.
saxatile 973
Schranckii 974
Thoa 772, 826
urens 826
Thottea 773, 798
grandiflora 798
THOUINIA 20, 49
ligustrina 49
nutans ib.
Thrinax 526, 570
parviflora 570
Thryallis 658, 684
brasiliensis 684
Thuja 996, 1006
aphylla 1006
dolabrata ib.
occidentalis ib.
orientalis ib.
THUNBERGIA 891, 934
capensis 934
Thuraria 661, 703
chilensis 703

Thymbra 886, 898
spicata 898
verticillata ib.
Thymus 886, 913, 914
Acinos 913
alpinus 914
Brownei ib.
cephalotes 913
filiformis 914
imbricatus ib.
indicus ib.
Mastichina 913
numidicus ib.
pannonicus 914
Piperella ib.
Serpyllum 913
Tragoriganum ib.
villosus ib.
virginicus ib.
vulgaris ib.
Zygis ib.
Tiarella 661, 708
cordifolia 708
trifolia ib.
unifolia ib.
Ticorea 996, 1009
fœtida 1009
Tigarea 774, 813
aspera 813
dentata ib.
Tilia 815
alba ib.
americana ib.
caroliniana ib.
cordata ib.
europæa ib.
pubescens ib.
tomentosa ib.
Tillæa 220, 289
aquatica 289
capensis ib.
Tillæa
muscosa 290
perfoliata 289
Tillandsia 522, 530, 531
angustifolia 531
canescens ib.
decumbens ib.
fasciculata 530
flexuosa ib.
lingulata 531
monostachya ib.
nutans 530
paniculata 531
polystachya 530
recurvata 531
serrata ib.
tenuifolia ib.
usneoides ib.
utriculata 530
Timmia 524, 538
angustifolia 538
obliqua ib.
Tinus 647, 652
occidentalis 652
Tithonia 1165, 1259
uniflora 1259
Tocoyena 296, 330
longiflora 330
Tolvifera 655, 677
Balsamum 677
Tomex 260
glabra ib.
Tondin 602, 635
surinamense 635
Tonina 525, 570
fluviatilis 570
Tonsella 82, 106
scandens 106
Tontanea 213, 280
gujanensis 280
Topobea 741, 754
parasitica 754
Tordylium 308, 472
apulum 472
maximum ib.
officinale ib.
peregrinum ib.
scifolium ib.
syriacum ib.
Torenia 887, 935
asiaticum 935
Tormentilla 781, 860
erecta 860
reptans ib.
Tournefortia 295, 324
argentea 324
bicolor ib.
cymosa ib.
fœtidissima ib.
glabra ib.
hirsutissima ib.
humilis ib.
maculata ib.
serrata ib.
suffruticosa ib.
volubilis ib.
Tourrettia 889, 940
volubilis 940
Tovomita 774, 808
gujanensis 808
Tozzia 888, 925
alpina 925
Trachelium 297, 358
cæruleum 358
diffusum ib.
tenuifolium ib.

Tradescantia 522, 532, 533
Aubleti 533
axillaris ib.
cordifolia ib.
cristata ib.
discolor ib.
geniculata 532
malabarica ib.
monandra ib.
multiflora 533
nervosa 532
papilionacea 533
spathacea ib.
speciosa ib.
virginica 532

Tragia 83, 94
cannabina 94
Chamelæa ib.
innocua ib.
involucrata ib.
Mercurialis ib.
urens ib.
volubilis ib.

Tragopogon 1161, 1168, 1169
asper 1169
capensis 1168
crocifolius ib.
Dalechampii 1169
Dandelion ib.
lanatus ib.
major 1168
mutabilis ib.
orientalis ib.
picroides 1169
pomifolius 1168
pratensis ib.
ruber 1169
undulatus 1168
virginicus 1169
villosus 1168

Trapa 216, 265
bicornis 265
natans ib.

Tremella 1286, 1446-1448
adnata 1446
allii 1447
annulata 1448
arborea 1446
atra 1448
cavernosa 1446
cerebrina 1447
cinnabarina ib.
clavariæformis 1446
coralloides 1448
crispa ib.
deliquescens ib.
difformis 1446
digitata 1448
encephaloides 1447
fucata 1446
glandulosa 1448
granulata 1446
hemisphærica ib.
hydnoidea 1448
intestinalis 1447
juniperina ib.
lithophila ib.
mesenterica ib.
meteorica 1446
miliaris 1448
moniliformis 1446
Nostoc 1447
orbicularis 1446
persistens 1447
Pisum 1446
plana 1447
pruniformis 1446
punctiformis ib.
rubella 1448
ruberrima 1447
rubra 1448
rufa 1446

Tremella
Sagarum 1447
sepincola ib.
stipitata 1446
torta 1447
undulata ib.
ustulata ib.
verrucosa 1448
verticalis ib.
vesicaria 1446
violacea 1447
viridis ib.

Trewia 772, 813
nudiflora 813

Trianthema 660, 703
crystallinum 703
decandrum ib.
fruticosum ib.
monogynum ib.
pentandrum ib.

Tribulus 657, 683, 684
cistoides 684
lanuginosus ib.
maximus 683
pentandrus 684
terrestris ib.

Trichilia 657, 679
alliacea 679
glabra ib.
hirta ib.
moschata ib.
pallida ib.
spectabilis ib.
spondioides ib.
terminalis ib.
trifolia ib.

Trichocarpus 777, 834
gujanensis 834
Trichomanes 1283, 1318-1321
adiantoides 1319
asplenioides 1318
bivalve 1320
canariense 1321
capillaceum ib.
ciliatum 1318
clavatum 1319
contiguum ib.
crinitum 1320
crispum 1318
cuneiforme 1320
demissum ib.
dilatatum 1319
elatum 1321
epyphyllum 1320
flaccidum 1321
fucoides 1319
gibberosum 1220
hirsutum ib.
humile 1318
japonicum 1321
linearis 1320
lucens 1319
membranaceum 1318
multifidum 1321
polyanthon 1319
polypodioides 1318
pusillum ib.
pyxidiferum 1320
reniforme 1318
reptans ib.
rigidum 1319
sanguinolentum 1320
scandens 1321
sericeum 1318
sinense 1321
solidum ib.
squarrosum 1320
Trichomanes
strigosum 1320
tamarisciforme ib.
tunbrigense 1319
undulatum ib.
Trichosenthes 81, 102
amara 102
anguina ib.
cucumerina ib.
fœtidissima ib.
nervifolia ib.
Trichostem a 886, 918
brachiatum 918
dichotomum ib.
lineare ib.
Tridax, 1165, 1254
procumbens 1254
Trientalis 593, 595
europæa 595
Trifolium 1075, 1077, 1140-1144
agrarium 1143
albidum 1142
alexandrinum 1141
alpestre 1142
alpinum 1141
angustifolium 1142
arvense ib.
aureum 1143
bicorne 1142
biflorum 1143
cespitosum 1141
Cheleri ib.
clypeatum 1142
comosum 1140
erectum 1143
filiforme ib.
flexuosum 1142
fragiferum 1143
glaciale 1141
Trifolium
globosum 1141
glomeratum ib.
gujanense 1143
hedysarioides 1141
hybridum ib.
incarnatum 1142
lævigatum 1143
lappaceum 1142
Lupinaster 1140
Melilotus ib.
cærulea ib.
cretica ib.
indica ib.
italica ib.
officinalis ib.
ornithopodioides ib.
polonica ib.
messanense ib.
montanum 1143
ochroleucum 1142
pannonicum ib.
pratense ib.
procumbens 1143
psoraloides ib.
reflexum 1140
repens 1141
resupinatum 1143
rubens 1142
scabrum 1141
simplicifolium 1144
spadiceum 1143
spumosum ib.
squarrosum 1141
stellatum 1142
striatum 1141
strictum 1140
subterraneum 1141
suffocatum 1143
tomentosum ib.
uniflorum 1142

Triglochin 527, 587
bulbosum 587
maritimum ib.
palustre ib.
Trigonella 1075, 1078, 1145, 1146
corniculata 1146
Fœnum græcum ib.
hamosa ib.
indica ib.
laciniata ib.
monspeliaca ib.
platycarpos 1145
polycerata ib.
ruthenica ib.
spinosa 1146
stellata ib.
striata 1145
Trigonia 655, 673
lævis 673
villosa ib.
Trigonis 598, 610
tomentosa 610
Triguera 295, 338
baccata 338
TRILLIX 774, 805
lutea 805
Trillium 527, 588
cernuum 588
erectum ib.
sessile ib.
Triopteris 662, 725
citrifolia 725
jamaicensis ib.
rigida ib.
Triosteum 299, 369
angustifolium 369
perfoliatum ib.
Triplaris 743, 767
americana 767
ramiflora ib.
Tripsacum 87, 178
dactyloides 178
hermaphroditum ib.
Trisetaria 87, 177
Forskahlii 177
Tristemma 656, 693
mauritianum 693
Triticum 88, 199, 200
æstivum 199
bicorne 200
bromoides ib.
compositum ib.
hibernum 199
junceum 200
maritimum ib.
monococcum ib.
polonicum ib.
prostratum ib.
pumilum ib.
repens ib.
Spelta ib.
tenellum ib.
turgidum ib.
unilaterale ib.
Triumfetta 740, 750
annua 750
Bartramia ib.
Lappula ib.
procumbens ib.
rhomboidea ib.
semitriloba ib.
Trixis 1166, 1271
aspera 1271
erosa ib.
terebinthinacea ib.
Trolius 782, 881
asiaticus 881
europeus ib.
Tropæolum 598, 605
hybridum 605
majus ib.
minus ib.
peregrinum ib.
Trophis 217, 277
americana 272
Tsiana 1, 9
speciosa ib.
Tubea 1286, 1481
album 1481
gulosorum ib.
oleraceum ib.
parasiticum ib.
Tubercularia 1287, 1482
fasciculata 1482
nigricans ib.
sulcata ib.
volvata ib.
vulgaris ib.
Tubifera 1472
cylindrica ib.
ferruginosa ib.
fragiformis ib.
Tubiflora 19, 27
carolinensis 27
TULBAGHIA 525, 535
allicea 535
cepacea ib.
Tulipa 547
biflora 547
Breyniana ib.
Gesneriana ib.
silvestris ib.
Tunatea 772, 820
gujanensis 820

Turia 303, 403
cordata 403
cylindrica ib.
Gijef ib.
Leloja ib.
Moghada ib.
Turnera 311, 503, 504
cistoides 504
gujanensis ib.
frutiscens ib.
Pumilea 503
racemosa 504
rupestris 503
sidoides ib.
ulmifolia ib.
TURRÆA 657, 679, 680
glabra 679
lanceolata ib.
maculata 680
pubescens ib.
sericea ib.
tomentosa ib.
virens 679
Turritis 968, 987, 988
alpina 988
glabra 987
hirsuta 988
Tussilago 1164, 1224-1226
alba 1225
alpina ib.
Anandria 1224
dentata 1225
discolor ib.
Farfara ib.
frigida ib.
hybrida 1225
japonica ib.
lutea ib.
Tussilago
nana 1224
nutans 1225
palmata 1226
paradoxa 1225
Petasites ib.
pumila 1224
radiata 1226
rubella 1225
sibirica 1224
silvestris 1225
spuria ib.
Tympanis 1285, 1460
saligna 1460
Typha 85, 147
angustifolia 147
latifolia ib.
Ubium 779, 839
quadrifarium 839
Ulex 1076, 1093
capensis 1093
europæus ib.
Ulmus 305, 456
americana 456
campestris ib.
effusa ib.
hollandica ib.
nemoralis ib.
pubescens ib.
pumila ib.
Ulva 1285, 1390, 1392
articulata 1391
codendulifolia 1392
compressa 1391
confervoides ib.
cuneata ib.
dichotoma ib.
glandiformis ib.
Ulva
intestinalis 1391
labyrinthiformis ib.
Lactuca ib.
lanceolata 1390
latissima ib.
Linza 1391
lumbricalis ib.
moccana ib.
montana 1390
oryziformis 1391
papillosa ib.
pavonia 1390
porrifolia 1392
Priapus 1391
purpurea 1390
ramosa 1391
reticulata 1390
rugosa 1391
Sagarum 1392
squamaria 1390
stellata 1391
umbilicalis 1390
vermicularis 1391
Uncaria 299, 370
gujanensis 370
Uniola 88, 183
bipinnata 183
mucronata ib.
paniculata ib.
spicata ib.
Unona 282, 869
discreta 869
UNXIA 1161, 1249
camphorata 1249
Uratea 656, 677
gujanensis 677
Urceolaria 296, 390
exotica 390
Urena 1000, 1058, 1059
americana 1058

Urena
leptocarpa 1058
lobata ib.
multifida ib.
procumbens ib.
reticulata ib.
sinuata ib.
tricuspis ib.
Typhalæa 1059
viminea ib.

Urtica 217, 268-272
æstuans 271
alata 268
alienata 269
arborea 272
argentea 271
baccifera ib.
balearica 269
betulifolia 270
canadensis 271
cannabina ib.
capensis ib.
capitata ib.
ciliaris 269
ciliata ib.
cuneifolia 270
cylindrica 269
depressa 270
diffusa 269
dioica 268
divaricata 271
Dodartii 269
elongata ib.
ferox 270
filiformis 269
frutescens 272
gracilis 269
grandifolia ib.
herniarioides 270
japonica 271
iners 269
interrupta 271

Urtica
lappulacea 271
laxa 268
lucida 271
macrophylla 270
microphylla 268
nivea 272
nudicaulis 268
numulariæfolia 270
palmata 271
parasitica ib.
Parietaria 270
pilulifera 269
pumila ib.
radicans 270
repens ib.
reticulata ib.
rhombea ib.
ruderalis 271
rufa 270
rugosa 268
serrulata 270
sessiliflora 271
spicata 269
stimulans 272
stolonifera 268
trianthemoides 270
urens ib.
villosa 271
virgata 269

Utricularia 20, 39, 40
alpina 39
bifida 40
cærulea ib.
foliosa 39
fibrosa 40
gibba ib.
inflata ib.
inflexa ib.
minor ib.
obtusa ib.
pumila ib.
purpurea ib.

Utricularia
stellaris 40
subulata ib.
vulgaris ib.

Uvaria 782, 868
javanica 86
lanceolata ib.
longifolia ib.
zeylanica ib.

Uvularia 525, 546
amplexifolia 546
cirrhosa ib.
hirta ib.
lanceolata ib.
perfoliata ib.
sessiliflora ib.

Vaccinium 601, 620-622
album 621
amœnum ib.
angustifolium 620
Arctostaphylos 621
bracteatum ib.
cereum 620
ciliatum 621
corymbosum ib.
diffusum 620
frondosum 621
fuscatum ib.
hirtum 620
hispidulum 622
ligustrinum 621
macrocarpon 622
meridionale ib.
mucronatum 621
Myrtillus 620
pallidum 621
resinosum ib.
stamineum 620
tenellum 621
uliginosum 620

Vaccinium
venustum 621
virgatum ib.
virgineum 622
Vitis idæa 621

VAHLIA 307, 463
capensis 463

Valantia 214, 240, 241
Aparine 241
articulata ib.
Cruciata ib.
Cucullaria ib.
filiformis 240
glabra 241
hispida 245
hypocarpa 241
muralis 240

Valentinia 601, 618
ilicifolia 618

Valeriana 81, 91, 92
Calcitrapa 91
celtica ib.
Cornucopiæ ib.
dentata 92
dioica 91
echinata 92
elongata ib.
Locusta ib.
mixta ib.
montana 91
officinalis ib.
Pha ib.
pyrenaica 92
rubra 91
saxatilis 92
scandens ib.
sibirica ib.
sinensis ib.
supina ib.
tripteris 91

Valeriana
tuberosa 91
villosa 92

Vallaris 137, 391
indica 391

VALLEA 294, 814
stipularis 814

Vallisneria 22, 80
spiralis 80

Vandellia 953
diffusa 953

Vangueria 299, 367
madagascariensis 367

Varronia 295, 394
alba 394
bullata ib.
curassavica ib.
globosa ib.
humilis ib.
lineata ib.
macrostachya ib.
martinicensis ib.
mirabiloides ib.

Vatairea 1076, 1085
gujanensis 1085

Vateria 775, 819
indica 819

VATICA 741, 748
sinensis 748

Velezia 307, 459
rigida 459

Vella 967, 969, 970
annua 969
Pseudo-cytisus 970
tenuissima ib.

Veratrum 527, 589
album 589
luteum ib.
nigrum ib.
Sabadilla ib.
viride ib.

Verbascum 294, 377, 378
bicolic 377
Blattaria 378
Boerhaavii ib.
Chaixi ib.
ferrugineum ib.
hæmorrhoidale ib.
lychnitis ib.
Myconi ib.
nigrum ib.
Osbeckii ib.
phlomoides ib.
phœniceum ib.
pulverulentum ib.
sinuatum ib.
spinosum ib.
thapsoides 377
Thapsus ib.

Verbena 20, 41, 42
Aubletia 41
bonariensis ib.
capitata 42
caroliniana ib.
curassavica 41
globiflora 42
hastata ib.
jamaicensis 41
indica ib.
lappulacea ib.
mexicana ib.
mutabilis ib.
nodiflora ib.
officinalis 42
orubica 41
prismatica ib.
procumbens 42
spuria ib.
stœchadifolia 41
supina 42
triphylla ib.
urticifolia ib.

Verbesina 1165, 1255 *sq.*
alata 1255
biflora 1256
Botvellea ib.
calendulacea ib.
dichotoma ib.
fruticosa ib.
gigantea ib.
laciniata ib.
Lavenia ib.
nodiflora ib.
pinnatifida ib.
siuensis ib.
virginica ib.

Vermicularia 1286, 1480
hispida 1480
Pseudo-sphæria ib.
pubescens ib.

Veronica 19, 28-31
acinifolia 31
agrestis 30
alpina 29
Anagallis ib.
aphylla 28
arvensis 30
austriaca ib.
Beccabunga 29
Bellardi 31
bellidioides 29
biloba 31
camtschatica 29
carnea ib.
caroliniensis 31
catarractæ 29
Chamædrys 30
decussata ib.
elliptica 29
fruticulosa ib.
hederæfolia 30
hybrida 28

Veronica
incana 28
incisa ib.
laciniata ib.
Lappago 30
latifolia ib.
longifolia 28
marilandica 31
maritima 28
montana 30
multifida ib.
nummularia 31
officinalis 28
paniculata 30
pectinata ib.
peregrina 31
pilosa 30
pinnata 28
prostrata 30
pumila 29
romana 31
salicifolia 29
saxatilis ib.
scutellata ib.
serpyllifolia ib.
sibirica 28
spicata ib.
spuria ib.
succulenta 31
tenella 29
Teucrium ib.
triphylla 30
urticæfolia ib.
verna 31
virginica 28

Viburnum 310, 496, 497
acerifolium 496
cassinoides 497
cuspidatum ib.
dentatum 496
dilatatum 497
erosum ib.

Viburnum
hirtum 497
Lantana 496
Lentago ib.
macrophyllum 497
nitidum ib.
nudum 496
obovatum ib.
Opulus ib.
prunifolium ib.
scandens ib.
serratum ib.
tinoides ib.
Tinus ib.
tomentosum 497
villosum 496
virens 497

Vicia 1077, 1110-1112
angustifolia 1112
benghalensis 1111
biennis ib.
bithynica 1112
bohemica 1110
canescens 1111
caroliniana 1110
cassubica 1111
Clymenum 1112
Cracca 1111
dumetorum ib.
exstipulata ib.
Faba 1112
Gerardi 1111
globosa 1112
hybrida ib.
lathyroides ib.
lutea ib.
monantha 1111
multiflora ib.
narbonensis 1112
nissoliana 1111
onobrychoides ib.
peregrina 1112

Vicia
pisiformis 1110
sativa 1112
sepium 1111
serratifolia 1112
silvatica 1111
tenuifolia ib.
Villarsia 306, 447
aquatica 447
Vinca 294, 435
lutea 435
major ib.
minor ib.
pusilla ib.
rosea ib.
Viola 302, 412-414
arborescens 414
arvensis 413
biflora ib.
calcarata 414
Calceolaria ib.
canadensis 413
canina ib.
cenisia ib.
cordata 412
cornuta 414
cucullata 412
decumbens 413
diandra 414
enneasperma ib.
grandiflora ib.
hirta 412
Hybanthus 414
Ipecacuanha ib.
Itubu ib.
Krockeri 412
lanceolata ib.
mirabilis 413
montana ib.
nummularifolia 413
obliqua 412
odorata ib.
Viola
oppositifolia 414
palmata 412
palustris ib.
parviflora 414
pedata 412
pinnata ib.
primulifolia ib.
procumbens 413
pubescens ib.
pumila ib.
riphæa ib.
sagittata 412
stipularis 414
stricta 413
suffruticosa 414
tricolor 413
uniflora ib.
villosa 412
Virea 1162, 1174
scabra 1174
VIRECTA 297, 334
biflora 334
Virola 526, 570
sebifera 570
Viscum 217, 273
album 273
antaroticum ib.
capense ib.
flavens ib.
macrostachyon ib.
opuntioides ib.
pauciflorum ib.
purpureum ib.
rotundifolium ib.
rubrum ib.
terrestre ib.
verticillatum ib.
VISNEA 740, 767
Mocanera 767
Vitex 890, 962, 963
Agnus castus 963
altissima 962
divaricata ib.
Leucoxylon 963
Negundo ib.
ovata 962
pinnata 963
sinuata ib.
trifolia 962
umbrosa 963
Vitis 301, 421
arborea ib.
heptaphylla ib.
heterophylla ib.
japonica ib.
indica ib.
Labrusca ib.
laciniosa ib.
pentaphylla ib.
trifolia ib.
vinifera ib.
vulpina ib.
Vogelia 81, 107
capitata 107
Volkameria 890, 961
aculeata 961
japonica ib.
inermis ib.
Kæmpferi ib.
scandens ib.
serrata ib.
Volutella 647, 652, 1459 *sq.*
aphylla 652
nuda 1460
volvata 1459
Votomite 216, 278
gujanensis 278
Voyria 293, 334
cærulea 334
rosea ib.

Wachendorfia 82, 120
graminifolia 120
paniculata ib.
thyrsiflora ib.
Walcuffa 998, 1029
torrida 1029
Wallenia 211, 246
laurifolia 246
Waltheria 996, 1008, 1009
americana 1008
angustifolia ib.
caroliniana 1009
elliptica ib.
indica ib.
ovata ib.
Webera 776, 820
quinquenervia 820
WEIGELA 291, 337
japonica 337
Weinmannia 602, 636
hirta 636
parviflora ib.
pinnata ib.
racemosa ib.
tomentosa ib.
trifoliata ib.
Willdenovia 298, 362
Schreberi 362
WILLICHIA 82
repens ib.
Willugbeja 296, 434
accida 434
gujanensis ib.
WINTERA 780, 852, 853
aromatica 853
axillaris 852
granadensis 853
Wisenia 312, 515
indica 515
Witheringia 211, 247
solanacea 247
WITSENIA 82, 107
maura 107
Wormia 780, 851
triquetra 851
WULFERIA 20, 40
carinthiaca 40
WURMBEA 527, 587
capensis 587
Xanthium 305, 464
americanum 464
echinatum ib.
fruticosum ib.
orientale ib.
spinosum ib.
strumarium ib.
Xanthorhiza 604, 646
apiifolia 646
Xanthoxylum 312, 509
caribæum 509
Clava ib.
trifoliatum ib.
Xeranthemum 1163
1218 *sq.*
annuum 1218
Xeranthemum
bellidioides 1218
canescens ib.
fulgidum 1219
imbricatum 1218
paniculatum 1219
proliferum 1218
recurvatum 1219
retortum 1218
sesamoides 1219
speciosissimum 1218
spinosum 1219
squamosum ib.
Stæbelina ib.
stoloniferum ib.
variegatum ib.
vestitum 1218
virgatum 1219
Xerophyta 522, 530
madagascariensis 530
Ximenia 615
americana 615
elliptica ib.
inermis ib.
Xiphidium 82, 119
floribundum 119
Xylocarpus 600, 611
Granatum 611
XYLOPHYLLA 311, 499
angustifolia 499
latifolia ib.
longifolia ib.
montana ib.
Xylopia 282, 866
glabra 866
muricata ib.
Xylosma 771, 797
orbiculatum 797
suaveolens ib.

Xyloſtroma 1287
1442
giganteum 1442
Xyris 83, 122
americana 122
indica ib.
Xyſtris 300, 390
Schreberi 390

Yucca 525, 562
aloifolia 562
Draconis ib.
filamentoſa ib.
Glorioſa ib.

Zamia 781, 863
anguſtifolia 863
Cycadis ib.
pumila ib.
Zannichellia 418
paluſtris ib.
Zanonia 310, 500
indica 500
Zea 85, 148
Curagua 148
Mays ib.
Zinnia 1165, 1246
Bidens 1246
multiflora ib.
pauciflora ib.
verticillata ib.
Zizania 526, 579
aquatica 579
paluſtris ib.
terreſtris ib.
Ziziphora 20, 43
acinoides 43
capitata ib.
hiſpanica ib.
tenuior ib.
Zœgea 1165, 1263
aleppica 1263
capenſis ib.
Leptaurea ib.
Zonnia 1076, 1096
bracteata 1096
Zoſtera 781, 863
ciliata 863
marina ib.
oceanica ib.
ſtipulacea ib.
uninervis ib.
Zygophyllum 657,
681
æſtuans 681
album ib.
arboreum ib.
coccineum ib.
cordifolium ib.
Fabago ib.
maculatum ib.
microphyllum ib.
Morgſana ib.
ſeſſilifolium ib.
ſimplex ib.
ſpinoſum ib.

INDEX II.

NOMINUM TRIVIALIUM ſ. PROPRIORUM, ET SYNONYMORUM.

Not. Quæ literarum characteribus conſuetis expreſſa leguntur, nomina Specierum trivialia indicant, quæ vero curſivis, Synonyma ab aliis uſurpata.

Abelmoſchus 1066
Abies 1073
Abrotanum 1209
Abſinthicum 1211
Abſus 668
Abutilon 1048
Acango 529
Acanthium 1190
Acarna *ib.*
Acetabulum 1365, 1459
Acetoſa 586
Acetoſella 734
Acetoſellus 586
Achæmenis 897
Achenia 1061
Achillea 1206, 1208
Achras 398
Achirantha 427
Archyranthes 426
Acidoton 1036
Acinodendron 688
Acinos 913
Aciphylla 480
Aciſonthera 605
Acmella 1193
Achronychia 619
Acroſpermum 1478
Acroſtichum 1311, 1322
Acturus 938
Aeuſi 443
Adenanthera 554
Adenoſtema 1256
Adhactota 32
Adiantum nigrum 1304
Adima 422
Ægagropila 1395
Ægiceras 747
Ægilops 644
Ægilops 196 *ſq.*
Aeginetia 955
Agallocha 203
Agara 1390
Agaricus 1430 *ſq.* 1440
Agarum 1390
Agaſtachys 145
Ageratoides 1200
Ageratum 1252
Ageria 31
Agnus caſtus 963
Agrimonia 1195
Agrimonoides 757
Agroſtis 163, 171,
Ahovai 433
Aira 157, 176
Aizoon 704, 731
Akara 814
Alaternus 400
Alcea 1055
Alectorolophus 923
Alhagi 1123
Alicaſtrum 12
Aliſanus 605
Alkekengi 381
Alliaria 983
Allovia 8
Alnus 282

Aloë 561
Aloides 852
Alsinastrum 643
Alsine 17
Alypum 226
Alysson 908
Alyssum 971
Alyxia 430
Amalago 76
Amalanchier 841
Amanitea 1400
Amarella 462
Amaryllis 537
Ambotai 869
Ambu 418
Amelloides 1239
Amellus 1205, 1237
Ammi 483
Ammodytes 1135
Amomum 483
Ampeloprasum 541
Amsonia 439
Anacampseros 731, 752
Anacardium 493
Anagallis 29, 957
Anandria 1224
Ananas 529
Anastomosis 1449
Anblatum 924
Andrachne 697
Andromeda 620, 622, 626
Andropogon 152, 194
Androsæmum 1157
Anemonoidæ 871
Anguina 102
Anguria 100
Anil 1129
Anisum 492
Anserina 858
Anthelmia 333
Anthemis 1248, 1261
Antheuphorbium 1195
Antholyza 107
Anthora 838
Anthriscus 473
Antostaphylos 621
Apargia 1176
Aparine 240, 241
Aperemoa 869
Aphaca 1109
Apios 763, 1106
Apucuita 668
Aquifolium 287
Arbor toxicaria 389
Arbor tristis 23
Arbuscula 73, 204
Archangelica 482
Arctotoides 1275
Arcturus 938
Arcuma 8
Arcyriæ 1467
Areira 683
Argemone 809
Arguzia 324
Aria 829
Ariboa 788
Arisarum 865
Aristella 191
Armeria 510, 710, 715
Armeriaca 795
Armoracia 975
Artemisia 374, 1250
Artocreas 1478
Aruncus 850
Arundo 171, 579
Arundo 172, 174, 195
Asak 803
Asarina 934
Aschrek 668
Ascidium 1484
Asclepium 489
Asellus 1102
Asigron 1156
Aspalathus 1087
Asparagus 558
Aspergillus 1487
Assa fœtida 479
Aster 1240
Asteriscoides 1261
Asteriscus 1270
Asteroides 1262
Astragalus 1094, 1125
Atamusco 539
Athamanta 486
Atocion 716
Atoto 762
Atraphaxoides 637
Aurantium 1153
Aubletia 45
Auricula 327, 1176, 1459
Auricularia 232, 902
Auricularia 1431, 1440 *sq.*
Auriscalpium 1439
Avellana 637, 966
Avena 171 *sqq.*
Averrhea 287
Azadiracha 681
Azarolus 850
Azedarach 680

Baccabunga 29
Baducca 806
Bæothryon 125
Bailloviana 1386
Balanghas 1034
Balanus 1427
Balsamea 614, 1073
Balsamina 101, 415
Balsamita 1209, 1247
Balsamum 677
Banksia 9, 24
Barba jovis 1099, 1440
Barbula 1335
Barometis 1312
Bartramia 750, 1335
Basiticum 918
Bastera 1386
Batata 574

Batatus 341
Batrachia 1015
Behan 1266
Behen 712, 716
Belladonna 381, 539
Bellidiastrum 1243
Benedicta 1268
Benghas 417
Bengoin 650, 699
Bergiana 628
Bergkia 651
Bermudiana 118
Bernardia 1036
Berula 482
Beryllus 1416
Betel 76
Betonica 32
Betulus 754
Beurreria 394
Bidens 1246, 1260
Bidens 1193
Bihai 423
Bilimbi 128
Bistortæ 638
Blakea 820
Blattaria 378
Blechum 957
Blitum 205
Boæformis 138
Boaria 25
Bohea 821
Bois cochon 614
Bois dentelle 632
Boldus 566
Boletus 1440
Bombarda 1477
Bona nox 346
Bonarota 31
Bonduc 672
Bonducella *ib.*
Bonus Henricus 448
Borbonia 651
Borbonia 1113
Bosvallea 1256
Botrys 449, 893, 1018
Bourgati 467
Bovista 1464
Brathys 1156
Breynia 807
Bryopteris 1289
Bryum 1326, 1328 *sq.*
Bubonium 1241
Buceras 702
Buchnera 41, 923
Bulbine 554
Bulbocastanum 475
Bulbocodium 108, 535
Bunius 107, 486
Buphthalmum 1279
Bupleurum 465
Burgoni 801
Bursa pastoris 474, 1383
Byssus 1356

Caapela 1006
Cacalioides 1276
Cacao 1151
Cacatin 688
Cachanlahuan 462
Cainito 395
Cakile 997
Calaba 814
Calabura 811
Calamintha 914
Calamus 568
Calceolaria 414
Calceolus 62, 1436
Calcitrapa 91
Calcitrapæ 1268
Calcitrapoides *ib.*
Calendula 1273
Caliculus 1452
Calinea 805
Callicornia 1245
Callipteris 1311
Callorocea 393
Calyciflora 770, 778 *sqq.*
Calyptranthæ 792
Camara 945
Cammarum 838
Campanella 1431
Campanula 577
Camphora 650
Candel 747
Candelabrum 439
Canifolia 476
Cantharellus 1430
Capillus Veneris 1316
Capraria 947
Caprea 74
Caprifolium 368
Caput galli 1126
Caput Medusæ 198, 759
Caput Medusæ 1444
Caracalla 1102
Caragana 1116
Carambola 728
Carandas 806
Carcharias 1474
Cardamomum 9
Cardiaca 909
Cardinalis 356
Carduelis 1184
Carduncellus 1192
Carduncuulus 1190, 1266
Cari 384
Corica 96
Carota 474
Carum 486
Carvata 59
Carvi 491
Caryophyllus 711
Cascarilla 1029
Cassapoa 96
Cassia 649
Cassine 287
Cassipurea 817

Cassytha 785
Castanea 757
Catalpa 940
Catappa 701
Cataria 899
Catechu 649, 804
Catianus 1105
Catinus atrum 495
Caucalis 474
Cauda felis 554
Cavenia 803
Cedrus 1073
Ceiba 1040
Celosia 463
Cembra 1072
Centaurea 1202
Centaureum 1263
Centaurium 461
Centauroides 1268
Centella 468
Cepa 543
Cepæa 731
Cephalotes 1201
Cerasus 795
Ceratonia 805
Ceratospermum 1476
Cerbarato 1252
Cerefolium 487
Cerei 784
Cereolus 1413
Cerris 644
Ceruana 1257
Cervaria 476
Ceroiana 505
Cervicaria 350
Cererach 1301
Chætophora 1392
Chairi 373
Chamæbuxus 1082
Chamadrys 895
Chamæcerasa 368
Chamæcerasus 795
Chamæcistus 594
Chamæcristæ 671
Chamæcyparissus 1205
Chamædrys 30
Chamæjasma 634
Chamælea 94
Chamæmespilus 841
Chamæmoly 544
Chamæmorus 857
Chamæpeuce 1202
Chamæpitys 893
Chamæsyce 761
Chamomilla 1249
Champaca 868
Chanas 97
Chaos 1472
Characias 766
Charactera 946
Charantia 101
Chate 100
Cheiranthus 949
Cheiranthus 986
Chelonoides 942
China 582
Chionanthus 49
Chironia 618
Chironium 480
Chloroxylon 649
Chordorhiza 139
Chrysodon 1422
Chrysogonum 556
Chytraculia 792
Cicer 1134
Cicera 1109
Cicla 452
Cicutaria 488
Cineraria 1228, 1276
Cinna 170
Cinnamomum 649
Cipura 118
Citrullus 101
Cladium 137
Clathrus 1390
Clathrus 1467
Clava 760
Clava Herculis 509
Clavaria 1484
Clavaria 1474
Clavis 1421
Clavus 1420
Clavus 1405
Clematitis 591
Clematis 1244
Clinopodium 910
Cliffortiana 357
Clusiana 859
Clymenum 1110, 1112
Clypeolus 66
Cneorum 344
Cobbe 495
Cocculus 756
Cochlearia 972
Cocoës 1367
Cœli rosa 735
Cojan 1114
Colocasia 864
Colocynthis 100
Colpoon 429
Colubrina 387
Columa 637
Columella 1061
Coma aurea 1203
Cominia 495
Commelina 533
Commersonia 799
Conami 203
Connati 253
Conomon 100
Consolida 837
Contra 1210
Contragenea 265
Convallaria 266
Convallaria 558
Convolvulus 639
Convolvulus 347
Cookia 675
Copaja 942
Corallodendrum 1087
Coralloides 1376, 1444
Corallorhiza 56

Nnn nn 2

Coriaria 494
Corindum 642
Coris 1159
Cornu Alces 1444
Cornu Cervi *ib.*
Cornucopiæ 123
Cornuti 875
Coronaria 842
Coronopus 975
Cota 1251
Cotoneaster 841
Cotula 1251
Cotula 1248, 1255
Cotyledon 516, 704
Courbail 667
Cracca 1111
Crassula 519
Crataecea 774
Crater 1452
Craterella *ib.*
Crista 671, 672
Crista castrensis 1343
Crista galli 922, 1087, 1126
Crocodilia 1266 *sq.*
Crocodilium 1267
Crossopetalum 255
Crotalaria 665
Croton 94, 701
Cruciata 241, 462
Crucibulum 1454
Crupina 1264
Crus corvi 157
Crus Galli 829, 157
Crux Andrææ 1160
Cubeba 77
Cucullaria 241, 1079
Cucurbitula 1475
Cujavillus 786
Cujete 943
Culcita 1314
Cumlaban 649
Cumete 787
Cunonia 112
Cuphea 753
Cupula 1461
Curagua 148
Curandas 433
Curcas 1027
Curcuma 5
Cururu 641
Cyani 1264 *sq.*
Cyathus 1430
Cycadis 863
Cydonia 842
Cymbalaria 930
Cyminum 484
Cynapium 486
Cynocrambe 745
Cynops 254
Cynosurus 181
Cyparissus 766
Cyphia 357
Cytisus 1098, 1127

Daboecia 622
Dæmia 444
Dahi 807
Dalea 1139, 1198
Dallbarda 857
Damasconium 592
Dandelion 1169
Datora 379
Dens canis 546
Diadema 1455
Dicera 316
Dicranum 1328
Dictamnus 912
Didire 1104
Didymadon 1333
Diervilla 369
Digitalis 1428
Dilleniana 718, 1040
Dioscoridis 965, 1180, 1220
Docha 173
Dolichos 1094, 1106
Dombeya 1037 *sq.*
Donatia 207
Donax 194
Doria 1229
Doronicum 1230, 1242
Dortmanna 355
Doyenium 1145
Dorgonium 343
Draba 972
Draco 558, 1086
Dracontium 864
Dracunculus 864, 1212
Drakena 265
Droebachiense 1224
Drymeja 143
Dryopteris 1313
Dudaim 109
Duhoon 287
Dulcamara 383
Duna 173

Ebenum 617
Ebenus 1087
Ebulus 497
Ecastaphyllum 1086
Ecbolium 32
Echinomelocacti 784
Echinus 511
Eglantaria 853
Elamifera 614
Elatine 931
Elatines 351
Elegia 201
Elengi 612
Elephas 922
Ellisia 960
Eluteria 505
Elvela 1440, 1442
Emblica 203
Embolus 1467
Emerus 1118
Endivia 1184
Endocarpon 1370

Ensete 567
Entada 801
Ephemerum 331
Epidendrum 1466
Epidendrum 60
Epigeios 172
Epipactis 469
Epiphyllanthus 499
Epipogium 55
Epithymum 285
Epixylon 1471
Eragrostis 180, 183
Erianthos 1039
Erinacea 1100
Erinaceus 1439
Erinus 352, 357
Eriocephalus 1277
Eriopila 574
Erisithales 1189
Erm nea 836
Eruca 989
Erucago 991
Erucaria *ib.*
Erucastrum 989
Erviiia 1113
Erysiphe 1486
Erythrina 1088
Erythroxylon 400, 1028
Esculus 645
Esula 766
Eucomis 545
Eugenia 792
Euodia 258
Eupatoria 757
Euphorbia 442
Eustachiana 807
Euterpe 569

Faba 1112
Fabago 681
Faba indica 1104
Faba nigrita 1102
Faga 284
Fagopyrum 639
Falcaria 483
Falx 176
Farfara 1225
Farsetia 985
Fasciola 66
Favus 1436
Ferulago 478
Festuca 182
Fibula 1421
Ficaria 877
Ficoides 1195
Ficus indica 785
Filipendula 850
Filix 1370
Filix femina 1312
Filix mas *ib.*
Filum 1384
Fiorniana 1034
Fissidens 1338
Fistula 669
Flagellum 138, 1389
Flammula 873, 877
Flos aëris 63
Flos aquæ 1396
Flos cobalti 1397
Flos cuculi 736
Flos jovis 735
Fœniculum 941
Fœnum græcum 1146
Fragaria 861
Frangula 399
Frisea 428
Fructifloræ 772, 778 *sqq.*
Fumana 823
Fumus 1421
Funaria 1327
Fungoidaster 1452
Fusus 1408

Gærtnera 1386
Gaguedi 225
Galactia 1107
Galanga 8
Galaxia 476
Galbanum 484
Gale 284
Galeobdolon 905
Galium 235
Gandarusca 33
Garcini 104
Geaster 1465
Genista 1089
Gentiana 618
Georgia 1327
Gerascanthes 392
Gerbera 243
Gethyllis 564
Geum 705
Ghesperubilla 432
Gigas 1448
Gijef 403
Gingidium 474, 481
Githago 785
Glaucium 809
Glaux 1134
Globba 6
Glycina 1086
Gnaphalium 1220. 1282
Gnemon 1003
Gnidia 24
Gnidium 632
Gnomon 1477
Gorteria 1192
Gossypium 1040
Granatum 98, 611, 793
Granum Paradisi 5
Grimmia 1334
Grossularia 420
Grossulariæ 419
Gryllus 165
Guaicuru 652
Guera 614
Guazuma 1151
Guidonia 816

Gutta 810
Gymnandra 922
Gymnostomum 1333

Hælava 932
Hæmanthus 540
Hæmastigma 1455
Hæmatomma 1361
Halicacabum 642
Hamcur 204
Hapalanthus 121
Harmala 750
Harra 990
Hartogia 409
Hafpan 136
Hastile 1175
Hauponis 1198
Hedwigia 1331
Hedypnois 1182
Hedysarum 1086, 1127 *sq.*
Heisteria 1082
Helenium 1240
Heleonaster 139
Helianthemum 825
Helimus 450
Helix 420
Helix 72
Helminthochorton 1394
Helonias 548
Helvella 1430 *sq.*
Helxine 639
Hemionitis 1301
Hepaticæ 870
Herba venti 911
Hermannia 519
Hesperis 981
Hibiscus 1060 *sq.*
Hippocastanum 595
Hippocrepis 1310
Hippomarathrum 489
Hirculus 706
Hirundo 1452
Holodendron 1116
Holoschœnus 125
Holostea 718
Horminum 45
Hospita 683
Hura 9
Huggan 683
Hyacinthus 1416
Hyacinthus 532
Hydnora 1005
Hydrolapathum 584
Hydropiper 638, 643
Hyleanthus 414
Hypericum 1069
Hypochæris 1177
Hypocistis 745
Hypoglossum 105
Hypophylladendron 222
Hypophyllum 104
Hypopithys 635
Hypoxylon 1465, 1474
Hypsolodendron 494
Hyssopifolia 753
Hysterophorus 375
Hystrix 195, 198, 959, 1092, 1476

Jabotapita 682
Jacea 1265
Jaceæ 1263 *sq.*
Jacobæa 1228
Jalappa 342, 377
Jambos 787
Janipha 1027
Jaroba 943
Jatiauca 339
Iberis 973
Icaca 796
Idatimon 819
Jemadophila 1358
Jeminicus 132
Ilex 644
Ilex dodon 99
Illecebrum 1345
Illecebrum 427
Inaa 801
Infundibulum 1452
Inophyllum 814
Intybus 1184
Jolithus 1356
Jonquilla 536
Jonthlaspi 977
Ipecacuanha 414
Iria 132
Irio 982
Ischæmum 164
Isnardi 1267
Isora 727
Ituba 414
Jujuba 401
Jungia 420
Jussieua 768
Justicia 960
Iva 893
Ivira 1034
Ixia 117, 119, 1005
Ixina 278

Kaki 617
Kali 127, 452
Kalmianum 1156
Kanki 612
Karetas 529
Karka 172
Karstiensis 1147
Kataf 614
Kerere 941
Keule 830
Keura 12
Kleinia 1195
Kœlpinia 1183
Kœlreutera 517, 1327
Kœtjape 681
Kopela 427

Labellum 1455
Lablab 1103
Labrusca 421
Laburnum 1115
Lacryma 149
Lactuca 1391
Ladanum 905
Lagetto 632
Lagopoda 1141 *sq.*
Lagopus 221, 1008
Lampas 1064
Lampugeng 6
Lancea 1191, 1315, 1293
Lanceola 67
Lanceolaria 1084
Langaus 7
Languas 6
Lantana 496
Lapeironsia 108
Lappa 1184
Lappago 30
Lappula 315, 750
Larix 1072
Lasianthus 1069
Lathyris 763
Latus 617
Laurentia 357
Laureola 631
Laurocerasus 794
Lavenia 1256
Lebbek 802
Leersia 1331
Leloja 403
Lencea 110
Lens 1113
Lentago 496
Lentiscus 457
Leonatis 910
Leontica 767
Leontopetalon 556
Leontopodium 1278
Leonurus 6, 910
Leptaurea 1263
Leptostachyon 921
Leskea 1341
Leucadendron 1154
Leucadendron 221 *sqq.*
Leucanthemum 1247
Leucoglochin 139
Leucoxylon 651, 942, 963
Levisanus 224
Levisticum 481
Libanitis 893
Libanotis 476, 478
Licaria 574
Ligta 564
Ligustrum 26
Liliago 555
Lilia Agarinthus 552
Liliastrum 555
Liliifera 867
Lilium convallium 559
Lima 184, 456
Limonium 511
Linaria 931
Lineatus 1104
Lingua 59, 877, 1276, 1295, 1429, 1477
Linophyllum 428
Linosyris 1203
Linum 289
Linum stellatum 331
Linza 1391
Lobelia 361
Locusta 92
Lœflingiana 192
Lomenia 112
Lonchitis 1309
Lonchophyllum 59
Lonicera 333
Lophanthes 898
Lotoidea 1140 *sq.*
Lotus 400 812
Lotus 1097 *sq.*
Lubia 1105
Lucidor 113
Luffa 101
Luma 790
Lunaria 585, 1292
Lupinaster 1140
Lupilina 1143 *sq.*
Lupulus 451
Luteola 758
Lychnidea 951
Lychitis 378, 910
Lycium 394
Lycogala 1471
Lycoperdon 1466, 1471
Lycoperdon 1459 1470 *sq.* 1473, 1481
Lycopersicon 384
Lygistum 277
Lysimachia 332

Macqui 751
Macucu 396
Macula 1475
Mæsia 1329
Magaca 121
Mahagoni 680
Mahaleb 795
Majeta 691
Majorana 913
Makal 792
Malus 842
Mammea 1039
Mancinella 1003
Mandragora 381
Manghas 433
Manghas 674
Mangle 747
Mangostana 748
Manihot 1027, 1067
Mapania 122
Mappa 1074, 1397
Mariscus 135
Marmelos 774
Marmetos 749

Marototoni 466
Marrubiastrum 909
Marsilea 1297
Martagon 545
Maru 913
Marum 894
Mastichina 913
Matichodendron 397
Matrella 169
Matricaria 1244, 1250
Max 1102
Mays 148
Meadia 328
Medica 1152
Menium 341, 350
Medulla panis 1438
Melanium 753
Melanocardium 943
Meleagris 545
Melhania 1028
Meliloba 566
Meliloti 1140
Melissophyllum 916
Melo 100
Melocactus 784
Melongena 384
Melopepo 101
Mercurialis 94
Mercurialis 468
Merjamia 48
Meriana 113
Merianella ib.
Metel 379
Metkan 634
Metopium 494
Meum 486
Megereum 631
Michelianus 129
Micranthus 399
Microcos 818
Milium 160
Millefolium 1254
Mini 787
Mioga 6
Mitra 1450
Mitreola 333
Mnium 1326, 1331, 1336, 1348 *sqq.*
Mocanera 767
Moghadd 403
Mokusin 1449
Molle 683
Mollugo 239, 506
Moly 544
Mombin 729
Monetaria 1084
Monnieria 37
Monorchis 57
Monsoniana 626
Moræa 114
Moringa 673
Morio 52
Morsus ranæ 654
Morysana 681
Moschatellina 643
Moscheatos 1005
Moschus 1263
Mouriri 678
Mourocenia 497
Mucedo 1484, 1486
Mucilago 1466
Mucor 1425, 1481
Mucor 1357, 1462, 1466, *sqq.* 1471, 1484, 1487
Mungo 1102
Mungos 333
Murcila 723
Murex 965
Murrubium 1198
Murucuja 501
Musa 423
Muscari 560
Muscipula 716
Mussænda 433
Mutellina 485
Mutellina 1210
Myagrum 971
Miconis 1248
Myosuros 64
Myrica 1382
Myrobalanos 729
Myrrhina 1018
Myrthiphyllum 363
Myrtillus 620
Mystax 1014
Myxa 392

Nagi 284
Napeta 401
Napellus 838
Napus 988
Nardus 166
Narthecia 554
Nasturtium 980
Neckera 1340
Negando 616
Negundo 963
Nelumbo 812
Neoltia 59
Nepeta 914
Nepetella 900
Nepita 914
Nica 1116
Nidus 1301
Nidus avis 56
Nigellastrum 722
Nigrina 927
Nil 340
Ninsi 483
Niruri 203
Nissolia 1109
Noli tangere 415
Nostar 1447
Noucheli 811
Nuga 673
Nummularia 331
Nummularius 401
Nutrix 1098
Nux Vomica 387

Nyctanthe 233
Nictelea 1330

Occarium 1439
Ochrus 1108
Octoblepharis. 1331
Octosperma 1453
Oculus Cati 1217
Oculus Christi 1240
Ocymum 902
Odontites 923
Œnoplia 401
Offa 1404
Oleander 435
Ollaria 818
Olus atrum 490
Onites 912
Onobrychis 1126, 1133
Ononides 768
Opobalsamum 614
Opopanax 490
Oporina 1242
Opulus 496
Opuntiæ 785
Orellana 812
Oreoselinum 476
Orsota 803
Orchis 61
Ormithis 51
Ornus 75
Orontium 934
Orthotricha 1335
Orvala 904
Osmunda 1385
Ostruthium 488
Ostrya 754
Otites 713, 1307
Oxyacantha 830
Oxycedrus 1004
Oxycoccus 622

Padus 794
Pagapata 747
Paliurus 400
Pallas 1101
Pallor 1400
Palmetta 1388
Palmetto 569
Palove 1028
Panaces 480
Panacocco 1116
Pandacaki 434
Panicum 166, 196
Papaver 1053
Papaya 701
Papillaria 1377
Papiria 564
Papyrus 133
Pardalianches 1243
Pareira 1006
Parelias 764
Parellus 1364
Parietaria 268
Paronychia 427
Parqui 388
Parretaria 270
Parsonsia 753
Parterium 1135
Parthenium 1249
Passerina 633
Patagua 1026
Patientia 584
Patumo 812
Pavetta 364
Pavia 595
Payco 448
Pecan 755
Pecten 487
Pectis 1245
Pelecinus 1137
Peloria 931
Pemphis 753
Penæa 1082
Pentapetes 1038
Pentstamon 928
Peplis 761
Peplus 763
Pepo 101
Perado 287
Paragua 497
Perebea 96
Pereskia 786
Periclymena 368
Peripea 952
Periploca 439
Persea 650
Persica 793
Persicariæ 637 *sq.*
Personata 1184
Pes capreæ 244
Pes tigridis 347
Petasites 1225
Petesia 277
Petroselinum 493
Petigeræ 1373
Peziza 1478
Peziza 1431, 1450, 1461
Pharnaceum 105
Phegopteris 1310
Phellos 643
Phelypæa 924
Phlegmaria 1289
Phleum 75
Phlomidis 962
Phœnix 180, 190
Phœnopyrum 841
Phormium 532
Phu 91
Phylica 410
Phyllanthos 785, 1050
Phyllanthus 499
Phyteuma 356, 758
Pica 1306
Picea 1073
Picris 1178
Pileolus 1458
Pilosella 1176
Pilularia 1383
Pimenta 792
Pinaster 1071

Pinastra 126
Pinea 1072
Pinguin 529
Piperella 914
Piperita 258
Piriri 746
Piscidium 972
Pistolochia 591
Pisum 1446
Pitajaya 784
Pithyusa 764
Placenta 1419, 1475
Placomium 1385
Plantago 591
Plectanthrus 917
Pneumonanthe 460
Poa 174
Podagraria 493
Polemonium 345
Pohlia 1335
Polium 896
Pollveria 841
Polygonatum 550
Polygonatum 559
Polypodium 1316, 1321
Pomum 541
Pongelium 726
Ponteria 248
Porophyllum 1196
Portula 578
Portulacastrum 834
Posoposa 701
Præcox 862
Priapus 1391
Primula 325
Prinus 644
Prionitis 959
Prismatocuspi 352
Proteus 1463
Protium 614
Pseud Acacia 1115
Pseudacorus 115
Pseudarmeria 510
Pseudhyssopus 896
Pseudoæmella 1193
Pseudobrasilium 417
Pseudocaspicum 383
Pseudochamædrys 30
Pseudochamæpitys 893
Pseudo - China 583, 1227
Pseudococcinea 48
Pseudocyperus 146
Pseudocytisus 970
Pseudodictamnus 909
Pseudonarcissus 535
Pseudoplatanus 616
Pseudopsidium 787
Pseudosphæria 1480
Psoræ 1365
Psoralea 1128
Psyllium 254
Ptarmica 1252
Ptelea 618
Pteranthus 281
Pterococcus 767, 833
Pterota 258
Pulegium 903
Pulicaria 1241
Pulmonariæ 1366
Pulsatillæ 870
Pumilea 503
Pungam 1086
Pyracantha 840
Pyretrum 1251

Quamoctil 345
Quapara 724
Quebitea 596
Quila 195
Quivisia 682

Radula 945, 1234
Ramariæ 1444
Ramoatchi 852
Rapa 988
Raphanistrum 990
Rapunculus 348
Rarania 485
Ratabulum 1344
Relhaniæ 1207 *sq.*
Remirea 122
Rete 1449
Reticularia 1466
Rhabarbarum 654
Rhagadiolus 1183
Rhapontica 1265 *sq.*
Rhaponticum 654
Rhodora 694
Rhoeas 809
Ribes 654
Ribesia 419
Ricinella 1036
Ricinocarpos 1031
Ripogonum 583
Ritero 1280
Robur 644
Rocella 1377
Rocoubea 836
Rosa marina 1381
Rosa sinensis 1065
Rotang 570
Rothmannia 434
Rotula 1424
Royoc 371
Ruellia 964
Rugi 195
Ruhamon 248
Russula 1401
Ruta muraria 1304
Ruyschiana 915

Sabadilla 589
Sabdarissa 1066
Sælanthus 256
Sæneb 496
Sagarum 1392, 1447
Sagittifolia 812

Sagu 570
Salicaria 752
Salina 1004
Saljunca 91
Salsilla 564
Salsola 422
Salviastrum 895
Sambuc 23
Sambucina 420
Samia 911
Samyda 700
Sanseverina 561
Santolina 1253
Saphia 982
Saponaria 460, 642
Sapota 573
Sappan 672
Sarcocolla 249
Sarsaparilla 582
Sasanqua 1069
Sassafras 651
Saururus 597
Saxifraga 716
Scabiosa 1265
Scammonea 340
Scandix 473
Scariolo 1172
Sceptrum 222, 934, 1411
Sceptrum Carolinum 926
Schangini 1080
Schinoides 458
Schœnanthus 164
Schœnoides 125, 578
Schœnoprasum 543
Schœnus 75, 122, 132, 139
Sciadaphyllum 509
Scirpus 122
Sclarea 47
Scleriæ 137
Scolopendium 1301
Scolymus 223, 1190
Scopa 202
Scoparia 449
Scopolia 380
Scordium 896
Scorodonia 896, 937
Scorodoprasum 542
Scorpiurus 1123
Scorpius 1089
Scurrule 575
Scutellariæ 1362
Sebestena 392
Secamone 440
Sedum 517
Sejal 802
Selago 1289
Selago 27, 226 *sq.* 951
Semen 1481
Seminutum 1458
Semsek 1211
Senecio 1276
Senega 1083
Senejal 803
Senna 669
Sennæ 667
Sensitiva 801
Sera 1236
Seraria 221
Seriana 641
Seriphium 1282
Serpentaria 590
Serpyllum 913
Serra 1307, 1385
Serraria 252
Serratula 1202, 1266
Sesban 1121
Sibthorpia 595
Sida 1040
Sideroxyloides 726
Sidoides 503
Silaus 477
Silene 709, 736
Siler 479
Siliqua 431
Siliquastrum 666
Simaruba 682
Simira 93
Sipho 591
Siriboa 76
Sisarum 483
Sisyrinchium 115
Smilax 559
Soda 452
Soja 1105
Solandra 468
Solandra 360
Solanum 381
Soldanella 343
Solidago 1204
Sonneratia 747
Sophera 670
Sorghum 173
Sparganophora 1197
Spartium 1094
Spartum 123
Speculum 352
Spelta 200
Sphærocarpon 1089
Sphærocephala 1468
Sphærocarpus 1471
Sphærospermos 399
Sphondilium 480
Spica 900
Spica venti 168
Spicanthus 1293
Spilanthus 1193
Spina Christi 400
Squamula 1430
Stæhelina 1219
Staphis agria 837
Stelis 576
Stella 1134
Stewartia 1069
Stigma 1476
Stilbum 1484
Stipa 177
Stæbæ 1267

Stœbe 1264
Stœchus 900
Stratiotes 565
Strathiopteris 1293
Styraciflua 832
Suber 644
Sunsub 668
Sur 97
Surubea 407
Swarzia 1321
Sycomorus 96
Symphoricarpos 369

Taab 98
Tabacum 380
Tabernæmontana 439
Tabularia 1443
Tachia 244
Tæda 1072
Tagera 668
Tagetes 1277
Tagore 383
Taius 1475
Tamaquarina 438
Tamonea 37, 689
Tanacetum 1207, 1277
Tanarius 1074
Tanacarvilleca 60
Taniboa 689
Taobona 798
Tapia 749
Tapogomea 372
Tapura 93
Taquari 746
Taraxacon 1175
Taraxacon 1174 *sq.*
Tartonraira 631
Tataria 992
Tatula 329
Tazetha 536
Teff 174
Telankotta 387
Telephium 731
Tenageia 572
Tendo 1384
Terebinthus 457
Termis 1100
Tetragonotheca 1270
Tetrahit 905
Tetralix 627
Tetraphis 1327
Teucrium 29
Thaliana 987
Thamnia 816
Thapsi 939
Thapsus 377
Thelypteris 1311
Theodora 673
Thevetia 433
Thoninia 388
Thora 878
Thumung 6
Thunbergia 433
Thymbra 897
Thymethæa 631
Thymifolia 753
Thirsine 745
Tibuchina 691
Tiburbu 812
Tiglium 1030
Timmia 1327
Timulu 1082
Tintinabulum 1423
Tinus 496
Tiraculli 760
Tithymoloides *ib.*
Tobira 407
Tococa 690
Toka 98
Tomex 246, 745
Tonxat 8
Toqueve 393
Tora 668
Tordylium 473
Tortula 1333
Totta 623
Toxicaria arbor 389
Toxicodendrum 494
Trachelium 350
Tradescanti 1233
Tragacantha 1135
Tragium 492
Tragoriganum 913
Tragus 452, 1272
Tremella 1369
Tremella 1459
Trenta 229
Trichia 1470
Trichia 1468
Trichomanes ramosum 1304
Trichomanis 1348
Trichostomum 1332
Tricticæ 1468
Trifolium 1121, 1138
Trichosanthes 500
Trionum 1067
Triplium 843
Tripolium 1232
Trixago 923
Troglodytarum 567
Tscampaca 868
Tuba 1451
Tuberaria 824
Tubulifera 1472
Tulipifera 867
Tuna 785
Tupa 355
Turbith 489
Turpethum 341
Typhalæa 1059

Ulmaria 850
Ulva 1446
Umbilicariæ 1374
Umbilicus 730
Umbraculum 1419
Umbros 32

Unedo 697
Ungi 790
Unguis Cati 800
Uregu 868
Urinaria 203
Urtica 267
Usnea 1379
Usneæ 1378
Ustilago 1472
Utea 93
Utimata 666
Uva crispa 420
Uvaria 561
Uva ursi 697
Uvea 1448
Uvedelia 1270
Uvifera 640

Vaalac 918
Vacaria 710
Vaccinium 622
Valdivia 195
Valerandi 358
Vanilla 63
Venetum 1262
Verbascum 938
Verbesina 1250
Verbesina 1193
Vernix 494
Vesicaria 977
Vesicaria 1142 *sq.*
Vespertilio 501, 642
Vincetoxicum 445
Viorna 873
Vira 1215
Virgaaurea 1237
Viscaria 736
Visnaga 474
Vitalba 873
Vitaliana 325
Viticella 873
Vitis idæa 621
Vochy 20
Volucris 57
Vourcapoa 1086
Vuapa 93
Vulneraria 1099
Vulvaria 449

Wampi 675
Watsonius 111
Webera 1330
Wedelia 1270
Weissia 1334
Winterania 749
Wolgericus 1114

Xanthocarpus 841
Xanthoxylum 285
Xeranthenoides 1191
Xiphium 114
Xylopyrus 401
Xylosteum 369

Yervemora 455

Zabucajo 819
Zanoniæ 121
Zatachendi 917
Zeocrithon 199
Zerumbet 5
Zeugiter 148
Zingiber 5
Zizyphus 400
Zuzygium 792
Zygis 913

F I N I S.